



★ EX BIBL.
REGIÆ CHIRURGORUM
PARISIENSIIUM ACADEM.



6.949

5950

G V L I E L M I

B A L L O N I I

MEDICI PARISIENSIS CELEBERRIMI,

CONSILIORVM

MEDICINALIVM LIBRI II.


A IACOBO THEVART, Facultatis Medicæ Paris. Doctore,
Authoris pronepote, scholiis nonnullis illustrati,
digesti ac in lucem primùm editi.

T O M V S P R I M V S.

*In quo pleraque continentur quæ & ad Morborum cognitionem
eorumdémque curationem propositis Exemplis, & obscurorum
Hippocratis locorum intelligentiam pertinebunt.*

Inter cætera elegantissimùm & utilissimùm est de Calculo Opusculum.

Adiecta est Authoris vita, cum Indicibus necessariis.



P A R I S I I S,

Apud IACOBVM QVESNEL, vñ Iacobæ,
sub signo Columbarum.

M. D C. X X X V.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 309

LECTURE NOTES
BY
PROFESSOR [Name]

1950-1951

Chicago

UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

1950



ILLVSTRISSIMO VIRO
DOMINO D. CLAVDIO
BOVTHILLIER,

SANCTIORIS INTIMIQUE
Confessus Christianissimi Regis Consiliario, &
Primario Sacri Ærarij Comiti, necnon Regij
vtriusque Ordinis Questori integerrimo,

IACOBVS THEVART, Doctor Medicus
Parisiensis. S. D.




*N*ihil mihi (Vir maxime) sed
virtuti tantum tuæ debes, quod liber
hic ab omnibus Philiatris iamdudum
expetitus, sub tuis felicibus auspiciis
in lucem prodit, honori que tuo datur.

Salutaria quæ continet ac tradit Con-
silia nullo alio patrono magis tuta esse poterant, quam
eo qui salutarium ac optimorum Christianissimo Regi
in arduis rebus Gallie Consiliorum auctor existit;

cuiusq; fidei & consiliis cōmissa iam pridem sanctioris
 Aeriarij fuit Praefectura. His tam praclaris nominibus
 nuper te Christianissimus ipse Rex in deligendis ditio-
 num suarum administris longè sagacissimus ac pru-
 dentissimus ex Augusto supremi Senatus ordine in
 Sacrum secretumque suum Consilium adsciuit. In quo
 quantâ sagacitate & auctoritate iudicij aliorum sen-
 tentias dirigas, quàm singulari prudentia tua ipse
 consilia aperias, quàm expedita celeritate, eadem ubi
 opus est exequaris, nemo est qui non passim admire-
 tur ac pradicet. Sed interim dum gravissimis Gallia
 rebus sic inuigilas, dum Te totum das atque consecras
 publicæ saluti, scias velim me tuam ad incolumita-
 tem studia omnia mea votâque dirigere: hoc quippe &
 amplius à me non modò publica illa tua facinora qui-
 bus uniuersam deuincis Galliam iure meritoque re-
 poscunt, sed ea potissimum incredibilis, quâ me sem-
 per parentemque meum complexus es beneuolentia,
 ad id me nec reluctanter cogit & impellit. Huius tuae
 erga nos propensionis quoties recordor, me tibi deuin-
 ctissimum debitorem toties profiteor, unâque doleo
 tenuiorem mihi fundum esse quàm ut me unquam
 eo debendi reatu liberare possim. Sed ecce mihi fide-
 iussor amicus ac sponsor idoneus occurrit BAL-
 LONIVS ille, magni quondam nominis in salu-
 berrima nostra facultate Medicus, cuius eximium
 hoc Consiliorum opus in sinceri mei erga Te animi mo-
 nimentum tuos ad tholos donarij instar humillimus

DEDICATORIA.

appendo. Quod si tibi gratum esse pro solita tua co-
 mitate significaueris, animum ad alia edenda addide-
 ris, qua mihi vitâ decedens, sed numquam moriturus
 Avunculus reliquit non minoris momenti opera: Bene
 ac feliciter vale (Vir iterum maxime) Et quo ani-
 mo Clarissimus BVTHILLIERIVS patruus
 tuus, charissimum parentem meum nuper excepit,
 eodem quaeso me tibi deuotam eius sobolem prosequere.
 Ita fiet ut hoc Opus in tuam clientelam commenda-
 tum, tuaeque dignationi nuncupatum maiorem tui
 nominis splendore apud omnes existimationem sit ha-
 biturum. Lutetiae Parisiorum ineunte anno à sa-
 lutifero partu M. DC. XXXV.





BENEVOLO LECTORI

IACOBVS THEVART Doctor
Medicus Parisiensis, S. D.



IV multumque tacitâ apud me cogitatione perpensi, priusquam hæc GVLIELMI BALLO-
NII auunculi mei, Clarissimi quondam nostri ordinis Decani, antiquiorisque Doctoris opera quæ per me nunc prostant, publici iuris facerem; tandemque rebus diligenter pensitatis de quibus ij maximè sunt solliciti, qui vt sua aliorumve scripta posteritati nota faciant, se nomenque suum omnium censuræ subiiciunt, publicæ rei amor meos nimium prudentes metus vicit: cum præsertim in ea semper fuerim sententia, ab eo tempore quo de hominis vitæ cursu quotidiano iudicare cœpi, eos beatos & aliquâ ratione humano fastigio sublimiores esse, quibus diuino munere concessum fuit, aut facere scribenda, aut

scribere legenda, beatissimos verò quibus vtrumque: sicque dolui summo iudicio, singulari prudentiâ, adeoque eleganti nitidâque dictione conscripta opera, tot vigiliis & lucubrationibus exarata, nostrisque adeò profutura nepotibus, aut in priuatos meos vsus solum verti, aut tandem in blattarum tinearumque escam seruari. Quod ne mihi probro adscriberetur ex omnibus BALLONII operibus editioni paratis, quorum me ille heredem testamentò instituit, Consilia hæc medica primùm in lucem emittenda censui, quòd scilicet à plerisque Philiatris desiderari, nullaque doctissimorum Collegarum (excepto Fernelio) ea de re scripta opera extare animaduenterim. Quæ quidem si diligenter & accuratè euoluas incredibile dictu quàm bene tuis studiis cõsultum erit. Primùm enim perfectam facilèmq; addisces methodum medendi plurimis morbis inauditis & curatu difficillimis qui in hac florentissima Parisiorum vrbe propter frequentiam & celebritatem, sæpiùs quàm alibi gentium aut sanandi aut diiudicandi proponuntur: Deinde verò legitimam & numeris omnibus absolutam, qualèmq; primarij olim Medici celebrarunt consilia ineundi rationem habebis: Denique non paucorum Hippocratis Aphorismorù elucidationem, adeò vt hæc quoque Consilia singularis alicuius commentarij loco meritò esse possint. At verò tuis commodis priuatim inseruiens, vtque vberiore,

& nunquam satis optatum ex his fructum sis percepturus, copiosissimos rerum memoriâ scitûque dignarum indices vocumque Græcarum Latinarumque contexui: alios præterea duos perquam necessarios cùm morborum omnium & symptomatum, tum & Aphorismorum Hipp. qui toto opere explicantur: Denique quæ superflua mihi visa fuerunt multis in locis substraxi, scholiaque aliquot passim iis quæ ex Authoris peculio sunt adiunxi. Licet verò in describenda morborum symptomatumque historia, à capite ad calcem vsque progrediendo methodicum ordinem Author non sit secutus, non minoris propterea existimationis Consilia hæc esse debent. Enimverò id factum fuit quòd è re nata, & pro ratione temporum, quibus ægros inuisit, eorum affectus in commentarium & historiam redegerit, adde quod exquisita ordinis ratio in conscribendis Consiliis parui admodum sit momenti: quam ob causam Authoris seriem immutare nefas duxi, abundèque fuit prædictos morborum indices his subiecisse; quod si mihi laudi non vertatur, satis est tamen quod studio operaque mea in communem usum relata sint. Cæterum aliorum operum seriem & catalogum quibus artem nostram locupletavit idem BALLONIVS, hic non descripsi, neque etiam quod multos fecisse video ad scriptorum commendationem, eum magnis encomiis & laudibus celebrandum suscepi.

quandoquidem id tentare aut aggredi frustranei laboris videri posset, nam quæ super ea re desiderari, tuumq; genium, ingeniumque pellicere & recreare poterunt, abundè & elegantissimè in eius vitâ ex Libro de illustribus Medicis Parisiensibus desumpta, est prosequutus Clarissimus Collega *RENATVS MORÆVS* Medicinæ & Chirurgiæ Professor Regius, summi iudicij & exquisitissimæ doctrinæ vir, cuius hoc non mediocri singularis virtutis argumentum est, quòd sic alienas virtutes quæ plurimis inuidiam aut fastidium pariunt colat, foueat ac prædicet. Interim si quæ hac in editione errata admissa esse obseruaueris, quæ typographo aut mihi imputari possent, exemplarium cacographia, frequentes in his obeli, atque huc illuc sparsi asterisci vtrumq; faciliè excusabunt: quorum tamen compendiarum congeriem (quod multi solent) non struxi, quod ita leuia esse animaduertim vt te remorari nō debeant, deinde verò operis venustas & elegantia tali congerie velut deformi aliquo nœuo plerumque deturpatur. Itaque (*Beneuole Lector*) qui laborem meum ἀνεπιφθότως es obseruaturus, quidquid mei fuit officij diligenter aduertas bonique consulas quæso, eaque ratione audacior factus alterum eiusdem Authoris Consiliorum librū elegantissimum, aliisque dein præstantissima opera non minoris in medicina faciendâ vtilitatis necessitatisque propediem excudenda curabo. Vale.



GVILLIELMVS
DE BAILLOV;
EX LIBRO

RENATI MORÆI
DOCTORIS MEDICI PARIENSIS
ET PROFESSORIS REGII
De Illustribus Medicis Parisiensibus.



NTER cætera ἡ καλὰ ἡ μάλιστα ἀξία, hoc in Thucydide summum & eximium est docente Halicarnassæo, quod neque mendacium vltro dixerit, neque suam ipse conscientiam prodiderit. Quisquis ad historiam scribendam accedit, velim intelligat μὴ δεύτερον τῆ ἀληθείας, præceptoque Phocylidis obsequatur.

Ψεύδεται μὴ βάλῃεν τὰ δ' ἐπιτιμία πάντα ἀγορεύει;

Sic vt nihil odio, nihil amicitia tribuat, non metuat, non speret, non parcat, non misereatur, non erubescat. Vt historia fax est & lumen temporum, sic historia veritas: sine qua degenerat in fabulam ἡ εἰς ἀπάτην ἡ εἰς γόητειαν. Sic mecum ab initio huius operis constitui; vt nihil ad fucum, nihil ad pompam scriberem, nec dissimulatis, si quæ sint, criminibus, nec virtutibus, si desint, inductis. *Elogiorum* ea lex est vt splendeant solis virtutum luminibus, neque vltra hos carceres progrediantur, liberiora sunt βιογραφίας spatia, laudis & vituperij alternat vices, virtutis & vitij coloribus discriminatur; atque vt fidentiùs exultat in commemoratione rerum præclare gestarum, facinora tamen licet vetercundè, ἡ ἀπὸ κινδύνοισι delibat: Facit quod Pictores solent qui dum venustas imagines penicillo exprimunt, n̄uos & v̄bras non prætermittunt, ne conciliandæ magis gratiæ quàm delineandæ speciei lenocinari videantur. In hoc ego imitatus graues & summos viros, in ipsa vitarum descriptione à nonnullis maculis interdum non abstineo; non tam conuiciandi pruritu &

In iudicio de Thucyd.

Lucian. de scribenda hist.

In poem. v̄d.

Idem Lucian. ibid.

Idem Halicarn. ibid.

Vt Elogia differant à vitis.

Plut. in Cimon.

Plutar.

Sueton.

Tacit.

Cassius, Herodia. Corn. Nep. Eunap. libidine, quàm vt insinuem non modò quod sequendum, sed etiam quod sit fugiendum. Quod quidem non ideo longo deduximus exordio, vt in **GVILLEMO DE BAILLOV**, cuius historiam enarrandam suscipimus, multorum criminum aut vitiorum veniam deprecet, quàm vt à me criminationem adulationis remoueam; quod in illo culpandum nihil aut vituperandum inuenerim.

Patria & natalia BALLO- NII. Parens Archite- ctura peri- sus. Is Lutetia natus circa annum Christi millesimum quingentesimum tricesimum octauum, Nicolao patre (quod illi fuit cum Galeno singulare) Geometria & Architectura peritissimo: qui è generosa stirpe **BAL- LONIORVM** apud Vnellos ad Nogentum Retrodi, vbi eorum est nobile pradium, oriundus, sedem & domicilium fortunarum suarum Lu- tetiam transtulerat; allecius fauore atque amicitia *Guillariorum Morta- riorum*, qui eo saeculo primos dignitatis gradus in imperio Gallico erant consecuti. Ex his enim senior supremus Aerarj Tribunus Catharinae Mediceae regia & egregia aedificia molienti, apud qua gratia valebat plu- rimu, *Nicolaum* obtulit, vt eximium Architectu qui linearem daret deli- neationem, & Sacelli illius politissimi Suesfionensis Palatij, & scalarum regiarum quae sunt in postica Lupara, quo erant nec augustius quicquam nec elegantius prisca saecula viderunt. *Andreas* verò *Guillarius* in supre- mo Senatu Praeses vir integerrimae vitae vel eo argumento quod solus cu Sancerrae Comite, & Cancellario Hospitalio Principis Condai damna- toriae sententiae subscribere noluerit; *Guillelmum* Nicolai filium vna cum liberis suis erudiendam in ludum litterarium miserit, ac propriis sumpti- bus aluerit. Florebat ea tempestate Academia Parisiensis non modò ce- leberrimis Professoribus, sed disciplinis institutisque feuetioribus: sic vt *Guillelmus noster*, cum esset procliu ad artes & scientias ingenio, & ad virtutes à natura comparato, intra aliquot annos Graeci Latini que sermo- nis peritissimus, Philologicarum & Philosophicarum rerum scientissi- mus, modestiae, pietatis, temperantiae, ceterarumque virtutum studiosissi- mus euaderet. Vt erat solitudinis amans, expertus curarum, ludi & aleae nescius, honestarum etiam voluptatum negligens, impatiens otij, libro- rum helluo, pulcherrimarum rerum avidus, prorsa, versaque oratione dies & noetes stylum exercens, primas in oratoria & poetica consecutus est: adeo vt qui purius Latine loqueretur, aut floridius scriberet, aut lite- ras pingeret elegantius parem non habuerit. Ita feliciter emenso libe- raliu disciplinarum stadio philosophicisque studiis ex vno Aristotele delibatis de *Pedagogia* cogitare coepit; quae vt hodierna die fax est saeculi & ingeniorum remora, sic ea tempestate fax fuit eruditionis, virtutis & gloriae seminarium. Annis aliquot in Montano Athenaeo humaniores docuit literas, quae ornamenta sunt superiorum disciplinarum; deinde inualecente eruditionis fama ad Aristotelem (quem nonnulli ex Acade- mia exterminare contendebant) explicandum accitus & inuitatus fre- quentissimum auditorium habuit nobilium illustriumque discipulorum, qui tam ex eius ore facundo & erudito philosophiae praecpta, quàm ex modesto & verecundo eius vultu virtutum exempla hauserunt. Interim

Detes eius.

Literas humanio- res & phi- losophiam docet.

Verò sub *Rachæo, Contæo, & Dureto* seniore Parisiensibus Medicinæ Professoribus rudimentum eius artis posuit, cuius postea futurus erat ornamentum. Tunc temporis erat Medicina velut in ætatis flore constituta, ex quo sub *Copo, Briffoto, Ruellio, Tagantio, Andernaco*, ex cineribus Arabum reuiuifcens, & adolescens sub *Hollerio, Flexelio, Syluio & Fernelio*, qui beatissimis suis consiliis emorientem Valesiorum stirpem sæcundissimâ prole ad vitam excitauisset; cœperat florere & vigere ducibus *Varaæo, Dureto, Rochæo, Fabro, Pietreo, Lassillæo*, auctoritate, gratiâ, dignitate, gloria, opibus locupletata. Hoc lenocinio excitatus *Guilhelmus* ad præclarissimam artem, Baccalaureorum numero adscriptus est anno 1568. ac sequenti biennio post *Martinum Akakiam* *ιατρῆς παιδῶν*, primum in licentia gradum obtinuit; cum alioquin quatuordecim haberet Commilitones & Antagonistas, atque inter eos viros egregios doctrina & eruditione illustres *Antonium Valetum* Hollerij scholiam, *Nicolaum Ellenium* scholæ nostræ Athlantem, *Henricum Blacuodæum*, *Ioannem Amicum*, *Ioannem Pelleterium*, *Claudium Bazinum*, & *Antonium Bruelium*, qui licet in eodem ordine, & sub iisdem ducibus cum *GVILLELMO BALZONIO* meruissent & pugnauissent, attamen non nisi post eum sacramento legibusque soluti missionem & exauctorationem adepti sunt. Renunciatus Doctor à *M Nicolao le Grand*, anno 1570. sic se ad omnia Doctoris munia & officia exequenda comparauit, qua disputando, qua orando, qua docendo vt per quadraginta sex annos continuos suam stationem deseruisse non perhibeatur. In palæstra Medica tam strenuus pugil, disputator tam vehemens, tam acutus syllogismorum artifex, & subtilis argumentorum architectus, vt non solum in commentariis nostris ab eruditissimo Gourmeleno *Vir acutissimus*, sed etiam vulgò *flagellum manus Baccalaureorum* singulari Elogio diceretur. In componendis adomandisque *Thesibus*, siue sententiarum vbertatem, siue sermonis ornatum, siue polymathiam, siue concinnam rerum recto ordine coherentium seriem spectes nemini postremus: sic vt (quod hæcenus in scholis nostris fuit inauditum) eruditissimam Thesiam: *Αν τις τις hominum sua μετὰ πικρῶ μὲν, suis Genus*, bis disputandam proposuerit, anno scilicet 1602. & rursus anno 1615. omnium Medicorum rogatū perfectissimum illum & absolutissimum ingenij fœtum suspicientium, è quo licet breui & exiguo plus ille laudis & nominis est consecutus,

Quam leuis è tota Marsus Amazonide.

Thesum apud Medicos Parisienses compositio vt varium & eruditum opus sic difficile, arduum, & argutum: concisa dictio sed compta, artificium singulare, sed de industriâ inuolutum, multiplices rerum & verborum ad gratiam non ad lasciuiam comparatæ delitiæ, eruditio mascula non elumbis, condita sententiis non lenociniis epicheiremata; syllogismo nititur quinque appendicibus quasi totidem fulto columinibus seu transtris; *περὶ τῆς* duobus primis corollariis exposita & confirmatâ sententiam ducit ad *καταλαμβάνον*, tertio & quarto explicatum & probatum, è quo *συμπέρασμα*, vltima appendice deducitur ad totius negotij comple-

studet Medicina.

Status Medicina saculo Superiori.

Baccalaureatus eius. Alterum licentia locum obtinet.

Doctor factus.

Eximius disputator.

Elogia eius.

Thesum peritus artifex.

Thesis bis disputata.

Martial.

ep. 29. l. 4. Thesis argutum opus.

Ve differunt Theses Medicae Paris. ab aliis.

mentum, argumento tam acri iunctura & subtili stamine contexto, vt artificium non nisi peritis & oculatis innotescat. *Theses* aliorum more si scribas, nihilo plus laboris & industriæ colles, quàm si è libro transcribas: plana & facilis narratio, sed ieiuna & sterilis, nuda & plerumque barbara vocabula, scabra & inculta rerum maceries, nullæ scintillæ dignitatis litterariæ, nulli flosculi, vt occurrunt verba sic cadunt sub numeros, sed sine numeris, sine luminibus nequidem sententiarum quibus disciplinæ solent collustrari. Medicæ autem Parisienses vt verborum suauitate demulcent, sic sententiarum grauitate delectant, doctrina nobiles, arte illustres, rerum varietate mirabiles, totæ tamen suæ. Sese hinc explicant eruditorum ingenia, & in hoc scriptionis genere se produunt probant que tanquam in perplexo omnium opere atque arduo, è quo licet Doctorum eruditionem, facundiam & solertiam æstimare. Præfiscini dictum hic velim ad amolendam inuidiam, neue quemquam meo sermone commoueam, si palam & publicè profitear in isto laudis & studij argumento *Guillelmum* nostrum cæteros omnes anteuertisse. *Thesis* illa bis agitata, semel atque iterum probata, laudata semper, vt & illa, quam de rheumatismo & arthritide exposuit omnes in admirationem rapuere, nonnullos in æmulationem, in societatem gloriæ neminem. Solet plerumque inuidia alienis incrementis insidiari, & comitari incedentes per gloriam non secus ac umbra deambulantes per Solem. Eam tamen *Guillelmus Ballonius*, virtutum suarum splendore extinxit & comitate morum superauit,

Stobæus de inuid. serm. 38. Lior ab-fuit ab illo.

*Facta sequebatur quamuis ingenia lior
Solut hic inuidia fines virtute reliquit
Humanumque modum;*

Claudia. in Stalic.

Decanus electus.

Calamitas scholarum Paris. Pestis. Bellum Chirurgicum.

Collegas enim suos tam fauentes & beneuolos expertus est vt primam illi ordinis sui dignitatem contuleriat, eumque mense Nouembri anni 1580. *Decanum*, qui caput est facultatis, conspirantibus omnium votis in biennium procrearint. Laborauit per ea tempora Medicus ordo Parisiensis duabus maximis calamitatibus *solitudine & seditione*. *Illam* induxerat pestilens lues quæ ferini & contagiosi catarrhi à caputio denominati prænuncia scholas ferari coëgit dispersis Doctoribus & discipulis vrbe & Academiam deferentibus. *Seditionem* mouere aduersus facultatem *togati Chirurgi*, & arroganter publicè profitentes docentesque Medicinam, & impudenter Doctorum nomen & titulum ambientes. Per eas rerum angustias, & in illo negotiorum æstu in vno *Ballonio*, spes omnium & expectatio fuit collocata: vtpote qui & auctoritate qua pollebat, & virtute qua cunctos demerebatur, & morum integritate qua plurimos antecellebat, & animi constantia atque fortitudine qua se à rebus aduersis frangi non patiebatur, vnus esset qui nutantem & labantem dignitatem nostram, labefactatumque imperium sustinere & fulcire posse videretur. Initio quoque sui magistratus nihil prius aut antiquius habuit quam vt *Agyrtas*, circumforaneos, & *Empiricos* quorum capita erant Itali duo *Cyprianus* nescio quis, & *Caurianus* seu *Cabrianus* ex vrbe exter-

Lis in Empiricos.

minaret. Vt gens illa est adulteriis, lenociniis, veneficiis, Astrologicis & superstitiosis diuinationibus famosa, sic se solet tacitis artibus in aulas principum insinuare, & in Nobilium domos qui nihil nisi quod peregrinum est & exoticum amant & admirantur. Horum parricidia vt compesceret reos apud Senatum egit: neue hæc impetigo ad facultatis vsque Medicos serperet, renouandum antiquum decretum omniumque Doctorum sigillis ac nouo iureiurando confirmandum curauit aduersus eos qui societatem inirent cum Empiricis & illegitimè Medicinam exercentibus. Interim aperto Marte pugnandum illi fuit in Ministros medicinæ refractarios, seruire bellum facultati & Academiæ intentantes. Cum enim rogati Chirurghi, superioribus annis subreptitios libellos à Rege obtinuissent non solum de docenda publicè Medicinâ, sed de adipiscendis licentiarum & Doctoratus titulis; sensissentque elusos & reufos conatus suos nouo diplomate regiò à M. *Claudio Rousselet*, primo decanatus sui anno qui fuit 1576. impetrato: ad nouas artes & technas conuolandum rati à summo Pontifice, nescio quo suadente Genio diploma *indulti* nomine extorferunt; quo Cancellario Ecclesiæ Parisiensis facultas demandabatur concedendi illis Apostolicam benedictionem vt licentiatorum gloriâ relucere. Mirare quòse ambitiosa illa societas extulerit, & quo factu in omnium florentissimam Academiam quintam quamdam facultatem introducere sperauerit! Cum itaque verendum foret, ne si taceretur, ius præscriptionis litteræ illæ habituræ essent, coercedusque initio videretur impetus iste nouitatis qui iam Rectorem Academiæ (inconsultus licet ordinibus) cum toto suo ornato & comitatu ad actus Chirurgorum euocauerat: Decanus primò ex postulatione facta in Rectorem, ab illo publicam hanc confessionem extorsit, *pœnitere se facti, & quod contra iura Academia illum actum Chirurgorum exornasset.* Deinde verò litem omnem ad supremum Senatum detulit, & cum Academia eiusque Cancellario ad ipsum prouocauit. Interea summi Pontificis fides & æquitas imploratur, multorum Purpuratorum Estensis, Pelleuzi, Rambulieti auctoritas interpellatur, Foxij apud Pontificem Oratoris Regij, Mureti, aliorumque clarissimorum vitorum gratia & fauor crebris literis sollicitatur. Quid plura? apud Legatum Pontificium frequentes itiones & reditiones, orationes à Decano habitæ, variæ actionum formularumque argutiæ susceptæ, tandem dicta à summo Præside dies cum duabus aliis integris in Patronorum actionibus insumuntur. *M. I. Chouart, pro Academia prudentissimè summoque iudicio dixit; M. D. Chopinus pro facultate aliquot capita satis plausibiliter perstrinxit: M. C. Robert, pro Cancellario vniuersitatis ingeniosè orauit: M. Augustinus de Thou, Regius patronus breuiter & ad rem conuenienter; Pro Chirurgis M. I. le Verst, à Chirurgo natus & Chirurgorum patronus vastè & effeminatè dixit, Academia cardines & firma facultatis Medicæ fundamenta molliuscula & effeminata oratione concutere ac conuellere giganteo more tentauit.* Nec tamen vt ipse fatetur *BALLONIUS* in Commentariis sui Decanatus, plurimis lisset sumptis laboribus hoc consequi potuit, vt absolutum ea de re Sena-

Decretum in Empiricos renouatum.

Causa litis in Chirurgos.

Diploma pontificiè pro Chirurgis.

Animaduersionis in Rectorem.

Articuli digesti & oblati.

Ex Commentariis facultatis.

Ex iisdem comment. tusconsultam obtineretur. *Desuit, inquit, voluntas nusquam, sed, fortun.* na: *Affectum quidem, sed non perfectum negotium. Nullus non à nobis susceptus labor est, partim ut apud Senatum partim apud Romanam curiam res conficeretur. Nobis is desuit fauor qui in literas, & in publicam rem esse debet. Quod enim commune est negligitur. Accedit quod tot sunt ambages, tot in foro formula & diuerticula, ut ante in medio cursu obruamur, quam portum aliquem conficiamus.* Hactenus commentarij de illo negotio, cui quamuis extremam manum non imposuerit **GUILLELMVS BAL-**

Ad mendandum se applicat.

LONIVS, ita tamen affectit & disposuit; ut illud non solum diuturnitate temporis sponte sit dissipatum, sed ambiciosa Chirurgorum societas sic attrita, ut quæ olim chirurgicarum rerum & medicarum cognitione superbiret, nunc rerum propè omnium ignoracione videatur gloriari. Relicta rerum publicarum administratione **BALLONIUS** ad usum Medicinæ se contulit; in quo tam prudenter feliciterque se gessit, ut inter primi nominis Medicos haberetur acceptissimus gratissimisque viris consultissimis *Marescoto, Magno, Altino, Riolano seniori, Pietrao, Liebantio, Gourmeleno, Miranio, Laurentio, Seguino* Archiatri, quibus fama & gloria par esse potuisset, si quantum doctrina & ingenio valebat, tantum usu & exercitatione voluisset contendere. Sed homo ab omni famæ aucupio alienus, diuitiarum quoque minimè appetens, neglexit adminicula quibus ad summos honores, & facultates conscenditur. Minùs aulâ quàm Musæo delectabatur, magisque ægris plebeis & ignobilibus, quàm illustribus & Aulicis qui Medicos velut catulos in compedibus vinctos & alligatos retinent. Eum *Henricus Magnus* ante urbis deditiorem in oppido sancti Dionysij & benignissimè exceperat, & de rebus grauissimis, præsertim vero de calamitate Parisiensium differenter longo tempore audiuerat; ut si voluisset ad aulam conuolare fauentia habiturus fuisset numina. Sed ab Aulâ velut famulatio abhorrens priuatam vitam amplexus est; exinde anno 1601. euocatus à Rege potentissimo hortante & suadente

Gratus Regi Henrico.

Recusat dignitatē Aulicam.

illusterrima *Domina de Monglas* Regionum Liberorū curatrice, ut curâ susciperet salutis serenissimi Principis Delphini, cuius capite salus orbis continebatur; dignitatem eam recusauit, senilem ætatem, effœtas vires, ingenii que tenuitatem obuiens, ne cogeretur otium domesticum aulico negotio, philosophicamque parcimoniam, Principum delitiis permutare. Ita sui iuris & potestatis factus popularibus suis medicinâ factitauit, non ad aucupandam (quod nunc fieri amat) popularē auram, vel ad opes summo æstu comparandas, sed ad ægrorum tædia leuanda & lenienda, tanta humanitate & comitate ut non instar Archagati à sæuitia vrendi & secandi *hominum carnifex*, sed à mitissima curandi ratione *infantium Medicus*, vulgò nuncuparetur. Interim nihil de studio remittere, Græcos Latinosque auctores probæ & antiquæ notæ diurna nocturnaque manu euoluere, difficillima eorum loca & notare & illustrare, præscam Hippocratis & Galeni doctrinam aduersus Nouatorum calumnias tueri, de grauissimis morbis & peritissimos quosque literis consulere, & vicissim à multis consuli, rariore morbos ac prodigiosos in aduersaria cogere &

Medicus infantium dictus. Labor & studium eius.

explicare, singulorū morborum historias Hippocratis exēplo describere, quotidie aliquid adnotare, obseruare, designare, vt mirum sit negotioso homini tantū studij ad tot monimēta conscribenda; homini verò studioso tantū otij ad tam multa circa ægros suscipienda negotia superfuisset. Cū verò perfectissimum & absolutissimum Medicum sola eruditio non constituat, sed probitas & virtus, cuius gratia cætera quæ in vita contingunt expetuntur; potuit GUILLELMVS BALLONIVS, vt ingenij gloria, sic morum integritate gloriari. Pietatem enim imprimis quæ virtutum est condimentum, ἡ κτηνὰ τῶν πρὸς θεῷ, ita excoluit, vt nullum diem à sacro missæ sacrificio intermisisse perhibeatur: omnia auspicatus à Deo & in Deum omnia referens, vt pote cum Θεῷ περιύτος, ἅπαρ ἄπερὺ πρέμω, præsentē & fauente numine quod inextricabile est, facili negotio explicari posse profiteretur. Tanta autem charitate exarscebat, vt non solum consilio ægros omnibus adiuuentis destitutos solaretur, sed pecuniis subleuaret quas non paucas in pauperes singulis diebus erogasse multi recordantur. Ignotorum miseris illacrymari, aut verbis recreare gementes integrum non est humanitatis nostræ officium, sed egenis prospicere ac dare operam, vt pauperibus alimenta non desint. Licet verò Orthodoxæ religionis incensus amore hæreticæ prauitatis sectarios canepius & angue auerfaretur; non potuit tamen probare pessima eorum consilia, qui Henricum IV. legitimum regni successorem auita hæreditate priuare malis artibus contendebant; sed eius partibus licet in vrbe rebellis non solum tacitè fauit, sed publico monumento quod sub Riueti nomine de calamitate & miseria ciuium Parisiensium conscripsit. Duxerat in vxorem filiam Geruasij Honoræi Pharmacopœi Parisiensis pudicissimam feminam, singularis virtutis, prudentiæ, probitatis, frugalitatis, e qua inter cæteros liberos filium natū minorem susceperat quem Medicinæ destinabat. Sed is postquam multā & virtutis & ingenij argumenta præbuisset, optimoque Parenti propter eximios in literis factos progressus esset acceptissimus, æstro quodam pietatis in familiam Capucinatorum transfiliuit, inscio & inconsulto, vt fieri solet, Parente. Qui cum hoc tristi nuncio quasi turbine afflatus fuisset, subito quidem casu exanimatus & velut è mentis statione dimotus fuit; sed mox reuocata in consilium ratione, & institutum filij diuinæ prouidentię committens in hæc verba Euangelij prorupit, *meliorem illum partem elegisse quæ ab eo non auferetur*, piissimæque hac meditatione recreatus secessum amantissimi filij patientissimè tolerauit. Singulas virtutes quid attinet commemorare? cum obitu suo qui est vniuersæ vitæ ἀπαγγελῆσις, & comœdiæ totius conclusio, quanta sanctimonia & mentis puritate vixerit reliquerit quasi consignatum. Eo enim temporis & rerum articulo quo virtutes & vitia pro suo in nos imperio solent cogitationibus nostris obuersari, eas ad Deum fudit preces, ea constantia venientem mortem excepit, eo spiritu mundi veneficia eiurauit, iis votis in cælum aspirauit, vt igniculos pietatis spectatoribus ingeneraret, cogerétque religiosissimum virum ex Capucinatorum ordine, qui vt vicem absentis filij suppleret illi assidebat, palàm exclamare

*Vir ut de
Eus sic
probus.*

*Pietas
eius.*

*Philo de
nominum
mut.*

*Synes. epist.
139.*

*Charitas
vera.*

*Valent. &
Marcian.*

*l. 12. §. 2. C.
de sacro-
sanct. Ec-
cles.*

*Factioni
non sub-
scripsit.
Vxor.*

*Filius na-
tu minor
Franciscan-
nus.*

*Obitus &
mors.*

in Ballonio se iusti Lothi imaginem atque speculum contemplari.

*Corporis
dotes.*

Quadrato fuit GUILLELMVS BALLONIVS, & obesulo corpore, pleno, aperto, & ad lætitiã composito vultu, raso capillitio & barbitio, suauitate vocis eximia, blando eloquio, & in sales explicato, non daci, non petulanti.

*Ingenium
& virtus.*

Ingenio plurimum valuit, prudentia & sagacitate, laborum patientissimus, virtutum egregius cultor, comis quidem, sed ab vrbãnitãte sæculi alienus, totus in libris, sed in administrãtione rei familiaris propè nullus, quam vxoris prudentiã committebat.

*Stylus &
dictio.*

Stylus illi floridus, limatus, nitidus, & in vtraque oratione prorsa & vorfa accuratus; dictio compta & elegans, circumcisa potius quam diffusa; condendi Epigrammatis insignis artifex, cuius exemplum non pigebit apponere ex Commentariis Dureti in Coacas Hippocratis desumptum, quibus Epigramma præfixit:

*Poeta non
vulgaris.*

*Exit opus tandem, multos quod præsit in annos
Duretus, Coi lux & imago senis:
Fallor non operis, non libri nomina quadrant:
At melius dici bibliotheca potest:
Cunctarum hic seges est medicarum vberima legum,
Et modica medicas mole coerces opes:
Morborum causas & signa, æstus & horum
Legibus & cautè, queis medeare, docet:
Vanalis medicina hac Ilias vnica prodest,
Frustra alios cudes bibliopola libros.*

Liberi.

Ex suauissima vxore liberos quatuor suscepit, duos mares, feminas totidem: Filius natu maior armaturæ militaris inspector & arbiter: minor militiæ Capucinorum nomen dedit, Polycarpi cognomen consecutus, vir vt facundiã sic pietate nulli secundus: filiarum alia D. Chappotino tributarij iudicij Niuernensis Præfidi saltuariõque Præfecto nupsit, altera D. Subleto armatæ militiæ Censori & Aristarcho, quos opimã fati hæreditate beauit.

*Anti-
quior Do-
ctus.*

Obit *Antiquior Scholarum Magister*, anno Doctoratus sui 46. ætatis 78. Christi 1616. elatus in ædem D. Paulo sacram vbi resurrectionem expectat.

*Mortis an-
nus.
Pronepotes
duo.*

Loco filiorum duos Pronepotes habuit Doctores Medicos Parisienses, vnum à forore *Simonem le Letier*, eruditissimum prudentissimumque virum; alterum ab vxore *IACOBYM THEVART*, non minùs virtutum quàm Librorum & Manuscriptorum heredem. Is cultissimi ingenij vir, doctrina & eruditione nobilis, rerum philosophicarum & Medicarum cognitione clarus vt reipub. medicæ dignitatem promoueat, simulque memoriam optimi Senis intermorituram exsuscitet, opera eius omnia publici iuris facere constituit, quod vtcito perficiat omnium literatorum nomine rogo & obtestor, vt si quidem tanti beneficij non sit au-

stor, saltem erogator habeatur. Idem quoque vir Iconem *BAL-Icon.*
LONII pollicetur, vt eodem momento, & mentis imaginem & corpore
 simulacrum liceat intueri.

Inter libros editioni paratos, sequentes in bibliotheca eiusdem clarissimi
 mi *THEVARTII* afferantur,

*Libri
 edendi.*

Consiliorum Medicinalium libri duo.

Epidemiorum & Ephemeridum libri duo.

De virginum & mulierum morbis liber.

Epistolarum Medicinalium liber.

Opuscula Medica de Arthritide, lapide, & vrinarum sedimento.

In quibus omnibus vterum auctoritas contra Ioannem Fernclium de-
 fenditur :

Definitionum Medicarum liber.

Commentarius in librum Theophrasti de vertigine.

Adversariorum medicinalium liber.

De Gibbositate libellus.

Paradeigmaton liber.

*Epitome primorum librorum ꝯ Gal. de simpl. medicamentorum facultati-
 bus.*

Morborum omnium Onomasticum.

*Dicta septem sapientum carmine latino expressa, quę seruantur in Bi-
 bliotheca D. le Letier Pronepotis.*

Amicos, familiares, discipulos eius superfluum esset recensere, cum
 ex Epistolarum & Consiliorum libris repeti facili negotio possint.

Amico.

F I N I S.



IN COMMENDATIONEM
OPERIS D. G.

DE BAILLOV,
CLARISS. MEDICI PARISIENSIS
olim Decani, & Scholę antiquioris
Magistri,

EPIGRAMMA.

D*V*M sua consultus miseris BALLONIVS
agris
Consilia impertit, consulit ipse sibi:
Corporibus tantum, atque ad tempus profuit, at nunc
Victuro aternum consulit ingenio.

IOANNES BERAVLE
Doctor Medicus Parisiensis.



IN DOCTISSIMA CONSILIA
Medica Clarissimi viri D. D.

GVL. DE BAILLOV,
DOCTORIS MEDICI PARISIENSIS
olim Decani, & antiquioris
Scholæ Magistri,

HEXASTICHVM.

SE *urgeri fatis cernens BALLONIVS, atque*
Abrumpi vitæ stamina grata suæ:
Nil facitis, Parca, nec enim minùs ipse salutem
Humanæ, scriptis auxiliabor, ait:
O res mira! aliis nam sic dum consulit, ipse
Producit vitæ stamina grata suæ.

GVIDO PATINVS, Bellouacus,
Doctor Medicus Parisiensis.

IN EADEM.

L*Utrum alij querant: BALLONIVS arte salutem*
Reddit Consiliisque; omnibus absque lucro;
Hoc Medico amissam desperet nemo salutem,
Consilium semper, fit Medicina, bonum.

PINEAV
E iij



A P P R O B A T I O .



ÆC Consilia Medica Magistri GUIL-
LELMI DE BAILLOV, Medici Pari-
siensis celeberrimi, eruditâ oratione &
summo iudicio conscripta, fruuntur eâ
quâ diutius caruere luce, futura rei Medicæ & orna-
mento & vsui maximo. Datum VII. Calend. Iunij.
Anno M. DC. XXXIV.


Fr. BOVIONIER, facultatis
Medicæ Parisiensis Decanus.

EXTRAICT DV PRIVILEGE
du Roy.

PAR grace & priuilege du Roy, il est permis à M. IACQUES THEVART, Medecin de la Royne mere, Docteur Regent en la faculté de Medecine en l'Vniuersité de Paris, de faire imprimer les Oeuures de Medecine de M. G V I L L A V M E D E B A I L L O V, iadis tres-celebre Docteur en ladite faculté, son Oncle, par luy examinez, corrigez, augmentez, & mis en bon ordre, avec defences à tous Libraires & Imprimeurs, & autres personnes de quelque qualité & condition qu'ils soient, d'imprimer ou faire imprimer, vendre, ny debiter lesdites Oeuures de B A I L L O V, ensemblement ou separément, sans le congé & permission dudit sieur T H E V A R T, durant le temps & espace de dix ans, à compter du iour que lesdites Oeuures seront acheuées d'imprimer; à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, & de mil liures d'amende, despens, dommages & interests enuers luy; nonobstant oppositions ou appellations quelconques, Chartre Normande, clameur de Haro, ou autre chose à ce contraire; ainsi qu'il est plus au long contenu en l'original. Donné à Paris le 18. Septembre mil six cens trente-quatre. Signé, Par le Roy en son Conseil. R E N O V A R D, Et scellé du grand sceau de cire jaune.

L Edit sieur T H E V A R T consent & accorde que I A C Q U E S Q V E S N E L, marchand Libraire à Paris, iouyffe du present Priuilege pour le regard de ces deux volumes de Conseils de Medecine, ainsi qu'ils en sont demeurez d'accord par contract passé pardeuant deux Notaires du Chastelet de Paris.

Ce premier volume de Conseils acheué d'imprimer le 10. Feurier 1625.



INDEX CONSILIORVM
MORBORVM ET SYMPTOMATVM
HOC IN OPERE CONTENTORVM.

Numerus prior Consilium designat,
posterior paginae faciem.

D E Capitis dolore. CONS. 1.	fol. 1
De Tabes. Conf. 2.	fol. 4
De turbatis ac cruentis urinis. Conf. 3.	fol. 5
De febre tertiana notha. Conf. 4.	fol. 7
De Colico dolore. Conf. 5.	fol. 9
De pulmonum phlogosi. Conf. 6.	fol. 11
De febre hectica. Conf. 7.	fol. 12
De fluxione biliosa in scoptula & brachia. Conf. 8.	fol. 14
De melancholia Hypochondriaca. Conf. 9.	fol. 15
De colli ac cervicis contorsione. Conf. 10.	fol. 16
De alui fluore. Conf. 11.	fol. 17
De sanguinis stillicidio ab utero. Conf. 12.	fol. 20
De sanguinis profluuiio à partu. Conf. 13.	fol. 23
De febre tertiana typum referente. Conf. 14.	fol. 26
De hepatis inflammatione. Conf. 15.	fol. 27
De duplici tertiana. Conf. 16.	fol. 28
De febre tertiana. Conf. 17.	fol. 30
	De

<i>De febre erratica.</i> Conf. 18.	fol. 32
<i>De febre pestilente.</i> Conf. 19.	fol. 34
<i>De febre tertiana.</i> Conf. 20.	fol. 36
<i>De visus imbecillitate.</i> Conf. 21.	fol. 39
<i>De Asthmate.</i> Conf. 22.	fol. 42
<i>De febre tertiana.</i> Conf. 23.	fol. 49
<i>De Hydroke.</i> Conf. 24.	fol. 53
<i>De febre cum grauibus symptomatis singultu & tussi.</i> Conf. 25.	fol. 57
<i>De doloribus ventriculi.</i> Conf. 26.	fol. 60
<i>De febre continua cum destillatione in pulmones.</i> Conf. 27.	fol. 66
<i>De doloribus ad sternū & spinalem medullam.</i> Conf. 28. f. 71	
<i>De febre quartana cum grauisimo capitis dolore & lienis affectu.</i> Conf. 29.	fol. 72
<i>De vermibus & a'ui fluore cæliaco & dysenterio.</i> Conf. 30.	fol. 73
<i>De luaca passione.</i> Conf. 31.	fol. 77
<i>De Calculo.</i> Conf. 32.	fol. 81
<i>De Epilepsia.</i> Conf. 33.	fol. 124
<i>De alui fluore.</i> Conf. 34.	fol. 126
<i>De scabie & pustulis.</i> Conf. 35.	fol. 134
<i>De febre tertiana.</i> Conf. 36.	fol. 136
<i>De febre purpurata.</i> Conf. 37.	fol. 141
<i>De melancholia hypochondriaca.</i> Conf. 38.	ibidem
<i>De Hydroke.</i> Conf. 39.	fol. 148
<i>De conuulsione.</i> Conf. 40.	fol. 154
<i>De fetore oris & anhelitus.</i> Conf. 41.	fol. 160
<i>De pulmonum affectibus, & an ad pulmonum morbos quadret tenuis diata.</i> Conf. 42.	fol. 174
<i>De ventriculi gangrena. & syderatione.</i> Conf. 43.	fol. 197

- De vena sectione in febris tertianis.* Conf. 44. fol. 199
De Lethargo. Conf. 45. fol. 203
De renum calculo. Conf. 46. fol. 220
De sanguinis per os reiectione ex costarum vulnere. Conf. 47.
 fol. 122
*Questionis explicatio; cur multi valdè valetudinarij viuant, alij
 integrè sani, alij in statu neutro.* Conf. 48. fol. 226
De capitis vulnere. Conf. 49. fol. 233
De lactis asinini præstantia & dotibus. Conf. 50. fol. 236
*Questionis explicatio. An qui Gibbi ex Asthmate sunt ante
 pubertatem moriantur?* Conf. 51. fol. 240
De renum calculo. Conf. 52. fol. 254
De diarrhæa & dysenteria. Conf. 53. fol. 258
De Angina. Conf. 54. fol. 280
De cholera morbo. Conf. 55. fol. 295
De fluore muliebri. Conf. 56. fol. 299
De cholera morbo. Conf. 57. fol. 300
De alui fluore in muliere grauida. Conf. 57. fol. 305
De singultu febrì superueniente. Conf. 58. fol. 306
De febre purpurata. Conf. 59. fol. 318
De Epilepsia. Conf. 60. fol. 331
De Elephantiasi. Conf. 61. fol. 349
De fluore vterino. Conf. 62. fol. 350
De voluulo. Conf. 63. fol. 354
De febre quartana. Conf. 64. fol. 360
*Explicatio trium questionum quarum 1. est de hypnoticis. 2. de vsu
 medicamentorum & præpropere vena sectione in febris qui-
 busdam. 3. De ratione purgandi macilentia corpora.* Conf. 65.
 fol. 372
De fluore vterino. Conf. 66. fol. 380
De febre Hæctica. Conf. 67. fol. 382

De <i>Gonorrhœa virulenta</i> . Conf. 68.	fol. 383
De <i>febre erratica</i> . Conf. 69.	fol. 384
De <i>Hydrope</i> . Conf. 70.	fol. 387
De <i>febre maligna</i> . Conf. 71.	fol. 391
De <i>febre maligna</i> . Conf. 72.	fol. 394
De <i>convulsione & complicatis vteri affectibus</i> . Conf. 73.	f. 395
De <i>pleuritide</i> . Conf. 76.	fol. 400
De <i>febre semitertiana</i> . Conf. 77.	fol. 402
De <i>sanguinis sputo</i> . Conf. 78.	fol. 408
De <i>febre typhode</i> . Conf. 79.	fol. 412
De <i>Gonorrhœa virulenta</i> . Conf. 80.	fol. 413
De <i>febre Assode</i> . Conf. 80.	fol. 415
De <i>hepatis inflammatione</i> . Conf. 81.	fol. 416
De <i>febre continua cum eruptione parotidum</i> . Conf. 82.	ibid.
De <i>febre continua</i> . Conf. 83.	fol. 417
De <i>febre continua cum grauibus symptomatis</i> . Conf. 84.	f. 418
De <i>febre maligna</i> . Conf. 85.	fol. 423
De <i>febre maligna</i> . Conf. 86.	fol. 425
De <i>destillatione in pulmones</i> . Conf. 87.	fol. 428
<i>Questionis Explicatio. Cur exiguâ puris excretionem animus facile deficiat?</i> Conf. 88.	fol. 430
De <i>parotidibus</i> . Conf. 89.	fol. 437
De <i>quartana febre leipothymia implexa</i> . Conf. 90.	fol. 438
De <i>hepatis phlogosi</i> . Conf. 91.	fol. 442
De <i>precautione febris lentæ & destillationis in pulmones</i> . Conf. 92.	fol. 443
De <i>Arthritide</i> . Conf. 93.	fol. 444
De <i>Gonorrhœa virulenta</i> . Conf. 94.	fol. 464
De <i>febre lenta symptomatica</i> . Conf. 95.	fol. 466
De <i>pleuritide nothæ</i> . Conf. 96.	fol. 469
De <i>Ischiade</i> . Conf. 95.	fol. 474

De Carcinomate vteri. Conf. 96.	fol. 476
De destillatione in pulmones. Conf. 97.	fol. 477
De febre continua. Conf. 98.	ibid.
De Dysuria. Conf. 99.	fol. 478
De Mola & fluore vterino. Conf. 100.	fol. 480
De Animi defectione. Conf. 101.	ibid.
Ad facilem vteri gestationem. Conf. 102.	fol. 481
De vlcere in regione pubis. Conf. 103.	ibid.
De vrinae incontinentia. Conf. 104.	fol. 482
De visus imbecillitate. Conf. 105.	fol. 483
De quodam qui per tres menses integros laborarat, vt tanta diu- turnitatis causa in medicos referretur. Conf. 106.	ibid.
De febre quartana, Arthritide & variis affectibus. Conf. 107	fol. 490
De febre maligna. Conf. 108.	fol. 506
De Cordis palpitatione. Conf. 109.	fol. 511
De febre continua cum grauissimis symptomatis. Conf. 110. f. 520	
De febre continua & destillatione ferina. Conf. 111. fol. 536	
De Hypochondriorum phlogosi. Conf. 112.	fol. 541
De febre continua horrida & destillatione. Conf. 113. fol. 547	
De Capitis dolore. Conf. 114.	fol. 550
De febre semitertiana. Conf. 115.	fol. 559
De febre & dentium dolore. Conf. 116.	fol. 566
Encheiridion sanitatis D. Henrico Heruilleo, in militiam Pro- fecturo praescriptum. Conf. 117.	fol. 568
De febre continua. Conf. 118.	fol. 569
De vermibus. Conf. 119.	fol. 572



I N D E X

APHORISMORVM HIPPOCRATIS qui hoc in opere explicantur.

- E**xplicatur Aphorismus 5. libri 7. à furore habito, &c.
pag. 125, & 298
- Explic. Aph. 44. libr. 6. quibus ex stillicidio vrina. p. 78
- Explic. Aph. 65. lib. 5. quibus tumores in ulceribus apparent, &c. p. 270
- Explic. Aph. 45. lib. 2. quicumque pueri morbo comitiali laborant, &c.
pag. 155
- Explic. Aph. 64. lib. 5. lac dare, &c. p. 237. & sequent.
- Explic. Aph. 23. lib. 4. quibus ex morbis acutis aut diuturnis velex vulneribus, &c. pag. 224
- Explic. Apho. 3. lib. 6. in longa dysenteria auersio ciborum, &c. p. 269
- Explic. Apho. 28. lib. 2. febricitantibus non omnino leuiter, &c. p. 205
- Explic. Aph. 6. lib. 2. qui parte laborant aliqua, &c. p. 216
- Explic. Aph. 69. lib. 5. mulieribus rigores ex lumbis, &c. p. 270
- Explic. Aph. 46. lib. 6. qui gibbi ex asthma, &c. p. 240
- Explic. Aph. 34. lib. 4. si à febre habito tumore non existente in faucibus, &c. pag. 290
- Explic. Apho. 26. lib. 7. in forti dolore ventris, &c. p. 303
- Explic. Aph. 34. lib. 5. si grauida aluus fluat, &c. p. 305
- Explic. Aph. 8. sect. 2. Prorrh. corporis partes extremae si celeriter mutantur, &c. pag. 325
- Explic. Aph. ultimus. lib. 5. icterici non valde flatuosi, &c. pag. 516
- Explic. Aph. 43. lib. 4. quoquomodo febres intermiserint, &c. p. 526
- Explic. Aph. 30. lib. 2. circa initia & fines omnia imbecilliora, &c.
pag. 526
- Explic. Aph. 9. lib. 7. à profluuio sanguinis desipientia, &c. p. 312
- Explic. Aph. 13. lib. 6. à singultu habito sternutamentum, &c. p. 309

- Explic. Aph. 22. lib. 1. coëta medicari, &c.* pag. 129, & 493
Explic. Aph. 65. lib. 4. in febris circa ventriculum æstus, &c. p. 498
Explic. Apho. 73. lib. 4. quibus Illia obmurmurant, &c. p. 358
Explic. Aph. 3. lib. 7. à vomitu singultus & oculorum rubor, &c. p. 309
Explic. Aph. 71. lib. 5. quibus cutes circumtenduntur, &c. p. 134
Explic. Apho. 6. lib. 7. in morbis longis immortia. p. 134
Explic. Aph. 18. lib. 4. dolores supra diaphragma, &c. p. 131
Explic. Aph. 41. lib. 4. sudor à somno multus, &c. p. 140
Explic. Aph. 6. epid. melancholici fiunt epileptici & contra, &c. p. 147
Explic. Aph. 9. lib. 4. melancholici fortiter purgandi, &c. p. 130
Explic. Aph. 56. lib. 4. sudor superueniens febrem non soluens, &c.
 pag. 140
Explic. Apho. 38. lib. 4. ubi sudor ibi morbus, &c. p. 141
Explic. Apho. 67. lib. 4. ex somnis timores in febris, &c. p. 144
Explic. Apho. 14. lib. 2. Prorrh. faciei color bonus & mæstitia, &c.
 pag. 498
Explic. Apho. Coac. coloris bonitas & sudores, &c. p. 363
Explic. Aph. Coac. cholera morbus leipyriam soluit, &c. p. 297, & seq.
Explic. Apho. Coac. in potibus submurmurant, &c. p. 282
Explic. Aph. 8. lib. 3. Prorrh. quibus lumborum labores præsequuntur. 301

F I N I S.



BENEVOLO LECTORI
 GVLIELMVS
 DE BAILLOV,
 DOCTOR MEDICVS
 PARISIENSIS S. D.




I vt cuiusque est ingenium, ita se
 limet ac exerceat, præclare de se
 mereri videtur. Et cum exercendæ
 industriæ excolendæque ingenij du-
 plex omnino sit ratio, vna dum pri-
 uato studio addicti in communem
 vtilitatem nihil afferimus, ac si in se ipsa res verteretur,
 altera dum studiorum nostrorum partem cum aliis
 communem esse volumus, vt hæc ab illa longè diffi-
 det, ita vtilitatis & laudis quæ ab alterutra redit, alia
 atque alia ratio existit. Qui priuatis in studiis sese ab-
 dit, maiorem ætatis suæ partem in iis occupans, cum
 secum ipse viuat, sibi soli natus videtur. Cui melior
 inest animus eximia cuiusdam immortalitatis opinio-
 ne imbutus, is priuati sui otii, cui se adiecerat, fructum
 longè fluere ac manare volens; ad alios quoque vult
 pertinere: Sui enim conscius est miseram se aliâs vitam
 propagare, nisi quæ ipse apud se commentus est & in
 vnum contulit, eorû alios participesq; esse velit. Quod

quidem ab re non videtur. Nam in iis qui secum ita viuunt exilis admodum est immortalitatis opinio: in iis contrà quos publici nominis desiderium ac amor tangit, augustum aliquid ac florens existit. Et qui umbrâ & otio delectati falsa temporis vsura abutuntur, tamen si excellentem animo literarû impressam effigiem tenere se existiment, nullo laudis aculeo pungi videntur, cum illam non exprimant, alioqui non ita publicam vtilitatem defererent vt priuatæ seruiatur. Cum verò nullâ laudis spe ducantur atque alantur, eos nihil aut parum falis ac humani habere iudicandum est. Illis pectus refrigescit cum hoc nullus laudis ardor inflammari, quod stolidissimum quemque frigidissimûmq; hominem incendere ac incitare possit. Nimiùm illis scilicet æger est animus, vt quibus non sint stomachi delicatissimæ epulæ quas laus subministrat, quæque acerbiter omnem condire possint ac mitigare. Frustra tot præliorum dimicationes bellicosa sustinuisset Antiquitas, in qua priscum semper aliquid ac nitidum apparuit quod in publicam rem redundaret. Frustra arbores seuisset sæculo alteri posuturas, in excolenda agricolatione tantam operam posuissent: Nec minus ridendi essent qui seposita omni rerum domesticarum curâ in publicæ vtilitatis studium sese conicientes libris de re quavis editis & miro artificio limatis claruerunt. Inanis eorum omnis foret industria nisi cum rebus illis arduis ætatem suam tererent, simul etiam admirabilis cuiusdam immortalitatis opinione, & laudis nullo marcere extinguendæ incredibili expectatione sese sustinerent ac recrearent, quod qui negat suam ipsius inertiam abundè declarat. Quod eo animo di-

ætum acceptúmque velim, vt & instituti nostri consili-
um intelligatur, & hominum sibi solis consulentium
pessima mens condemnetur. Nouimus qui tametsi
publicis scholis multùm profecerint, tam malè tamen
de Publica re mereantur, vt nil nouum cudere, nil scri-
bere, nil in ordinem redigere velint. Non hos labo-
ris vigiliarúmque piget, sed cùm multa studio contri-
gerint, nonnulla alienâ industriâ collegerint, piget ta-
men eorum partem aliis communicare, quorum hæc
ratio est ieiuna admodum & angusto ingenio digna.
Quid attinet me nonnullam operam ponere in iis enu-
cleandis euoluendisque quæ multa sunt apud me ara-
nearum & tinearum ludus & esca? si quid tale velint
posterius, laborent, assequantur, nolo meam industriâ
illis inertiae desidiaeque occasionem dare; belluinum
hoc & libero homine indignum. Si hoc iure nobis-
cum egisset antiquitas, si imensum artium prouen-
tum inuidisset, langueremus nunc omnes ac frigerem-
us. Quicquid agimus, scribimus, excogitamus, id non
est nouum, sed veterum inuentis addimus tantum at-
que amplificamus. Meliùs multò de nobis meruit An-
tiquitas quæ nullum non sustinuit laborem vt multa
vndiq; quæreret, ingenio & industria excoleret, quod
in commodum nostrum verteretur. Immò in eo con-
sumuntur eorum industriæ & curæ, vt posteriorum su-
pellex instructior locupletiorque illorum labore red-
datur. Quò fit ut nos maiorum conatus proximè imi-
tati succideremus nonnullam temporis partem quam
in hunc librum conferremus ac conuiceremus. Si quid
enim aut ingenio nostro quæsiuerimus, aut aliorum
industriâ collegerimus, id ipsum huc contulimus vtili-

tatem non omnino pœnitendam aliis allatum. Sic nulla infamiæ aut fœcordiæ nota nostro nomini hærebit, vt iis contigit qui aut cùm se desidiæ dediderint, omnem laborem detrectent, aut cùm multa aliàs habeant diffusa, dispersâque quorum nōnullus esset fructus, si in vulgus ederentur, nolunt tamen laborum suorum partem cum aliis communem esse. Quod cùm brutum sit ac inhumanum, inde longè nobis recedendum arbitramur: si quid hîc sit lectione dignum, hoc pro arbitratu vtere: sin autem, aliquid afferes limatius ac excogitatum magis quod nos qui huius rei inuentores dici volumus, amplectamur. Vale, & iis qui publico nomine laborant magnam gratiam habe. Lutetiæ Parisiorum. Idibus sextilibus 1572.





VLTVM BALLONI CERNIS SVB IMAGINE, CVIVS
PRAESTANTI INGENIO HOC NOBILITATVR OPVS.
Jaspar Isac facit 1635 *Jacobus Thehart. r. D. M. P.*



G V L I E L M I

B A L L O N I I,

MEDICI PARISIENSIS CELEBERRIMI,
CONSILIORVM MEDICINALIVM

L I B E R P R I M V S.

C O N S I L I V M P R I M V M.

D E C A P I T I S D O L O R E.

A D D O M I N V M A N D R E A M G V I L L A R D V M,
Regium in Consilio Secretiore Consulens.



ETERES partium infirmitates etsi omnino non tolluntur, leniri tamen solent ac mitigari. Eas autem iam vestigia pressisse, ac iam pridem inueterasse, argumento est, quòd cum sopitæ extinctæve iudicentur, eæ veluti postliminio redeunt, sæpe acerbius quàm aliàs nos exercent ac fatigent; siue, quod ferè fit, externa aliqua causa adsit quæ ignauiam morbi exsuscitet, siue ab humoribus qui intus ignaui residet que latent, dolor hîc redintegrandi sui causas principiaque ducat. Inter affectiones, quæ in hominum genus maximam partem sæuiunt, sunt capitis dolores, & ventriculi infirmitas. Hic quidem quoniam, vel ob vsu medicamentorum quibus maxima hominum pars imprudentiùs addicitur; vel ob esculentorum

potulentorumve varietatem, alteratur ac elanguescit; cerebrum autem, quod pars sit externarum iniuriarum procellis maximè exposita, & internis affici solita, cùm in instar cucurbitæ infernè sursum errabundos vapores attrahat. Ac præ cæteris quidem nuper apud me questus es de vetere capitis infirmitate, quam hemicraniam appello, quæ statâ ratâque periodo caput exerceat; vnde capiti conflata comparatâque imbecillitas, vt leuiuscula de causa in subiectas partes illinc tanquam à fonte scaturientes humores præcipientes ferantur. Quinetiam à catarrho in fauces, deinde in pulmones melius, quod vberimè saliva in os recurat, idque cum aliàs, tum maximè dum hemicrania repetit, quæ sua periodo ratôq; circuitu in alteram tantum capitis partem tyrannidem exerceat. Sed vt pluribus paucis antè diebus edisserui, non tam à capite residua hæc superfluâq; materia dimanat, quàm à ventriculo, ab hoc nimirum resudantè tenui sero in os ob consensum ventriculi cum cerebro, quasi ventriculus quâ data porta exoneret sese, eo quo mirum in modum vexatur, excremento. Quamquam imbecilla malèq; affecta pars est; non prius tamen morbus reuifescit, quàm à causa aliqua externa vis ac impressio inferatur. Vnde pertinacè studio, cura, sedulâq; in rem aliquam animi contentione, aut eiusdem perturbatione, cum alioqui sedatus tranquillûsque esset, vetus infirmitas detegitur ac inualefcit. Sed in eo demum virtutis & temperantiæ significatio maxima est, qui causis illis quæ morbos excitant occurrit, vt suo sibi Marte perniciem conciliasse non iudicetur. Et in potulentis, esculentisq; moderatum se præbendo, & in animi perturbationibus quietum ac equabilem, & in aliis id genus temperatum. Ægrè fers admodum, quod liberum in literarum quarum mirum in modum desiderio elanguescis, studium incumbere non permittat aut parata in oculos fluxio, quæ te care frui vetat, quam cum vita eandem æstimas; aut hemicrania, quæ longo annorum flexu confirmata in caput tuum ius, vt sic dicam, vindictarum habere videatur. Si quid consilio possum, censerem iocineris & ventriculi stato tempore rationem habendam esse. Quantum mente ac ratione colligo, duæ illæ partes accusandæ sunt, vt iam pridem illustrium Medicorum qui tibi fecêre medicinam tacitum consilium videtur indicasse. Eorum enim omnis ratio & industria in eo versata est, vt intemperiem iecinoris calidam emendarent, ventriculo robur ac firmitatem conciliarent. Sed & illud addo, corpus tuum iam ad melancholicum statum videtur diuertere, non tam ratione curaru in quibus opprimeris, quarum tamen moli ac magnitu-

dini erecto animo resistis, quàm ætatis descriptione & annorum flexu. Hoc enim iam pridem Hippocratis auctoritate testatum est, corpora biliosa ætatis decursu cum perspiratione earent, melancholica effici. Supprimitur enim humor qui per extima cutis diffusi debuisse, biliosusque humor exassatur, vnde in melancholicum succum facile degenerat. Itaque cum constet hepatis vernaculam esse intemperiem quæ demum variorum affectuum tanquam fomes ac seminarium existat, illa primum corrigetur. Optimè ad eam rem consultum videretur si syrupus ad hanc formam concinnaretur: ℞. succorum endiuia, scar. borrag. depurat. an. ℥. iii. succi summitatum lupul. ℥. j. succi pomor. de curtip. ℥. iii. succi granat. ℥. ii. sacchar. candi & communis partes æquales quod sufficit; fiat syrupus coctus, celo æstuante in usum reduc. Loco huius syrupi in pharmacopœorum officinis asservatur syrupus è cicho. compositus cum rheo. 2. Non vidèberis operæ multum pretij facturis si medicamentis purgantibus corpus assuescat. Nam cum illis nulla amicitia cum corpore intercedat necessitudo, ab iis corpora alterantur ac deteruntur. Deinde in pravam consuetudinè adducuntur; desuescere autem non facile est, aut non commodè id fit. Humores enim qui desides in corpore diu restiterunt, & qui de sanitatis gradu nondum deiecerunt, semel moti ac concitati deteriores redduntur, quàm ipsi fuerunt dum quiescerent. Potes cassia fistulari contentus esse admistò rheo. At ventriculo consultum oportet sumptis stato tempore pilulis aliquot, quibus non tam ventriculi repurgandi, quàm eius confirmandi facultas concessa sit. Conferent pilulæ ex aloe initio pastus, nisi hæmorrhoidum fluxui sis obnoxius. Conferent et pilulæ sub ea forma. ℞. mass. pilul. de aloe ℥. j. aggreg. ℥. ii. cinamomi interior. grana vi. cum aqua bugloss. infus. granor. vi. mastich. fiant pilul. De cerebro quoniam ita queretis, rationis est earum partium curam rationemque habere. Quæcunque enim labes contingit ea, ad inferarum partium morbum ac infirmitatem transferetur. Plura multò sunt quæ in eam rem conferri possunt, sed malo desideres, quàm minùs copiosè accommodatèque ea à me explicari ac pertractari. Parisiis Calend. Februar. 1571.

sectio 6.
lib. 6. epiol.
cc

2. Galenus
Comm. in
Apho. 15.
lib. 3.

Apho.
Et 2. de
diata acutorum. Item
cap. ult. lib.
de consuet.

cc
cc
cc

cc
cc
cc

CONSILIVM SECVNDVM.

Pro Iano Guichonio ad Tabem vergenti.

CV M vigil astitisses Illustri hero tuo ministraturus, plethoricis symptomatis cerebrum foetum plenumque relictum est, vnde perenni defluvio in pulmonibus labes contracta est. Eò quoque aliquid contrulisse videtur consuetudo assidua cum hero phthifico, cuius halitus potest ad alios venenatam mali qualitatem traducere. Hoc enim iam pridem veterum auctoritate confirmatum est. Ergò inueterata iam in pulmones fluxio est, & quæ pulmones iam affecterit labe nulla arte eluenda. Verùm, quòd nondum artuum corporisque vniuersi macies contracta sit, id arguit nondum confirmatam phthisin esse, sed aliqua industria ac arte eleuari posse: Malum hoc funditus tolli posse si quis asseueret, aut effecturum se polliceatur, fraudem is faciet ac decipiet. Duobus modis occurri potest; vno, si quàm maxime poteris legitimam victus rationem seruaueris: altero, si per intervalla seuis medicamentis te accommodaueris, quæ paulò post describam. Hæc autem in victu rata firmâque sunt, somno diuturno abstinebis, ac præcipuè meridiano, frugalis cœna esto, iurulenta parca erunt, ientaculum solo pane constabit, potus nullus esto: Vini vsus huc non confert, cum multis abstinencia vini sanitatem reddiderit. Quoniam tamen abstinere omnino difficile est, metuendumque sit, ne circumcisus vini vsus stomacho imbecillitatem pariat, aqua primo haustu in pastu sumetur, vt viscera superiore abstinencia paulum resiccata, raptò ad sese primo haustu humescant, nec incalescant. In aqua incoquantur myxaria, dactyli, pruna. Quod ad medicamenta, valentiorum vsus parum tutus, malum enim inueterauit; at blandiorum.

- ℞. Cass. ℥j. Diaphœ. ℥iij. cum Elect. Diatrag. & pulp. ziz. yphor.
 fiat bolus aut hic potus. ℞. Decoct. pector. ℥iij. in quibus incoquantur
 folior. sena ℥ij. seminis fanicul. ℥j. s. in express. infund. agar. troch.
 ℥iij. in expr. diss. cath. & Syrup. e bech. an. ℥vj. Diaphœnicon. ℥j.
 fiat potus. Nec verò abundè erit capiti consulere, sed & humoris
 in pulmonem illapsi ratio est habenda. Eò conferet hic linctus.
 ℞. Elect. diatragacant. frig. ℥j. sacch. candi puluer. diaireos, an. ℥ij.
 penidiar. ℥j. B. looch sani ℥. B. cum Syrup. myrtino, aut de hyss. fiat
 linctus. ℞. confect. de rebecca ℥j. vtatur sæpè. ℞. looch sani &

expertis ℥ iij. *Utatur cum baculo glycyrr. Vesperi cubiturus* *Uteris opiata.*
℥. pul. elect. diatraga. ℥ vj. *boli arm.* ℥ j. *β. confer. vesar. veter.* ℥ j. *β. cum*
syrup. de papau. fiat opiata. Hordeata plurimum cōferēt. Nec est quod
 frequenter iis remediis te fatiges, eorum enim vsus incidet maximè
 in magnis temporum mutationibus. Vere appetente venæ sectio
 plurimum utilis erit. In aurora conandum est expectorare ea quæ in
 pulmonibus contenta erunt: depexis in posteriora capillis commo-
 dè adhibebuntur sacculi ex milio & fursure. Commodè in ore ver-
 sabuntur grana mastiches. Deinde excipiendus fumus hoc puluere
 in prunas iniecto.

2 *℥. Nig. Rom.* ℥ iij. *pulu. ros.* ℥ ij. *thuris* ℥ j. *mastich.* ℥ β. His reme-
 diis non pristinam sanitatem, quam non pollicemur, sed longiorem
 iucundiorémve vitam promittimus.

ANNO TATIO.

2 Fortasse suffitus ex aromaticis quales hic & à medendi peritis præ-
 scribi solent non conueniunt in affectibus *juuuenis* capitis: in his enim
 semper coniuncta est grauitas, hanc autem adauget plurium aromatum suf-
 fitus. Nam calida omnia superiora facile petunt, fumis caput opplent. *Gal.*
comm. in aphorism. 28. lib. 5.

CONSILIVM TERTIVM.

Ad consulem Regium turbas ac cruentas vrinas excernentem.

RENVM affectus maximam partem iure hæreditario ad poste-
 ros perueniunt, vt & earum partium quibus commune publi-
 cūque officium à natura demandatum est, sic nimirum quibus ce-
 rebrum imbecillius est, ij ad posteros id vitij transfundunt, vt quem-
 admodum bonorum sic & morborum hæredes constituantur, in cæ-
 teris lithiasis hæreditaria esse solet, quod semini impressa sit dis-
 positio à qua affectus principia causasque ducat. Vita tamen institu-
 tum plurimū ad hanc aut illam partem confert, vt natua dispositio
 corrigatur, vel vt deprauata victus ratione prauorum humorū pro-
 uentus in corpore fiat, vnde lapidis generatio & soboles consequa-
 tur. Affectus quo non ita pridem conflictaris propter insolentiam
 mirum in modum terruit te, cum nulla hætenus rudimenta eius
 extiterint. Doloris tamen species, situs, vrinæ quoq; ipsa malè affe-
 ctorum renum locuples satis argumentum reliquerunt. Non quin

à superis quoque partibus aliquid deerrare possit, ita enim quæ loco supero sitæ sunt partes in eas sua onera deponunt; quæ inferiore sitæ sunt, quæque excipiendis totius corporis excrementis dicantur. Vrinæ arguunt renum affectus, eosque indicant: illac enim traiciunt ac si quid præter naturam contineatur, deuehunt ac in matula ostentant. Arénosæ apparuerunt primum quæ contentum necessarium in renum cauis calculum non arguunt, sed cum vi naturæ deturbentur deijcianturve, generationi lapidis occasiones præripiunt. Alioqui metus foret ne si illic diutius resisterent, in lapidem tandem cogerentur ac coagmentarentur. Cruentæ postea, ac *mezzosæ*, & ad nigrorem deurgentes excretæ sunt, quæ lapilli contenti occasionem, vel opinionem potius fecerunt, cum sæpè eiusmodi excernantur attritu collisive rei duriusculæ renem deterentis. Nam cum corpus id carnosum sit, facile patitur. 2. Quamquam & ab hepate, & à liene præsertim nigrore aspersæ excerni possunt, cum eo loci exasentur aduranturque humores, qui postmodum cum reliqua humorum colluue defluentes nouo colore urinas imbuant ac intingant. Tamen siue à renum pressu attritue res ita euenerit, siue aliunde raptus humorum fiat in renes, vnde & grauitatis sensio adest, quæ lapidem contentum ementiatur, consulendum tamen renibus, vt & non ita facile excipiant onus aliarum partium amandantium à se se excrementa, si hoc aliunde eueniat, siue à propria ipsius renis imbecillitate & morbo id contingat. Id vt aptè commodèque fiat deriuandus est aliò humorum cursus qui præcipientes in renem malè affectu ruunt. Quod vsu syrui huius solemnis facile consequeris, præsertim quo tempore Luna silet.

℞. scariol. acetos. plantag. an. m. j. endiuie, agrim. lupul. an. m. B. foliorum viol. & maluæ an. m. j. bismal. m. B. Quar. semin. frigid. maio. semin. endiuie an. ʒ. j. passul. glycyr. an. ʒ. B. sebest. 4. Caricas tres, summitatum vrticæ mollis m. B. fol. senæ ʒ. j. B. polyp. & semin. carth. an. ʒ. j. corticis myrob. citrin. & tamarin. an. ʒ. j. fiat Decoct. ad lib. j. in col. diss. sacch. quart. iij. express. ʒ. j. B. rhei & ʒ. s. azar. maceratorum in succo end. cum ʒ. j. sant. citr. & ʒ. ij. cinn. fiat syrup. coctus. cap. ʒ. j. B. interlunio Lunæ, cum decocto glycyr.

℞. Diatrag. frig. ʒ. ij. cap. frequenter. ℞. vng. refriger. Gal. aut rosati Mesue ʒ. ij. pro litu regionis renum. Interdici debet vsus eorum quæ mouendarum vrinarum facultate pollent, nam ea ad renes materiam deueherent, & ita obstruerent, vnde malorum incrementum, ideo perperam & ignorata rerum natura plerique au-

dito lapidis nomine, aut renum affectus statim ad vinum album & diuretica concurrunt, ignorantes cautiùs vtendum esse vino albo, præsertim cum corpus scatet excrementis: Hæc enim vsu eorum quæ tenuitate partium prædita sunt, in renem affectum conuehunt, natâque inde obstructio. mirum in modum lædit, efficitque vt morbus quasi rediuius capiat incrementum. Exercitationis magnæ sunt opportunitates ad præcautionem, & curationem calculi; sed hic consideratos esse oportet, ne aut intermissione exercitationis propriæ officij corpus ignauum reddatur, vel exoluatur, vnde magna crudorum humorum copia congeratur; aut vehemētiore agitatione humores agitetur, vnde sursum, deorsum ac in omnem partem impetu facto, tandem eæ onerentur partes quæ imbecillitate aliqua fatiscant. Quomodo affectu renum tentati nimis exercitatione sæpè dolores magnos experiuntur. Videndum ne curiosa nimis & accurata ciborum varietas obsit. Nam varij inde humores generantur qui naturæ conficienti plus faceffunt negotij, quam si res vniufmodi vsu veniant. Quoniam autem renes semel affecti alijs atque alijs exercentur morbis, vnde eorum successio contingit, æstuante cælo ad lac asinum confugiendum: huius eximie sunt dotes cum accommodatè vsurpatur, ita præposterum eius vsu magna incommoda consequuntur. Quod faciliè magno vsu apparebit. Calend. Martij. 1571.

ANNO TATIO.

2. *Simile quid obseruauit Hipp. in Herophonte, qui licet nigra minxisset, conualuit, lib. 1. Epid. sect. 3. & Gal. sub finem lib. 5. de locis affect. inter cætera ea de re commemorabilis locus est apud Aëtium, tetrabibli 3. ferm. 3. cap. 3.*

CONSILIVM IV.

Pro Nobili puella Lodoica de Heruille.

ILLVSTRIS virgo febreprehenditur quæ typo tertianam refert, sed quod & paroxysmi in noctem inciderent, & quod longiores forent, esse notham spuriamque febrem tertianam inferebat. Eo quoque cõtulit verna constitutio calida, sed tepens. Corpore erat fatis malè affecto, & fædis coloribus deturpato, sed illâ insitam

innatamque habebat corporis imbecillitatem; adeo ut toto febris cursu impura humorum colluuius emanaret, locuples congesta cacochymia & in dies succrescentis argumentum. Sic potulenta esculentaque omnia corrumpabantur: sic hectica quaedam corruptela & diaphthora conijciebatur. Exactis diebus tredecim (qui septem circuituum terminus erat) cum & sudores erupissent, & alius abunde lata foret, hinc fluxus quidam diarrhœicus terrore magno apparuisset, sed hic quam primum repressus est, quod non excernerentur quæ excernenda erant, idque magno totius corporis incommodo fieret; tamen quasi rediuius repetiit, & ad tertianum paroxysmum auctarij vice adiectus & alius ut duplex tertiana existeret. At esse mirum oportuit, quod excretae materiae copia malum non terminarit, sed ne minuerit quidem. Quod in omnibus morbis malum. Dubitatum est num secunda esset vena? Aliis non placuit hoc remedium, quod iuuenicula, imbecilla, corpore admodum diffabili, materiaque non tam in venis contenta, quam in mesenterio, in quo magna obstructionum copia contineatur. Aliis secus visum est, qui experientia norint in febribus ab obstructione natis praesens remedium afferre venae sectionem. Itaque omissum remedium hoc. Potuit tamen usurpari, quod febris nulla apparetet vacuitas finitis paroxysmis, impresso nimirum partibus solidis calore. Morbus diurnus, partim lecurus, partim verò non apparebat; diurnus quidem quod maximam partem accessiones in idem tempus inciderint, & eodem desierint: quod ex Hippocratis mente morbum fore longum significat. Securitatem autem designabat accessionum stata periodus & repetitio; ex eiusdem enim sententia periculi immunitas est cum intermissione quocumque modo illa sit. Nam & malignae humorum putredinis & inflammationis metus abest ex mente Interpretis. Itaque febris ex se quidem securitatem pollicetur, sed ratione subiecti patientisque corporis non item, quod viscerum magna impuritas subsit fortasse & diaphthora. Et duorum alterum consequi est necesse, vel ut in longum tempus morbus producat, vel hectica quaedam symptomatica consequatur. Illud enim obseruatum est à venarum mesaraicarum obstructione nasci febres hecticas, quæ diu sine sensu magno agros exercet. Eoque initi consilij extremum peruenit, ut agarico & folliculis obstructionum libertas quaeretur. Nam quæ excernuntur viridia, flaua, & varij coloris recrementa, ea non minuunt paroxysmos, quod arguit id non excerni quod excerni debuit, unde natura opprimitur tantum, sed non alleuatur.

CONSILIVM QVINTVM.

Pro Coquo Domini de Roiffy, colicum dolorem pati se afferente.

INREDIBILE dictu quantis doloribus venter imustorqueatur. Ac sepe exercent in ea parte dolores quos frustra, multis adhibitis remediis siue ea assumantur, siue adhibeantur, soluere aut lenire cogitabis. Iniectis clysteribus non soluantur, medicamentis paulò vehemētoribus irritantur. 2 Primus nostra memoria Fernellius obseruauit sæpenumerò cruciatus excitari, qui quadam similitudine & vehementia colici nuncupantur, quibus tamen non in colo intestino sedes est, sed vel in peritonæo, vel in membranis quæ abdomini ventrisque partibus obtendantur. Non clysteribus, non medicamentis leniuntur. Eorum materia aut flatus est, aut acer æruginosusque humor, qui cum diu restagnans in visceribus restitisset, tandem inusitatam viam in abdominis spatium aut in peritonæum sibi patefacit. Et hæc in diurnis febribus contingunt. Quippe natura depulsionem materiæ crissimque in aluum molitur; & cum nullam expeditam viam nanciscatur, humorem illum è venis ac visceribus in membranas auertit ac deriuat. In quatuor aut quinque id ego deprehendi, qui cum dies aliquot febre confictati fuissent, aut quod eius diurnitatis eos tæderet: aut quod cum primum natam febrem rescindere ac iugulare cogitarēt, inito cum mulierculis, aut præstigiatoribus circulatoribusque hominibus consilio, motum impetumque materiæ impediuerunt. Et cum ea inducias aliquot dies dedisset, resumptis collectisque viribus, iam demum recens furibunda quaquauerfus sese insinuat, vnde dolores priore morbo deteriores exurgunt. Ac vt cæteros omittam, Nicolaus du Saulsay memorandus hîc. Hic febrem tertianam sustinuerat: remedia neglexerat, serò tamen neglecta vsurpauit. Habitu erat melancholico, putri, aut saltem pessimè affecto liene. Cum febris quieuisset, octauo post die astricta aluo, in stomachi capacitate flatum sensit. Pauculo post tempore paulò contractius malum ferè superius orificium occupauit, ac si hic punctum esset aliquod: circa pectinem ad extremum muscoli recti altera doloris sedes, præterea circa renem sinistrum; non quia meo iudicio materia diffusa esset magis, sed in particulis his magis elucebat. Pulsus paruus; sudores, ac veluti animi defectiones; vrinx fluxæ ac sedimentum nigricans diuulsimque:

(sed tales yrinas in melancholicis, & quibus affecta viscera sunt obseruau) pugnatur cardiacis, nil profectum. Ita exactus dolor, ac velut superficiem attingens, vt minimum digitorum appulsum, imò ne rarissimi lintei ferre possent. Descendit in balneum, adhibiti litus, fofus, medicamenta vomitoria vsurpata, nil profectū. 2. Imò sequebat magis dolor. Visus est toxico infectus. Ac eius rei magna erāt argumenta: duodecies repurgatus; & hīc blandis primūm agendum est, nec incepto desistendum. Cum vires languere viderētur, secta fuit vena dextra, alleuatus paulūm, malum recruduit iterum. exhibita sunt iterum medicamēta, secta vena sinistra; alleuatus; ex interuallis datā narcotica, somnum inire nequibat. Sed an hīc sectio venę utilis? Nullus penē est qui à secanda vena nō abhorreat, cum deicta sint vires admodum. Præsentiſſimum tamen remedium, quod materia à centro per metastasim ad habitum corporis viam affectat, & cum illic restitet, potest educi sectione venę. Siquidem tenuis fuisset, per insensilem transpiratum, aut sudores efflasset: sed cum crassa foret, medio quasi itinere obiecta veluti morā resistens, membranas ferit atque diuellit. Lutetiæ Parisiorum mense Maio 1571.

ANNOTATIO.

2. In aliorum scriptis hoc nondum obseruau. Fernelius vocat colicum dolorem non legitimum: dolor non est erraticus, sed in imo ventre fixus manet, & intolerabilis est, fotibus paulum quiescit, sed multo seuior repullulat; imò Io. Fernelius ait eum dolorem aliquando tertianarum febrium (quibus aliquando succedit) modo, repetere ac exacerbari. Non est quod huius rei inuentæ gloriam sibi decernat Fernelius: Nam & Hippocrates aliquid simile in Coacis videtur obseruasse. Verba quidem obscura sunt, sed tamen idem subindicasse mihi videntur: dolores, ait, ex lumbis diuturniores qui febre exacerbantur tertioribus, similiter tertianæ febri, vel in modum quandam tertianæ febris, grumosum sanguinem egerere faciunt: Hoc enim vult dicere, vel eos dolores quadam periodo repetere, more earum febrium quibus successerunt, vel in febribus modum quandam tertianæ retinentibus eos demum repullulare ac reuifescere. Porro in eiusmodi ægris quos obseruauimus, crudelissimè affligit dolor, & tumores quidam nonnullis apparent, vt in fabro lignario cōtigit, qui diutissimè in somnis præ dolore mansit cum colico isto dolore illegitimo: hinc abscessus metuebantur: nec abs re, nam de ijs dictum est ab Hippo. in Coacis, durities circa ventrem & dolores in febrientibus cum horrore, cibum auersantibus, si alio parum humectata non

purgentur ad suppurationem veniet. In ijs nos & frequentibus fotibus, & medicamentis opem attulimus.

2 Hippocrates lib. de affectionibus eos dolores adumbrasse videtur, dum explicat quotuplex sit voluulus, vnus hyemalis: alter æstiuus & ictericus: tertius hæmatites, & autumnalis. Nam ij dolores ad voluulum accedere videbantur.

2 Ioannes Fernelius in talibus balnea vsurpabat, viribus nondum lapsis: ac in balneo ipso medicamentum purgans propinabat: Quod dum agere incipiebat, educi iubebat ægrum e balneo.

2 Acde eiusmodi doloribus quos hic æger noster sustulit, videtur agere aphorismus Coacar. animaduersionum. Quibus dolores Hypochondriorum, oris ventriculi, hepatis, partium circa vmbilicum, hi sanguine per inferiora excreto sanantur, non excreto moriuntur, quia metusest inflammationis.

CONSILIVM SEXTVM.

De pulmonum phlogosi.

Pro puella Nobili Longueil.

FILIA Consulis Regij alui profluuium ac febre prehenditur, in pulmonibus incendium magnum conceptum est. Febris quidem specie benigna ac mitis videtur, tamen nisi occurratur, futurum est, vt in hæcticam degeneret: in pulmonibus erysipelatodes aliquid esse declarat appullus manus ad regionem thoracis; infirmis est pulmonibus, tum quòd id vitij à matre contraxit, tum quòd superiore hyème magna in pulmones destillatione laborarit: hinc difficultas magna anhelitus, hinc pulmonum imbecillitas, hinc pituita patris in iisdem *ἐν τῷ δεξιῷ*, & nisi diligenter provideatur, breui in pulmones factò humoris impetu grauius aliquod opinione nostra malum eueniet. Præterea alius fluit, vomitiòq; ægram fatigat. Quæ deiiciuntur liquidiuscula sunt, & diarrhoïca. Magna vermium suspicio quos putredo magna parit. Nam paulò post propinato ex Rheubarbaro poculo excretus vermis mortuus (quod tãtam corruptelam significat, vt nequidem eam vermes, prognata tamen ex putredine soboles, ferre possint.) Itaque oppugnanda ventris inferioris putredo, quæ febrem hanc penè hæcticam putridam quoque efficit: alterandi & pulmones. Hæc enim quæ adest sitis ingentem in pulmone conceptam flammam arguit. Et cum silentium, frigida

12 **CONSILIORVM MEDICINALIVM,**
haustus, necnon auræ frigidæ inspiratio sitim sedare dicatur ab Hippocrate, eam sitim non explebit frigidæ potus, cum non in aluo æstus, sed in pulmonibus concipiatur: foris illinetur totus thorax Oleo violaceo, & butyro recenti: epithemata cordi & iecinori applicata. Sedatus vomitus. Præscriptum rheubarb. Omnia in melius vertuntur.

CONSILIVM SEPTIMVM.

De febre hectica.

Pro Puella.

Claudius de Heruille circa mēsem Martium cælo cęstuan-
te cepit febricitare. Diaria erat febris quæ primo quoque tem-
pore in speciem quandam hecticæ degeneravit. Acid Medicos pri-
mis diebus latebat ad eam rem parum attentos. Aluus liquida deie-
cit, cinericia, putria admodum. Paucis post diebus aluus restitit. Se-
cta vena, sed frustra. Interiecto aliquo tēporis spacio vrinæ crocæ
turbatæ apparuerūt: illud *χλωροσμία λαμπρῆ* Hippocratis, id est faciei
viriditas collapsa est: breuissimis interuallis deprehensa est collabi
corporis ea tantula quæ inerat corpori moles. Metus maximus fuit
Hecticæ *μαρασμώδους*: fomes in pulmonibus est, & in imo ventre: fe-
brisque complicata est, eleuato subinde ex imis sedibus vapore, qui
cordis intima feriat atque attingat. Hicque considerari debent *ἔξω*,
putredo malæque qualitas per partium inferarum quandam cor-
ruptionem. A cibo refrigerabantur extimæ partes: rubebant genæ
ex interuallis. Itaque non tam de morbo eiusque specie laboratum
est, quàm de curatione, quæ operosa ac difficilis visa est. Nam ari-
ditas cutis & scabrities, marcor, & collapsus repentiè habitus, fa-
cies penè Hippocratica, caloris ad interiora recursus & expansio,
vicissitudóque eius à cibo præsertim, caloris acrimoniâ hecticam
intemperiem ali fouerique declarabant. Institit & quidam hoc ar-
gumento nixus probare hecticam febrem non esse, quòd à cibo re-
frigeratio, non calfactio coningeret. At Galenus exemplo de per-
fusionem calcis adducto vult in hecticis febribus à cibo partes calefieri:
sed non excludit leuem refrigerationem, quam postea calfactio excipiat.
Vel dicemus in iis quibus robusta sunt viscera, calfactio nẽ
statim enasci: quibus contrario modo affecta, leue refrigerium

contingere. Ergo primo quoque tempore hæc instituendi vsurpandique remedij iam demum nata necessitas & occasio videbatur. Sed hæc audito febris hecticæ nomine, non statim ad humectandum refrigerandumve accedere oportebat, eorum more qui empiricâ methodum sequuti, omnia confundunt ac peruertunt. Febris illa hecticæ omnia argumenta præfererat, sed vnde nata, an morbo successerit, symptomaticave, an essentialis, quæstione dignum putatur. Hecticæ rarò primariæ sunt, & vt agnouit Galenus 3. *de præfag. ex puls.* aut à mœrore aut ab ira nascuntur, præeunte aliquâ diaria. Alias causas non agnouit. Nec enim credibile causas procatarticas tantam vim habere, vt primo quoque tēpore partes solidas immutent. Tamen ex tribus vnum videtur probabile. Visus est diariam productam pati cum cælum mense Aprili æstu incandesceret, cui febrî aut celatæ, aut neglectæ hectica promptè successit, vt 8. *Meth.* Gal. ait contingere. Nam faciles sunt morborum successiones in malè præsertim affectis corporibus. Vel potius (vt licet simile legere apud Gal. 3. *de præfag. ex pulsibus*) cum intemperies & superficiali phlogosis ratione cæli æstuantis præcessisset, ecce hectica pestilens quæ contingit aliquando, oborta est, quæ omne medentis consilium ad cardiaca conuerterit. Quod & vrinæ prætendebât, quæ confusa & subcroceæ apparebant, cum nil tale contingere soleat in simplici hectica. Sæpè enim idque primis diebus vrinæ non parum absunt ab vrinis sanorum. Probabile & illud hecticam hanc veluti symptomaticam in corpore macilento malèque affecto ab obstructione, aut vitio totius substantiæ partis alicuius natam. 2. Etenim legere est exoriri sæpè febres lentas ex hecticarum genere à latente obstructione, aut semimala in parte quam corruptela. Sic nimirum focus videtur cor, hepar per consensum cordis, mesenterium, ipsi quoque pulmones. Licet Gal. lib. *de Marasmo* neget pulmonē sedem esse febris hecticæ, quòd pulmo sit humidus, & perpetuo nouo attracto aëre refrigeretur. Sed hoc quàm verum, aliorum esto iudicium. Ac in hoc iuvene pulmo & mesenterium focus videtur, vt ne vno neglecto alteri malè consulari. Itaque hic considerantur intemperies, mala qualitas, putredo, vt perpetuò vrinæ declararunt. Diligenter profligata est mala qualitas, duorumque hæc habenda ratio, putredinis, intemperiei tanquam cuiusdam phlogoseos. 2. Hic tamen opus, hic labor. Audito nomine morbi sectio venæ, cum putredo est, & purgatio; cum autem hectica intemperies est omnis refrigerandi modus & alteratio

2. Gal. 10.

Meth.

14 CONSILIORVM MEDICINALIVM
intelligitur, sed hic grauissimè à plerisque peccatur. Nam ait Gal.
10. *Methodi*, in febribus hecticis si quid peccatur, grauiter pecca-
tur; & cum affectus sit magnus, leuissimū errorem tolerare nequit.
Ac hīc contrariæ multæ indicationes. Ita blandissimè ex interuallis
corpus repurgandum, litus corporis totius, præsertim verò ad
thoracem. Syrupus resumptiuus. Auræ refrigeratio, frigida potus.
Aqua rosarum & violarum: nam & facile penetrat, & summam
refrigerandi vim habet. Massipanes: panis infriatus in iure gallina-
rum, aut caponum. Lac asininum postmodum iure & loco præscri-
betur.

ANNOTATIO.

2 *Obstructio & phlegmone duo sunt quæ impediunt quo minus audacter
in febribus hecticis refrigeremus. Tamen Gal. mauult vsu frigida &
obstructionem & phlegmonem augere, quàm sinere longius serpere hecti-
cam intemperiem.*

CONSILIVM OCTAVVM.

Pro biliosa fluxione.

Anglus annos aliquot laborauerat destillatione biliosa in sco-
ptula, & brachia cum capitis dolore. Destillationis fons cre-
ditus est in capite esse; ita tamē vt hepar præcalidum author prima-
rius crederetur. Metusque tandem est, ne in partes inferas humor
deferatur; illucque aut gonagram, aut ischiadam faciat. Quod vt
ne contingat, omnisque mali præripiatur occasio, remediis iis oc-
currendum. Vinum circūcūdi debet. Corpus Rheubarb. sæpè repur-
gandum. Per tres annos vere & autumnio basilica aperiatur. Luna
silente hyemis tempore repurgetur pilulis ex agarico, sine quibus,
& cocciis. Tota æstate cassia cum rheubarb. Cum fluxio in
motu est applicetur supra partem bolus armenia, aut nutritum:
amura aut aqua falsa: pro capitis dolore paretur Lixiuuum ex
cineribus sarmentorum & vnciiis quatuor fol. senæ mund. Para-
bitur smegma ex nigella romana, roremarino, sale. Item opiata ex
conserua antheos, buglo. borrag. cortic. citr. & myrob. item mi-
thrid. ther.

ANNOTATIO.

2 *De ijs articulis morbis biliosis doctē Aëtius cap. 28. serm. 4. ce-
cyabib. 3.*

CONSILIVM NONVM.

De Melancholia Hypochondriaca.

Pro quodam Mercatore de Montargis.

Mercator quidam variis curis implicatus ac metu mortis percussus cœpit macrescere admodum. Habitus erat macilentus, squallidus: Hypochondria collapsa. Destillatio in pulmones, & difficultas anhelitus. Cuidam Empirico se concrediderat qui accurata diæta catarrhum sistere contendebat, sed frustra id, & inperitè. Luteriæ cum moram nonnullam traheret, cōsultuit medicos vt præsentim malo occurrerēt. Visus est tantum queri de difficili anhelitu, cuius authorem catarrhum accusabant. Oculi erant mobiles, modò fixi, Galli vocant, *εσγαρεζ*, quasi esset attonitus. Quod propter affluentem animalem spiritum fit affatim, deinde propter eum resistētem; E nare sinistra stillabat humor putris serosus, qui si resistaret in cerebro, aut vertiginem, aut epilepsiam accerferet; sed vt accuratè inuestigata est totius mali causa, ac præsertim de difficili respiratione, de qua solum querebatur, laborabamus: inuenimus tandem eum melancholia Hypochondriaca laborare, & in visceribus quasi hēctica quædam affectio deprehensa est. 2. Difficilis respiracionis causa longiùs repetita est, eaque siccitati marcorique viscerum ac cordis præsertim accepta relata est. Nam in ista hypochondriaca affectione siccitas est totius corporis per alimenti proprii corruptionem, siccum est cor calidum tamen calore acris, febrili & squalido. Vnde cum cor flabellationem (vt sic dicam) euentilationemque summè efflagitat præ siccitate, dum sufficiētē motū duplicem non habet ad refrigerationem eius caloris febrilis, statim repetito motu illud compensat ac refarcit. Hinc fit vt dum paulò magis corpus agitatū est, quasi animal ipsum ἀνωγει remaneat & veluti suffocatum. Sic causa difficilis respiracionis & anhelitus potius ad siccitatē cordis incendio iunctam referenda est, quàm ad catarrhum. Non quin pulmones ipsi laborent, vt & cæterum corpus. Itaque in eo omnino versandum est, vt quacunque id ratione fieri possit, corpori prima moles restituatur, tollaturque, tum alimentis, tum medicamentis squallor & marcor totius corporis. 2. Nam vt dicebat quidam ex veteribus, melancholia hypochōdriaca laborantes, tum demum curati dicuntur cum pinguescunt. Corpus renutriendum optimis alimētis, vtendum hordeatis sæpè ac iusculis: pulmones humectandi,

balneis vtendum licet catarrhus dehortari videatur. 2 Sed quoniam extinguendus aut humefaciendus, & temperandus calor ille præter naturam qui omnium illorum malorum autor est, magis speratur felix euentus ex vsu balneorum, quàm sinister exitus. Caput corroborandum, humectandum, conferet lixiuum ex cephalicis & folliculis senæ. Lacti asinino locus erit post diligenter, blandè tamen repurgatum corpus. Etenim licet melancholicum sit, propter eaque vehementioribus vtendum sit medicamentis secundum sententiam Hippocratis: Tamen illud sine consilio & ratione non est vsurpandum, etenim cum in melancholicis humoris potius atriae contumacis copia in promptu est, quam vitium substantiæ, ac praua quædam viscerum diathesis & imbecillitas: illuc tum ad vehementiora remedia conuerti debet consilium, præsentè scilicet viscerum ipsorum robore, quod ab Hippocrate intellectum putari debet: sed cum cachexia quædam est ob alimenti corruptelam, vitiatamque nutritionem, ac viscera vitata sunt ac vieta, illuc ex interuallis blando medicamento vtendum est, vt sensim ac sensim potius therapia consistat in epicrasi quadam, quàm frequenti catharsi quæ vim visceribus alioqui effectis illatura est.

ANNOTATIO.

2 Aëtius cap. 15. tetrabibl. 3. serm. 2. vbi ex professo agit de ijs splenicis quos tussis infestat, & istam tussim soli catarrho tribuunt nonnulli.

2 Mesueus cap. de melancholia Hypochondriaca.

2 Hæmoptoicus erat, sed Hipp. lib. 2. prorrh. admirabiliter scribit Hæmoptoicis non asferre periculum in ijs in quibus dolores melancholici excitantur in dorso & sterno. Quod in historia de Tassino annotauimus.

CONSILIVM DECIMVM.

Pro quodam Nobili cui Collum intortum erat.

Nobilis vir annos natus 45. in bello ciuili perfuga multa tulit, & in tot tantisque discriminibus cœpit laborare destillatione à capite postico, præsertim in humeros & ceruicem. Hinc colli ac ceruicis contorsio quædam, & cum tempore occursum non fuisset remediis ad id institutis, ita malum increuit vt facies in posteriora detorqueretur, & non nisi magno conatu in anteriora reflectere-

tur.

tur. At siue bibere, siue edere, siue loqui veller funiculo in eam rem comparato, retrahebatur caput aliorsum inclinans. Lutetianis Medicis nunquam quidquam tale videre contigerat. Ac laborandum fuit in specie morbi inquirenda, & remediis accommodatis. Videbatur nonnullis vnus partis esse resolutio, quæ alteri conuulsionem attulisset: quod non erat credibile, nam in eodem statu pars perpetuò permanisset: At reducta facies in locum suum, nisi magno conatu & magno cum dolore sisteretur, conuulsio quodam modo statim reuelleretur in postica, magna omnium qui aderat admiratione. Conuulsio erat reuera, & omnes muscoli erant affecti, & viscoso frigidòque humore imbuti, qui discussus vsu rerum calidarum affectum sustulit. Itaque hæc remedia descripta sunt, quibus aliqua ex parte alleuatus est.

℞. Pilul. cocciarum & aurearum an. ʒ. ʒ. turbith & agar. trochisc. an. ʒ. ʒ. fiant Pilule.

℞. Gummi Elemi ʒ. j. olei ebuli Keirini, & lumbricorum an. ʒ. ʒ. pro litu ad cervicem & occiput cum lana succida.

℞. Emplastri de beton. ʒ. iij. opopa.gumm. elem. stiracis an. ʒ. ʒ. picis naualis, picis pinguis an. ʒ. j. pulu. maior. & Ireos an. ʒ. ij. ʒ. ceræ & olei ruta q. s. fiat Emplast. pro capite.

℞. Nitri pulueris. ʒ. ʒ. sulphur. viui ʒ. iij. fiat puluis quo sinapizetur Emplastrum prædictum.

℞. Castor. ʒ. ij. sem. nigell. Roman. ʒ. iii. ligni aloës ʒ. ij. pul. maior. ʒ. ʒ. fiat puluis pro suffitu cum rosis rubris.

℞. Conser. anth. bugl. borag. folior. beton. an. ʒ. iii. mithrid. ʒ. j. ʒ. marg. elect. ʒ. j. rad. pæon. & sem. eiusdem an. ʒ. j. cum syrupo de stæchade, & conseru. citrij, fiat Opiata ad vsum ante cibum, & serò ante somnum. Vsus est decocto guajaci & Chynæ: abstinuit vino: Repetita sunt remedia frequenter, vsus est Laconico.

CONSILIVM VNDECIMVM.

Pro alui fluore.

Adolescens in comitatu Equitis torquati cum debitum officij munus exequi non posset præ valetudine nimirum lubrica, cepit eum diurnæ cessationis tædere, aut quod inuita penenatura multa ferret quibus ferendis satis nõ esset. Affectus erat alui fluor aut diarrhoicus fluxus, inueteratus & penè eum nutriticis lacte suctus, adeo

omnem eius memoriam superauerat. Egregie ad calamitatem natus videbatur. Affectus tædio cum eò magis augeti infirmitatem hanc videret, quo maior annorum decursus fieret, nihilominus solatus aphorismi fide, *Quibus iuuenibus aluus fluit, iis senibus astringitur*, Medicos consulit, vt hoc iam corroboratum malum vel extirpent planè, vel aliqua ratione alleuent, nam eum sæpè cogit magna desidendi necessitas. Malum hoc non tam mereri videtur nomen morbi quàm symptomatis, quod tamen ab imbecillitate aliqua in visceribus nata profectum est. Non affligit perpetuò, sed ex interuallis præsertim cum plenius paulò gulæ ventrique indulsit. Sæpè ita inuito illo aluus fluit, aut potius laxatur, vt primo quoque tempore desidere cogatur, nec ratione vlla differatur. Interim totum corpus emaciatum est, pallidum, fitis magna, cætera satis ad res alacris. Non queritur de frequenti nimis deiectione, nec enim plus æquo aluus descendit, sed de cita nimis liquidæque aluo, & vt ita dicam, stercoris incontinentia. Intestinorum affectus; aluus cita, Græcis *διέξοδος ταχέα*, dysenteria, leienteria, (quæ ventriculi quidem vitio fieri solum nonnullis visum est, tamen intestinis tribuitur à Galeno *com. in apho. 22. lib. 3. aphorism.*) diarrhœa, cœliaca affectio, fluxus hepaticus, lienosus. Fluxum hepaticum aut lienosum quidam annos aliquot pertulêre, tamen tandem parte resoluta interiêre. Ergo non est eiusmodi fluxus, leienteria minus esse potest, nec enim ea infirmitas tandiu perseuerasset. Nec sanè ventriculum in vitio esse suspicamus. Nasceretur autem vel ab excretrice ventriculi irritata, vel à retentricæ resoluta, vel à coëtrice debilitata. 2. Retërix resoluitur à pituita acida & coniunctam habet *ὀξυγέστατον*: ab hæctica intemperie ventriculi, & intestinorum distributioni subseruientium: vel secundum Oribasium, à pituita crassa viscidæque quæ replet rugas ventriculi. Excretrix irritatur multitudine alimentorū per se, vel quia non distribuantur ob obstructionem mesaræi: vel acrimonia alimenti, vel humoris, vt cum ventriculus aphthis tentatur. Ergo ad fluxum diarrhoeicum potest reuocari. Obseruatum est enim diarrhœam quamdam biliosam esse qua bilis flaua, aut citrina ardens ac plerūq; spumans emanat, idq; sine magna ventris torsione. Sed tamen cum in diarrhœa non modò in excretionis modo, sed & in qualitate & in quantitate peccatum sit: hic noster affectus ex parte aliqua quiddam habet tale, ex aliqua verò non. Nam vt prædictum est, non de frequenti nimis deiectione non conqueritur, sed de cita nimis aluo, & de excretionis modo. Fluxus alui, qui motus est ad excernendam

materiam per aluum & intestina, aut à toto corpore, aut à parte, fit motu naturæ, aut symptomaticè. A toto corpore aut diarrhœa est propriè, aut colliquatio, aut cruentus fluxus, aut varij coloris, aut cholera morbus. Si à capite, cerebrialis fluxus dicitur, vnde sæpe mulieribus *p̄t̄e yuuantios* dicitur à capite manare. Aut hepaticus, aut alui- nus, cum nimirum in lactibus, aut crassioribus intestinis, aut in mesaræo, aut mesocolo vitium concipitur. Et sic in cæteris prout hæc aut illa pars infirmitate detinetur. At nil tale in hoc affectu. Siquidem si tale aliquod vitium cõceptum esset, iampridè detectum fuisset in ægotantis iuuenis perniciem. Ergo de frequenti deiectione non laboratur, nil de aliena excrementorum qualitate, sed de excretionis modo. In tribus res tota versata est. In hepate intēperies est, vnde biliosi acerrimique humoris prouentus fit, qui in intestina illabens facultatem excretioni dicatam irritat; facultati retentrici imbecillitas comparata est. Inest quoque intestinis sensus exquisitus, idque propter eorum nuditatem, ex corporis enim mole & facilitate facillè colligitur interni corporis constitutio, & longo temporis tractu, aut ab ipsa cõformatione intestina non satis oblita obductaq; sunt mucore pituitosoque humore, quem natura instituit ne bilis flauæ illà transeuntis, aut excrementi mordacis acrisque per calorem redditæ molestiæ tam facillè sentirentur. Quod fortassis non absere. Ego autem cum pruritus narium obseruarem, cœpi rogare num vermium molestias sensisset. Nam inter causas fluoris alui vermes numerantur. Dum nimirum generatur putris humor vermibus generandis aptus, qui & perse aluum citaret, & cum vermes generet, vermes ipsi mordicando idem præstaret, intellexi excretos infrà supraq; vermes, deprehensum est tandem hepar in vitio esse. Ad hæc capita curatio reducta est. Utatur conserua rosarum initio pastus. Aliquando granis mastich. cum syrupo rosarum siccarum, Iulepo ros. myua cydo. In iusculis misceatur succus ompha. Expurgetur bilis quæ multa circum cystim & iecur collecta est, decocto seridis, absinth. pont. plantag. lactucæ nouell. 4. seminũ frigidorũ maiorũ in quo macerentur ʒ ii. rhei, in forti expresso dissol. syrup. myr. ʒ ʒ vel ex succo plantag. & portul. Cum perseverabit fluor addetur corall. ʒ j. rhu pul. ʒ. j. Vere & æstate parabitur syrupus ex succis omph. plantag. portul. seridis, cichorij vtriusque cum ʒ ij. seminis papau. alb. cum seminib. frig. madeant boli armen. ʒ ij. in nodulo addentur ʒ. ij. rhu. pro lib. in forti express. Iecori adhibebitur cerot. resfrig. & epith. Parabitur Elect. ex puluere triac. coral. rub.

20 CONSILIORVM MEDICINALIVM,
seminis plantag. terr. sigill. carabe cum saccha. dissol. in aq. con-
tiente. Intestina oblinantur decocto omazor. cui coquantur ros.
plantag. fol. myr. cum mucag. gummi tragac. interdum cremore
hordei. Vtatur elixis potius quam assis. Vere nouo si pulsus velo-
cior, tundatur vena iecoris. Lacte asinino & balneis vti poterit. Idi-
bus Iunij 1571.

ANNOTATIO.

2 Et quod hic dicitur de ventriculo, idem de intestinis dici potest, quorum
ruga dum laeuigantur, fluor alui contingere potest.

2 Longi cum perseuerant alui fluores, raro id fit citra catarrhosam ce-
rebra dispositionem: veteres autem Medici eo discernunt fluxum hepaticum
& cerebralem à stomachico & intestinali, quòd hepaticus & cerebrales sit
periodicus & nocturnus; stomachicus autem diurnus fere, & non periodi-
cus. Ratio hæc esse censetur: ideo illi sunt periodici & nocturni; quod per
fluxionem fiant, & præterea eadem de causa multis sunt de nocte ob reuo-
cationem caloris intro, & pororum occlusionem: citantur enim tunc catarrhi:
huc accedit motus materiae phlegmatica de nocte. Quod autem caput adiu-
uet maximè huiusmodi fluores, & propterea illi consulendum sit, primus ob-
seruauit Hippocrates, lib. mei ^{na ddi}: Huius verba hæc sunt, Dysenteria,
Leienteria, diarrhœa, morbi consimiles sunt: Hi sic sunt sanandi vt de-
fluxum à capite impedias, & à ventre superiore, morbi enim natura hinc
est. Qui locus est diligenter annotandus.

CONSILIVM DVODECIMVM.

De sanguinis stillicidio ab utero.

Cviusdam mercatoris vxor cum grauida esset, diésque aliquot
paulum de sanitatis gradu deijceretur ex alto in latus dextrum
cecidit. Ante casum stillauerat paululum sanguinis ab utero ac si
fluxus menstruus minaretur: A casu grumus sanguinis apparet ac
paulò plenior fluor: febricula prehendit: corpori magna est lentitudo:
pondus quoddam in pectine sentit: dejecta appetentia, pulsus
paruus, humilis ac in quodam ictu deficiens. Quæritur num foetus
mortuus. Cum res in dubitationem adducta est, iam dies octauus à
casu agebatur, & superioribus diebus, vt antè dictum est, stillicidium
sanguinis præcesserat. Quæsitum est primum, num utero gestaret:
num vitale, si vitale, an casus iste vitam foetui præripere potuisset?

ne temerè de accelerando partu elidendòque fœtu cogitaretur. Ægra mulier vtero se concepisse certò affirmabat, quod exactis duobus mensibus menstruum nil apparuisset, nisi quod paulò ante casum tantillum cruoris effluxisset. At nunquam illi menses substitute- rant quin vtero concepisset. Nunc an à lapsu aliquid alienum con- tigisset. Non visa est vita præcisa fœtui quòd vitalis non esset ex- actis tãtũmodo duobus mensibus & duodecim diebus. Imo embryo tantũ est. Quod falsum videtur. Nec enim à die quo mouetur in vtero fœtus numerari debent dies vitæ. Prius enim vt planta viuit, deinde vt animal sentiens: tum vt mobile animal: postremò vt ra- tionis capax. Sensus enim facultate illustratur fœtus circiter diem sextum & trigessimum. Vbi autem ad mensem tertium mas perue- nerit, femina verò ad quartum, moueri incipit, ait Hipp. calcitra- re. Ac certè siue mas, siue femina geritur, aliæ prægnantes sem- per die 42. aliæ mense tertio, aliæ non nisi medio prægnationis cursu eum loco dimoueri sentiunt. Itaque deceptus admodum medicus qui negauerit extinctum posse esse fœtum, post duos men- ses & 12. dies, & quòd vitam animalis viuere nõ existimetur. Ac ille totius corporis lentor, fluor sanguinis, *αἰμορρία*, *λεηνορμία*, pulsus *δρακόνι*, & *ἑλληψις*, cuiusdam ponderis in pectine sensus, lumbo- rum magnus dolor, tormina, dejecta appetentia, sudor in quibusdam tantũ partibus apparens, qui Hippocr. *ἐπίδρωσις* dicitur, ac in ma- lis habetur, immò & sudor subfrigidus apparens, alienum aliquid contingens satis apertè videntur attestari. Immo quibus diebus in morbis apparet aliquid, iisdem natura nescio quid moliebatur. Molam nullam esse inde colligi potest, quòd ante casum nil deuol- ui videretur in alterutrum latus decumbenti. Tamen hæc omnia signa non potuerunt Medicos adducere vt certò crederent colli- sum esse oppressũque id quod vtero contineretur: alia enim mul- tò certiora paruissent exactis præsertim, octo aut nouem ab occa- su diebus. Tamen narrantibus obstetricibus sæpè à casibus in vnum aut alterum mensem signorũ argumentorũque extincti seminis fidem supprimi. 2. quamquam Hippoc. in Historiis vicesimi diei in eiusmodi rebus mentionem inierit. Enim verò stillicidium san- guinis si à fundo vteri manaret, os vteri hiaret, si quid collisum esset, ac vietum (Gallis fanè) id vnà efflueret, aut alia ratione sese pro- deret. Potuit enim à casu sanguis effluere, non quòd aliquid alienum in vtero sit, sed eo modo quo antè casum, per externas nimirum venas quæ ad collum vteri pertinent, non per eas quæ in fundo de-

litescunt. Item & lapsus author eius stillicidij esse potest, non propterea hiante vtero, sed erumpente sanguine per partes inferas, vt potè præ cæteris ab eo casu conflictatas & concussas. Vt in ijs apparet, quibus cerebrū concussū est, aliàs enim per os, aliàs per nares, aures, oculos quoque ipsos sanguis quaquauersum erumpit. Leipthymia, ac pulsus exiguitas potest humorum summam putredinem consequi, quam deiectiones detegebant. Propinato enim blando medicamento ex rheub. & elect. diacarth. tantula quantitate excreta sunt admodum putria, cineritia, subflaua, quæ magnam subesse corruptelam significarent. Ac metus ipse, animiq; pathemata, quibus mulierum leue ingenium facilè concutitur, & quibus ista de qua sermo est, mulier, ex interuallis agitabatur, non nihil earum rerum afferre ac adducere potuerat. Ac in tam accipiti ambiguoque negotio videndum, ne quid detrimenti capiatur: nihilque audentius molendum quousquē rerum agendarum proliuior promptiorque sese nobis offerat occasio. Saltem non obfimus dum prodesse volumus, cum hoc multum ad honorem Medicorum referre videatur. Ac mirum quod diem circiter 13. apparuit, refrixerunt extimæ partes, crurum femorūmq; tantus sudor, isque frigidus sequutus est, vt larga veluti copia aquæ irrigatæ essent illæ partes. Ac deficiens ille pulsus necessariò aut affectum cor, aut os ventriculi declarat. Addo & illi in asthmaticis, & iis qui ab oppressione pulmonum moriuntur, tales pulsus apparēt. Præterea in magna humoris corruptela idem contingit. Licet febris adesset, ac vrinæ flammæ apparerent, vsu vini etiam generosi non interdicta est: exhibita sunt quæ vim roborandi superioris orificij ventriculi haberent. Tertio quoque die propinatū rheubarbarum, vt omni ope exigeretur is putris humor, qui febrem posset recendere. Rerum præscriptarum hæc ratio est.

℞. Rad. bistort. tormentill. tunica an. ʒ. j. rad. & folior. dictamni, agni cast. an. ʒ. ss. fiat decoct. in qua infunde rheu. ʒ. ij. ℞. rad. bistort. gra. 6. sacch. ros. ʒ. ʒ. fiat potus. cap.

Item ℞. Ambra gris. gran. iij. margar. electar. ʒ. j. corall. rub. fragm. lapid. pretios. & lap. hamatitis an. gr. ʒ. rad. bistort. ʒ. ss. puluer. diarrh. abb. ʒ. j. cum sacch. ros. in aq. bistort. dissol. fiant tabellæ.

ANNOTATIO.

2. *Ab Aristotele quæ conceptus corruptio intra 7. diem fit, in quibus dicitur, Latinis effluxio, in Sæcis autem ad 40. diem vsque fit. De his Hippocrates primus lib. de septimestri partu.*

CONSILIVM DECIMVM-TERTIVM.

De sanguinis profluio à Partu.

Mulier annos 35. nata, longè à partu magno sanguinis profluio diuexata est. Multa eò conferentia adhibita sunt. Cùm sanguis restitit iam primùm oborti dolores atrocissimi circum lumbos, & ventrem ad vmbilicum. Non cedebant remediis. Inter dolores ab vtero numerabantur. Relictis Medicis ad mulieres confugitum est. Illæ & balneis & fomentis, & cucurbitulis vterum loco reponere conabantur. Sed frustra, tandem variis vltro citroque vsurpatis remediis, dolores conquieuerunt. Aliis Medicis visus est vterus illuue humorum oppletus esse: ideo præscripta sunt hæc ad sedandos primùm dolores, tum ad deplendam istam humorum illuuiem.

℞. Rad. alth. lilio. farine lini an. ʒ iii. mal. viol. parietar. an. m. j. chama. melilo. an. m. j. coquantur addendo butyr. recent. & ole. lilior. an. q. suff. fiat cataplasma, cui adde foliorum rutæ in sartagine cum axungia porci coctorum, m. ij. cinam. pulueris. ʒ β. fiat catapl.

℞. Casto. ʒ β. rheub. ʒ iiij. fiat massa cum syrup. viol. capiat pilul. 4. pro dosi. Ab vsu fomentorum alleuatus dolor aliqua ex parte, sed partibus imbecillitas est comparata. vnde aliquo post tempore facta veluti systrophe & collectione humoris ad hypochondrium dextrum, difficultas summa respirandi consecuta est: primò occursum manuum dolor ingens. Ingredi non valebat. Curuata penè incedebat. In neutrum latus decumbere poterat. Cum superioribus diebus de vtero conquesta esset, visa est morbi sedes esse in partibus quæ ad vterum pertinent. Ac præsertim ligamentorum vteri vitium aliquod esse suspicabantur, sed situs sedem esse aut in hepate, aut in partibus vicinis demonstrabat. Initum est ea de re consilium.

Summus Hippocrates successiones morborum considerandas esse præcipiebat, quod in morbis longis multa symptomata contingant quæ bonis & eruditis Medicis ob similitudinem & fallaciam imponant. Et noui morbi tanquam soboles rediuiua ex aliis subinde consequantur ac repullulent. Nec mirum si hæc mulier post dolores vterinos, post sanguinis profluuium ingens tam variè ac variè conflicteretur, quod multis contingit post partum præsertim

si difficilis & laboriosus extiterit. Nam oportuit naturam diuturnitate morbi, iam debilitatam aliquid moliri, aliquid in partem aliquam deponere, quod in fine morborum contingit, præsertim si qua pars dolitauerit. Id quicquid est de quo dubitatur dolor est ad dextrum hypochondrium, qui aut immutati habitus, aut alienati temperamenti consequens est. Difficultas respirandi, corporis piger motus, inflexio difficilis. Quæ & iis contingunt authore Aëtio, quibus ad cornu dextrum vteri collectio fit & inflammatio, aut cum vteri ligamenta in vitio esse incipiunt. Morbus tumor est. Sed vnde natus, quæ sedes, & cuiusmodi sit, hoc opus, hic labor. Omnis Hypochondriorum æqualitas in bonis ducenda quod subiectas partes benè habere significet. Inæqualitas in mole & qualitate in malis ponitur. Nam verum est quod scribit Hippocrates. *Hypochondrium molle esse conuenit, dolore vacuum, æquale. At inflammatum, aut inæqualiter se habens aut dolens signum est ægritudinis non benè moratæ.* Ac nisi præcessisset illud sanguinis profluuiū, illic inflammatio hepatis concepta fuisset: nec absuit longè quin conciperetur. Illud confirmat sententia Hippocratis, *Quibus præcordia non mollia, facies sana, non liberantur citra multi sanguinis ex naribus fluxum, aut conuulsionem, aut coxendicum dolores.* Porrò, tumor qui eas partes occupat, aut externas, aut internas tenet. Item aut humilis est & depressus, aut eleuatus: occultus, aut apparens. Recens, aut inueteratus. Si recens & repentè fit, aut inflammationem significat, aut abscessum. Si inueteratus & sensim increscat, scirrhum significat, aut obstructionem, aut. Gal. *com. in 4. Aphorismorum.* Hic non est inflammatio, quia febris vacuitas non repentè contigit, quo fit vt scirrhi suspicio sit, aut congestæ illic multæ materiei. At externas maximè partes occupat, nam digitorum pressus altus dolores affert, quo fit vt non hepar, sed muscoli intumuisse iudicentur. Mirum illud est, quomodo secutum hoc sit post magnum sanguinis profluuium, quin potius vnà cum sanguine id quicquid est excerni debuerat, & magno illo profluuiio hepar quodammodo refrigerescere debuerat, & alius humescere, per Aphorism. Hippo. *A large sanguinis profluuium alui humectantur.* At contra contigit, immo aluus suppressa est, & frequentibus clysteribus irritata. Sæuissimi dolores fuerunt qui colicos referrent. Quod duabus de causis mihi videtur contigisse, aut quia profluuij diuturnitate caloris paupertas consecuta fuerit: hinc flatuum & torminum magna vis exorta est: Aut quia natura, quâ data porta, à centro ad circumferentiam humores

mores detorferit, qui lancinantes peritonæum & partes vicinas, eos dolores excitarunt. Præterea purus sanguis excretus est, multa crassa excrementa, quibus præsertim inter alias mulier hæc abundat, quod & præpinguis sit, & intemperanter viuat, in aluo restiterunt, quæ eos dolores inuexerunt. Ergo si ampla & vasta mole aut venter imus, aut pars hypochondrij promineat, si non fluctuatio sit, non alui suppressio diuturna, non hydropis suspicio, aut est musculorum abdominis tumor, aut mesenterij, aut hepatis. Nam ab ingluuie sæpe acruus est pituitæ, quem Natura aut in pancreas, aut in mesenterium relegat. Et in iis glandulis quæ illic iacent exaggerantur varij humores qui tempore siccescentes renitentem durumque tumorem ingenerant; vnde in iis partibus veluti concreuisse iudicatur. Atque vt finiat oratio, duorum alterum esse videtur: quoniam mesenterij tumor alitè sepultus est, nec se in conspectum dat: vel est tumor insertus musculis abdominis; tum quia primo contactu occurrit, & quia etiam citra pressum dolorem afficit. Aut est tumor qui iecur sine scirrho distendit, iisdem ferè notis se prodens ac scirrhus in se. Hic in iecoris ambientes membranas effunditur: & vt aliquando legi, sæpe tantus est vt vniuersum hypochondrium repleat, & nulla iecoris circumscriptio appareat. Hic à flatu, aut cruditate quam immodica frigida potio affert, vel in tempestiuo fugacium fructuum esu: & non grauitatis, sed tensionis sensus est, vtpote ab humore crasso & lento quem iecur validum à se excutiens in proprias membranas deponit. Nec enim propriè scirrhus est. Curatio hæc legitima esse videbitur. Omni ope amolienda est illa materia, quæ eo loci congesta falso scirrhum refert. Cauendum à remollientibus, ne vel cancrorum quid generetur, vel scirrhosum. *Comparatus est syrupus solemnus ex ℥. y. rheub. ℥. j. agar. & ℥. iij. foliorum sena. Rhabarbarum in succo mercurialis maceratum est. Foris applicatum est hoc.*

℥. Ceruæ samalini ℥. y. mucag. scellæ & rad. altheæ an. ℥. j. Extrahatur in aqua hepaticæ. Fiat linimentum cum oleo rosato.

CONSILIVM XIV.

De Febre Tertianæ typum referente.

ADuocatus febre corripitur inæquali, sed quæ ad tertianæ typum referri posset. Vix erat expers febris, pulsus admodum languidus, sæpe hiabat os, continuæ erant pandiculationes. Morbus nescio quid sinistro portendebat. Antequam de remediis statuatur, primum constare oportet quis morbus, & quæ morbi causa. Alioqui inutilis opera, inutile omne consilium. Si obscura morbi species est, vt in hoc ægro existit, huic non protinus remedia adhibenda, sed maior negotij pars naturæ committenda. Nam futurū vt natura legitima vitæ ratione adiuta morbū profliget, & patefaciat id de quo dubitatur. Incerta enim medicatio non nisi dispēdio decernitur. Omnis morbus suis se signis & symptomatis prodit. An hæc febris intermittens, an continua, planè dici non potest. Nam nullā, aut exigua febris vacuitas apparuit hætenus: quod aut inflammationem, aut malam humorum qualitatem declarat. Tamen solatur Aphorismus dum ait: Quocumque modo intermiserint febres, periculum abesse significant. Si autem morbos & eorum accessiones periodorum vices declarant, in censu febrium tertianarum haberi potest, quod tertio quoque die nouæ accessionis rudimenta apparent, sed ita parum perspicua, vt quorsum res euasura sit hætenus non sit intellectum, facilè in hecticam notham degeneraret: corpus squallidum est, calor (vt sic dicam) squalidus, tempus id postulat: à cibo statim calfactio sequitur, contentio animi; in somnia vacuitas doloris, pandiculationes frequentissimæ, ita tamen vt putredinis maxima eluceant argumenta. Magna est imbecillitas, quæ aut affectū cor, aut ventriculi orificiū, aut malam putredinē arguat à qua vapores excitentur. Vrinis parū fiditur, quod hic eger nephriticus sit. Parum autem tutū iudiciū est vrinarum in eo casu. Nam sæpè humor crudus excernitur à renibus ipsis, qui falsò hypostasin laudabilem refert. Morbus fuit breuis. Sectâ venâ euentilatus calor, qui in putri materia erat sepultus. Bis repurgatum corpus satis vehementer. Toto morbi cursu abstinere vino non iussimus, tum quod imbecillitas summa dehortaretur: tum quod habitus esset melancholicus. Hic autem vino interdiceret non est artis.

CONSILIVM XV.

De Hepatis inflammatione.

THesaurarij vxor prauis scatens excrementis in vtero cō-
 ceperat. Toto grauiditatis tempore nonnullos dolores
 ad vmbilicum sentiebat. Præteritâ tempestate austrinâ post im-
 moderatum vsu fructuum fugacium alui fluore tentata est, qui
 dies aliquot neglectus. Tandem decumbere coacta est. Excer-
 nebantur cruenta, viridia, *καχολαγ.* Interiecto tempore pici si-
 millima mox ramenta intestinorum prodibant. Febris successit.
 Dubitatū an fluor is esset symptomaticus, proptereâque potiùs
 in febrem esset incumbendum, quàm alui fluorem. Videbatur
 Medicis optimum si sæpe repurgaretur. Non aptè tamen. Desi-
 dere cogebatur nocte quadragies, & ita vires frangebantur.
 2. Vomitus fuit æruginosus planè: vomebat ante cibū, & præser-
 tim à somno. Dolitabat regio hepatis. In hoc phlogosis conii-
 ciebatur. Prætermissa venæ sectio. Celebrata est die octauo fe-
 bris. Tardiùs hoc factum, & nullo profectu. Sexto & septimo
 die excreta sunt quæ cadauerosum olerent. Et hæc suspecta sunt
 planè. Vinò erat interdicensum tum ratione febris, tum phlo-
 goseos in hepate. Nam hic dolor recenter obortus, in dextro
 hypochondrio aliquid simile subesse demonstrabat. Pulsus fal-
 lebat: At scire debebamus ex Galeni sententia in grauidis pul-
 sum esse partium & oppressum. Vnde sæpe grauidas febre non
 laborare existimamus, cum tamen reuera laborent. Ab hepate
 inflammato refudabat inutilis & serosus humor, qui in ventri-
 culum refluens illum perturbabat, & vomitum promouebat. Er-
 go tam frequenter desidendi desiderij causam reuocabam ad
 serosum humorem, qui continenter ab hepate inflammato re-
 sudabat, iuuante ad id vteri pondere: vnde conatus & inane de-
 siderium sæpe potest contingere. A partibus internis facilè re-
 sudat humor qui fluorem alui citare potest. Tandem hepaticæ
 deiectiones apparuerunt. Decimo tertio die peperit vitalem.
 Lochia suppressa sunt: aluus non reddidit vt antè: Omnia visa
 sunt tranquilliora, sed calor sensim intrò reuocabatur. Sequente
 nocte profusè ridebat. Delirabat. Repète omnes partes refrige-

28 CONSILIORVM MEDICINALIVM
rūt. Sudor frigidus. Per duodecim horas hæc apparuerunt. Mente satis constabat. Interiit. Ab omnibus clamatum est. Et tantæ cladis causa relata est in prætermittam reprimendi fluoris alui occasionem. Quod perperam & imperitè effectum fuisset. Nam ubi primum repressa est, mortis periculum creauit. Ac tanta excrementorum varietas etiam prauissimorum satis abundè docuit summam fuisse in partibus intimis corruptelam, quam Græci *διασπαστική* nuncuparunt. Ac & tempus, & corporis constitutio, & grauiditas, & affectus ipse omnem salutis occasionem præriperunt. Si alius suppressa fuisset, non est dubitandum quin febris & alia symptomata increuissent.

ANNOTATIO.

2. *Ingens bilis copia sursum deorsum ferebatur: deorsum quidem per alui fluorem dysentericum, sursum per vomitum. Nam æruginosum per os exercebatur. De eaque verum fuit quod dixit Hippocrates in Coacis. Quæ ante partum in modum cholera morbi, id est humore sursum deorsumque lato, dolent, facile quidem pariunt; sed si febricitent, perniciosè habent: tum aliàs: Si quid in faucibus adsit, aut si aliquod prauum signum adsit. Quæ omnes aphorismi circumstantia in mulierem istam inciderunt. Et interiit. Sub finem s. epid. narrat de quadam muliere grauida quæ dysenteria laboraret. Sed edito fœtu statim quieuit malum. Nam pondus pueri potest facere ad irriuationem, & inane desiderandi desiderium.*

CONSILIVM XVI.

De duplici Tertiana.

A Dolefcens annos circiter vndecim natus toto mense Augusto febre laborauit duplici tertiana, quæ exasperationes tamen certas & statutas non habebat. Corpus macrum erat, cacochymum, visceribus affectis malè. Et qui color in cute efflorescebat, is alimenti prauitatem detegebat. Progresso morbo fluxio in pulmones eum adoritur: paulò post dolor permolesus ad hypochondrium dextrum: alius ad sinistrum. Cùm morbus quiescere videretur, postliminiò redit, non idem, eandemque rationem habens, sed diuersus. Lenta obscuraque fe-

bris eum noctu diuque sine ferè vllò sensu occupabat. Dolor hypochondrij dextrì repetit. Initur consilium. Capita hæc sunt: Vnde hypochondrij dolor: Quæ febris. Complicatane. Quæ medendi ratio. Dolorem hypochondrij ementiri potest stomachi inflatio & dolor. Vnde sæpe conqueruntur de alterutro latere ægrotante, cùm aut nullà, aut exigui doloris causa sit in alterutro viscere: sed affectus ventriculus, tumefactusque affecti hypochondrij opinionem facit. Atque ita diligenter videndum ne similitudo affectuum nobis imponat. Tamen non multùm nostra nos fefellit opinio: sed reverà dolor in ea hypochondrij parte erat qua latet hepar. Nullus qui appareret tumor: nulla inflammatio, siquidem amplior febris esset. Sed id quicquid erat meo iudicio, depositio erat materiæ in partem illam vt infirmiorrem & exercitiorrem toto morbi tempore. Febris lenta est, complicata cū catharro, & fomitem habet maximè hypochondriorum obstructionem, id est, partium in hypochondriis contentarum. Nam annotatum suprà est à latente obstructione mesenterij nasci febres non hecticas quidem per empyreuma & phlogosin, sed putres hecticas, vt putredo continuitatem, perseverantiamque (vt sic dicam) afferret. Euincenda itaque putredo omnis. Alius pigra est admodum: an ideò vehementioribus pugnandum remedijs? Nequaquam. Sic fœdè ac turpiter à Medicis arbitratur, qui quum aluum pigram admodum vident, nilque etiam valido medicamento deicientem, temerè corpuscula sicca & emaciata graibus medicamentis fatigant. Nesciunt enim, nesciunt, siccitatem corporis retentricem confirmare admodùm, & deiectiones non posse fieri faciles & liberas, nisi humiditas quædam radicalis sit quæ actionem adiūuet. Sic enim magna illa siccitas omnem actionem impedit ac interuertit. Interea affatim sæpèque medicamenta valida damus, & dum maiorem siccitatem afferimus, nihilominus nostro voto satisfat. Ergo catharrus febri iunctus illam prouexit. Vtrique consulendum, sed maximè *αὐτὴν* per *ἐπιμασίν* sensim ac sensim refici renutririque debet. Expeditis obstructis, lac asinum dabitur, quod omniū tardissimè acescit. Et non est quod dehortari videatur febris nisi ea admodum magna sit. Quod Galeui consilium est *libris* *π.ε.ι. η.ζ.ο.ρ.η.ς.*

CONSILIVM XVII.

De duplici Tertiana.

Mercatoris vxor cū instaret pariendi tempus febre prehenditur, quæ duplicem tertianam imitaretur. Ac quæ in tempus autumnale febres incidebant, ad tertianarum naturam accedebant, ac iis de nocte præsertim ægri torquebantur. Humor biliosus suppressus induebat naturam pituitæ eiusmodi febres ingenerans. Quæ vomebantur biliosa erant, subuiridantia. Et quod mirum fuit, illo temporis non videbantur immunēs à febre ægri, incertisque horis modò cum sensu frigoris, modò sine eo adoriebantur. Exactis duodecim ferè diebus enixa est, viribus satis robustis, facilè. Quæ excerni debuerunt, excreta sunt. Sed repente, aut vno prope dicam interiecto die dolor oboritur acutus, difficultatem respirationis inferens. Nulla tussis erat: nec febris aliquantò acutior. Cū aut tussire, aut expectorare vellet, aut aliorsum mouere, præ dolore illud non poterat. Simile apparuerat nobis in alia quæ peperisset. Ab imo ischio ad mediàm lateris dextræ partem dolor erat toleratu difficillimus. Hic remediis non cedebat. Tandem exeunte pure per sinum pudoris alleuatio. 2. Sic in multis grauidis orgasmo materiæ quam natura vtpote imbecillior facta enixa non potest regere ac domare vt ante partum, multa contingunt quæ pleuritidem mentiuntur, siue quod motu naturæ humor sursum deorsum moueatur: siue quod externa aliqua fluxio fiat, siue quod circa hypochondriorum tunicas & venas humor multus est, vnde per continuitatem membranarum & vasorum communionem eleuatur hypochondrium alterutrum, & hic meteorismus difficultatem respirandi affert, quæ similitudine imponit sepe Medicis, supponitque alium affectum pro alio. Ita nimirum *in Coacis*, summus Hippocrates animaduertit quendam lateris dolorem cum hypochondrij meteorismo & difficultate spirandi. Sed vocat eum dolorem, lateris dolorem sine signis; quasi dicat pleuritidem non esse, ne ea similitudo nobis falsò imponat. Cū vigeret hic dolor, metusque esset suffocationis, quesitum num tutò & iure tundèda esset vena, cuius maxima est opportunitas ad anteuertèdos morbos per congestionē nascituros. Dehortabantur vires imbecillæ: partus qui paulò antè præcesserat: item quòd

pleuritis non esset, aliisque fortassis remediis cederetur. Denique metus suppressionis lochiorum à partu: quæ si supprimerentur, omnia peiora multò contingerent. At cum dolor ad pectus vrget cum difficultate spirandi, non statim tundenda vena: immò nisi signa adsint, talem sectionem improbat Hippocrates in Coacis Animaduersionibus. Tamen ne quæ materia locum certum nondum teneret, tandem parti impacta opinione nostra maiorem morbum afferret, in eam ventum est sententiam, vt sectio venæ tutò celebraretur. Sanguis qui fluxit lacteus erat, planèque putris. Dolores conquieuerunt: Lochia nõ sunt suppressa, immò aliquando vt & in menstruorum tardo pigròque motu, sectione venæ liberalior, multo fluxio fit. Sed antequam tunderetur vena, præscriptum est hoc poculum.

*℞. rad. bistort. myrrh. dictamni, & rad. rub. maioris, añ. ʒ. ʒ. mithrid. scr. ij. syrup. rosar. palled. ʒj. vini albi ʒvj. cum aqu. hyssopi & arthe-
fiat potus, capiat mane. Vna post hora aperiatur vena.*

Cùm perseveraret febris, augerenturque symptomata, subesset magna cacochymia, quod ex olidis excrementis apparebat, quesitum rursus quid hic consilij caperetur. Intumebant pedes & brachia: item facies, ac si leucophlegmatia tentaretur. Ac mirum fuit (dicebat senior medicus) quomodo non discuteretur morbus hic à febre, cum Hippocrates febrem aquas ac crudos humores concoquere ac digerere affirmaret. Sed illud verum est præsertim de febre superueniente, aut de ea quæ esset copię humoris analogæ. Quod in hac muliere non constabat: nec iure ea sententia Hippocratis citabatur. Etenim hic febris corrumpebat sanguinem: sanguinem corruptum auersantur partes, & facultas alteratrix quodammodo vitata, non ratione sui, sed alimenti in probum sanguinem affluxos humores non couertebat. Accedit quod inflatio ista morbos istos sequi soleat, minusque propterea terrificæ esse soleat, præsertim cum in neutro hypochondrio tumor aut inæqualitas appareret. Tandem de purgatione vna atque altera, tertiãque cogitatum est, quod hypofarcidio habitum liberari alui profluuio, testatum Hippocrates reliquisset. Tamen non erat *comperidi*, nec tam frequentibus locus fuit purgationibus. Immò decipiuntur sæpe Medici rerum similitudine. Et ea tempestate multis pedes, manus, & brachia intumescere, & qui vena sectione educebatur sanguis, planè putris erat.

ANNOTATIO.

2. *Quæstio magna esse potest, An cùm lateris dolores cr:untur in muliere à partu cui lochia eunt, secunda sit vena. In hac enim muliere cui dolor lateris, vt hic dicitur, abortus est, secta vena lochia suppressa sunt. Vereor ne illa suppressio tanti mali causa sit, id est, cur in hydropem incidit. Vide nostras historias de uxore Comitis de Maulcuri, r.*

CONSILIUM XVIII.

De Febre Erratica.

PROcurator post curas aliquot & molestias, præeunte aliquâ corporis grauitate in febrem incidit. Hæc de genere earum quæ vagabantur eo tēpore autumnali. Incertæ: sine typo: modò cū sensu aliquo rigoris: modò sine eo. 2. Exiguo medicamento prouocatus lepothymiaprehendit, paulò post visa est alius liberior: sed mox restitit. Inde omnia symptomata increuerūt. Illud autē præ ceteris terrori fuit: In accessionibus pulsus paruus, febris nō analogos, coma, aphonia. Nulla re excitatur. Mirū hoc fuit in homine fatis macro. Erat & quidam ^{psor,} & suffocationis metus ingruebat. Sectâ venâ perseuerarunt illa. Cessante accessione & tentatis multis ad se tandem redibat, semisopitus tamen. Repurgatus sepe. Hæc ab oppressione cerebri nata erant. Coeuntibus quoque malignis vaporibus à partibus inferis, vt febris pestilentis suspicio aliqua esset. Verum quidem illud coma, catalepsin, cataphoran denique ipsam aliquando sub finem longorum morborum contingere, quod nos ipsi animaduertimus: & plerique interierunt; tum quod corpus aliquot dies fideratum manens non nutriretur: tum quòd summa erat oppressio cerebri, & febris augebatur, in modum continuæ perseuerans. Credibileque fuit horum alterum, aut illam catalepsin ab exhausto manare, quod periculosissimum: aut propter paupertatem caloris & spirituum, & longitudinem morbi multa succreuisse pituitosa excrementa, eaque maligna, quæ cū à febre dissipata non fuissent, restitanti in corpore tam funesta symptomata intulerunt. Nec huic solūm viro ea symptomata tam formidabilia conti-

contigerunt, sed & omnibus ferè qui toto illo tempore in febres inciderunt. Vidi quibus suffocationis periculum ingruit accessione aduentante quasi pondus in pectore sentirent, & sibi præcludi fauces viderentur. Aliis accessionis initio præfrigidi sudores, quod rarò contingit. Aliis (quibus ex longis interuallis tantum tussicula erat infesta) cum accessio prehenderet, tussis ad eò vehemens accidebat, vt eam quam molestissimè ferrent. Mulieri sexagenariæ toto tempore accessionis leiporhymia: comatosum quid, dolores permolesti. Querimoniam. Sed vt ad ægrum nostrum reuertamus, variis remediis à primariis Medicis occursum est. hic potus iniectus est.

℞. scobis unicornis gran. ʒ. ʒ. ambra grisea gran. ʒ. cum aqu. card. fiet potus. cap. Iniecti frequenter clysteres: iniectus & hic.

℞. centaur. minoris, betonica, mel. ss. saluia, calament. an. m. j. flor. genist. p. ij. sem. lini ʒ. ij. agar. in nodulo positi ʒ. ij. fiat decoct. ad ℥. j. In col. dissolue Cath. & hiera diacoloclyntidos añ. ʒ. ʒ. olei aneth. ʒ. ij. fiat clyster.

℞. Conseru a rh. flor. saluia & beton. añ. ʒ. ij. mitho. ʒ. j. ʒ. semin. pæon. ʒ. ss. cum syrup. conseru. citrij. fiat opiata.

℞. folior. saluia. beton. maior. yua. arthr. prim. veris an. m. j. florum stæchados, saluia. & anthos, an. p. ij. fiat decoct. in vino pro fotu capitis.

℞. olei chamam. liliorum, & nardini an. ʒ. ij. castorei ʒ. ij. aceti scillitici ʒ. j. pro embroche totius capitis.

℞. thymi sature. beton. & saluia an. m. s. piperis ʒ. j. s. coquantur in ℥. j. Colatura dissolue oxymel. scillitici ʒ. ij. fiat gargarisma. Vsus est hydromelite. foribus ex lixinio sarmenti. cum agarico, sena, & rasura ligni sancti. Item vsus decoct. sarseparille & guaiaci.

Quis enim dubitat quò minùs decoctum ligni sancti conferat vbi oppressum videtur caput à pituita. Siccando enim confirmat, & liberat à dominatu ipsius pituitæ.

℞. Theriacis, mithridat. añ. ʒ. s. olei de castor. ʒ. ij. aceti parum pro nuca & posteriore capitis parte.

Item ℞. pyretri, nucis mōscate, caryophyll. an. ʒ. s. castorei ʒ. j. fiat puluis pro naribus. Tamen mihi valde suspectus est castorei vsus, propterea quòd Epilepsiam inducit.

Item ℞. emplastr. de betonica ʒ. ij. ladani styracis, calamita añ. ʒ. j. olei ros. chamam. an. qu. suff. fiat magdaleon pro capite.

℞. oxymel. simpl. & syrup. de hyso. an. ʒ. s. cap. ex cochleari.

Item ℞. theriacis, mithridat. añ. ʒ. ij. conseru. acori, campa. anthos,

an. ʒ. j. pulu. diamarg. diarrhod. abbat. an. ʒ. j. decoctionis beton. buglos. bipincl. mors. scabio. cum ʒ. j. semin. pæon. 6. lb. distillentur in alambico.

ʒ. prædicta decoct. ʒ. iij. colentur per manicam Hippocratis cum sacchar. Vtatur sape. Subiectus & hic clyster est.

ʒ. salvia, maiorana, betonica añ. m̄. j. mercurialis m̄. j. sem. anisi & pæonia an. ʒ. j. fiat decoct. ad lb. j. in qua dissolue hiera diacolocyntid. ʒ. B. mellis mercurial. ʒ. B. salis comm. ʒ. iij. castorei pulueris ʒ. j. fi. clyster.

Sed perendie quàm iniiceretur hic clyster, dati sunt ʒ. ij. pillularum sine quibus serò. Tertio post die potio hæc propinata cum accessio præcessisset superioribus similis: initio autem illius dormiendi adest inexpugnabilis necessitas..

ʒ. beton. bipin. scabio. folior. buglos. an. p. i. folior. senæ ʒ. s. semin. card. citrij & pæon. añ. ʒ. s. fiat decoct. in qua infunde agaric. trochisc. ʒ. iij. rhei ʒ. ij. cinnam. ʒ. s. In express. dissolue hiera diacolocyntid. ʒ. j. fiat potus.

Item *ʒ. florum anthos, stæchados, betonica, calament. an. m. s. radic. angelica ʒ. ij. florum cordial. p. i. 4 semin. frigid. maiorum, cuscut. citrij an. ʒ. j. B. Fiat dec. ad quart. tria. In coll. dissol. confect. Alkermes ʒ. iij. theriac. & mithridat. an. ʒ. ij. fiat potio colata per manicam, pro tribus dosibus.*

Item *ʒ. farin. fabar. & orobi an. ʒ. iij. pulu. chamem. beton. ireos, an. ʒ. ij. coquantur in oxymel. satis diu ad spissitudinem pultricule & tenacitatem. fiat cataplasma pro capite dempto superiore emplastro post operationem medicamenti.*

Vires interea concidebant. Interiit decimo septimo die. Fortasse superior curatio paulò durior fuit. Etenim conuenit in euincenda multa materia pituitosa: sed in siccitate coniuncta cum humoribus aliquot iuncta virium infirmitate non ita conuenire viderur.

CONSILIVM XIX.

De Febre pestilenti.

Nobilis mulier post liberalem vsum fugacium fructuum, & molestias aliquot, cum tamen ea satis hilariter viueret, cepit aliquando conqueri de dolore & grauitate capitis. Aliquot post diebus cum omnia vitæ munia probè fungeretur, à prandio cepit caput dolere: deinde omnium artuum dolor. Febris acutissima. 2. Vomitiones frequentes, varia excerneban-

tur. Aluus fluxit. Secundo die mitiora aliquantò omnia. Febris perseverabat. Ex intervallis modò temperatę partes percipiebantur, modò acerrimo calore calfactę: Iactationes plurimę: resistit aluus: vomitus cessant. Tertio intumuit facies: paulum taciturna: raptus humorum fursum. Omnes partes dolent. Urinę confusę, nigricantes. Quarto eadem perseverant. Nox difficillima: clamores: taciturnitas: difficilis anhelitus: surrectiones quadraginta: iactationes. Quinto oculi feroces: mox depressę palpebrę: serò omnia exacerbantur: oculi ferociores: constantes quasi defixis palpebris: acies oculorum obtusa: aphonia: potum assuiebat submurmurando: non deglutiebat: delirabat: Nox implacidissima. Sexto interiit corpore purpureo. Acutissimus hic morbus: nec ante quartum diem quicquam tentatum est. Pestilens fuit febris, declararunt iactationes quamplurimę, omnium penè facultatum casus, summus stomachi dolor. Inanis vomendi appetitus. Partes modò tepidę: elato teterrimo vapore à centro ad superficiem modò calidissimę. Lingua non erat febrile analogos, nec enim præficca. Et iam observaui in febribus malignis nec magnam sitim esse, nec linguę ariditatem: nec calorem magnum. Vnde sæpe morbus multò maior est opinione. Et cum specie parvus appareat, tamen ex eo eius malignitas paret, quòd non cedat remediis. Suspecti mihi fuerunt parui tremores. Et in hoc morbo cum alijs observaui illud quod scripsit Hippocrates verissimum; *In malis febribus parui tremores: & in potionibus. In siccis quasi subsilientes & submurmurantes pessimum.* Iniectus clyster. Quarto die blando medicamento repurgata: tum aluus supra modum reddidit. Quinto secta vena. Planè putris sanguis. Et cum fluebant menses, metusque esset suppressionis: item & ratione malignę qualitatis, data potio hæc.

℞. rad. tormentill. dictamn. bistortę, & rub. an. ʒ. ij. conservę flor. cichorii ʒi. f. scabiose p. j. flor. p. j. fiat decoct. In coll. dissol. pulu. cimam. ʒ. f. puluer. rasur. eboris scr. j. mithridat. scr. iiij. syrup. limon. ʒ. vj. fiat potus.

Cautos admodum esse medicos oportet in eiusmodi morbis, in quibus tantę iactationes, nec febris tam effera & magna specie quam suis se prodit signis: cum functionum animalium casus adest. Et quotquot eiusmodi febribus prehensos vidi, in iis observaui facultates animales primo quoque tempore occupari quod mirum est.

ANNOTATIO.

Febris hæc pestilens fuit, cum tamen constitutio alia esset temporis. Et primis diebus morbi sanissima erant omnia, & proicctio virium. An hæc febris tam effera, tam maligna, & qua mulierem validissimam tam citò è medio sustulit, vitio humorum contingere potuit, & potuit hercle. Et in hanc rem meminisse oportet historia Hippocratis, qua quarta est ordine sectionis 3. lib. 3. epid. Narrat quendam statim phœneticum decubuisse, qui tertio die interiit, Galenus in Commentar. In illius acri corpore humor generatus fuerat lethali veneno similis, in corporibus vicinis aliquid paulatim agens, quæ quando vitio iam aliquo pacto opportuna erant, humorque ipse enaserat malignissimus, lethale repente apparuit symptoma. Et quomodo generetur venenum in nobis ob prauitatem humorum, ut tamen minime opinantibus nobis eripiantur acri, Galen. ample docet in part. 17. lib. 2. Prorhetic.

CONSILIUM XX.

De Febre Tertiana.

Consul regius tribus ante mensibus connubio iunctus, & vt verisimile est, exhaustâ multâ animâ, imbecillior redditus, in febrem tertianam incidit. Hæc post eâ in duplicem tertianam versa est, nec tamen reliquo tempore febris vacuitas: medicamento agitatus est: aluus liberior reddita est: biliosa materia & effera in intestina deriuata fluorem inuexit. Metuitur à dysenteria aut longo fluore. Dubitatum de sectione venæ. Præripiebat occasionem impetus alui: item & virium imbecillitas: superiore trimestri ob causas dictas inducta quòd recens coniugibus parcè detrahendus sit sanguis. Secta tum est parcè. Incubuerunt omnino ad id Medici vt aluum qua id ratione fieri posset, sisterent: dolores si quos ferret, sedarent; vires confirmarent. Subinde iniecti clysteres manè bis, ter, quater: item serò, & aliis temporibus.

℞. rapsi barbati, centinodia, plantag. rosar. rubr. an. m. ij. semin. cydoniorum & psyllij an. ℥. ss. malicorij ℥. ss. fiat decoct. ad ℔. j. in qua dissolue sacchar. rosar. ℥. j. syr. de siccis ℥. ij. vitellos ouorum duorum.

Item ℞. decoct. ordin. quartar. ij. in collat. dissolue mucor. feminis
psyllij, & cidonior. extract. in aq. hordei an. ℥. β. sacchar. ros. ℥. ij. vitellū
oui vnus. fiat clyster.

℞. Radic. gram. acetosæ, passul. integr. añ. ℥. j. cichor. plantag. agrim.
beton. an. m. j. granor. berber. recent. ℥. j. semin. acetos. plantag. card. ci-
trij. an. ℥. β. conseru. rosar. nenuph. an. ℥. ij. fiat decoct. ad quart. tria. In
col. dissolue syrupi cap. vener. & de cichor. an. ℥. j. β. fiat apozema.

℞. syrup. de succis ℥. j. cum gran. 4. mastich. fiat potus. cap. dormiturus.
Interea purgabatur ex rhabarb. per interualla.

R. rasur. ebor. cornu cerui vsti & loti in aq. ros. an. scr. j. margar. elect.
scr. β. rasur. unicorn. gr. vj. dissol. In decoct. 2. dactyl. passul. integ.
cap. vnus papau. & lact. cum ℥. i. syrup. de nenuph. & de succis. Capiat
hora somni. Media nocte cap. hordeatum paratum cum decocto semin.
papau. albi & lactuce, cum saccharo ros.

℞. flor. nenuph. viol. rosar. rubr. an. p. i. semin. lactuce, papau. albi, an.
℥. ij. Ex his contusis fiat frontale inter duas syndones: vaporetur aqu. ro-
sar. prius illinantur tempora oxyrhodino.

℞. caponem iuuen. carnosum, perdices duas, decoction. iuuenis caponis
alteraticum lactuc. cichor. domestic. plantag. semin. maiorib. frigid. li-
bras 4. conseru. rosar. veter. ℥. ij. conseru. buglos. nenuphar. an. ℥. j.
myrobal. Embl. ℥. j. β. Omnia reponantur in alambico, in balneo Maria.
Fiat destillatio.

℞. predicti destillati quart. tria, sacchar. rosar. ℥. i. β. Fiat inlep, utat-
ur cum condito.

℞. mirobal. vnā Emblicam. coral. rub. puluer. ℥. β. rasura cornu cerui
loti vsti, margar. elect. an. scr. j. rasura unicornis gr. vj. ofis de corde
cerui scr. β. cum sacchar. rosar. dissolue in aqua ros. fiat conditum.

Sape ac saepe datus syrupus somniferus, qualis ante descriptus est.

℞. furfur. rosar. rubr. balaust. tapsi, plantag. an. p. j. semin. psyllij, ci-
donior. altheæ, añ. ℥. β. fiant duo parui sacculi qui bulliant in lacte pro
fotu ani. Renouentur quotidie.

℞. cerati ros. Mesue. loti in aqua rosar. ℥. ij. β. excipiatur linteolo pro
fede.

℞. plantag. centinodia, tapsi añ. m. i. balaust. rosar. rubr. flor. chama-
mel. nenuphar. an. ℥. i. fiat decoct. in lacte chalyb. dissolue sacchar. ros. an.
℥. i. β. boli armen. ℥. ij. syrupi rosar. siccar. ℥. j. vitellum oui. fiat clyster.

℞. succi cydonior. ℥. ij. succi plantag. portulac. an. ℥. i. cum sacchar. rosar.
Sic inlep in modum syrupi perfecte colli. utatur cum decocto graminis. 2.

Fiat emplastrum ex cerato Santalino pro hepate.

℞. aqu. plantag. rosar. an. ℥. ij. aqu. decoct. hordei ℔. β. in quibus dissol. hyrup. rosar. succ. & mell. rosar. an. ℥. i. β. *Fiat gargarismus. colluctos sepe; sentiebat enim ardorem in faucibus, & difficultatem deglutendi. Teneat in ore sacchar. rosar. interdum tabell. diatragacant. frig.*

℞. malum cidonium vnum: pistetur & contundatur in mortario pauco aceto rosato affuso: passetur per setaceum: passatura adde conser. rosa. ℥. ii. β. puluer. rosar. ℥. iii. mastich. puluer. absynth. rom. añ. ℥. ij. malaxentur cum oleo rosato. *Fiat cataplasma pro hepate & ventric. Extendatur super stupas molles & bene carpinatas, prius in aqua rosar. & aceto pauco maceratas.*

Item ℞. carabes ℥. ij. mastich. ℥. i. β. puluer. elect. diamargar. frig. triasantal. rasura eboris, cornu cerui, cum ℥. i. coral. vtriusque ℥. i. semin. agni casti ℥. β. semin. melonum ℥. ii. tunice interioris gallinae preparata ℥. ii. β. saccha. ros. qu. suff. *Fiat puluis.*

Et quoniam diurnitate morbi & fortasse refrigeratione ventriculi, ad eius regionem dolor obortus est, sequenti fotu ei prouisum est.

℞. absynth. roma. maio. ros. rubr. añ. m. j. menth. m. β. ligni Rhodij, cyp. an. ℥. β. omnium santalor. ligni aloes, an. ℥. ij. florum chamem. p. j. *Fiat decoct. in aqua & quarta parte vini pro fotu ventriculi ante coenam. Illinatur oleo cytoniorum & mastichino.*

℞. conseru. rosar. symphyt. buglos. borag. an. ℥. iii. myrobal. emb. ℥. β. rasura eb. coral. cornu ceru. an. scr. j. osis mespilo. scr. j. terra sigill. scr. ii. cum saccharo ros. fiat conditum.

℞. Trochiscor. de camphor. ℥. i. margarit. elect. scr. i. rasur. unior. ℥. 4. *Fiat puluis cap. hora som. cum iulepo rosato.*

℞. cerati santal. ℥. ij. mastich. ℥. β. puluis ligni rhod. ℥. iiij. malaxentur cum oleo rosato. *Fiat emplastrum pro iecore.*

℞. corali rubr. cornu cerui vsti an. ℥. j. rhei torrefacti & irrorati succo granator. ℥. j. incorporentur cum ℥. j. conseruae rosarum cum pauco syrupo myrtill. fiat parua mas. capiat mediam partem duabus horis ante insculum.

℞. balaustiorum, nucis gallarum ℥. β. absynthij rom. & vulgaris an. m. j. cyp. cal. aromat. ligni rhod. an. ℥. β. seminis plantag. ℥. ij. santal. omn. ℥. ij. *Fiat decoct. in aqua fabr. & quarta parte vini pro fotu ventris: Post fotum*

℞. mucagin. gummi arab. extract. in aqua rosar. ℥. vj. olei myrtill. cyd. an. ℥. j. *fiat litus post fotum.*

3 ℞. pulu. de cynoglof. ℞f. mastich. gr. 6. excipiantur Symplo de ciccho. fiant duæ pilulæ, cap. dormiturus.

Cùm dolor imum ventrem vexaret.

℞ malu. bijmalu. parietariæ an. m. j. semin. lini, fenugr. an. ʒ i. florum anthemit. meliloti an. m. j. absynth. rom. j. fiat decoct. in oxymel. diu: fatus fiat: & post materialia applicentur. Item data saepe potio ex iulepo rosato & ℞ j thuris.

ANNOTATIO.

2. Melius est incoquere eos succos cum aliquo decocto conuenienti, gratior & melior erit.

3. Galenus cap. i. lib. 12. method. magnam cautionem vult adhiberi in vsu soporosorum & anodynorum medicamentorum. Et Trallianus, non vulgarem noxam sequi ait ex talium rerum potione, præsertim cum imbecille sunt vires. Quæstio tamen esse potest num imbecillis viribus tutus soporosorum vsus, cum hæc viribus studere videantur.

CONSILIVM XXI.

De imbecillitate visus.

DOmina de Pallue aquea cum exertos habeat oculos, eosque satis latos vt radij rerum obiectarum non facilè in conum coniiciantur: nec suo satis gyro qui per opticum canalem feruntur spiritus retineantur: conqueritur sæpè de imminuto visu. Ac cum probè intelligerent Medicij id vitij à natura pendere vt arte subleuari tantum possit, non corrigi, tamè ne aliquid non agerèt, & efflagitanti vrgenti que mulieri nihil denegarent, variis atque variis remediis, illam bona spe crexerunt. Sæpè enim postica capitis partè dolorem grauem perferunt: sæpè ad radices oculorum ab intimis partibus dolores protenduntur, vt malè affecti cerebri nonnulla suspicio adfit. Itaque eò medicorum processit industria, vt capiti consuleretur, vel per se affecto ac laboranti, vel sublatis aliunde vaporibus plethoricis symptomatis aucto. Ac si, vt eos qui medicinam castè & integrè faciunt, decet, lubentè ægræ querenti denegassent, cum sæpè frustra contra eiusmodi inueterata mala, à natura que con-

40 CONSILIORVM MEDICINALIVM
tracta pugnetur, vt certè fecissent, non tot remediis eam vexa-
uissent ac onerauissent. At misellorum agrotantium morbi
etiam desperati aliqua remediorum formula sunt eludendi.

℞. fœnicu. recent. euph. symphy. petre. chelid. an. m̄ j. sem. ormini,
fœnic. an. ℥℞. agrimo. buglos. m̄ ℞. turbith in nodu' o positi myrob. citrin.
an. ℥ s. folior. sene ℥ j. s. fiat decoctio ad quart. 3. dissol. sacch. quart. 3. ad-
dendo express. ℥ j. ℞. agar. recent. troc. & ℥ ℞. rhei infusi in aqua fœnic.
cum ℥ j. santal. cap. ℥ ij. cum decoc. fœnicu.

℞. Decoct. vnus capi alserati cum acetosa, bugles borrag. lib. iij. car-
nem vnus cap. & duarum perdic. conseru. rosar. buglos. nenuphar. viola.
an. 3 ij. pulu. triasantal. simpl. diamarg. frigid. an. 3 ij. puluer. elect.
de gemmis ℥ ij. micam vnus panis albi maceratam in aqu. cordial. &
vino albo. fiat destillatio.

℞. bipinel. m̄ ℞. betonica sicca, sūmit. fœniculi viridis an. m̄ j. sūmit.
lupuli p. j. florū cordial. p. j. agrimonia, scariola, an. p. j. fiat decoct. ad lib.
℞. In colat. dissolue sacchari quart. j. express. 3 vj rhei infusi in aqua fœni-
cu. cum cinna. ℥ j. nucis mos. ℥ ℞. agari. ℥ j. fiat syrupus in tres doses.

℞. beton. origa. sampsuc. thymi, puleg. siccat. añ. p. j. caryophyl. nu-
cis mos. macis. cubeb. piper. lon. an. 3 j. masti. 3 ij. nucis cupres. cortic.
thur. an. 3 i s. styrac. calam. benioin. an. 3 ij. fiat pul. pro cucufa.

℞. elect. diarrhod. 3 s. coriandri prepar. cinnam sem. anisi, macis an. ℥ j.
in euph. sic. 3 ij. pulueri entur, subtilis. cum lib. ℞. sacch. fiat puluis.

℞. masti. 3 ij. cubeb. nucis mos. macis, galan. cala. arom. an. 3 s. pul-
ueri sentur omnia & excipiantur gummi tracas. in aqua roris mar. disso-
luto fiant trochisci, quorum vnus cum tenui linteo versetur in ore mane
expendo.

℞. Decoct. sampsa. & succi beta añ. 3 i ℞. vini albi odorif. 3 j. mel.
ros. ℥ ℞. pul. nigel. rom. ℥ i. nucis mojc. 3 s. bulliant omnia seruore
vno, colentur & seruentur. in vase pro caput purg.

℞. agar in succo fœnic. loco vini al. trochis. masse pillul. lucis & sine
quibus. an. ℥ j. cum succo fœnic. fiant pillule.

℞. Euph. fœnic. an. p. j. semin. fœnugr. loti in aqua fœnic. 3 j. maio-
ra. p. ℞. sem. anisi, fœnic. & gallitrich. an. 3 ℞. fiant duo sacculi quadrati
qui bulliant in aqua euphr. pro foru oculi dolentis.

℞. Aloës in aqu. end. & succo fœnic. depurato lota 3 ij. pul. hier.
simpl. 3 i s. rhei ℥ ij. agar. troch. ℥ j. pulu. euph. ℥ i. cum syrup. rosar.
pallid. fiat mass. pill. cap. bis mense pillul. 3. pond. ℥ ij.

℞. aqu. still. roris m. 3 ij. in hac calidiusc. dissol. salis gemma 3 ij.
& in hoc liquore infunde nodulum ex aloe linteo leui inuol. ex quo linteo
expresso

expresso instillabitur guttula liquoris prescripti: id fiet mane & vesperi.

℞ symph. petr. & fœnic. an. m. iij. ruta, chelid. an. m. ij. irroren-
tur vino albo per triduum: fiat destillatio in alambico cum magno igne ad
vsum.

℞ milii comm. libr. j. salis furfur. macr. salu. sicc. an. lib. s. semin.
fœnic ℥. iv. fiant duo sacculi pro capite.

℞ emplastr. de betonica ℥ij. opop. ℥ j. castor. ℥ ij. picis naualis ℥ s.
pul. chamom. maior. ireos, an. ℥ i. s. cera ℥ -ij. cum oleo nard. fiat
emplastr. sinapizetur ℥ j salis nitri pro capite.

Ouum recens ad duritiem coquetur detracto vitello, puluere è vitriolo
albo, & saccharo cando implebitur: ambabus partibus oui diuisi colligatis
macerabitur in aqua rosar. & euphrasie per quatuor dies: expressione fa-
cta fiet collyrium.

Huic Dominæ in metu cœcitatatis hîc multa remedia præscri-
buntur. Item & alia quę sequuntur optima cognitu.

℞ semin. fœnugr. loti in aqua tepida ℥ i. semin. fœnic. ℥ s. euphr.
p. s. fiat decoctio in aqua ubi ferbuerint leuiter: primam aquam abicies:
nouam addes: in secunda aqua dissolue sacchar. rosati cand. ℥ iv. mellis
rosati ℥ ij: fiat colyrium, de quo guttas in oculum iaciat agra.

℞ farin. fœnugr. & tuthia prepar. an. ℥ iv. aloës lot. e ℥ ij. fellis per-
dicis ℥ s. amyli ℥ s. cum melle ros. colato. Formentur trochisci, siccentur
in umbra, siccatis vtatur cum succo fœniculi de par. addita pauca aqua ro-
sa. maiore vel minore pro ardore.

Eidem pariter Dominæ ad dentium fœtorem corrigendum
hæc præscripta fuerunt.

℞ rad. mal. dr. s. myrrha dr. s. mastich. cornu cerui vst. an. ℥ j. off.
spong. & sapia an. dr. s. sang. drac. ℥ j. ireos flor. ℥ j s. coralli vtriusq. an.
dr. s. cinamomi & santal. citrin. an ℥ ij. cum saccharo ros. fiat puluis
pro dentibus. ℞ puluer. predict. ℥ i s. excip. gum. trag. extract. in
aqua odorif. fiant parui troch. versentur ore sape mane præsertim.

Item ad dentes.

℞ rad. althea ℥ j. ciner. rorismar. ℥ j. s. florum rosar. rubr. ℥ iij. agrim.
m. s. alum. ℥ s. tartari ℥ ii. fiat decoct. ad lib. s. pro ablutione dentiũ.
℞ corall. vtriusq. rosar. rubr. an. ℥ ij. cinnam. xyl. an. dr. i. s. mastich.
℥ ij. cum melle rosato: fiat opiata pro dentibus. Item:

℞ coral. vtriusque ℥ j. ossis sapiæ ℥ i. sang. dracon. mastich. an. ℥ s. pulu.
rad. bistorta & ireos floren. an. dr. s. cinam. ḡ. 8. ambr. gris. & carso-
phyll. an. gr. 2. ligni aloes ℥ i. rasur. ebor. cornu cerni vsti, rosar. rubr.
an. dr. s. cum melle. fiat opiata. Item:

℞ corall. vniūque, pumicis, santal. rubr. cryst. an. ʒ iij. cinnomo. caryophyll. an. ʒ j. cum melle rosato, & granis 6 mesch. fiat opiata. Aut ℞ marmor. alb. crystall. an. ʒ iij. pumicis, santal. rub. añ. ʒ s. caryoph. ireos flor. an. ʒ ʒ, cum melle. Fiat opiata.

CONSILIVM XXII.

De Asthmate.

CAROLVS d'Heruille ex asthmate, difficilique anhelitu laborabat. Iuncta erat & destillatio in pulmones, quæ suffocationis periculum afferebat. Summam pulmonum infirmitatem Medici accusabant, qui sese facile explicare non possent, nec alas suas expandere ad exigendam materiam quæ orthopnoeam concitaret. At inito prudenter consilio cum catarrho pugnatum est, incisa materia quam conceperant pulmones: & quoniam in tabem inclinatio fiebat, analeptics quoque cautum prouisumque est, ne marcor adaugeretur, tandemq; in discrimen coniceretur. Huc autem referentur multa remedia, tum quæ sistendo catarrho dicant operam, pulmonum alas explicant, tabem retardant, & hæmoptoica quoque ipsa. Vt cum eorū sylua in promptu erit, facile si quid sese offerat eiusmodi, occurratur. Magna enim copia est hominum è pulmonibus Lutetię laborantium: siue quod, vt olim Romæ eiusmodi affectus percrebuerint, ob aëris humidam temperiem, idem Lutetianis contingat. Magnam enim partem perfiantur austrinis Parisienses. 2. Siue quod Lutetiani partes thoracicas imbecillas habeant, catarrhi que obnoxij sint. Delicatæ sunt vitæ, imbecilla habet viscera. Siue quod cum post centum annos multi tabidi decubuerint, cumque nullus quantam hoc perniciem afferat, cautè animaduerteret, hæreditario iure ad posteros malum serpsit. Nam quicumque stirpe tabida sati sunt, eos ferè omnes tabes attingit. Siue quod cum nullus Medicorum hætenus monuerit nos quanta sit labes & contagio pulmonum affectorum, è quibus aura venenata effertur facile eos quibuscum versantur inficiens ac contaminans, nemo sibi prouiderit, & ita incautus venenatâ qualitate infectus fuerit. Ac futurum tandem est vt nisi vel in eam rem interdiciendæ consuetudinis lex sanciat, vel cane peius & angue tabe affectorum communis locietas fu-

giatur, malum hoc ita Lutetiæ accrescat, vt oppido pauci malignam eius vim effugiant. Cur enim elephantiorum, cur febricitantium consuetudo eos quibuscum vitæ communio est, contaminat, tabidorū virulentia impunè in populo iactabitur? Halitus foetor, spurcicies, squalorq; corporis, character & viriditas decussa, marcor, consumptio corporis luculento etiā iniecto alimento, quid aliud præter tabificam qualitatem malignamque designat. Ophthalmia, qui affectus est externus, aëri expositus, vt vapor faciliè euanescat, intuentium oculos inficit, vapor è pulmone vlcerato, tabidoque pulmones alios non inficit? Vnde tanta corporis consumptio & macies, nisi quòd tabifica qualitas ad cor delata, & à corde continuato cursu per arterias ad omnes corporis partes deriuata, omnes in extimis facultates, debilitet, conspurcet, & contamineet? In phthoe enim vt & elephantiasi spectatur quædam totius substantiæ diaphthora, quæ nulla arte corrigi & emendari potest. At plerique visi sunt & à neotericis & à veteribus qui parentum alterutro tabido sati eodem anno nati interierint quo & parentes. Nec est quod Hippocrates in *Aphorismis*, iuuenibus hunc morbum accidere dicat, quòd à vehementi exercitio sæpe hæmatoptysis præcesserit, vt Galenus interpretatur. Etsi enim causa hæc procatarrhica aliquid efficiat, tamen naturalis procliuitas maioris multò momenti est. Sed iam ad remedia descendamus. Ad marcorem in phthisi.

℞ amygdal. dulc. ℥ij. pinear. passul. mund. in aqua rosar. mund. & cont. an. ℥j. pulp. carnis capi vel coxar. ranarum vel cancrorum flumiatiliū, vel testudinum ℥j. medull. 4 sem. frig. maior. alb. & bombac. an. ℥ij. anisi & cinam. an. ʒ℔. amyli parum, sacchar. qu. suff. fiat massa panis cum in sculo pulli: fiant placentæ. coquam. in clibano.

℞ puluer. pulm. vulpi præpar. ʒj. pulu. diaireos & diatrag. frig. sacchari cand. an. ʒj. coral. rub. rasur. unicorn. an. ʒ 4. ambr. gris. gr. ij. marg. elect. ʒj fiat puluis.

℞ har. vit. linum vnam, pullos tres, testudinem nemoralem vnam: coqu. in aqua cum lactuc. portul. agrimon. pinear, iuiub. sebest. semin. bombac. vngul. caball. passul. ʒj. ℞ præd. decoct. ℞ 6. lymaces vineal. 60. repurantur in alambico cum carne capi iuuenis. Fiat destillatio in Balneo Mariæ: vtiatur in passu. & extra passus cum sacchar. r. f.

Etcum vrget tussis à catarrho destillante in pulmones, hæc conferunt.

℞ glycyrr. ℥ss. passul. ℥j. iuiub. sc̄est. an. num. 6. bulliant in iusculo pulli. In colat. dissol. mann. granat. ℥ij. sacchar. candi ℥ij. fiat dosis.

Fiat litus ad totum thoracem ex oleis quæ ad eam rem institui ordinarie solent.

℞ conseru. ros. violar. & bugloss. an. ℥ss. conser. scabios. & vngu. caball. an. ℥ij. pulp. sebest. & iuiub. an. ℥ij. boli arm. præp. ℥ij. pulu. elect. diatrag. frig. ℥ij. syrup. ros. sicc. & myrt. qu. suff. Fiat Opiata.

℞ rosar. rubr. mastich. santal. citrin. an. ℥ij. myruill. ℥ij. sampsuc. flor. stæchad. an. p. s. beton. sicc. ℥ss. Fiat puluis ienuiss. quo aspergatur pars anterior capitis.

℞ diatrag. frigid. ℥j. penid. ℥ij. looth sani ℥ss. iulep. ros. qu. suff. fiat in modum Opiate.

℞ nigell. rom. ℥ss. vernicis ros. an. ℥ij. ligni aloës ℥ij. mastich ℥j. fiat suffitus pro capite.

℞ decocti hordei mund. ad crepat. cocti ℔ ij. in quibus bull. iuiub. sebesth. daetyl. passul. an. ℥j. glycyrr. ℥ss. bulliant omnia ad consumpt. tertie partis. adde folior. vngu. caball. & bipinell. an. p. j. In decocto dissol. sacchari albi ℥vj. fiat syrupus eximius.

In catharro vehementissimo cum magna humorum copia frigidorum præsertim, valet quod sequitur.

℞ chamem. melil. scabios. bugles. hys. satur. an. m. j. vngu. caball. m. ij. rad. enul. campan. eryngi an. ℥ij. semin. anisi ℥ij. rad. ireos ℥ss. fiat decoct. & excipiaturs eius fumus.

℞ rasur. ligni sancti. ℥ij. sarcop. ℥i. s. stæchad. Arab. omnium capill. scabios. bipinell. borrag. hys. agrim. an. m. ss. semin. anisi, fenic. an. ℥ij. glycyrr. ℥j. iuiub. sebesth. polyp. an. ℥ij. epith. vnt. i. s. Fiat decoct. ad ℔ dimid. In colatura dissolu. theriac. veter. vnc. s. syrup. cap. ven. vnc. iij. syrup. de stæchad. vnc. j. s. colent. per manicam hippocr. cum cinnam. Capiat uncias tres singul. matur.

Cum præ copia materiæ asthmaticæ ægri quodammodo videntur, valet hoc quod sequitur.

℞ rad. serpent. vnc. ij. passul. & glycyrr. an. vnc. j. fiat decoct. ad lib. j. In colat. dissolu. sacchar. vnc. iij. fiat in modum Iulepi. Item:

℞ cypp. calami arom. an. ℥ii. cort. citrii, asse odor. an. ℥i. milii sicc. furfur. mac. loti in vino & sicc. an. ℥ij. salu. ℥ij. ros. rubr. santal. citr. an. ℥ss. Fiat puluis, cuius pars inspergatur capiti hora somni.

℞ succi liquir. in aqua scabios. infusi ℥vi. puluer. elect. diatr. frig. ℥ii. pulu. diatr. ℥iij. sacchari candi & penid. an. ℥i. s. sacchari albi ss. ℥iij. cum infus. gum. tragac. in aqua rosar. fiat pasta: form. pil. sub lingua.

℞ boli arm. ʒ s. elect. diatrag. puluer. glycyrr. cirræm. an. ʒ i. pu.
elect. aromat. rosar. ʒ s. sacchari albiss. ʒ iv. cum infus. gummi tragac.
in aqua rosar. & ungu. cabal. fiat pasta.

℞ puluer. irecos floren. gummi tragac. an. ʒ i. amyli, boli arm. an. ʒ j.
rhet pulu. ʒ ii. rasura ebor. cornu cerui an. ʒ s. liquirit. rosa ʒ i. s. saccha.
in aqua ungu. cabal. soluti quant. suff. Fiant tabell. ʒ j. teneat in ore
sape.

℞ mell. destum. sacchari & butyri recent. an. ʒ vj. viatur ex cochleari.

℞ medul. caulium rubror. coctior. inter cineres vnc. duas, 4 semin. fri-
gidor. maior. incisor. vnc. j. sacchari albiss. vnc. iij. fiat conferva.

℞ diatrag frigida. vnc. s. diatricos vnc. s. semin. bombac. melon. an. dr.
ij. pulpæ passul. mundat. ʒ i) s. cum partibus aquis syrupi violar. & ca-
psil. fiat loob.

Et cum perenniter illabatur catarrhus à materia effera, qui
tabem tandem afferat, ille qui sequitur syrupus miraculosè di-
citur prodesse.

℞ flor. & germin. r. salicis, folior. vitice mortua an. m. iv. summit.
viminis rubri, folior. bursa pastor. an. m. y. fiat decoctio in lb. iij. aqua
rosar. ungu. cabal. & bursa pastor. cum saccar. lib. j. s. ad medietat. su-
mat ʒ j. s. cum aqua destillat. viminis rubri.

℞ ungu. cabal. bugles scabios. an. m. i. s. iniub. sebist. num. 4. fol.
senæ ʒ i. fiat decoctio ad lib. s. In colatura infunde agar. ʒ s. sacchari
candi lib. s. Fiat syrupus, capiat bis in hebdomad.

℞ syrupi rosar. siccar. iniub. & de papau. an. ʒ ij. pilul. de cynogloss ʒ j
miscantur in mortar. capiat ager sine aqua duo cochlearia sero, adantà
ʒ i. s. puluer. saccha. ros. aut candi.

Suffumigium pro capitis ornamentis in destillat. Sed hoc mi-
hi valdè non probatur. Vsurpatum tamen à nobili viro.

℞ coriandri prapar. ʒ vj. gummi hadera, sandarac. mastich. olibani,
& rosar. an. ʒ j. s. trochiscor. de caphura ʒ s. semin. papauer. albi ʒ i. s.
contundantur omnia crassiusculè. Ex his mane & vespere in lecti introitu
suffiantur capitis ornamenta.

℞ agar. trochisc. ʒ j. olibani ʒ ij. fiant pilule 6. capiat vnam dormi-
turus.

℞ scabiosa, bipin. ungu. cabal. an. m. i. ficus pingues num. 8. passul.
iniubar. sebist. prunor. damasc. an. ʒ j. semin. melon. cucumer. ar. ʒ ij. fiat
decoct. ad quartar. ij. in quibus dissolu. oxymel. simpl. & sacchar. ros. an.
ʒ vi. fiat in modum syrupi.

℞ materialia prædicta, coquantur cum gallo vetere, in decoct. ʒ v.

dissolu. manne grana. vnc. ꝑ. s. fiat potus.

℞ radic. albhe in taleolis sect ꝑ. i. summit. malua, bismal. buglos. borrag. an. m. i. plantag. p. ꝑ. i. iuiub. sebest. dactyl. pruna damasc. an. an. 20. semin. bombac. melon. cucurb. an. ꝑ. s. glycyrrh. ꝑ. s. conseru. ungu. cabal. ꝑ. s. ungu. cabal. m. ꝑ. s. hysopi sub linem positi p. s. florum nenuphar. & violar. an. p. i. agrimon. bipin. an. m. i. Fiat decoct. ad lib. i. in aqua ungu. cabal. & rosar. In colat. dissalut. sacchar. candi, & rosa. an. lib. ℞. Syrupi de ungu. cabal. ꝑ. s. penid. ꝑ. s. fiat syrupus perfectè coctus.

Et quoniam sanguis ore reicitur, sæpe formidabile symptoma proximè phthoen minitans, quammaximè anniti debemus vt hoc arceamus.

Syrupus ex stercore asinino in omni reiectione sanguinis confert plurimum. Lauatur primùm in aqua rosar. in eadem incoquitur cum saccharo rosato, & fit syrupus.

℞ conseru. rosar. veter. buglos. borrag. an. vnc. i. puluer. semin. plantag. ꝑ. i. boli armen. terra sigil. an. ꝑ. s. lapid. hemat. scr. i. cum syrupo capill. ven. fiat opiata.

℞ Iuleptros. vnc. i. vtatur cum aqua ros. & plantag.

℞ succor. portulac. plantag. vrtice mori granat. lactuc. an. ꝑ. s. sacch. ros. quart. tria. fiat Iulep in quo madaeat nodulus ꝑ. s. lapid. hemat. sicut, alkoor puluer.

℞ syrup. myrtil. & papau & rosar. sicc. an. ꝑ. s. capiat dormituru.

℞ mumie puluer. ꝑ. s. terra sigill. scr. ℞. aqua plantag. rosar. centinod. an. vnc. j. detur.

℞ succi ungu. cabal. plantag. an. vnc. iij. succi berber. & macerat. rosar. sicc. an. vnc. ij. cum saccharo ros. fiat iulep.

℞ mumie ꝑ. s. terra sigill. & boli armen. an. ꝑ. s. aqua myrtil. & ros. an. ꝑ. s. decoct. rosar. & cortic. citrii lib. s. ꝑ. s. iulep. in 4 doses.

℞ boli armen. terra sigill. mumie an. ꝑ. s. semin. papau. albi & melon. an. ꝑ. s. glycyrr. ꝑ. s. sacch. candi ꝑ. s. Excipiantur omnia in gummi tragac. extracto in aqua rosar. fiant formulæ quas in ore teneat.

℞ maioran. flor. chamem. melilori an. p. s. fiat decoct. pro vapore nasi.

℞ meliss. buglos. scolop. plantag. beton. ungu. cabal. folior. cardui. portul. an. p. s. passul. ꝑ. s. folior. sene ꝑ. s. F. accoet. infunde rhei ꝑ. s. dissolue syrupi violar. ꝑ. s.

℞ semin. papau. albi ꝑ. s. puluer. diarrizag. frigid. ꝑ. s. amy ꝑ. s. semin. melon. lactuc. an. ꝑ. s. glycyrr. ꝑ. s. sacch. ros. ꝑ. s. cum mucagin. semin. phyll. in aqua lactu extract. Fiant formulæ quæ ore versentur.

Cum à capite catarrhi origo est labentis in pulmones, vt &

capiti & thoraci consulatur, valet hic syrupus.

℞ radic. lapathi acuti, serpent. bismalua. iros florent. an. ℥ s. cichor.
tot. agrimon. adiant. ungula caball. hyssopi an. m. i. semin. bombac.
mal. melon. cucumer. senn. añ. ℥ ij: passul. glycyrr. an. ℥ i. s. ficus, iuiub.
an. numero x. violar. p. ij. Fiat decoct. in qua infund. agarici trochisc.
℥ ij. cinnamom. & santal. citrin. ℥ ij. bulliant mand. in colat. dissol. cass.
℥ iij. sacch. qued suff. Fiat opiata, capiat unc. vnam cum sacch.

℞. pula. rosar. cornu cerui, santal. alb & rub. an. ℥ ij. spod. gummi
Arab. mastich. an. ℥ s. coral. ℥ j. succi glycyrr. ℥ s. semin. papau. &
melon. an. ℥ v. cum saccharo in aqua ros. solu. fiant tabell. pondere ℥ ij.

℞ diarrhod. abba. diatrag. frig. an. ℥ j. coral. ℥ j. cum sacch. dissol.
in aqua rosar. fiant tabella pondere ℥ j. s.

℞ rhei ℥ s: mastich. gr. ʒ. cum aqua agrimonia. fiant pilule tres, ca-
piat mane.

℞ succor. plantag. portul. centaur. an. ℥ iij: succi granat. ℥ iij: aqua
rosar. macerata cum lapide hemat. super marmore ℥ ij. sacchari ros. qu.
satis. fiat syrupus posito nodulo boli armen. inter coquendum. Capiat co-
chlearia duo cum express. ʒ. vnius rhei bis in mense.

℞ aquar. plantag. & rosar. an. ℥ ij: aqua macerat. rosar. siccat. ℥ ij.
cum sacch. ros. fiat Lulep.

℞ rasura ebor. cornu cerui, margar. elect. an. scrup. j: coral. rubr. lapid.
hemat. boli armen. terra sigil. an. ℥ s. glycyrr. ʒ y: cum sacchar. ros. in
aqua arnoglos. soluto. fiant tabella pondere ℥ ij.

Opimum est remedium opiata facta ex pulpa passular. dama sc. ex pul-
pa iuiubar. & sebest. cum sacch. qu. suff.

℞ succi depur. per residenciam. plantag. portul. granat. cydonior. be-
ton. agni cast. an. ℥ ij. sacch. ros. qu. s. fiat syrup.

℞ spodii, rosar. rubr. boli armen. terra sigil. hemat. an. ℥ s. coral. rubr.
carab. margar. an. ℥ i. s. gummi tragac. dr. ij: semin. papau. albi, por-
tulaca, mal. rosar. rub. arnoglos. cornu cerui vsti an. dr. ij. acacia, succi
barba hirci, succi glycyrr. an. dr. ij. amyli torref. drag. ij. terantur,
misceantur cum saccharo, fiat puluis.

Tabidos alui fluorprehendit saepe, vnde mors consequitur.
Eò hæc conferunt.

℞ cerati santal. ℥ ii. cerati stomach. cydonior. an. ℥ s. mastich. ℥ j:
olei myrtil. qu. suff. fiat emplast. pro stomacho.

℞ oiet de absynth & cydonior. an. ℥ ij: spica nar. ℥ ij: santal. citrin.
coral. rubr. spod. rosar. an. drag. j. cera q. s. Fiat liniment. pro hepate.

℞ conf. rosar. nenuph. an. ℥ i. coral. rub. cornu cerui, boli armen. ter.

re sigill. an. dr. s. sacch. ros. ℥ iij. Fiat conditum.

℞ succi pomor. de curtup. plantag. endiu. an. vnc. iij. succi granat. & cydon. an. vnc. i. β. sacchari & syrapi rosar. an. qu. suff. fiat syrupus.

℞ pulu. elect. diarrhod. abbat. & triasant. an. dr. β. diamarg. frigid. ℥ ij. cornu cerui vsti, & ebor. an. ℥ j. sacchar. dissol. in aqua rosar. Fiant tabella.

℞ conseru. rosar. symphy. an. ℥ j. cortic. citrij cond. myrobal. citrin. cond. an. ℥ β. trochiscor. de terra sigill. & de spod. an. dr. β. trochisc. de coral scr. j. pulu. elect. Letitiæ grana xv. cum syrup. myrtino. Fiat syrup.

Ad superiora quoque pertinent hæc quæ in destillatione præscribi possunt.

℞ conseru. violar. anthos, carnis myrobol. embl. cond. an. dr. ij. pulu. passul. & sebest. an. ℥ s. ol. bani pulu. mastich. an. scr. j. cum syrupo de stæcha. Excipiantur omnia: capiat drach. j. horâ somni.

℞ conseru. symphy. rosar. an. ℥ j. carnis myrobol. embl. vnc. β. cum syrupo myrti. Fiat opiata, capiat mane cum syrupo sequ.

℞ sigill. Salom. herbæ iudaicæ an. p. ij. plantag. cum rad. m. i. consolidate viriusque an. m. β. bipin. m. j. β. semin. plantag. ℥ ij. Fiat decoct. ad lib. j. In colatura dissol. sacch. ros. ℥ vi. capiat ℥ i. s. pro dosi.

℞ rad. ireos florent. enule campanæ, glycyrr. ras. an. ℥ β. passul. mund. dr. 6. ficus pingues num. tres, iuiub. sebest. alkeken. an. num. 6. bulliant in aquis partibus vini albi & aqua. Fiat decoct. ad usum sequentem.

℞ gummi tragag. zj s. pul. glycyrr. ℥ iij. pul. elect. diaireos simpl. & diatrag. frig. an. ℥ s. sacch. candi & penid. an. ℥ i β. anyli. zij. cum sacc. al. ℥ vj. dissol. in decocto superiore. fiant cylindri.

℞ rad. ungule cabal. ℥ ij. glycyrr. ℥ j. carn. dactylo. viij. iuiub. sebes. an. ℥ j. adian. folior. ungu. cabal. an. m. j. passul. damas. nucleor. pini. an. ℥ i. s. semin. mal. bomba. an. ℥ iij. fiat decoct. addendo sub finem puluer. pulmon. vulp. ℥ ij. in colat. ad quart. iij. dissol. oxymel. simpl. syrup. violar. an. ℥ ij. sacch. can. ℥ vj. fiat syrup. vtatur mane longe à pastu.

℞ carnem duarum testud. prepar. rad. serpent. maior. glycyrr. ungule cabal. an. ℥ ij. scabio. adiantii. capil. vener. scario. hyss. an. m. j. iuiub. sebes. numero 12. passul. ℥ ij. semin. melo. cucurb. dactyl. enucleat. nucleor. pini, & pistactar. an. ℥ j. fiat decoctio in aqua scabio. ungule cabal. scabio & endiu. in colat. ad lib. j. dissol. mel. al. & sacch. an. quart. iij. clarificatio fiat puluere sequenti.

℞ pulu. diaireos, diarrhod. abb. an. zi. puluer. pulmo vulp. prep. ℥ iij. pul. ireos flor. ℥ β. ciunnamo. zi. ponantur omnia in nodulo.

ANNOTATIO.

ANNOTATIO.

1* Maxime verò contingit magnam partem pulmonum in his regionibus vitiatam apparere, quòd etiam à pueritia magna in thorace accretur phlegmatis copia. Videmus enim omnes ferè nostros pueros iusticulosos esse, raucos, & treuuantius, cum tamen nil extussiant. Sic colligitur pituita, quæ non recta amplius à natura pulmones corrumpit.

2* Tussis oritur vel stimulatà naturà à materia influente è capite: vel eadem stimulatà à materia contenta in pulmone. Cum tussis continenter affligit, argumentum est descensus humoris è capite, licet interuallis longis, credibilius à materia in pulmone contenta oriri. Si à capite manat, roborandum caput, & impediendus catarrhus: si in pulmone contenta, bechicis utendum. In catarrhis, sed ferinis, presertim illud fieri potest: non est alienum sepe ac sepe cibum ingerere; hinc enim catarrhi impetus debilitatur: nisi fortè ex esculentis aut potulentis aliquid alienà qualitate tussim prouocet.

* 3 Salix maximas vires habet. Desiccatur impensè, & sine morsu. Mirum est, cum hæc arbor adeò sit familiaris nobis, eius vires tamen negligi, quæ Dioscorides tanti facit lib. 1 suorum Simplicium.

* 4 Quarto locor. affector. Galenus abunde explicat quomodo distinguere possimus an sanguis à ventriculo, an à pulmone, an ab ore reiciatur. Inter cætera commemoratione digna, scribit quosdam hemorrhagiã tentatos, & excreuisse sanguinem per vomitum ob ductam per os & per nares forte fortunã hirudinem exiguam admodum quæ tempore accreuerit. Quod notandum est.

CONSILIVM XXIII.

De Febre Tertiãna.

DOMVS Lotharingæ custos circa mensem Augustum in febrem incidit. Vt corpus biliosum erat, constitutio temporis calida sicca, ita adorta febris est tertiana. sed ea non multò post tempore mutationem recepit, & quæ prius stata rataque esset, ea erraticæ effecta est in quartanam proximè degeneratura. Reddito aëre caliginoso, inæquali, frigidòque corpus melancholicum effectum est per adustionem humoris biliosi

50 CONSILIORVM MEDICINALIVM
dominatum humoris indicarunt & actiones animales expedi-
tæ, citæ, celeres, motus animi, excrementa quoque ipsa, & ca-
loris species. Tandem quartanarius decubuit, ingens admo-
dum sitis, procliuuitas ad iram, vigiliæ perpetuæ. Nec dum ta-
men perseverant circuitiones periodique quartanæ. Exactis
enim sex aut septem circuitionibus satis constantibus, interie-
ctæ sunt aliæ accessiones modò cum sensu frigoris, modò sine
sensu, ita tamen vt die quoque quarto primæ febris ratio ali-
qua retineretur. Dubitabatur num triplex, an duplex quartana:
an hemitritæus. Non hemitritæus erat quòd continuus non ef-
fet, nec affecti ventriculi argumenta sese proderent. Non du-
plex tertiana, quod maius multò esset interuallum inter repeti-
tiones quàm in duplici tertiana esse solet. Ergo eæ accessio-
nes ita incertæ aut significabant causam nondum satis firmã in
lactibus & viscere vtroque, aut translata materia à suis sedibus
breuì finitum iri morbum. Scribit Galenus vsu intempestiuo
theriaces & rerum similium, præsertim nondum cocta materia
effici vt ex simplice quartana duplex triplèxque fiat. Incidit e-
nim materiam nondum præparatam, & in diuersas partes pellit.
Ita nimirum humor in illo corpore redundans tenuis, acer, à
bilioso adusto procreatus, seipse potuit mouere, ciere, & im-
pellere. Vt quod theriaca tanquam externum efficere posset,
idem humor tanquam à sese habens motus principium præsta-
ret. 2. Sed hæc fortassè argutiora. Non adhibuimus maio-
rem operam vt morbus destrueretur, quia corpus vt nimis sic-
cum ferendo non esset. Immò nostra remedia irrita videntur
fuisse, nisi ex eo irrita non fuisse videri debent, quòd nobis au-
toribus, cum alioqui morbus esset periculosus, & homini ne-
cando satis, vim mortis tamen euaserit, morbo nimirum delu-
so & temperato. Contrà in hac quartana gerere se oportuit
quàm in aliis. In his enim vsui sunt aperientia, vehementer &
impensè calfacientia, piperata, salsaque: Sed hic ad humectan-
tia planè descendendum fuit, tum vt ingenti siti quæ præcipui
symptomatis rationem habebat, consuleretur, tum vt humo-
rem biliosum adustum temperaremus, & quodammodo oc-
casionem contrahendæ putredinis præiperemus. Quærebatur
num iteratò mittendus sanguis, an medicamentis pugnandum.
Neutrū accommodatū visum est. In morbis acutis, & principis
morborum longorum valida quidem remedia vsuueniunt,

quod & natura adhuc viget, & quia humor cedit trahenti medicamēto. Hic morbus progressus est, & nescitur quorsum eue-
dar. Ergo naturæ medicatrici cōmittend^o est. Natura enim mā-
ximè medica in longis apparet coquendo, fecernendo, abscef-
sum moliendo, virtus non stat: ergo & venæ sectionem & pur-
gationem dehortatur. Mineræ virtutum in partibus solidis.
hæ siccæ sunt diuturnitate morbi, vaporū ora conuident, con-
cidūt, & collabuntur: siccitas illa & collapsus impedit actionem
medicamēti: & potius colliquatio afferretur partib^o solidis. Pre-
terea si paulò validius medicamentū daretur, metus esset ne in
dolores colicis similes eger incideret quod in plerisq; obseruatū
est quibus humor exagitatus est. Item & obseruatū mulierem
quartana laborantem, cum iam 16. dies quieuisset assumpto etiā
medicamentulo, in morbū elapsam esse: Omnis enim materia
agitata emotaque seipsa quiescente deterior esse solet, quod di-
ligenter animaduertendum fuit. Vrinæ flammeæ sunt admo-
dum, sitis magna non propterea tamen hæc sectionem venæ ar-
guunt. Nam oportet in iis febribus fuliginosum excrementū
efferri à præcordiis ad cor, quò fit vt facillimè ventriculum at-
tingat, & à ventriculo tunicam linguæ aluòque ipsi cōmmunē.
Et cum sedabitur illa, incipietque corpus bene nutriri humidis
alimentis naturæ resurgentis, & recreantis sese erit argumen-
tum. De prognost. Metus esset ne in marasmus coniceretur,
nisi probā victus ratione prouideatur: id quod febres erraticæ
efficiunt sæpè, tum quòd focus multiplex, & natura sæpè ac sæ-
pè affligatur. Spes enim conualiturum, quòd hypochondria non
meteora, nec pro ratione febris inæqualia. At in omnibus mor-
bis hypochondria rectè valere optimum. Alui fluor confer-
ret si non cum excrementis rapiatur chylosa substantia è ven-
triculo. Nec hodie verum constat esse quod scribit Hippo-
cates, quartanas securissimas: cum his temporibus aut illis succe-
dat hydrops, aut scirrhus lienis. Tamen cum affecta non sint
viscera insigniter satis tuta potest esse quartana. Nunc autem
obseruatur in eiusmodi febribus quartanis canerosam in cor-
pore lienis concipi dispositionem, quæ quo magis medicamen-
tis irriteretur, magis ægrescat medendo, quod & in externis affe-
ctibus cernere est. Tota ratio curationis ad duo reuocabitur, ad
curam ventriculi vicinarumque partium: item ad dietam.
Dieta hæc erit: Utatur iusculis sæpè, immò etiam sub finem ac-

cessionis, minutalibus vitulinis, panata; hordeatis, vino diluto tamen. Est enim sitis ingens, & vrinarum venosique generis ardor dissuadet vsum vini, tum morbi longitudo suadet; aqua enim non transfret vasa longo morbi tractu collapsa & conuientia, nisi vcheretur. Ventriculo studendum quòd fatiscat morbi longitudine, & quòd eadem de causa congerat multa excrementa, vnde morborum aliud semen. Liniatur ventriculus oleis quæ vim habebunt eius corroborandi, & astringendi. Foueatur iis quæ eundem excitabunt & confirmabunt. Dantur tabellæ ex aromatico rosato descriptione Gabrielis, & Triasantalato. Atque ea ratione futurum est, vt vincente, triumphantéque naturâ, quæ nunc inferior veluti latet, morbus debilitetur, & tempore destruat.

ANNOTATIO.

* *Hic æger grauissimè habebat, & dolores grauissimos perserebat. Sudabat sæpè, & tamen nihilum sudores proficiebant. Ac reuerà nos obseruauimus in Quartanis sudores non proficere solere. Nam cum materia sit crassa, frigida, leuia, non est credibile eam ita attenuari posse, vt in sudores resoluatur. Sed cum calor naturalis & calor febrilis nihil non agere possit, adoritur aliam tenuem materiam alendo corpori satis accommodatam: vt mirum non sit si non proficiant tales sudores, cum maxima ex parte non sint ipsius materia morbifica. Profunt quidem sudores apparentibus coctionis signis, quòd materia natura cedat, sed donec aliquid tale apparuerit, non est quicquam opis expectandum. Vnde non est cur solliciti simus de citandis sudoribus in Quartanis. Nam si sudores nondum apparentibus signis coctionis, procurari non possint sine obstructionis maioris metu, quod ars non audeat facere id si natura parum prouideat, presterit, minus sauiti corporis consuluerit. Quod hic diximus de crebris sudoribus qui in Quartanam incidunt, questione dignum vnde oriantur. Nam non credibile est materiam tam crassam ita in halitus abire, id quod præsertim in corpore squalido & sicco, in quo tamen tot sudores apparent. Et hic annotari oportet anno Domini 1573 plurimis Quartanaris corpus rotum sudoribus disfluxisse corpore planè emaciatò, squalido & arido. Et ij sudores nil proficiebant. Horum duplex causa esse videbatur, infirmitas nature priore morbo ita fatigata: item ariditas hepatis & viscerum. Nam cum calor febrilis diu durans partes resiccet, fit vt quod alimentum allicit, ad partes facile non possit agglutinari, præsertim cum liquidius est. Tales*

autem febricitantes solis iusculis liquidis utebantur; nec mirum si nequeante hepate ob siccitatem multum consumere, reliquum per sudores exeat. Hanc questionem alio loco fusius forè explicabimus.

*2. Tamen si in morbis, & presertim in febribus: in hypochondriis, nec inaequalitas, nec tumor appareat, propterea securos esse non oportet de morbo, ut in hoc aegro apparuit: Etenim vitium saepe in ipsis visceribus haeret quod tactu nec visu percipitur. Itaque falli non oportet: Et id primus obseruauit Gal. cap. 7. lib. 5. Locorum affectorum; ubi declarat saepe colore aruginosum, aut auruginosum potius in superficie corporis apparere nulla existente obstructione, aut inflammatione, aut scirrho in hepate: ut & alteratio sit temperamenti non alienatio, nec sit morbus ullus in conformatione: idcirco cum tales colores adsunt, non statim ad admota foris deueniendum, ut male quidam factitant.

Iste vir, de cuius morbo hic differitur, circa mensis Nouembris decimum sextum diem lunam inclinante interiit. Et antequam interiisset intumebant pedes, omniumque partium corporis dolor obortus fuerat. Quarto antequam interiisset die, de repente suppressa est urina, & venter intumuit, ac si natura aliquid vellet moliri ad solutionem morbi: prescripto diuretico excreuit urinae plus minus pintas tres. Visus est alluari. Repente accessione noua cum horrore interiit.

CONSILIVM XXIV.

De Hydrope.

MERCATORIS vxor, de qua antè, nec purgationibus, nec Vide ante
hoc consi-
lium 17. venaefectione, febris & tumoris quo detinebatur, curationem recipiebat: Immò morbus tanto contumacior resistebat, quanto maiore operâ ac curâ Medici conarentur vt morbum profligarent. Sed à Medicis aberrari videbatur. Nam illi rerum humidarum vsum suadebant, vsum quoque vini: hi negligētā febre ab humidis rebus agram auocabant, vt & cruditatem humoris in præcordiis contentam corrigerent, & tumorem omnium partium extimarum & abdominis minuerent. Item vino interdicebant illi: hi eam ad eius vsum hortabantur. Nec abs re dubitatum est vtri potius esset consulendum. Nam & à febre metuendum est, quæ dum humores corrumpit, maiorem

semper tumoris occasionem affert, & tumor iste curationem postulabat, ne si incremento non prohiberetur, tandem hypofarcidion immedicabilem adduceret. Ac reuera tumor ille morbi rationem habebat, à febre quidem primò originem ducens, sed qui priùs symptomatis nomine donari deberet, morbi rationem habere debebat, quod & cruditatem eius causam corpus contineret, & actionem læderet. Dum contrariis sententiis pugnaretur, de agræ salute ambiguum admodum ibat, necdum constabat quo loco standum, quidve consilij ea in re caperetur. Coacto Medicorum concilio res diligentius pensitata est, quod agræ mulieris sanitas admodum lubrica foret. Visum est omnibus febrì & tumori consulendum; ita tamen vt potius febris, quàm tumor, eiusque causa negligeretur. Humorum congeries & cruditas visa est totius morbi causa: & febris ipsius, & tumoris. In iis humoribus sepultus calor visus est sese recreare nequies; vt nisi prouideretur breuì, leucophlegmatis verus sequeretur, à quo vix euaderet. Vrinę ardebant: sed id nihilominus febris habendam rationem indicabat, quod & leucophlegmaticis esset familiare, in quibus sectio venę metuenda, licet febris eam exposcere videretur. Quin & eam venę sectione curationem aggredi, agram iugulare asserabant: & erratum ab iis qui iam quartò venam secuissent, falso inducti sanguinis detracti prauitate. At talis in leucophlegmaticis sanguis redundare consuecit. Attantum abest vt quartò iterata venę sectio iuuerit, vt iacturam caloris naturalis attulerit, cum incubendum esset in coctionem tam contumacis materiæ morbum longum efficientis. In tanta enim cacochymia incidebat occasio nulla secandæ venę. Quod attinet ad veram curandi methodum, hæc in medium adducta sunt quæ in nullis morbis vsuuenire debent, & quæ Galenus 12 Method. propositâ febre cum syncope & cruditate coniuncta pertractauit. Nam eò loci nec purgationi, nec venę sectioni quicquam concedi debere explicauit, quod & vires in ea humorum corruptela, & veluti hypofarcidion habitusque tumore elanguescant, & cruditatis ipsa ratio omnem occasionem purgandi præripiat. Immodò in eiusmodi affectu solâ frictione corpus exercet paulùm admodum maioribus artis medicæ remediis attribuens. Ad summum reuocari debet eius morbi curatio ad duos canones quos Hippocratis Interpres pro hypothési proposuit. Nam in prima Aphor.

fectione, febrem hydropi humido iunctam constituit, vt vtri tribuendum sit in iis & similiter complicatis affectibus, doceatur: æquè studendum vtrique tandem concludit, ita tamen vt eius quod magis vrget potior ratio habeatur. 2* Posterior hypothesis est de febre quotidiana: in ea habenda est ratio febris, & materię: hæc siccantia & calfacientia postulat: illa contraria. Galenus ita in eo se geri negotio, vt neglectâ ad tempus febre materię preparationi incumbat. Quod diligenter annotari debet. Contra nitebantur, qui dicebant, idè sectione venę commodam videri, quòd ex lochiis & mensibus non nihil superesset. 3* Tandem dictum est mensium recentem suppressionem sectionem quidem venę hortari: sed cum morbus etiam ab ea suppressione natus iam affectus est. Imbecilla ea est quæ à suppressione ista fumitur indicatio: nam contaminata est sanguinis molisque corporis œconomia, succreuitque cacochymia quæ ex se catharsin indicabit. 4* Nec febris ipsa per sectionem indicat. Nec enim omnis febris sectione venę tollitur, præsertim quæ à cruditate orta est, & cum caloris inopia coniuncta est. Placuit eis vt vino etiam generoso vteretur ad excitandum calorem naturalem, vires recreandas, cruditatem coquendam, vt idonea reddatur ad excretionem, & tumorem minuendum. Vinum absinthites probatum. Sequens apozema institutum.

℞ rad. enul. camp. sicca ℥i s. rad. apij, petrosel. aspar. fanic. an. ℥j. omnium capill. agrimon. an. m. j. beton. scolop. chamad. chamapyz. an. m. j. florum cordial. absyn. rom. an. p. j. glycyr. polypos. passul. an. ℥j. stæch. florum anthos an. p. j. solior. senæ vnc. iij. agar. sub finem decoct. positi vnc. ij. fiat decoct. ad lib. j. addendo turbitib. vnc. s. In colat. dissol. saccha. q. s. fiat syrup. quo semel in hebdom. utatur.

℞ melilo. salvia, hyssop. agrimo. an. m. j. sypperi, cala. arom. schæn. an. vnc. s. florum cordial. p. j. fiat sacculus, bulliat in vino pro foku.

ANNOTATIO.

Mulier hæc circa solstitium autumnale interijt cum præcessisset alui fluxus symptomaticus à quo nil est alienata. Nec vlla fuit salutis spes quod omnium pene malè affectarum partium internarum magna argumenta apparerent. Ita enim Hippocrat. sub finem & de morbis, ubi in hydrope alius valde fluit, citissime moritur audiens & loquens.

*Hypofarcidios, quia aliis affectionibus successit, funestus fuit, non per se, sed ex euentu. Verum enim id est quod scriptum ab Hippocrate libro *mei nãdãr*, morbum omnem alicui succedentem, funestum esse ferè. Huc pertinet quod scriptum ab Hippocrate sub finem lib. 3. de morbis. Omnis hydrops difficilis curatu, præsertim si corpore attenuato veniat, & ubi aluus fluit, moritur citò.*

*Mirum est quod cum totum corpus ædematosum esset, & *vũfãdes* maccosum dicere possis, tamen intus ardorerat, & non nisi admodum sollicitata aluus reddebat. De hoc morbo videtur ad vnguem pronuntiasse Hippocrates in Coacis. Nam verè exprimitur morbus & symptomata: Quibus ex aegritudine aliquæ res ad aquam intercutem deuenit, his alui sicca spiratodea reddunt cum eliquatione maccosa: vrina non bona: distentiones præcordiorum, dolores, tumores in ventre & in aqualiculo: & iuxta spinales musculos: febres, sitis, tussis sicca, spirandi difficultas, crurum grauitas, abstinentia & horror cibi, paucis iniectis replentur.*

*Libro *mei nãdãr*, notandum quod scribit Hippocrates, hydropem succedere morbis longis, cum ægri purgati non sunt. Ratio hæc est, quia carnes corrumpuntur & liquantur, hoc, quod dicitur, communi sensu & experientia perspicitur.*

**2 Hæc ratio videtur probabilis ad dissuadendam venæ sectionem, cum suppressio inueterata est, ab ea non desumitur secunda venæ indicatio: sed cum recens. Tamen Galenus comment. in artic. 28. sect. 3. lib. 6 Epidemior. narrat se optimo consilio liberalissimã manu sanguinem detraxisse in muliere extenuatissima, cui iam octo menses menstrua purgatio subfuerat.*

**3 Mirum est quod hic propter cruditatem Medici vino interdici nolunt: tamen vinum febris planè dehortatur. Incredibile enim dictu quantopere vinum febrem angeat. Nam dum valemus, ac calor naturalis intra suos limites consistit, magna etiam generosi vini copia, nihilo penè auctiorem calorem reddit. Sed dum è gradu discessit, & iam febricula corpus occupauit, etiam tenue vinum propinatum statim symptomata excitat, quod qualitas caloris præter naturam facile adiecto stimulo appareat.*

CONSILIVM XXV.

*De febre cum grauibus symptomatis singultu & tussi,
pro Domino de Bures.*

Dvo sunt quæ inter accidentia symptomataque in febres quæ hac tempestate grassantur incidentia numerantur, quibus plurimum ægri torquebantur, singultus ac tussis. Nec ita quidem molesta esse ceperunt, vel quod totum febris tempus occuparent, vel quod breuissimo tempore diuexarent. Vidimus enim ineunte statim accessione ita suffocationis periculum oboriri, & tussis molestias, ac si nulla vitæ spes relinqueretur; desinente accessione placidè ac sedatè habebant. Singultus autem in nonnullis ita molestus fuit, qui febre nocturnâ, mox diurna cum destillatione in pulmones laborarent, vt omnia præter singultum moderatè ferrent. Sed ecquid causæ fuit tum singultus illius, tum tussis in accessionis tempora incidentis. Ac tussim quidem eo tum sequi tempore, quo paroxysmus repeteret ex eo coniecimus, quod febris à catarrho maximè esset. Et quæ materia subtilis, acrisque, quæ rigorem sensationemque frigoris afferre solet, quiescebat aliquò loci conclusa, dum ruptis veluti repagulis defuit decurritque in extima corporis, feriendo superiores membranas pulmones vel vestientes, vel illis proximas, tristis ille sensus tussim afferebat. Præterea in catarrhosis febribus quid impedit moueri quoque materiam in pulmonibus & capite ipso, quæ dum cietur, suscitatur, impelliturque, hoc molestiarum afferre solet? Accedebat & nocturni temporis occasio qua pituitæ falsæ serosæque impulsiones & molestiæ sese produnt. Quemadmodum enim vniuersalium temporum aliqua est obseruatio in motu humorum, ita & particularium. Sic continuo ascarides moueri Autumnno scripsit Hippocrates: sic in vespertinum tempus earum ascaridon motus incidit. Quod & defluxionum incurfionibus verum esse mulierculis compertum est.

Sed is singultus difficultatem maiorè afferebat. Nam duodecim aux sexdecim ferè noctes affligebat. At leuissimum ulcerationis sensu circa orificium ventriculi. Quod vt clariùs cognoscatur, licebit huc Hippocratem adducere, qui cum in omni

parte Medicæ contemplationis accuratus esset, ita nil reliquit quod animaduersione dignum foret. 1. Multos legimus, qui de singultu, eiusque causis disputarent, nullos præter Hippocratem, qui de singultiente febre conscriberent. Ergo omissis rebus variis, quæ ad singultus causas explicandas facere possent, quæque aliò loci quàm hîc venari liceret, ne opera omnis frustra ludatur, quod ad hoc institutum pertinebit, de singultiente febre disputabimus. **Quæstio** quæri potest, An hic æger, de quo paulò antè mentio iniicitur, singultiente febre laboraret? an quicumque febre detinetur, cui tanquam *επιμύθεον συμύθημα* adiungatur singultus, febre singultuosâ laborabit? Nequaquâ verò Nam & qui sub finem febrili, aut principio illarum malè iudicati sanguinem multum profundunt, vnde ratione inanitionis, & exhausti singultus oboriatur, propterea singultiente febre teneri dicentur? Nequaquam. 2. Et qui aliquot ex interuallis dum febricit, singultiat, nec tota febre, aut toto accessionis tempore, molestiis singultus vrgeatur, an singultiente febre vexari dicetur? Nequaquam. Ergo in omni Hippocratis doctrina vna singultiens febris dicitur, vt inquit Galen. Comment. in particulam quandam sect. 4. lib. de Diæta acutorum, cum vel toto febris tempore singultus molestus est, vel maximâ saltem febris parte illum generet, viscidus lentusque humor impactus orificio ventriculi. Vnde Hippocrates eiusmodi febres negat solutam iri, nisi aut diebus iudicibus, aut vrinæ profuuiuo aeris, aut abscessu, quod memoriâ dignissimum est. Sed in nostro agro proposito antequam cessaret singultus, totum corpus intumuit: Detumescente corpore repetiit singultus afferens ei aliquid permolestius quàm antè. Nam & vlcusculum excitauit, aut deflorationem aliquam, vt sic loquar, in partibus ad orificium ventriculi attinentibus. Nam cum quid deglutiebatur aut calidiusculum, aut manifestâ qualitate præditum, percipiebarar in imo œsophagi dolor, suspicabamur aliquid esse *επιμύθεον*, quod non vacabat periculo. Ad genus febrium singultientium fortassè referri dicet quis febres acutas ab inflammatione aut hepatis aut ventriculi natas, aut partium vicinarum. Quæ inflammatio, vt narrat Aëtius cap. de singultu; singultientium molestias affert. Quod & Hippocrates primus annotauit. Item referri videbitur, sed minùs aptè febris singultiens senum herniâ laborantium, & supinatione ventriculi, vt volunt vete-

Quæ fe-
bris vere
singul-
tiens di-
catur,
inquiri-
tur.

res. Nam dum intestinum prolapsum est, præsertim ieiunum, vt volunt, singultiendi finem non faciunt, & hoc in mortem præcipitare solet. Ac de singultu multa quæ in veterum libris intractata sunt. 3. Cui autem is singultus contigerat cum abdomen inflatum fuisset aluus biliosa reddidit: post excretionem biliosorum secuta sunt purulenta, quod mirum est. Nec credibile hæc à pulmonibus emanasse, quamuis hos laborare suspicaremur: Cum enim à partibus superis tale quid contingit, id simul & semel fieri solet. Vnde Galenus annotat Hippocratem datâ operâ vsurpassisse verba de præsentis, aut de præterito, *meiat*, aut *minxerit*. Nam cum à superis partibus excretio fit, Hippocr. vtitur verbo *minxerit*, quasi dicat, vt meiendi finem fecerit: sed cum à partibus proximis excretio fit, vtitur verbo præseti *meiit*;

quoniam propinqua est affectio quæ excretionem purulentam fouet. At hic æger sæpe eam excreuit materiam. Nos autem suspicabamur idē hic posse contingere quod & in vrinis. In his enim sedimentum puri proportionem respondet; imò & excerni potest aliquid simile puri, cum tamen non sit pus, sed mucago quædā quæ vnā cum vrinis à corpore deturbatur. Id autem in excrementis per aluum secedentibus apparere potest, præsertim in iis quibus longæ & maximæ fuerunt obstructions mesenterij, & longus morbus. Nam humores qui pepasimum admittere non potuerunt, tandem in mucorem versi sunt, qui pus referat. Quod & obseruauimus in nutrice quadam quæ ex longo morbo incidit in fluxum alui perennem, cruentum, mistum: Tandem secedebat aluus reddens aliquid puli simile, cum præcederent dolores alui colicis similes crudelissimi, cum inappetentia esset, summa extenuatio corporis, & marcor: præterea acerbissimus dolor ad regionem ventriculi, & totius abdominis, & qui minimo blandissimoque digitorum pressu exasperaretur. Sed id primus Hippocrates annotauit in Coacis duobus in locis. *Hepar dolentes, os ventriculi dolentes, soporosi, rigorem habentes, aluum turbatam, tenues, cibum auersantes, purulenta per aluum excernunt.* Et alio loco: *Durities circa ventriculum cum dolore in febrientibus, cum horrore cibum auersantibus, si aluo insuper parum humectata purgationem non faciant, ad suppurationem peruenient.*

Quod cum aliàs tum in ægra illa apparuit, cui totius corporis marcor aderat. At certò scire an id quod excernebatur verum pus esset, an quiddam puri simile, non erat facile.

ANNOTATIO.

1. Non solum lib. 4. de Diata, acutorum (vt hac paginâ annoto) Hippocrates meminit febris singultientis: sed & lib. 2. de morbis, vbi caput son. scribit de febre singultiente.

2. Praesertim verò & tussis & singultus premebant cum appeteret accessio febrilis: quod annotauit diligenter Sauanorola cap. de singultu. Singultus saepe à pressu costæ, aut depressæ, aut tracta contingit, quod diligenter annotauit Fernelius: item vomitus ab eadem causa fit, quod nos quoque ex ancilla pictoris obseruauimus.

3. Ille eger singultiens, tussiens, febriens, ad tabem vergens, decimo nono mensis Nouembris interiit. Aperto cadauere inuentus est hydrops, ascites in abdomine, qui longitudine morbi, & deprauatione alimenti è potu liquidorum gen. tus fuerat. Nam tanta diuturnitate facultates fatiscunt, concidunt ora va. orum, nil fere transsumitur. Inuenti sunt pulmones purulenti, corrupti: intestina liuescebant quasi siderata superne parte: vnde credibile fuit tum singultus magnam occasionem illinc natam, tum syncopes qua pr. hensus est. Lien planè putus. Denique nulla in toto corpore pars inuenta est integritatem suam seruans. Detiectiones purulenta quæ nobis admirationi fuerunt, à putu mesarego manabant. Detiectiones (antequam diem suum obiret) præcesserunt nigra, piciliquida similes.

CONSILIVM XXVI.

De doloribus ventriculi. Pro domina de S. Iean.

1. **P**LEROSQUE dolores ad stomachum variè fatigant, quos nescias an attingant ad ventriculum ipsum, an verò ad partes vicinas. Ratione enim membranarum tum quæ inuestiunt thoracem, tum quæ diaphragmati vicinæ sunt oriuntur saepe dolores continuitate quadam affligentes, & ea ratione alios aliterque quàm sint morbos mentientes. Vt saepe malè ab ægris species doloris ignorantibus intelligentes Medici decipiantur plerumque, nec dolori vllum solatium afferant. Quod cum aliàs rum in nobili muliere Equitis Torquati coniuge manifestum fuit. Illà cum dolores tum noctu à primo præsertim

fomno, tum interdium tribus aut quatuor horis à pastu pateretur, imbecillitate stomachi laborare se existimabat. Dolores illi re-
 petebant per intervalla, maximè si quid in victu peccaretur, aut
 constitutio temporis à naturali moderatione discederet. Sæpe
 intolerabiles sunt, & quasi suffocationis periculum ingruat, sta-
 tim discingi cogitur. Illi modò in ventriculi capacitae conti-
 neri videbantur, & delapso per pyloron cibo cum à duodeno
 ieiunòque traductio transuectioque alimenti fieri deberet di-
 stributio, repullulabant. Ac tum ac si creparet media & intum-
 mesceret ventriculus, vt reuerà contingit, cohibet spiritum vt
 flatus aliquis aut sursum aut deorsum erumpat, quod dum fit,
 alleuatur maximam partem dolore. Nulla illam vertigo exer-
 cet, nec syncope, sed præ dolore qui imum ventriculum affli-
 gens licet exiguus, ratione partis magnus est, & magni momen-
 ti, multa contingunt iis affectibus quam simillima. Itaque dum
 diligenter inquiritur huius mali sedes, & animo lustratur, multa
 vtrò citròque disputantur, quorum accurata & limata ratio
 plurimum valet, tum ad huius mali inuestigationem, & ad simi-
 lium affectuum notitiam venandam. Nos diligenter rem excus-
 simus, relicta diligentiori quaestione honorario arbitro & æsti-
 matori, ne quid præiudicata sententia afferat detrimenti. Dux
 sunt partes in nobis, quarum veteres infirmitates apparent &
 deteguntur, siue eæ per se ac solæ laborent, siue ambæ per cõ-
 munione & materiæ morbificæ & affectum, vt in hac muliere
 contingit, ventriculus & caput. Hoc quidem quod & superum
 locum tenens externis iniuriis pateat maximè, & interius attra-
 ctione & summissione vaporum. Non quòd in ea opinione
 Principis hærendum existimem, qui omnem à capite destilla-
 tionem iecoris calidæ intemperiei ascribit; nam cerebrum ipsum
 tum ratione imbecillitatis suæ, tum intemperiei illarum parens
 est & autor. Immo frigida intemperies iecoris eas potest pro-
 mouere. Addit Fernelius, si à iecore præcalido illarum destil-
 lationum proventus foret, excrementi minimi ea ratione in ce-
 rebro cogereretur. Quod quam probabile alij viderint. Venti-
 culi autem infirmitas patebit facile, quod & ciborum prom-
 ptuarium, etsi quid peccetur aut domi, aut foris, id est vel mala
 alimenta, vel præpostero ordine iniiciantur; domidum aut na-
 tiva, aut ascititia imbecillitas, aut dum propinquæ partes vitium
 attingunt. Quæ enim sunt propinqua & cõmunia, ea maximè

ac primùm affici solent. Receptum illud; *Vbi sudor, ibi morbus: ubi dolor, ibi morbus*: & vt doloris vacuitas actionumque bonitas cuiusque legitimam symmetriam declarat; ita doloris presentia, & earundem actionum læsio contrarium significant. In ægra nostra ventriculus, ventriculi que partes vicinas dolor exercet, ergo ibi morbus, hic intemperies, hic actionū peruersio. Et si enim habet *de Doct. Med.*, tamen isti dolores aut intemperiem aliquē declarant, aut malam conformationem. Ventriculū enim exercent; vel *anxia*, vel *ægidia*, vel *anxia*, rugitus, inflatio, singultus, nausea. Maximè verò queritur de oppressione vetriculi, ac veluti inflatione. Hæc autem cruditatis improprie dictæ, non autem quam *anxia* vocant, symptoma est: & sequitur vel caloris defectum, vel eius inopiam & paupertatem, vel externū vitium. Caloris inopiam dicimus, quod flatus qui excitantur necessario imbecillitatem caloris designant: cum enim vel validus calor est, vel impendiō imbecillus, flatus non excitantur; Galen. 3 de symptom. causis. Et suspicio est inflationis stomachi quam vulgus colicam stomachicam appellat. Quod si non solum intra ventriculum dolores consistant, sed infra, supraue, id per consensum fit. Vnde Archigenes apud Aëtium dicebat Medicos decipi sepe ratos doloris causam aut in præcordiis esse, ait in pectore, cum eorum causa à ventriculo repetenda sit.

Alter Medicus rem paulò altius repetiuit. Affectio hæc ait videri possit stomachi, quod hæc pars maximè affici cernitur: sed an tantum eius sit: & si sit, an per se, an per consensum afficiatur; hoc demum quæri potest: Omnis affectio quæ ventriculum exercet, ea aut intemperies est, aut morbus instrumenti: Si intemperies, aut in ore eius est, aut in ipsius capacitare afficitur ventriculus, aut in fundo in quo chylosos officina vera. Si os esset, eius affecti aliquot essent argumenta, leipothymia, aut deiecta appetentia à calore, aut intensa, à frigore, aut nausea aliqua: Nil horum ægra refert. Si mediū corpus esset, aut deprauatè coqueret, & ructus essent acidi: aut nidorulenti, sed acidi præsertim si imminutè: si non coqueret, aut diminutè, fluctuationes essent, quas *anxia* vocant, nausea impacta materia, vomitio, vagantè fluctuantè que eadem. 2. Si fluctuatio esset, & ab ea inflatio dum ventriculus non retineret, nec probè conficeret, oporteret necessariò cæliacas esse deiectiones, corruptas, liquidas, chylosas, quod tamen non apparet, & nil eorum quæ su-

ra dicta sunt. Ergo credibile in fundo mali causam esse, in quo coctio maximè fit. Et cū superiores partes benè habeant (nam si malè habuissent, maiora sese promississent affecti ventriculi argumenta, multò que latius malum emanasset.) Credibile quoq; fundum è natura habere, sed impediri eius actiones à remissa aliqua re præter naturam, ynde dolor excitatur, & præsertim cū à pyloro distribuitur ad inferiores partes alimentum. Cōiecturam facit catarrhus quo iam pridem affecta est, & reiectio pituitæ liquidæ & limpidissimæ per os à ventriculo, vt hinc colligamus perpendiculariter à capite ad fundum ventriculi delabi illud phlegma, quod egrè quidem corrumpitur, crudumque manet, aut paulum immutatum cum excrementis remixtū reiiicitur. Item dolor qui sub quartam pomeridianam repetit, indicat mesarei venas obstructas, & speciem quandam melancholiæ hypochondriacæ constituit. Hinc annotauit Fernelius cap. de ventriculi symptomatis, sæpe iccoris, lienis & mesenterij vitia sympathia integrè sani ventriculi concoctionem perturbare: sic melancholicis, hepaticisque & lienosis ventriculus malè concoquit, si vitiosâ qualitate laecessitur, &c. Ergo dum chylus aliqua ratione mitificatus rapitur à venis mesenterij, pars tenuior à calido iecore refugitur: cum crassiori parte phlegma illud mixtum subiens angusta viarum & elaborationem vix recipiens dolores excitat: 4 & nisi aliqua ratione domaretur, iliacas passiones excitaret. Itaque bene affectus est ventriculus, quod excrementa ipsam quæ ideam partis à qua manant referunt, laudabilia satis sint. Nam cū ventriculus probè officium non præstat, liquida, aut chylosa, aut cæliaca excrementa sunt: 5 cū tantum pituita liquida vitium facit illa remissa apparet excrementis, quæ spiratodea vocantur. Vnde verò hæc pituita à cerebro: *Hoc enim veluti medulla est.* Hippocrat. libro de glandulis: *Ab hoc fluxiones fiunt foras, intro: foras per oculos, nares, aures; intro per palatum: aut in pulmones, aut in ventrem. Si in ventrem, vel fluores fiunt, vel non. Si non fiunt, voluulosa sunt affectiones, &c.* Locus ille præclarus admodum.

6. Et lib. 4. de morbis idè ferè explicat dū docet caput fontem pituitæ, & eam à ventriculo calfacto accipere. *Lienem aquæ fontem, felliculæ fellis, bilis fontem, & cor sanguinis.* Quod diligenter notandum. Itaque non mirum si descensu pituitæ frigide putredinem vix recipientis illa mulier dolorem sentiat, & si postea voluulis sit.

obnoxia, & melancholiae hypochondriacæ. Quæ duplex est, vna vera per aduersionem humoris melancholici, aut congestionem; altera improprie dicta, ob pituitam illam quæ obstruit venas mesaraicas. Nec hic necesse est timere hypochondria. Nam sæpe vitium est in visceribus, melancholiaque hypochondriaca scilicet, sed in corporibus ipsorum viscerum & vasis eorum obstructio delitet sine vlllo perspicuo hypochondriorum tumore. Et dum condum aliquod continetur, facile in status digeritur. Quò teter vapor fertur, ibi vitium communicatur: si in cerebrum, mania, aut melancholia: si in ventriculum, coctionis error; si in cor, palpitationes. Maximè autem eiusmodi affectionibus corpus patitur cum hepar præcalidum. Porro calidum bifariam, vel vt ferrum & plumbum, id est diuisum calorem retinens: vel vt palea. Vnde in plerisque serofus sanguis quaqua- uersum irrumpens, & rubores faciei que maculas inferens; est enim veluti calor *δρεοπιτελαειδης*. Nam rapit tenuiorem chyli sanguinisque partem, & in halitum vertit. Sic plerisque ventriculus frigidus & hepar calidum calore halituoso. Hic omnia eferit, & in ichores vertit. Et talis calor non potest temperare frigiditatem ventriculi; nam fixum stabilemque esse calorem oporteret. Curatio illius affectus in diæta & pharmacia continetur. Diæta quæ ad siccitatem vergat potius, vt pituita illa consumatur quæ dolores citat. Pharmacia vt blandè deturbetur pituita, quæ in angustas vias rapitur sæpe, & à capite descendit. Item habenda ratio capitis mittentis. In corrigendo ventriculo non ita occupatos esse oportet, quod in vitio per se non sit. Abstineat à iusculis multis, à generoso & crasso vino. Sæpè cibum capiat, ne ventriculus vacuus aliundè humores euocet. Ab iis quæ cacochymiam promouerent abstineto. In ore semper contineat coriandrum conditum, passulas, cinnamomum, mastichem; & alia id genus.

Carminatiuis sæpè clysteribus vtatur, vt & à lienis corpore humores præparentur. Syrupus hic singularis.

℞ succorum menthe, absynth. pont. scariolæ depur. an. ʒ iiij. express. in rheub. macerati ad partem sacch. albi quart. ij. Fiat syrup. capiat semel in hebdom. aut bis.

Item in hoc affectu commendatur plurimum ad liberandos infarctus huius deiectionis sequentis.

℞ rad. cichory syluest. acetos. & gram. an. ʒ j. Incoque in lib. j aqua adsertias

ad tertias, in quibus infundantur ʒ ij rheib. talcolatim secti. De hac infusione capiat ʒ iiij singulis matutinis tepidè.

ʒ pulu. hiera picra (qua in eiusmodi affectibus ab Archigene plurimum commendatur) ʒ ʒ. pilul. sine quibus ʒ ʒ. rhei ʒ ij. Syrup. de ment. quod suff. fiat massa, capiat ʒ ij saepe vna hora ante cibum.

ʒ aromatic. ros. desc. Gabr. maior. ʒ. i. pulu. elect. triasan. ʒ ij. rasur. ebor. ʒ f. cum sacchar. dissol. fiant tabelle.

Fotus fiant ad regionem ventriculi, ex iis qua vsurpari solent ad confirmationem eius: & à fotu liniatur oleo de mentha, absynth. & mastich.

ʒ Syrup. de siccis ʒ ij. vtiatur serò cum granis mastiches aut olibani. Paretur opiata ex conscrvais rosar. buglos. anthos., conscr. violar. cortice citrij & theriaca pauca. Vtiatur serò dum componis se ad somnum.

Obseruatâ legitimâ victus ratione, & vsurpatis leuiusculis illis remediis prima sanitas poterit recuperari.

ANNOTATIO.

Aetius cap. 68. serm. 4 Tetrabil. 2. docet quomodo, & qui cruditatibus abundant, fiant pleuritici, non quòd sit pleuritis, sed imaginaria est.

2 Hippocrates lib. 2. de morbis, de morbo quem ructuosum vocant, huic affectui quem hoc loco describimus finitimo disputat. Sed illum ab humore praesertim bilioso nasci demonstrat. Caput illud commemoratione dignum est. saepe similes affectus disputandi proponuntur.

3. Tamen sputatio ista fallax esse potest signum. Nam & denotare potest prolapsum pituitose materiae à capite, item & melancholiam hypochondriacam; qua mulier haec nostra diuexatur. De melancholia dum disputat Galenus ex sententia Dioclis, proponit sputum humidum nullum consequi, praesertim iniecto cibo in iis qui laborant melancholiâ hypochondriacâ. Quod diligenter notandum est ne rei ambiguitate decipiâmur.

4. Cap. 14 sermonis 1. tetrabil. 3. Aetius notat affectus esse quosdam malos cum à capite in ventrem humores feruntur. Nam aut frigidi humores in ventrem calidum ferantur, aut contrâ: Ait difficilium curationem institui cum frigidi humores in calidum ventrem deferuntur: Item grauia inde symptomata edi. Tale quid mulier ea de qua hoc in loco perulisse mihi visa est.

5. Et nos in ea muliere obseruauimus excrementa sphyratodea mucosa pituita veluti oblita. Vocat autem Hippocrates in Coacis τὴν ἀνεγνώστου καὶ μέντις μύκωδες: eliquationem mucosam vocat.

6 Adhunc locum pertinet & alius lib. 1. de morbis. In morbis catarrhosis fluxum maximè caput exhibet, utpote quod cauum est & superne situm. Cum ab aluo fuerit calfactum, pituitam tenuissimam de corpore in seipsum trahit: ubi verò in eo collecta fuerit, rursus reddit acervatam & crassam, &c. Et tunc remittit vel in superum ventrem, id est thoracem, vel inferum. Et cons. 11. huius lib. de industria probatum est longorum alui profluuiorum, dysenteriarum causam cerebro acceptam ferendam esse, ex libro Hippocr. mei μετῶν.

CONSILIVM XXVII.

De Febre continua cum distillatione in pulmones.

MELCHIOR de Fresnoy annos quatuor natus febre corripitur cōtinuā, sed quæ exasperationes haberet vesperi. Catarrhus erat. Tussis sicca. Nec præ tenella ætate quicquam excernere poterat. Tamē inanis semper erat tussis, & tenuis humor cludebat spiritū. Vomitiones frequētes. Aluus albicantia deiecit, deinde substitit. Urinæ tenues, crudę, decolores pro febris vehementia: medicamentulo aluus sollicitata reddidit multa biliosa. Tussis perseverabat. Dolores ad sinistrum hypochondrium, sed vagi, nec eodem modo perseverantes. Deinde sinistram lateris partem occupabant. Aluus soluta est. Viridia excreta, chylosa: sitis quæ expleri non poterat. Magnum in pulmonibus conceptum incendium coniectum est. Hinc dolores ad sternum & latus sinistrum: sed qui ad latus sinistrum non perseverabant, ut antè dictum est. Medici putabant vomitiones ab imbecillitate ventriculi oriri. Quod in eam suspicionem eos adduxit est frequens deiectio, multaque rerum variarum, putrium, viridantium: Aliquando animus paulum deficiebat: & nos animi defectiones, & frequentes vomitiones in alio observauimus, cui inflammatio pulmonis à pleuritide, aut fugaci dolore lateris oborta fuerat. Quæstio hoc loco moueri potest, 2. an inflammatio pulmonis, siue ea sit phlegmonodis, siue erysipelatodis habeat hæc sibi coniuncta; defectus animi, vomitiones, tussim siccam, alui fluores, ac si per se primoque aluus inferior laboraret, fugacem genarum ruborem, tussim inextinguibilem, febrem non ita magnam omni tempore, sed ex interual-

lis ferocientem & prodentem sese: hoc fortassè pauci ante nos animaduverterunt, & sic alium morbum pro alio curamus: aut falsò vomitiones, & alia accidentia quæ narrauimus ad alias partes referimus: rati hoc non ad pulmones, quæ tamen præcipuè affecta pars est, pertinere. Et vt quod sentio obiter dicam; cum ad puellum asciti essent tres celebres Medici, vnus solùm affectum pulmonem intellexit, & quåndam speciem peripneumoniæ suspicatus est, vnde sectionem venæ suavit. Sed falsò subesse vlcus cogitauit, nesciens inanem hanc tussim erysipelatis pulmonis pathognomonicum esse. Omnes ignorarunt vomitiones illas frequentes, deiectiones frequentes, ingentem admodum sitim, & opinione maiorem, in inflammatione pulmonis solere apparere: Quorum ignorantiam vt detegam, ne fortè sese excusent quod nullo loco legissent, aut animaduertissent talia symptomata contingere solere inflammato pulmone, citabo Hippocratem, qui illum puelli morbum mihi verè expressisse videtur. Ita autem scripsit Hippocrates lib. i. de morbis, in omnibus suis obseruationibus ex monumentis admirandus: *Erysipelas in pulmone fit cum pulmo fuerit nimium resiccatus. Quod cõtingit ab ardore, febribus, labore, intemperie. Et cum superresiccatus fuerit, plurimũ sanguinis ad se trahit, maximè ex magnis venis tenuissimũ ac debilissimũ trahit. Postquã traxit febris ex ipso fit acuta, tussis sicca, repletio in pectore, dolor acutus in anterioribus ac posterioribus partibus, maximè circa spinam, magnis venis calfactis. Vomunt subruentum aliquãdo liuidũ, vomunt pituitam & bilem, animo linquntur ob sanguinis transmutationem derepente contingentem. Atque hoc maximum signum est in pulmone generati erysipelatis, & si assidua febris inuasio perseuerauerit.*

Aliquot alia scripta sunt quæ huc non pertinent. Itaque ex contextu Hippocratis apparet hæc maximè symptomata erysipelate tentato pulmone contingere solere: 3 dolorem sterni, vomitiones, tussim siccam: deliquium animi, quid mirum esse potest. Sed hæc contingunt vel maiora, vel minora, vel plura, vel pauciora pro humorum varietate. Nos autem obseruatione trium eo affectu laborantium, certò scimus febrem (licet sit occupatus pulmo) non eodem perpetuo tenore affligere ac sæuere: nam quia Erypelatosa affectioni comes est, & præsertim à tenui ferò, fit vt flammeus sit calor, cuiusmodi in palea accendi solet & euolare statim: si autem putris, solida, firmaque esset materia: & pars quæ inflammatur solida (vt hepar) perseuera-

ret febris, & calor eodem modo quo in candente ferro. 4 De-
 liquia animi quæ hîc contingunt nos admodum perturbarunt.
 ignorantes tale aliquid contingere posse inflammato pulmone,
 & triuales medicos secuti ad malignam qualitatem iactationes
 istas, deliquia animi, & virium iacturam referebamus, non au-
 tem ad propriam affectionem pulmonis, vt Hippocrates fecit
 loco prius citato. Mouit quoque alui fluor: sed duabus de cau-
 sis contingere potest: tum quia ventriculus ipse afficitur: & quæ-
 admodum leipothymia eumprehendit per consensum pulmo-
 nis ratione ichoris à pulmone resudantis, & ratione attractio-
 nis ab ingente calore pulmonis, vt eruditissimus Hippocrates
 annotauit: Ita quoque debilitas aliqua in ventriculum cadere
 potest, à qua leienteriæ aliquid simile contingit. Ac reuera in
 puello nostro chylosa nulla prodire. Secunda causa hæc esse
 potest, quòd ichor à pulmone refluens ferire possit ventriculū
 & intestina, hinc alui inferioris fibræ laxantur: hinc fluores.
 Fernelius vt in multis accuratus fuit: ita in pulmonum affectuū
 obseruatione annotauit quandam notham peripneumoniam,
 cuius idea apparet in ægro à nobis proposito. *Tennis, acris, mul-
 tâque destillatio* (inquit) *è cerebro confertim illapsa in pulmones inter-
 dum ardore præter naturam incenditur, estum ac febrem inferens, pleri-
 que eam affectionem peripneumonia nomine designant, in qua & tussis &
 spirandi difficultate & lenta febre sensim conficitur æger sine ulcere, sine
 spuitione cruenta.* In puello nostro verè exprimitur morbus: nam
 febris non erat admodum vehemens: destillatio erat magna:
 eludebat spiritum: 5 sensim conficiebatur: & incautis nobis
 cum cibum appeteret, biberet auidissimè, vicesimo die, item
 cum de purgando eo cogitarent Medici, sublatus est, magno
 affidentium mœrore. Debuerat mitti sanguis. Aperto cadaue-
 re nil præter naturam in pulmone contentum inuentū est. Vna
 pars pulmonis veluti stipula ardente deflagrauerat: lobus vnus
 pulmonis liuebat. 6 Hepar quoque veluti deflagrauerat. Et
 cum destillatio est, tussis sicca, febris non ita ad manū mordax,
 rubor genarum, dolor sterni (quod notandum) viriū deiectio:
 fitis ingens: perceptio summa caloris in pectore: non est dubiū
 quin inflammatus pulmo sit. Ac notari debet ex locis citatis
 prius tum ex recentioribus, tum veteribus, aliquid erysipelato-
 des in pulmonibus concipi bifariam, aut cum tussi, aut sine tussi
 saltem quæ magnam afferat molestiam (nam subest tantula.) ſi

Cap. de
 pulmon.
 morbis.

cū tussi destillatio est ferina, diluens calorē vnde febris non ita ferox apparet: illi incauti moriuntur: nil extundunt commemorabile: à capite presertim manat causa fouens morbum. Si finetussi à venis paruis & magnis refugitur sanguis, qui in pulmonem illabens, & incurrens potiùs attractis foueat incendiū. Et illud est quod volunt Medieci memorandum, veram peripneumoniam oriri excusso tenui & bilioso sanguine è dextro cordis sinu in venam arterialem; hinc totum pulmonis corpus occupatur, hinc inflammatio. Quod si verum est in inflammatione pulmonis, sectio venæ videtur potiùs celebranda ex interiore dextra. Tamen Fernelius ex sententia quorūndā, in inflammatione pulmonis secari vult internam cubiti sinistri. Ratio eius hæc est: Quoniam pulmonum venæ ex dextro cordis sinu prodeunt: hic autem in sinistrum parietem venæ cauæ inferitur, qui per alam sinistram in cubitum excurrit. Inter morbos qui occurrunt, pulmonum affectus cogniti sunt difficiles: nec enim signa vniuoca sunt, sed maxima ex parte equiuoca.

ANNOTATIO.

1 In illo rubor erat genarum magnus. Vnus ex Medicis ex eo collegit argumentum peripneumoniam aliis cum signis, alius repugnabat. Ille citauit Prognostic. Hippocr. & quamuis verum dicebat, male citauit. Nam in 2. Prognosticon meminit quidem ruboris genarum Hippocrat. in morbis thoracis, sed loquitur de purulentis, quibus & ob calorem pulmonum, & ob assiduam tussiculam rubent genæ, ait Galen. in Comment. part. 60. lib. 2. Prognost. Sed in Coacis peripneumoniam signum vixit dicit, politico modo loquendi, id est, ruborem genarum. Et ille Aphorismus huic agrò quadrat. Nam etiam fluente aluo erat inappetentia, sudores, vomendi desiderium, rubor faciei, cum febre & tussi. Quæ omnia declarant raptum humoris biliosi ad partes thoracicas, & concipi in illis partibus incendium. Sic Hippocrates in Coacis ait eos quibus hæc accidunt, interire modo peripneumonico.

2 Cùm Mesueus de peripneumonia loquitur, illud notat maxime quædam peripneumoniam biliosam esse, aliam pituitosam. Credibilis esse ait pituitosam esse. Porro pars qualibet laborat ab humore vel tanquam nutrimento, vel tanquam excremento. Si pulmo laboret ab humore tanquam excremento, à pituitoso humore laborat, si tanquam à nutrimento

à bilioso; nutritur enim humore bilioso. Vult autem omne excrementum ex sententia Aristotelis, parti contrarium esse, præter illud excrementum quod deferre solet facultatem, ideamque partem, ut est semen; siquidem ab omnibus benignum dicitur. Si prius verum est, peripneumonia à pituitoso humore tanquam ab excremento secundum Mesueum, & tanquam à contrario secundum Aristotelem deterior erit eà peripneumonia quæ est à bilioso humore, qui est veluti nutrimentum. Tamen dubitari potest an verum sit quod scribit Aristoteles, excrementum omne parti contrarium. Et an ea peripneumonia quæ sit à bilioso humore, ab eo fiat tanquam à nutrimento; siquidem superabundans humor biliosus, ut qui à partibus inferis per violentam exercitationem rapitur, excrementum verè dici potest.

3 Quoniam hic de peripneumonia agitur, quæ non sæpe occurrit, sciendum an pars dextra pulmonis, an sinistra, an superior, an inferior, an lobus vnus tantum occupetur ut inde veniemur occasionem usurpandi remediij. Argumenta omnium horum apprimè ad artem facientia enarrat doctissime Hippocrates in Coacis.

4 Quæri possit an deliquia animi in peripneumoniâ laborantem incidant. Nos id obseruauimus, & præcipitem virium lapsum & sudores subfrigidos. Quod primus Hippocrates obseruauit in Coacis, loquens de quibusdam quibus totus pulmo cum corde inflammatur, & de aliis, in quibus non inflammatur. Nam resoluuntur illi quibus cum corde pulmo inflammatur. Sic Regina Nauarra peripneumonica 3 die interit; & tertio vires collapsæ sunt planè.

5 Qui sunt peripneumonici, præsertim cum valdè sunt imbecilli ij diaphoreticis sudoribus dissoluantur, & symptomaticis. De iis Hippocrates Acutorum. (Idem porro iudicium esto de reliquis morbis acutis.) Mali sunt sudores circa caput & clauiculam apparentes; fiunt enim vincente aegritudine ob ætum, impetum, & violentiam.

6 Paulo antè docuimus & autore Hippocrate, & historiâ Regine Nauarra peripneumoniâ laborantis post leuem pleuritidem, cui addi potest historia Domina Dupuy, quæ post pleuritidem peripneumonica facta quinto die interit. Nunc autem monendum est de Aphorif. Hippocratis in Coacis, Peripneumonia ex pleuritide transmutata securiores sunt iis quæ ab initio fiunt. Quod minus verum videtur, cum translatio à pleuritide in peripneumoniâ lethalis sit. Nos quosdam breuè interisse vidimus, quibus peripneumonia pleuritide successisset, præsertim in quibus constaret pulmones imbecilles fuisse. At absolute peripneumonia pleuritide secuta, non videtur secuta, immò funesta, tum quod in partem princ-

per raptus fit, tum quod successio ista morborum pessima videatur. Hippocrates enim lib. *πρὸς τὸν Ἰφίτιον* scripsit, in morbis cum alter alteri succedit, & plerumque interficit. Cum enim corpore à morbo priore debilitato alius morbus successerit, debilitate perit prius quàm alius morbus desinat. Quod notandum. Deinde locus est Galeni comment. in part. ultimam lib. 6. Epid. *ἄσθ' αἰὼν αἰὼν, quo scribit pleuritiz curationem asserre peripneumonia.* Ait enim *πρὸς τὸν Πρωπονίαν ἢ πλεωόντις ἰσ'.* Contra verò eodem loco ait male succedere si pleuritis in peripneumoniam conuertatur, immò funestum esse videtur. Sed hæc omnia per comparisonem intelligi debent.

CONSILIVM XXVIII.

De doloribus ad sternum & spinalem medullam.

CAPONÆ Gabrieli dolores atroces ad sternum, spinalem medullam decurrentes ad scoptula aperta: ad mammas, vt nec in hanc, nec in illam partem corpus flecteretur. Cum in latus dextrum decumbebat, omnia exasperabantur. Aliquoties eos dolores perceperat, non tamen æquè crudeles ac eos quos circa mensis Nouembris finem ferebat. Nulla tussis erat, aut per exigua. Interdiu alleuatus videbatur. Aliquando nec rectus, nec decumbens præ dolore absque querela erat. Noctu exacerbabatur omnia. Infomnes noctes ducebat: è lecto surgebat impatiens caloris: nulla febris: cibum capiebat. Negotium nobis exhibuit. Nec sectio venæ, nec fotu, nec litibus dolores quiescebant. Pus congestum suspicabamur, admoniti oraculo Hippocratis, *Qui dolores pectoris nec purgatione, nec sect. one venæ sedantur, eos necesse est in suppuratum veris.* Tamen hæc ratio in contrarium adducebat, quod nullà tussis vexaretur quæ alioqui molesta esset si quid puris in capacitate aut membranis contineretur. Neesse enim esset refudare aliquid tenue, & horrores adesse si aliquid tale contigisset. Si vitium in pulmone esset, aut tuberculum aliquod contineretur, aut pus, aut aliquid aliud simile. Nulla inflammatio est, cum nulla febris. Tuberculum si esset, inspirandi & expirandi difficultate teneretur: nulla est. Vt summa fiat nullus adest tumor qui se aliquo signo proferat: nec si adest, ij propterea dolores oborirentur, cum pulmones sint *αἰσθησιμοί*. Ergo in membranis & circum membranas vitium

existit: aut in perioftio. Quod confequi oportuit nos & ratione
 & experientiâ. Itaque cum quid hîc fequeremur, non effe in
 numero, fcificitati fumus nunquidnam litus aliquando iis fieri
 folitos qui in magnis ponunt, & nobilitatis infigne exiftimant
 femel lue gallicâ aut hispanicâ potius laborare: fi modò labo-
 rem id exiftimare oportet quod fummae voluptati comes effe
 folet. Respondit subuerecundè obortis aliquando phymatis
^{aid. r. u.} oblitum fuiſſe hydrargyro. Et ad rem, quoniam rediuiui
 ſapè dolores ſolent renafci, aut ſaltem aliis affectionibus occa-
 ſionem, dare. Præſcripſimus abſtinentiam vini. Litus exanody-
 nis & diſcutientibus, decoctum farſeparillæ, tum vt in lecto
 ſudaret, tum loco vini in paſtu vteretur, ſed dilutiore. Exactis
 decem aut duodecim diebus cum accurata ſatis victus ratione,
 dolores cuiusmodi maximam partem ſunt leniti: ſed circum ſter-
 num veſtigium ſemper aliquod remanſit. Quod autem ſupe-
 rius hæc expoſita voluimus, eo præſertim conſilio factum eſt, vt
 cum querelas ægrotantium audimus de morbis intercutaneis
 nobis exprobrantium, quod nihil aut parum leuati videntur
 quantumuis arte & cõſilio comparatis remediis, recurramus ad
^{ſeior n.} id eſt ad occultum aliquod: non quòd à cœlo repetamus,
 vt plerique ſolent, ſed ad internas occultasque cauſas reuoca-
 mus. Nam quotieſcumque de fugacibus morbis aut doloribus
 potius conqueruntur ægri, aut de fixis circum ^{meiſtor} ſuſpicari
 oportet aut latens venenum, aut reliquias alicuius luis venereę:
 ſiue id ab hydrargyri, ſiue à morbi ipſius maligna vi ortum dica-
 tur. Ne temerè ſimilitudinibus decepti malè exerceamus æ-
 gros, ſumptibus minimè neceſſariis oneremus. Id non in hoc
 ſolum ægro contigit videre, ſed & in aliis quos ſæui admodum
 dolores ſurſum deorſum, in omnemque partem errantes exer-
 cebant.

 CONSILIVM XXIX.

*De Febre quartana cum acerbiffimo capitis dolore &
 lienis affectu.*

QUARTANARIUS habitu ſatis laudabili cum ad regionem
 lienis murmur quoddam ſentiret, & tempore acceſſionis
 acerbiffimo

acerbissimo capitis dolore cruciaretur: leniendo suo atroci dolori à Medicis consultum voluit. Signis syllogisticis conclusum est à flatu cum dolorem principia maximè causasque ducere. Quo fit vt fugax esset, crudelissimus tum ob membranarum diuulsionem. Atque vt vna eademque opera, & causæ, & symptomati, sed huic maximè occurreretur, his quæ sequuntur remediis tentatum est, vt aliqua ex parte dolor pelleretur. Horum ista est forma.

℞ bdellij in aqua vite soluti ℥ j. puluer. ceterach & coral. an. ℥ j. aloes ℥ iij. cum syrupo de pomis. Formentur pilula: capiat ℥ ij. ante partum die intermissionis.

℞ rad. bryonij ℥ iij. macerentur in aceto, passentur: passatura adde puluer. ceterach & ruta an. ℥ vj. oxymel. simpl. ℥ s. cum ol. de capparib. Fiet Emplastr. pro liene.

℞ diamargar. frigid. ℥ j. puluer. ceterach scrup. ij. coral. ℥ j. cum sacchar. in aq. buglos. soluto. fiant tabellæ.

℞ far. orobi, hordei & fabar. an. ℥ iij. cum oxymelite: fiet puls pro capite. Sæpe oxvrrhodinum fronti & temporibus illitum est.

In acerbissimo capitis dolore, qui de nocte præsertim repeteret cum febricula, & frigidis quibusdam sudoribus, decoctum est hoc præscriptum.

℞ medulle gaiaci ℥ iij. aque lib. viij. semin. pæoniae, cardui, an. ℥ s. beton. scariolæ, an. m. j. fiat decoct. ad ℔. ij. In colat. dissol. mellis ros. ℥ ij. bulliant ad despumationem pro iribus dosibus ad lib. j. s. capiat hora somni tri duo singulas doses.

Et reuerà vsu talis remedij leniùs habuit. Rursus ad hoc idem institutum.

℞ ros. rubr. saluia, yuz arthrit, primula veris, pulegij an. p. ij. flor. chamem. summit. anethi, melilot. rorismar. an. p. j. cyperi, ireos florent. an. ℥ ij. sem. lini ℥ x. cumini, dauci an ℥ j. fiant sacculi pro frictione capitis.

CONSILIVM XXX.

Ad vermes, & alui fluorem cæliacum & dysentericum.

IVDITH de Mesmes puella annos 4 nata, toto autumnali tempore & hyemali ex interuallis sentiebat tormina, & dolorem ad anum qua parte desinit rectum intestinum. Deiectiones

aliquando liquidæ erant, aliquando chylosæ, aliquando compactæ, sed quæ nonnihil crudi in se haberent. Qui dolores oboriebantur, fugaces erant, nec magnam molestiam afferebant. Ter aut quater terruit de repente nata leipothymia. Initum consiliū est, cuius hæc summa est; Deiectiones referunt ideam partium à quibus manant, & per quas feruntur, ac generali modo omnia excrementa. Cū aliis natura habet, figuratæ sunt, constantes, eadem horâ excernuntur quâ prius excerni debent. item nec in quâritate, nec in qualitate, nec in excretionis modo peccatur. Si quid in aliquo horum peccatur, hoc arguit omnia secundum naturam non habere. Vnde mutatio excrementorum olim inter symptomata haberi solita est. Ac necesse est vel morbum esse, vel affectionem quæ proximè in morbum sit degeneratura. Affectio illa œconomiam naturalem non bene affectam significat; quod vel in partium ipsarum nutritioni ac cōctioni dicatarum vitio positum est, vel in extrinsecus adueniente aliquo quod eiusmodi officium immutet & interturbet. Puella hæc cœliaca excreuit, cruda, liquida, foetida admodum; dysenterica quoque ipsa, cum tenesmo, torminibus fugacibus: raptus est aliquādo chylus, aut simile quippiam cum excrementis. Omnis morbus aut corporis conditionem, aut temporis constitutionem, aut vtrumque potius sequitur: sic enim constituunt τὸ ποιητικὸν καὶ τὸ σπαστικόν. Quod cū aliàs tum in hac puella obseruari potest. Sensit illud verum quod scriptum ab Hippocrate 2. Epid. *Autumno ascarides*: Et illud, *Autumno ferinum*. 2. Nam ineunte Autumno ascaridibus diuexata est. Non superiora vermes affectarunt quod obseruari potuit: non χλωροπυλα λαμπρὸν Hippoc. 6. *σπαστικὸν* decussum est, non oculorum flos: non pruritus narium: non leipothymia: quæ symptomata contingere tunc solent: sed in imis maximè partibus exercuerunt symptomata. Præterea viui & mortui excreti sunt. Corpus humidius, mollitie diffuens, vliginosum, tum à natura, tum à vitæ instituto. Nam pueri etsi naturâ humidi, & ab ea humiditate aliquot incommoda & commoda nanciscuntur, tamen ab excrementitia humiditate humidiores redduntur, tum quia ingluuiei se dedunt, tum quia non bene exercentur; habent enim animales facultates infirmas, naturales validas Galeno: vnde calor nō habet suam ἐκλάμψιν 6 Epidem. hinc proventus excrementorum; hinc in cauis hepatis obstructio, ab hac putredo, ab

hac vermes, & alia. Et notandum non semper vermes generari. Nam si sepultus sit admodum calor, nec emicet, & ingens humorum copia sit, non generantur vermes. 2. Siquidem validus calor requiritur, & maximè putris, vt multiplici sobole materia illa in vermes animetur. Quæritur an à ventriculi vitio, an à capite? Coquit benè, nec affecti ventriculi per se magna eduntur signa. Et si vligo sola esset, quæ ex sententia Oribasij replens læuigansque spiras & rugas ventriculi vt inde non adhærens alimentum præterfluat, non ita fieret de nocte, nec frequenter, nec tam putria graueolentiâ que subducerentur: Ergo credibile à cerebro fluxum quemdam fieri qui misso ichore quodam officium ventriculi inturbet, & aluum citet. Non bene mungit, caput habet latum, & latius quàm pro ratione corporis. De nocte maximè aluus fluit, quod à cerebro esse arguit. Pueri maximam partem caput oppletum habent: vnde veteres eam ob causam illis vinum interdicebant, hyeme incœnatos cubitum mittebant, & eos per suturas, per palatum, per cutim, per nares passim expurgari videmus: immò per aures; quamquam neget in Aphorif. Galenus eas cõparatas ad expurgationem cerebri, exceptis (ait) pueris. 3. Præter fluxum illû cerebralẽ copia quoq; humorum lentorum & tempore corruptorum hoc efficit: nam humidus calor illis tanquam lignorum strue obruitur & strangulatur. Nisi dicas quò humidius corpus, eò melius. Galen. 3. de symptom. causis, & pueros facultates naturales habere robustissimas. Quò humidius naturali humore, eò melius: & facultates naturales ad agendum habent robustas, sed non ad patiendum & resistendum. Sic minimâ occasione præhenduntur fluxu cœliaco, diarrhœico, non ita dysenterico, quia mucore madent intestina. Quicquid sit, ea cuitari possunt dietâ siccante. Quamquam I. sanit. tuendæ Galenus vetet ne exiccentur pueri, quia incremẽto prohibentur; intelligens maximè de humore primigenio.) Videndum ne dum prodesse volumus, non obsumus. Si sola vligo esset, & cruditas, corrigetur coctione & alimenti detractione: sed præterea est corruptela ergo corrigenda, & humor tollendus. Eâdem operâ detergendum, vacuandum, oppugnandi vermes.

De vermibus
lib. 4. de morbis,
loc. præciarius,
qui prima frõta
salus videtur, sed
notandum est.

℞ semin. contra ʒj. passul. glycyrr. conser. viol. an. ʒij. absynthij
rom. an. p. s. fiat decoct. in qua infund. rhez ʒj. coral. ḡ. v. In express.
dissol. eiusdem rhcub. ʒss. fiat potus.

Item ℞ Karabes ℥i. rasur. ebor. cornu cerui, margar. elect. an. ℥j. cinnam. gr. 4. cum saccharo in aq. portul. dissoluto, & ℥s. pulu. contr. fiant tabell.

Item ℞ ligni aloes ʒ ij. nigell. rom. ʒss. pro suffiendis operimentis capitis.

Vehementiora paulò sunt hæc quæ sequuntur remedia.

℞ semin. contra ver. ʒ ij. pulu. ras. ebor. cornu cerui an. ʒi. semin. portulac. scr. iiij. fiat puluis, misce cum eo quod sequitur.

℞ iheriac. ʒ ij. conseru. rosar. ʒj. omnibus mixtis fiat in modò opiata: vtatur quolibet mane.

℞ lupinorum ʒ ij. medulla colocymbidos ʒj. absynth. vulg. ʒj. s. aloes ʒj. theriaces ʒ ij. cum pauca terebinth. fiat in modum cereti, & imò ventri applicetur.

℞ syrup. de absynth. ol. amygdal. dulc. an. ʒj. absynth. menth. puleg. succorum. an. ʒj. s. radic. dictamni, tormentill. zedoar. an. ℥j. cum pauca cera. fiat linimentum pro ventre.

℞ pulu. barbotina ʒj. detur cum lacte.

℞ decoct. clyster. lib. s. in qua bulliant chamam. & sem. fœnic. an. ʒij. In colatura dissol. benedict. laxat. ʒ ij. confect. de bacis ʒj. s. ol. aneth & ruta an. ʒj. In torminibus à vermicibus.

℞ osis de cord. cerui, margar. elect. an. scrup. j. rasur. ebor. karab. an. ℥s. rheub. ℥ij. cinnam. gr. ij. cum sacchar. in aqu. absynth. dissol. fiant tabellæ pond. ʒj. s. capiat duabus horis ante pastum.

Item ℞ absynth. m. j. bull. in aqua & vino pro fotu sedis. Abstineat cœnà ne tantopere cerebrum oppleatur vaporibus. Pane sigillineo & autopyro vtatur, non albo (vt vocant) quoniam obstruit nimium. Vtatur sæpè rhabarb. condito. Prouidentum capiti, quoniam in illa augeri potest plethoricis symptomatis. Et in eius sororis defunctæ annos iiii natae cum conuulsionibus prehensa fuisset, in cerebri ventriculis magna aquæ citrinæ copia inuenta est. Sed his non sunt terrendi parentes 1572. Cal. Ianuar.

ANNOTATIO.

1. Notat Mesuauus vermes aliquando generari ab obstructione cysteos choliodochi, quia enim non interfluit humor biliosus purgandis intestinis accommodatus, idè succrescit pituita multa quæ in vermes animatur. vide cap. de cura vermium.

2. Quod tamen dubium esse possit. nam calor consumit materiam, et ergo eorum vermium occasionem tollit. Item effundit humorem biliosum in

intestina, hinc vermium internecio. Immo scribit Mesuavius saepe contigisse in febribus tum ratione caloris, tum ratione bilis effusse vermes pabulum querendo, ita locum in quo nati erant & conseruabantur, perfodisse, ut partem ipsam perforarent.

3. Lib. de affectionibus fluorum diuturnorum alui, causam à cerebro repetit.

CONSILIVM XXXI.

Ad Iliacam passionem.

IACOBVS Berthier post longas corporis agitationes, & conatus, & vsu rerum flatulentarum, in colicum dolorem, ut putabant, incidit. Sed iliaca passio erat. Aut (item à torminibus cruciatibusque conturbata, conuolutaque sursum deorsum intestina, tandem id mali intulerunt. Circa inguem apparuit tumor: intestini prolapsus erat. Semel eum tantum prolapsum passus fuerat. Tamen principio non putabant intestinum esse prouolutum, sed tumorem testiculi. Quod ne cui mirum videatur, sciendum in eo conformando naturam sui oblitam fuisse. Nam testiculus neuter in scroto erat: sed yterque intus conclusus erat: vnus quidem apparebat tactui soli, & circa pectinem locatus erat, alter delitescere planè. Sic tumorem tantum testiculi circum pectinem suspicabantur. At aliter res erat: & frequentes vomitiones, & suppressa omnino alui prolapsionem intestini indicabant. Dolor erat magnus circum umbilicum, quò situs est ileon. Pars fomentis & semicupis non est remolita: sed eorum vsu an contigerit nescio: intra triduum totus pecten inflammatus est, & aliquid acuminatum apparuit, ex quo pus saniosum & foetidissimum excretum est. Dubitabant an id ab intestino rupto nasceretur. Et magna rupti intestini erat suspicio. Quicquid sit, deuolutum erat intestinum è sua sede, quòd tumor ad pectinem indicabat. Clysteribus tentata alui, nil reddidit: longioribus balanis sollicitata, reddidit. Quae materia rupto exiguo tumore excreta est, ea graueolebat admodum: hinc faeculentæ materiae magna fuit suspicio. Tamen speculo res explorata est, nec incisum intestinum compertum est. Febris perseverauit: dolores frequentes, spuitiones, vomiti-

tus, sed non ita frequentes vt in aliis obseruauimus, sudores: defectiones animi. Sexto die totus pecten inflammatus magis, erysipelatosus, mors denique nono die. Aperto cadauere, imus venter quasi syderatus apparuit: prolapsus ileon. Insanabilis erat morbus. Iliacâ passione laborantes, alij celerius, alij tardiùs moriuntur. Quibus ab inflammatione malum ortum, intra quatuor dies moriuntur; vt Dominæ illustri de Mandossie contigit, quæ intra quatuor dies periit. 1. Quidam sunt in ea opinione vt existiment nullum voluulum in quo frequentes sunt vomitiones, sanabilem esse: sed errant. Nam primo quoque tempore vitatur motus intestinorum peristalticus, quo vitato vomitus & subuersiones stomachi contingunt. Item volunt in inflammatione statim gangrænam consequi, quod falsum est. Nam hinc persuadentur quod leipothymiam frequentem adesse videant: at non est necesse inde inferre à gangræna id consequi: siquidem faciliè communicatur id vitij ventriculo ob viciniam. Et teter vapor eorûquæ excernuntur faciliè leipothymiam adducere potest. Ceterum inflammatio, scirrhus, siue durus tumor, abscessus, voluuli causæ solæ videntur Galeno *Commen. in Aphor. 44. lib. 6.* At obstructionem à sicco stercore vult ileon inferre posse: at illi non videtur probabile vt crassi & lenti humores tantam obstructionem faciant, vt præpediatur exitus stercoribus; quod tamen omnes verum esse volunt. Nos prolapsus intestini id mali attulisse sæpè obseruauimus. Meisæus *cap. de intestinorum morbis*, vult colicam ac iliacam passionem sæpè eodem modo fieri; dum scilicet materia collecta est in monoculo: ac dum agitur nec excernitur, augentur dolores, hinc colica aut iliaca passio. Immò, ait, clyster quia non peruenit secundum substantiam ad superiora intestina, sed secundum vim tantum, agit tantum materiam in superioribus intestinis contentam, sed non excernit, vnde grandi conatu naturæ quia per inferiora materia secedere non potest, & stercus & clyster per os reicitur. Sed nunquid à crassis & frigidis humoribus iliaca passio nasci potest? Non videtur Galeno, vt dictum est; idèò non vult admittere illum Aphorismum Hippocratis germanum esse, *Quibus ex stillicidio urine ileos superueniunt, septem diebus percuti, nisi febre superueniente multa urina profuerit.* 2. Nam si quæ materia committit stranguriam eadem, ileon committat cogetur fateri iliacam passionem à pituita calida

aut cruda nasci posse quæ eadem & ad renes translata committat stranguriam, & reuocata in intestinum iliacam passionem. Fatetur ignorare se quid hic velit Aphorismus, ac narrat falsas veterum in illius Aphorismi interpretatione opiniones. Tamen quasi reuocans calculum, dubitans tamen censet frigidam materiam ileon committere posse quæ discutatur successu febris. Fuchsius illum Aphorismum interpretandum audentius quàm Pergamenus aggreditur. Primùm præpositionem accipit pro *et*; quasi dicat Hippocrates vt ileus superueniat stranguriæ à crassis frigidisque humoribus natæ. Quod autem intra septem dies moriantur, id ait fieri propter dolorem vtriusque partis & renis & intestini, qui dolor vires admodum deiciat. Et absurdè admodum diuclit verba Hippocratis, dum ait illud, *Febris si superuenit*, ita debere intelligi, vt loco ilei qui prius superuenit stranguriæ, febris succedat, ac ileus abeat; quasi nolit Hippocrates vnà cum ileo febrè adesse. Nam Hippocrates vult ileon quidem stranguriæ successisse, sed vult simul esse & febrem & ileon. Quidam fortassè putarent fieri posse ac verisimilè esse vt ei stranguria & ileos adsit, & febrem impedire quo minus intra septem dies illi affectus perimant. Nam febris alterutrum soluit malum: & sic solutus æger vno alacrior est aliquantò. Et illa febris non debet esse symptomatica ilei ab inflammatione nati, vt volebant veteres, sed succedere debet humorum aut spirituum potiùs inflammationi. Sed posterior hæc ratio de presentia duorum malorum simul stranguriæ & ilei non videtur plausibilis. Sed sententia Hippocratis vt non est temere pronunciata, ita veritati maximè consona videtur. Fieri enim maximè potest vt stillicidium vrinæ cõtingat à raptu pituitæ falsæ, acidæve ad renes. Quæ si fortè, vt ferè fit, vt morborum successione in intestina regeratur, aut in iisdem resistat, paulo vegetiore calore in flatu conuersa dolores vix tolerabiles excitabit. Hinc in gyrum intestinum conuoluitur, dissoluitur, intumescit. Et ab acerbitate doloris ileos reiectio omnium humorum per os vitiatu motu peristaltico. At quoniam febris, si modò sit analogos materiam mitificat, paralyfes, tetanosque soluit, potest quoque materiam in intestinis contentam coquere, mitificare; hinc ilei leuatio. Ac eã interpretatio non videtur à veritate abhorrere. At ex iis colligere licet in iliacis passionibus aliquando frigida maxime ex usu esse & balnea: aliquando

obesse plurimùm, prodesse verò calida. Nam cùm inflammatio est, non est dubium quin illa conueniant: si humores frigidi, lenti, pituitosi, calida conueniunt: 3. & si febris immineat, non est prohibenda.

Porro in nephriticis doloribus aliquid fixum est ac immobile ad alterutrus renis situm. In colica dolor est vagus, subuertens ventriculum: in ileo fixus est circum vmbilicum qua situm est intestinum ileon. grauas est. extensus, pungens. Sed pungens maximè est à vermibus. Annotat enim Meluæus iliacam passionem à vermibus excitari, dum illi scilicet loco fixi sunt, ac pungunt, cuniculos agunt, immò perforant intestinum. Ad id non stare oportet scitu ac obseruatione dignissima. Prius est: Quæ fieri potest vt in iliaca passione stercus meracum excernatur, quod Galenus tantùm morituris contingere ait. Nam si voluulus passio est intestinorum superiorum, non sita, sed generatione & ortu, & in illis tantùm chylus ac cremor sit, secretio autem 4. in cæco demum fiat: præpedita via in intestinis superioribus quomodo ab inferioribus crassioribus intestinis stercus ascendat, ac præsertim morituris, cùm iam vires fatiscunt. Quæstio hæc ardua est. Alterum est quod nos obseruauimus, & à Mesuzo diligenter obseruatum legimus, nempe iis qui à voluulo releuantur succedere incredibiles affectiones: Contingit, inquit, paralysis, materiâ ad neruos translata. Nam in ista affectione intra septem dies ratione astrictæ alui, & motus excrementi sursum inficiuntur spiritus, & humores qualitate inexplicabili: aliis vitiato simili modo hepate hydrops. Melancholia, tremor, fœtor, anhelitus, sudores frigidi, syncope, sitis inexhausta. 5. Vidimus mulierem quæ cum voluulo laborasset, eo liberata in hydropem incidit: hinc tabida interiit. Aliâ vidimus quæ cùm sudores frigidos extremitatû frigus per decem aut duodecim dies, etiam cessante ileo habuisset, fœtoremq; oris ingentem, & pudendorum ex quibus sanies graueolens refudabat. Inde fluxit aluus, repurgata ter aut quater sine vllò grauiore symptomate, aut morbo potius nunc bibens ludensque vivit.

ANNOTATIO.

1 Eorum opinio roborari potest sententiâ Galeni. Hic enim Comment.

in Aphorism. 10. lib. 7. scribit vomitum non semper adesse in ileis, sed quando exitiales sunt. Ac si dicat vomitum superuenientem mortem significare. Ego tamen vidi quibus adesset vomitus, & liberati sunt: immò facillimè omnium succedit vomitus, ut cum prolapsum est intestinum in scrotum, statim vomitus adest. Nisi quis dicat vomitus in prolapsu intestini faciente iliacam passionem non ita lethales esse, ut sunt in aliis speciebus iliace passionis, Quod credibile est: Aut per vomitus, eos præsertim intelligit qui cum faculenta materia, aut cum chylosa sunt. Nam simplices vomitus non ita mali sunt, nisi frequentes admodum sint.

2 D. Magnam Medicus & Professor Regius in Mathematicis voluulo interius impetu magno pituità multà in intestina prolapsà ibique collectà & putrefactà: unde abscessus factus, hinc morbus.

3. Febris non est tollenda aliquando in voluulo: contra faciunt Medici.

4. Nam colon tenuibus intestinis est superius. Sic mirum cur voluulus sit tantum affectus tenuium intestinorum, ut placet Galeno comment. in Aphorif. lib. 6. cum obseruatum sit rectum intestinum voluuli aliquando causam esse, aut saltem malum in eo esse. Vnde hist. 9. sect. 2. lib. 3 Epid. meminit crassorum intestinorum etiam voluulum esse affectum.

5. Libro de affectionib. Hippocratis locus est valde notandus de cura voluuli. Nam cum non admittuntur clysteres, vult fistulam ad utriculi extremitatem, applicari, & ita intestina inflari post dari clysteres. Quod fortè non negligendum in tam periculoso morbo. Porro nota apud eundem Hippocratem, eodem libro, ni fallor, triplicem esse voluulum, vnum hyemalem, alterum ictericum, siue æstiuum, tertium hamatiten, siue autumnalem. Obseruat dominus Magnus in voluulosis affectionibus nil melius esse quàm dare Confectionem Hiera, hac enim subuersiones ventriculi sedat. Item induratas faeces aliquando emollit & è recto intestino extrahit. Itè injectionem per longissimam fistulam conferre ex oleo de semine lini.

CONSILIVM XXXII.

Pro Calculosis.

NVLIVS hodiè æquè genus humanum vexat morbus, ac calculus. Morbum appello, etfi nonnullis id nōminis non placeat, quòd actio, nempe mictio impediatur à re præter na-

turam in capacitate contenta, quam tamen alij rei natura destinavit quàm calculo continendo. Quod qua ratione fiat, cōmē-
tatione dignissimum est. Alij vsūm lacticiniorum & casei, & re-
rum viscidarum accusant: alij limosas aquas & paludosas. Sit ita
herclè. Qui lacticiniis viscidis, crassisque alimentis vtuntur, aut
qui limosis aquis, ij maximā partem calculosi sunt; non tamen
generales has solas causas statuere oportet.

¶ Duæ mihi videntur rationes probabiliore, propter quas
tam longè latèque pateat hic morbus, vt aut nulli, aut oppidò
pauci ab arenulis, aut calculo, aut concretionē aliqua immunes
existent. Prima videtur ingluuiēs, & ea præsertim cū alimen-
torum varietate qua homines mirum in modum delectantur:
secunda, ius hæreditarium; nam ex calculosis ferè calculosi ge-
nerantur: Tertiā adiicio facilem generationem calculi, aut
tophi, aut arenularū, & præsertim in corporibus mollioribus &
delicatis, & imbecillis, cuiusmodi sunt nostra corpora si ea cū
priscis conferas. Quod enim tam facilis generatio sit, ex eo pa-
tet, quòd nulla non in parte corporis calculus aut topus gene-
rari possit: vnde plerisque in folliculo fellis, aliis in pulmonibus,
aliis in capite, aliis in vtero, aliis in corde, aliis in intestinis ge-
neratur, vt in nostris hypomnimeoneumatis abundè recensui-
mus. Accedit quòd ex variis humoribus generari possint, vt
postea abundè ex veterum sententia apparebit. Vnde iubeatur
valere eorum opinio & dogma, qui ex sola pituita calculos con-
crescere voluerunt: vnde pingues & obcætos calculo obnoxios
præ ceteris voluerunt. Quod falsissimum est. Ac ingluuiem
præsertim quæ varietate ciborum adiuuatur, calculorum paren-
tem esse nemo non potest fateri, qui nouerit ingluuiem & gulā
causam esse multiplicis cruditis; vnde natum illud, *Intempe-
rantia Medicorum mater*. Varietas autem propter diuersas variās-
que facultates naturæ quæ omnia ad vnum æquale & vniusmo-
di redigere conatur, plurimū in coquendo, alterando, segre-
gandòque similia à dissimilibus negotij facessit. Quod primus
annotauit Hippocrates, qui in lib. i. de Diætā morborum acu-
torum inter præcipuas dotes quas ptisanæ attribuit, recenset
eam, quòd ptisana nullum tumultum stomacho afferat. Verba
græca sunt, *ὄντι δ' ἐξ ὧν καὶ οὐκ ἔστιν*. Galenus non abs re Hippocratem
addidisse ait *καὶ οὐκ*, nec simpliciter *ἐξ ὧν* dixit, quòd nihil sit quòd
æquè cōctioni officiat ac varietas, quæ vni cibo inest, aut quæ in

variis cibis. 2. Nōne *ἀεὶδὲν* duobus tantum locis apud Hippocr. legitur, vno lib. 4 de Diæta acutorum, cum de glande mentionem iniicit. Glans (inquit) tumultum affert. In Commentario Galenus tumultum excitari ait, cum alimenta ingesta variis facultatibus prædita sunt, & dum vnum facilius coquitur, alterum ægrius: immò dum in eodem alimento & substantia media, & externa, non sunt analogæ: vt de glande & brassica Galenus docet comment. in particul. 18. lib. 1 de Diæta acutor. Locus alter est is de quo superius dictum lib. 1. de Diæta, cum de pifano loquitur. Atque vt res in angustum reuocetur, legenda maior pars commentarij in eum locum. Nam adducto exemplo athletarum, & eorum qui probè educantur & nutriuntur, docet quantoperè noceat varietas ciborum, varietas facultatum, vel etiam in vno & eodem edulio. Nam cum vna mordet, alia soluit, alia inflat, non dubium est quin chyloleos officina perturbetur, & naturæ plurimum negotij afferatur; quæ cum vniufmodi sit in officiali parte, ventriculo nempe existens, non facile subiget tam varia quæ ingeruntur. Hinc eò loci Galenus ait solitos athletas in arenam descendere volentes, 3 solo pane vti manè, solis carnibus vesperi. Ac eum tumultum à ciborum varietate afferri solere obseruauit Horatius in Satyris.

*Accipe nunc, victus tenuis quæ, quantaque secum
Afferat: in primis valeas benè. Nam variae res
Vt noceant homini credas: memor illius esca,
Qua simplex olim tibi sederit. Ac simul assis
Miscueris elixa, simul conchylia turdis,
Dulcia se in bilem vertent, stomachoque tumultum.
Lenta feret pituita.*

4. Itaque iis & escarum habendus delectus, & fugienda varietas quibus sanitas studio est. Ac hæreditario iure calculum vt & alios morbos ad posteros peruenire posse vulgò constat. Nam semini impressa sæpe vis est, quæ vt valet ad speciem, genus, & ideam retinendam, & ad prolem deuehendam; ita latente impetu morbosam *διὰ σπέρμης* transfundit, traducitque. Hinc ex macrocephalis macrocephalus Hippocrates obdeciduum ab omnibus partibus semen gigni asseuerat.

Sed his positis, in rei propositæ arcem libentiùs inuadamus. Dicendum quæ lapidis materia, quæ efficiens causa, qui ei obnoxij, quæ præcautio. Tandem nonnulla ex eis quæ vulgò vsur-

pantur remedia afferentur. In assignanda materia multi varia, multaque censuerunt. Ac primum, nomine calculi peculiariter intelligimus eum, qui aut in vesica, aut in alterutro rene generatur. Qui enim in aliis partibus corporis humani tanquam fodinis conglomerantur, cogunturque, ad præsens institutum nil pertinent. Quidam lapidis nomine eum qui in vesica continentur intelligi volunt, quod sæpe grandiusculus sit: calculi autem, eum qui in renibus cogitur. Sed quoniam ^{λιδίος} & calculosos vertit Celsus, & lapidosos, curiosa hæc de nominibus quæstio valere iubeatur.

Calculorum materiam quidam volunt esse aliquod purulentum, & pituitam quandam putrem. Hollerius annotat observasse se in quodam Præside Rhotomagæo pituitam putrem, & pus crassum falso calculum retulisse. Antequam aliorum opiniones recenseamus, expendere licet an pus, aut materia purulenta in lapidem cogi possit. Nam quod pus in vesicam illapsum, aut in eadem concretum non referat calculum, nemo dubitat: quicquid enim aliquâ ratione angustos canales, per quos vrina præterfluit, obstruere, obturareque potest, id calculum mentiri potest. Sed quæstio est, num pus in vesica calculus efficiatur. Nonnullis non videtur: Galeno id fieri posse videtur. Illorum rationem huc referemus, ne indictâ causâ illos arguamus, quamquâ à Galeni partibus stare consilium est.

20 Primùm ita ratiocinantur: Sanguis, saniesve dum putredinem concipit ut in pus vertatur, putredine fibras amittit: at fibrarum ope concretio fit: nam damarum sanguis non concrevit, quod fibrarum expers sit: Ergo pus in calculum cogi non poterit. Deinde, illud observari solet in abscessibus renum: Purulenta materia quæ à renibus abscessu tentatis excernitur, toti permiscetur tota vrina: & si in imo vrinae residis subsideat, parvâ agitatione rursus toti vrinae remiscetur. Quod arguit pus corpulentum solidumque nil esse, sed aliquid diuulsum: Ergo in calculum non cogitur. Contrâ verò apparet in femine & pituita. Nam utrumque ut fibrarum particeps cohæret, partesque vnitas habet. Unde aut tanquam separatim aliquid vrinae supereminet, aut in fundo residet: ne ratione sui lentoris & partium cohærentium ita miscetur vrinae toti, licet moueatur: sed suam cohærentiam conseruant. Atque ita conficere se putant ex præsentibus rationibus, pus in calculum concrevire non posse. Adducuntur

ramen victi ratione & autoritate Galeni, vt credant calculi rudimentum pure induci, incrustarique posse. Sed id subterfugere est, non rationibus & autoritati subscribere. Nam quantumuis obducatur calculi rudimentum pure, si quia fibrarum expers est non agitur, adaugeturque, nihilo maior calculus inde futurus est, quam si aquâ allueretur. Pus enim iis autoribus non concrefcit. Sed antequam eorum rationes conuellamus, Galenus audiatur. Verba eius sunt: *In animalis corpore ex purulento humore, aut ex purulento pituitosoque composito taphus nonnunquam creari potest: quemadmodum & in articularum morbis accidere consuevit. Eodem enim prorsus modo in hu & renum affectibus lapides concrefcunt.*

Com. in
part. 6.
sect. 1
lib. 6.
Epid.

Ad primam autem rationem quâ contendunt illi neoterici idè pus in calculum cogi non posse, quòd humores per putredinè fibras amittant: at fibrarum ratione concretio fit, ita respondere consilium est. Aliud est aliquid corrumpi, aliud in pus abire. Nam in corruptione partium fit alienatio, & materia tota præter naturam est, & causa efficiens tota quoque præter naturam. Partium quoque fit diremptus, & per eam partium diremptionem fibrarum dissolutio fit: hinc nulla cõhæsiõ, hinc dissolutio continuïtatis. At cum ex materia laudabili, intrâque naturæ limites contenta, pus fit, etsi pus illud naturæ non cedit in alimoniam: satis tamen est si aliquam eius gratiam recipiat. Hoc autem fieri dicitur si aliquid sit vniusmodi, si albor adsit, si lænor, si nil grumosum, nil inæquale. Idem enim opifex versatur circa pus, & circa alimentum: hoc differunt, quòd alimentum cedit in naturam, pus autem excretionem sui præmoneat, quod antecedenti, primariâque origine eius materia laudabilis fuerit, sed ex euentu illaudabilis extiterit, quod fortè extra locum sibi destinatû ab aliqua externa causa euocata fuerit. Quod in contusionibus apparet.

Satis autem est si in pure character naturæ imprimatur, vt eas dotes & facultates retineat, quas Hippocrates & Galenus puri laudabili tribuerunt. Cur enim toties Galenus in vlceribus commendat pus album, læue, æquale, vt æqualitas vim significet caloris naturalis sese in omnes materiæ partes æquabiliter inducentis? lænor materiæ *euocatur*, ingenium interpretor? candor vim partium solidarum, quæ quàm fieri potuit maxime, sibi assimilare annitantur pus? Et cum perfectè id assequi non possent, saltem quem à natura sortitæ sunt partes solide candorem.

86 CONSILIORVM MEDICINALIVM
eum in pus contulerunt. Si per putredinem fibrarum fit deper-
ditio, quomodo sanguis qui putrescit in vasis, aut extra vasa,
vertitur in sedimentum (de febribus putridis intelligo) album,
laue, æquale? Aut in laudabile pus iisdem dotibus illustre in ab-
scessibus? Immò ex generibus puris aliud videtur contra natu-
ram esse, vt quod in morituris apparet, liuidum est, subuiride,
fœtens, diuulsum, inæquale, non leue: In iis qui è natura habet
contrariis omnibus dotibus præditum est. Quinetiam licet ma-
teria diuulsa fuerit, virtute partium solidarum vnitur, labora-
tur, id quod *ερεος* & alienum secernitur. Et cum ex Hippo-
crate quædam vrinæ sint grumose in morbis, quæ postea tenues
fiunt, quid aliud per tenues intelligit, quam pro grumosis con-
fusisque vrinis redditas à natura chymosi, consistentia, & con-
tentis laudabiles: vt pauca sit hypostasis, sed ea alba, lauis, &
æqualis? Ergo alienum est ab experientia, & ratione puri ad-
imere cohesionem, & eam tribuere solis pituitæ & semini. Nam
& sedimentum & pus laudabile coherent: Immò licet antec-
dens vtriusque materia serosum tantum fuerit aliquid, & disso-
lutum, multiplici elaboratione & coctione (quæ omnis incref-
candis partibus fit) acquirit fibras, lentoresque, cuius ope con-
crescat. Et falsum est illud, quod pituitæ tam curiosè tribuitur:
nam sepe videas phlegma & misceri toti vrinæ, & postquam re-
federit remisceri, præsertim cum coctum non fuerit, & nondum
gratiam naturæ receperit. 5. Pus autem si à renibus refunda-
tur, non est mirum si misceatur, quia longo viarum anfractu li-
quore vrinæ dissoluitur ac dirimitur; vnde sepe puris formam
non referat. Falsò itaque puri eâ ratione vnionem & coherent-
tiam adimunt vt conficiant in calculum non cogi. Verum enim
pus cogitur, quod sensui notissimum. Nam & empyicos sæ-
pe grandinosa sputa extundere à concrecente in grandinem
& topulum pure obseruauerunt: In abscessibus tardius ruptis
aut naturâ, aut arte, pus ita sepe cogitur, vt iam lapidescere vi-
deatur. Nouerint itaque aliud esse corrumpi, aliud putrescere.
Per corruptionem vnio, vinculum ac cohesio tollitur, direm-
ptis videlicet partibus: per putredinem aut retinetur cohesio:
aut subactis elaboratisque partibus nouarum fibrarum fit ac-
quisitio, vnde nexus & copula consequatur. Ergo ex pure lapi-
des cogi posse intelligentius scripsit Galenus. Quod primus an-
notauit Hippocrates lib. 2. de natura humana. 6. *Quibus, in-*

quit, in lotiis subsident arenosa, vel topi, iis per inttia circa venam crassam tubercula extitère, versaque in pus fuere: ac deinde ipsis tuberculis haud celeriter ruptis pus in topus conuersum est, qui foras per venam cum lotio exprimuntur. Tamen quoniam & huius orationis idioma Hippocratem non sapit, & libellus ille falso adscriptus illi est, fit vt nullam vim id loci afferre possit. Sed ea in re audiendus Galenus, enarrans illam particulam, scribit: *Excretiones eiusmodi vinarum arenosarum possunt fieri à causa quam statuit Hippocrates: item & rene obstructo citra venam magnam. Maxima autem parte sine tuberculis sunt, cum succus crassus vel glutinosus exitum retardans concreuerit à calore loci arefactus.* Ergo agnouit Galenus arenosas vrinas nasci posse à pure concreto, quanquam non ita frequenter.

Ad materiam lapidis & eò loci quem supra ex lib. de natur. humana secundò adduximus: Galenus crassum glutinosumque humorem vias obstruentem præpedientemque constituit. Et comment. in particul. 13. lib. eiusdem, apertius multò designat, & causam efficientem, & materiam de puerorum calore locutus. *Pueri multi, quia admodum sunt voraces, cumulant succum qui propriè crudus appellatur, à quo facilè calculi generantur. Is autem humor vt materia rationem habet, ita & calor efficientis cause.* Ac mirum quomodo Hippocrates, aut quicumque eum librum scripserit, dicat, Puerulis nascitur lapis ob vesicæ caliditatem & totius corporis. Viris ob corporis frigiditatem haudquaquam generantur.

Multa in eum locum inquiri possunt, quorum explicatio ad seriem continuationemque disputationis apprimè pertinebit. Constitutum enim erat de lapidis causa, tum quæ efficiendi, tum quæ materiæ rationem habeat, disputare: de loco: de ætatibus, & iis qui magis minúsve obnoxij forent. Primum itaque dubitari potest an caliditas & vesicæ, & corporis totius ad generationem calculi faciat. Et quoniam Hippocrates meminit caloris multo humore perfusi, cuiusmodi est humidum primum, & calidum primum; an calor puerorum halituosus, *ατμώδης*, spirituosus, humidus, blandus, minimum mordax minimè ad generationem lapidis pertinebit. Nec enim probabile videtur, vt paulò post abundè demonstrabimus. Secundò quæri potest, an caliditas vesicæ tanquàm vnius partis eòdem pertineat, calculumque creet. Nam Ga-

lenus alio loco frigiditatem vesicæ constituere videtur causam generationis lapidis. Tertio, an viri, quod frigidi sint calculum non generent? Quarum quaestionum examen & euolutio non minimum habebit & voluptatis & vtilitatis. Voluptatis quidem, quod animus noster iis explicatis aliqua ex ratione satiabitur ac explebitur: Vtilitatis verò, & ad præcauendum, & ad curandum, & ad opem miseris mortalibus afferendum. Nam si, vt quidam volunt, immò maior Medicorum pars, calor qui ad generationem lapidis tanquam causa efficax & efficiens concurrit tenuitate partium, & acrimoniâ præditus esse debet, immò veluti febrilis, quod Hippocr. 6. Epidem. *ἡ ἰσχυρὴ* absolutè aliquando vocat; vt dum ait, *Qui ventre calido, carnes habent frigidus*: aliquando *πῶς*, ob igneam vim, seu potius (vt cum Arculano loquar) igneitatē; cūr toties in calculosis affectibus ad oxypora, ad *ὀξυπόρα*, & calidissima remedia concurrimus; nam causæ efficienti nervos & robur addimus. Atque ita, vt plerumque fit, aberramus. Si calor lapidis autor & parens temperatus est, halituosus, blādus, naturalis, qualem Hippocrates aut scriptor libelli illius, & cum eo Galenus constituit, cur *ἡ ἰσχυρὴ* præscribuntur temperata, dulcia, mucosā, blanda; nam & ea fouent calorem naturalem lapidis auctorem, & materiam reddunt viscidiorē, muccaginosā, lentiorē. In quo plurimum aberraretur. Ac credibilis, ab aliquo acri calore, aut saltem non à nostro blando & naturali concretionem fieri. Nam calorem potentem debere esse, tumque resoluentem satis ex mente Galeni apparet. Illius hæc verba sunt: *Lapis propria passio est purorum, qui ob edacitatem non paucos crudos humores generant, ex quibus pars crassior cum vrinis ad vesicam perueniens fit lapidum materia. Accedit altera causa, vehementia caliditatis. Nam & senes acruant crudum non paucum, non ob voracitatem, sed facultatis coctricis imbecillitatem. Non validū tamen calorem habent, qui crassam materiā resoluens lapidē generet. Vtitur participio *καταίσιος*, id est, exiccās, arefaciēs, exhalare faciēs, & tenuē substantiā eliciens ē materia crassa, vt fax tandem remaneat. Ergo & calor validus requiritur, & calor qui resoluendi vim habeat. An verò tali vi præditum est calidum primum & radicale, quod si fluens est, erit *ἀτμός* tantum, & *ἀπόβουη τῆς κατακλιθεῖσιν ὀπίσσω*: si fixum, partium solidarum *κετλήσεται*. Hic calor quandiu aliquid habet præsto in quo ver-*

setur coquendo, secernendo, alterando, non sese ad aliud accingere solet; vnde non est credibile calorem blandum & mitem in pueris exercere vires suas in crudis humoribus digerendis, & in lapidem conuertendis. Nam digestio illa, arefactio, resolutio quæ requiritur vt materia crassa lapidescat, soli calori febrili tribuenda est. Et quoties *ἰσχυρὸν θερμὸν* legitur, videtur de calore acri & febrili intelligi, cui passim Galenus ob igneitatē in apoplexiis, tetano, morbisque frigidis resoluendi vim, digerendi tribuit, immò & coquendi; quam in illo loco vbi legitur de calore febrili quòd concoquat, legitur, frigiditatem concoquendi vim habet, non absolurè, coquendi vim, sed frigiditatem coquendi, id est, corrigendi, mitificandique summam, quæ in crudis succis inest, frigiditatem. Sed hæc per transfennam. Nam si calor naturalis vim habet resoluendi, & in lapidem vertēdi in pueris, cum alioqui sit blandus, humidus, & multo humore obrutus. vnde sæpe impeditur Hippocratica illa *ἐκλυαυμένη*; an tanta in senibus frigiditas, vt, cum ob facultatis coquentis imbecillitatem multa congeratur materia cruda, illa non possit obstruere, vias impedire, siccescere, à calore acriore quàm sit in pueris, quantuluscunque is sit, lapidescere? Credibilius est. Vnde mirari subit cur autor libri de natura humana scripserit, *viris calculos non generari ob frigiditatem*. Item Galenus loco superiore, In senibus quidem suppetere materiam generando creandòque lapidi idoneam, sed præ infirmitate caloris non cogi. Nam Galenum contradictionis possumus conuincere; *Asthmata in senibus ex destillationibus ortum habent, cum & respirandi instrumenta sæpe habeant, proprium sui algoris principium, quando & in ipsis multa & crassa superfluitates generantur. Et præterea præsentē virium imbecillitate renes obstruuntur, & lapides generantur; cum tenax & crassa superfluitas in similem callo substantiam transuerit.* Antequam doceam contradictionem Galeni, de serie contextus dicam, istam periodon, *καὶ αἰσθητὴν τῆς ἀνάπνοιας ἀδύνατον εἶναι*, non soleo cum Leoniceno cum sequentibus connectere in eo sensu, Et præsentē imbecillitate virium renes obstruuntur, & lapides generantur: sed totam periodon refero ad disputationem de asthma, quam peculiariter Galenus explicat; siquidem Hippocrates in suo contextu non meminit vllius obstructionis renum in senibus. Quasi dicat Galenus, imbecillitatem

90 CONSILIORVM MEDICINALIVM
virium vnā ex causis esse quæ asthmaticos senes reddunt. Nam
sequens periodus tota sibi cohæret in textu græco sine vno
puncto, nec colo, nec inciso, vt malè fit in textu latino: *μολοῦσθαι*
τοῖς οὐροῖς καὶ τὸν ἄσθμα ἰσχυροῦσθαι, &c. Obstruuntur autem renes
sæpè, & lapides generant. Non autem legendum cum Leonice-
no, imbecillitate virium præsentē renes obstruuntur: lapides
autem generantur quando, &c. Nam hoc scriptoris est nec Ga-
lenum intelligentis, nec verba græca an benè malève cohæreāt
scientis. Quāquam hoc verisimile esse videtur ab imbecillita-
te renū tanquā ab adiuvante causa lapidem nasci posse. Nam
concretio quæ fit in parte quāpiam, infirmitatem partis agno-
scit nequeuntis à se se amandare id quod molestum est. De ver-
bis hæctenus. Nunc ad rem redeamus.

Quòd in mentem venit Galeno vt tam paucis literis contradi-
ctoria complectatur? Nam in vno Lithiasin propriam affectio-
nem puerorum scribit quod & cruditas, voracitas, & calor in-
gens in illis concurrant. Accedit quod partes puerorum fameli-
cæ à ventriculo nondum satis mitificatum alimentum rapiāt.
Raptus autem ille eò fit, quòd idem alimentum & ad auctiōnē,
& ad nutritionem faciat. Et quæ partes augeri debent, id quo
augeantur appetunt: quæ nutriri, id quo nutriantur. Diuersum
est partium studium, diuersum desiderium, quod vno & eodem
alimento debet leniri ac temperari. Nutritio quidem fit non
quatenus alimentum quantitate est præditum, sed quatenus sub-
stantia est quæ in alendæ rei naturam multiplici alteratione præ-
eunte mutari debet. Auctio verò contra. 7. Eandem lithiasin
ibidem à senibus remouet, quòd licet materia idonea sit, tamen
causa efficiens desit. Sed alio loco obstructionem renū seni-
bus contingere posse ait, vnde viscida superfluitas *ὀύσαισι παρῶν*,
callosam concretionem aut coagmentationem interpretor, cō-
trahere possit. At concretio fit resolutâ parte tenuiori virtute
caloris distantis. In senibus, autore Galeno, frigiditas domi-
natur. Quanam ergo causa efficiens? Nec est quod quis con-
etur defendere Galenum, quòd magna sit senū latitudo: vt qui-
dam sint virides, quidam decrepiti. Cùm vno in loco ait: In se-
nibus ob frigiditatem calculum generari non posse, de decre-
pitis intelligit. Cùm autem alio loco scribit viscidum & crassum
humorem callosam substantiam & naturam induere vnde lapis,
non de decrepitis capularibusque senibus intelligit, sed de viri-

dibus, in quibus non ita languidus, paucusque calor sit naturalis. Contra tamen colligere licet ex eiusdem commentario. Nam dum delithiasi, & asthmae, & stranguria affectionibus senum disputat contra sententiam aliorum Hippocratis interpretum, asserit senes eò loci ab Hippocrate intelligi τὸν πλεονάζοντα ἄρσενος ἡλικίαν, καὶ ἐν αὐτοῖς χεῖρα τῆς τῶν λόγων ὡς ἀπείσους ἢ δὴ θλιβελάως. Eos inquam, senes intelligit, qui extremam ætatis partem exigunt. Atque in eiusmodi senibus orationem suam finit tanquam iam ordinatim singulas ætatum partes emensus. Si itaque in extrema ætatis periodo *σύστασις* illa *πυρρότης* fieri potest, cur non magis in iis quæ antecedunt? Itaque non videtur consentaneum à senibus & viris iam grandioribus reiicere calculorum generationem, præsertim cum materia in promptu est, cum non sit tantum frigus quin calor naturalis paulò acrior in angustiis viarum quodammodo præfocatus (nam in angustiis locis maximam partem lapides generantur) sufficiat ad cogendum compingendumque temporis progressu. Vt id quod simul & semel, aut brevior tempore in calidioribus fit, idem in non ita calidis, sed tempore longiore fiat. Quod alienum à ratione non videtur: immò rem ita esse credendum est. Eamque ob causam Hippocrates 6 Epidem. scribebat, *Post mictum concretio magis, an quòd calidiores?* Cur dubitat? Cum aliis locis calorem puerorum causam concretionis posuerit. Reuerà libro illo multa ad memoriæ subsidium conscripsit. Nec abs re fortè dubitando scripsit, an quòd calidiores? Dubium enim esse ostendimus, & paulò post plenius aperiemus, an calor naturalis mitis & blandus, concretionis causa.

Nunc quod mihi videtur probabile dicam de senibus & pueris: necdum enim explicabimus an ante mictum, an post mictum concretio fiat. Lapides generantur in vesica, generantur & in renibus, & aliis locis angustiis. Qui in loco ampliore generantur, & caloris vbertatem & materiæ declarant. nam cum materia alia loca in quibus cogi potuisset pertransferit, in vesica calidat tum per se, tum locorum vicinia, vt ex Hippocrate docebitur, nanciscitur copiam nouæ materiæ; vnde concretio fit. Qui in loco angustiore fiunt, quodam obstructionis modo fiunt, videlicet sicca, aut viscida, sed terreno modo affecta superfluitas diù in renibus & viis angustiis hæret; vnde obstructio, & ab obstructione, loco, tempore fit concretio. Itaque in calidis

naturis propria dicitur esse generatio lapidum tum in ratione lapidis, quia propriè lapis fit; tum in loco, quia in vesica; tum à causa efficiente propria, nempe calore; & in tempore, quia pauco tempore; & in effectiois modo, quia tenuioris partis resolutio fit; vnde propriè concretio. Sed in non ita calidis, immò iam ad frigidum temperamentum vergentibus generatio lapidis cernitur, sed non propria. Quia non per modum coëctionis per incrassationem & tenuium partium à calore consumptionem, sed per modum obstructionis, à qua res impeditur, & dum materia retinetur calor difflatione prohibetur, hinc longo tempore concretio impropria tamen fit. Item generatio ista fit in renibus. At non tam elucet vis caloris in generando lapide in angusto loco, quàm in capace: quia angustia loci quasi apprimè ad concretionem confert. Non prætereà digestio fit tenuis partis, quia non multus calor. Atque vtrumque modum explicat Galenus abundè. Nam dum de senibus agit, *εμπερασιονται οι νεφροι και φοιτασι λιθους και συστασις πορωδους ειναι*. Non dicit, In senibus materia subigitur à calore, digeritur, vnde concretio: sed obstruuntur renes, inquit, & generant lapides: Ergo in generationis forma desideratur efficiens causa propria calor, sed obstructio per se videtur statim causa. Deinde *συστασις πορωδους* meminit; ac si dicat, non verè lapis est, sed per obstructionem humor *παχος ειναι* coagmentatur, adipisciturque callosam naturam. Sed dum de propria lapidum generatione loquitur, vt ea quæ fit in pueris, aliter multò loquitur; nam non meminit obstructionis, immò reiicit angustiam vt causam aliquam. Epid. sed voracitatis, copix humorum & validi caloris, & resolutionis. Hic tria maximè considerantur, calor validus (qui in senibus deest) copia materiæ (quæ adest quidem, sed ob cōstrictis facultatis imbecillitatem, ergo penuria caloris) & resolutio. Quæ efficit veram legitimamque lapidis generationem. Itaque mihi videtur sibi quadrare Galenus.

Sed nunc quasi è portu paulùm remigrantes, quoniam longius soluimus, redeamus ad disputationem de calore; quoniam, vt supra diximus, Hippocrates dubitauerit, an ideò quòd calidiores pueri post mictum in iis *ουδυνα* fiat? Et si calor, an sit mordax & acer, an naturalis, vt supra attigimus. Ac calorem quidem esse causam generationis lapidis certum est, siue calor fit in parte ipsa in qua reapse generatio fit, siue in partibus vici-

nis quæ parti adiaceant. Quod fortè nouum videtur, sed id primus Hippocrates animaduertit libro de aëre, locis & aquis. Quorum aluus satis fluida est ac sana, non ardens, nec stomachus vesica coarcescit, hi facile urinam eiiciunt, & nihil in vesica congregatur. Quorum aluus ardens ac feruida fuerit, in his necesse est vesicam idem pati. Cum enim magis quam pro natura fuerit calefacta, stomachus ipsius inflammatur. Cum hoc patitur, urinam non dimittit, sed in ipsa coquit atque adurit: quod tenuissimum, excernitur; quod purissimum transit ac emittitur. Quod crassissimum ac turbidissimum, coacervatur, ac primum concretescit parum, deinde magis dum voluitur ab urina, quicquid crassum compactum fuerit ad seipsum aptat, augetur, & in tophum concretescit. Cum urinam emittit, ad vesicam stomachum allabatur ab urina impulsam, urina emissionem impedit, & dolorem affert. Quare pueri fricant ac trahunt pudenda. At videtur causa mictionis eo loco esse. Signum autem quod hoc ita se habeant, hoc est, urinam splendidissimam calculosi eiiciunt ad similitudinem seri, quia id quod crassissimum ac biliosum isthic manet, coacervaturque. Pueris autem lapis fit si lac non salubre fuerit, sed valde calidum ac biliosum. Ventrem enim percalfacit & vesicam. Tria hic obseruatione dignissima sunt. Primum, quomodo ætus, calorque & vesicæ & partium vicinarum calculi præuentum faciat: vnde adustio fit, & orificij vesicæ inflammatio. Ergo de calore acri locus intelligitur. Secundum, quod contra neotericorum sententiam primaria in vesica coagmentatio fiat, nec sit ad renes recurrendum. Tertium, quod lac in pueris calculum generet. Quartum addo de urinis splendidissimis, nam hoc non videtur probabile. Neque enim veri similitudinem habet ita splendidas & tenues urinas, & albas reddi, cum ætus sit & in vesica, & in intestinis ratione astrictionis & ardoris. Sed hoc mihi propterea videtur contingere, quod multa copia lenti viscidique humoris subsideat, à qua resudet tenue serum, quod tanquam paratum magis ad excretionem, emingitur: sed quod crassum est ac biliosum (hoc est quod in mole ista calidum est ac æstuans, tanquam summopere conferens ad generationem lapidis) remanet: & quod excernitur tenue est, incoctum; quia licet calor sit multus, hic naturalis non est, sed æstuans, vt vult Hippocrates hoc loco (quanquam in aliis recurrit ad humidum calidumque primum, quod in pueris multum est) & propterea urina cocta non apparet, sed diluta multum, & albicans ob eam impressionem quam habet à materia in fundo vesicæ contenta.

Tamen hoc controuersum esse potest maximè. De tertio, nempe de lacte, dicemus postea. De secundo, nempe de concretione lapidis & arenularum, an in vesica primò fiant, plenius posthac. De primo disputemus, quoniam instituta est quæstio de calore, an sit naturalis, & blandus, an verò contrarius. Id quod hoc loco ab Hippocrate dicitur aliquod problematicum habet. Nec enim absolutè verum est inflammari vesicam, & os eius nec intestina ardere vt inde generetur lapis. Tamen vt nihil efficitur temerè, nil ab Hippocrate imprudenter pronunciatum, ita eius verba problematica quidem, sed vera tamen cum reuerentia sunt capienda. Stultum est tanto auctori falsum aliquid affingere, quod fortè eius verba quæ aliquid secretius in se continent, non intelligamus. In ea re enim inscitiam nostram potius explicaremus. Illo loco de aquis agit, earumque commoda & incommoda explicat, prout aliis atque aliis ventis afflantur. Ac inter cetera docet in nonnullis aquarum à Borea perflatarum vsu arenulas in vesica generari, in aliis non item, prout nimirum cuiusque alius bene aut malè affecta est. Nam in cuiusque morbi generatione, non modò dispositio materiæ & eiusdem copia requiritur, sed subiecti ipsius; alioqui nihil generaretur. Itaque illo loco Hippocrates vult eos calculis fore obnoxios quibus inferior alius calidior est, & vesica ipsa. Quod quanquam problematicum, tamen verisimilitudinem habet. Nec Hippocratis verba vbique ad vnguem sunt exquirenda. Nam nihil aliud videtur innuere quàm eos calculis obnoxios esse, siue in renibus generentur, siue coagmentatio prima & rudimentum fiat in renibus, perfectio verò in vesica per materiæ nouæ appulsam, quibus alius astricta est, arida, sicca. Ac si dicat Hippocrates: Illud in arte Medica receptum est, & communi prudentiâ notum, calorem lapidis efficientem causam esse. Ergo quibus illa causâ præstò est, in iis credibilis est lapidem potius generari quàm in aliis in quibus deest, etiamsi par materiæ congeries adsit. Quo fit vt vesicæ ardor, alui durities, siccitas, calor plurimum generationem lapidis promoueant ac adiuuent. Vt enim calor hepatis & partium vicinarum facit ad meliorem chylifin tum in coctione, tum in facili alteratione, immò & digestionem, ita intestinorum vesicæ vicinioris calor facile communicatur & renibus & vesicæ; vnde in iis partibus augetur calor per aliarum partium viciniam, auctus calor ad rudimentum &

Notandum locus Hippocratis de generatione arenularum in vesica, contra veterum sententiam.

perfectionem lapidis facit plurimum. Sic nimirum quæ sunt vicina, & quæ propinqua, ea primum ac maximè affici solent, vt Hippocrates scripsit. Sic inflammatio recti intestini vrinæ stillicidium afferre potest: & vesicæ inflammatio tenasium adducit, vt in Aphorismis Hippocrates testatum reliquit. Et vterus recto intestino tenasium pariente laborat per consensum: immò & abortionem facit Hippocrati. Itaque fieri potest vt quibus ardens aluus est, ij præsentem materiâ calculosi fiant; quod communi experienciâ percipitur. Nam & qui præcalido sunt hepate, iis maximam partem aluus astricta est, & arenulas patiuntur: & qui nephriticis tentantur, & calculosi sunt, iuuantur plurimum educatione stercoris; tum quia induratum stercus opprimebat partes iam calculo pressas & fatigatas: tum quia breuissimo tempore aluus ita astricta, & ob astrictionem seipsâ calidior effecta potest calorem suum communicare partibus propinquis, & eas adiuuare ad nouarum arenularum generationem. Nam & dolores, & vigiliæ, & astrictio alui facilè corpus febriciens reddût: immò quibus naturâ præsertim biliosis durior, sicciórque aluus, iis maxima ex parte & capitis dolor, & renum calidioris (de ea enim conqueruntur sæpè) immò & rudimenta febris apparent. Calor itaque siue partibus ipsis insit, siue ab aliis partibus emanet, calculorum parens est. Vt non iterum prætercundus videatur locus ille Hippocratis supra citatus, pueris arenulæ cum lotiis excernuntur, tum propter vesicæ, tum totius corporis caliditatem. Vt non solum partium calorem in quibus solent nasci lapides considerarit, sed & totius corporis. Quod animaduersione dignissimum est. Ceterum subtilius & breuius de calore agendum. An calor sit acer & mordax, an calor blandus & mitis, an vterque. Nam in iis quæ antè dicta sunt, & docuimus probabile esse non à calore blando cogi posse calculum, quod ad coagmentationem; digestio tenuis substantiæ requiratur, & à frigiditate non iuuari coagmentationem. Vtrumque amplius excuremus, & tandem quid sentiendum aperienus. Audiatur Hippocrates.

Hippocr.
lib. de
humori.

Apho. 58
lib. 5.

Apho. 27
lib. 7.

Post mictum concretio pueris magis, num quia calidiores?

Aliquid intus reconditum obscuris verbis designat, sed non exprimit Hippocrates. Et vt antea monuimus, non audet absolute pronüciare an quod pueri calidiores, ideo eis fiat magis concretio (αἰσῶμα Γραῖς, ἀπὸ τοῦ ἤλιγου, καὶ αἰσῶμα).

eaque concretio

post mictum. Nam tacitè testè indicat duplex *πύκνωμα*, vnum ante mictum, alterum post mictum: Ita enim Græcis est, *μετ' ἔρριπιν, καὶ μετ' ἔρριπτος*. Pro nomine *ἔρριπτος* positum aliud est lib. 2. de nat. humana *ἔρριμα*, sed malè; nam ponendum erat *ἔρρ*. Aliud est enim *ἔρρον*, aliud *ἔρριμα*, seu *ἔρρισι*. Quæramus igitur cur Hippocrat. dubitet & hanc particulam ambiguam scribat *ἔρρ ἐπὶ διαρωπτεζ*, id est, an quòd calidiores? Duabus de causis videtur hoc adiectum esse: vna est, quia adiecerat particulam illam *μᾶλλον* videtur magis consentaneum, vt in iuuenibus, in quibus calor qualitate maior cernitur potius generetur lapis, quàm in pueris. Nam si calor coagmentationis autor est, vbi maior calor, ibi coagmentationis & coalitus occasio maior. Si itaque iuuenes calidiores, cur non in illis *πύκνωμα μᾶλλον*. Tamen in Aphorismis absolute pronunciarer pueros calidissimos esse, & nouerat illos & humidi primi & caloris primi vbertate fretos esse, à quo calido primo vere dicuntur calidi homines. Quanquam *θερμὸς* Græci Medici appellitauerint aliquando: immò sæpè quibus acer & mordax in aluis calor est. Nec mirum si dubitauerit, an quòd calidiores essent, in iis concretio post mictum fieret.

Secunda ratio videtur cruditas humorum, & superfluitas, præsertim in vesica coagmentationis lapidis causa est materialis: Vbi calor multus, ibi non est credibile crudos & superfluos multos humores coaceruari, vt res quoque se habet, præsertim ex parte caloris. Nam si magna sit ingluuius, ibi licèt calor multus, tamen non est satis coquendo, & mitificando. Si pueri calidi sunt, calor superfluam humiditatem & humores mitificabit, & nihil erit quod vim potentiàmque caloris effugiat. Ita nimirum in prognosticis Galenus scripsit, sedimentum multum esse in vrinis, quòd multi humores crudi, qui ratione copix effugerint vim caloris natiui, vnde eos necesse sit postea cum vrinis secedere, quòd naturæ gratiam non receperint, id est, in alimentum non facefferint. Itaque dubitat Hippocrates, an quòd calidiores? quasi dicat: An non alia causa est coagmentationis post mictum? Si enim calor validus esset in pueris, vt est, & humores coquuntur, & mitificantur, & ad facilem exclusionem comparantur; ideòque non est verisimile in vesica resistere, ac illic in calculum cogi; dilatantur enim multo calore vasa. Ergo alia causa est (dicere possit Hippocrates) nimirum propter ingluuiem humorum cumulus qui hoc efficiat, vt nimirum fiat

concretio post mictum. Accedit quod non dixit absolute, *Pueris magis concretio fit, an quod calidiores?* Nam si de concretionem & synagmate solo ageretur, non est dubium quin a solo calore repetenda esset causa, & non ambigeret, an quod calidiores. Nemo dubitat enim a calore *πυρρα* hoc fieri: sed adiecit, *μετ' ἕρπον*: post mictum: ut si ita quaeretur; An quia pueri calidiores, ideo in iis fiat concretio lapidis magis post mictum quam ante mictum? Et particula haec, *an quod calidiores*, dupliciter referri reducique ad ea quae praecesserunt potest: vel, An pueris concretio magis (supple) quam aliis in aetatibus, quod sint calidiores: quod videtur Galenus velle colligere. Vel, An in ipsis pueris fiat concretio potius post mictum, quam ante mictum, quod calidiores sunt. Etenim hoc probabile videtur, in pueris lapidem in vesica concrefcere praecunte aliquo rudimento ob copiam excrementi viscosi & crassi: quod renes quidem praeterit validam existente puerorum naturam, ac vasis satis dilatatis, sed quia graue est, facile remanet & residet in puerorum vesica ut molli & flaccida, exeunte tenuiori parte: sed in viris in renibus. 8. Cum in vesica fit, dicitur post mictum fieri, id est, post secretionem seri a sanguine, & eius in vesicam influxum; ita enim nomen *επίσπασ* intelligi potest. Cum in renibus fit, dicitur ante mictum fieri, id est, antequam secreta a sanguine seri pars sit, & illapsa in vesicam sit in renibus. Nam quidam volunt mictionem esse non cum actu a vesica excernitur vrina: sed cum in vesicam illapsa est vrina. Nisi forte dicat quis melius post mictum dici, id est, postquam excreta est a vesica vrina, ut excreta tenuiori parte humoris remaneat spissior & densior in vesica. Sed si hoc verum esset, quis esset sensus? quae ratio dictorum Hippocratis? Nam si ideo dicatur concrefcere lapis post mictum in pueris, quod id fiat post excretam a vesica vrinam: an probabile est in aliis posse generari lapidem in renibus ante mictum, id est, dum contenta adhuc est in vesica vrina? Non videtur verisimile. Nam contineatur vel non vrina in vesica, non propterea tamen in renibus generabitur lapis. Ergo credibilius est, post mictum dici, id est postquam illapsa est in vesicam vrina: Ante mictum, dum adhuc in renibus continetur. Nisi forte dicat quis, & defendat in hoc sensu dici concretionem fieri in vesica post mictum, quod fiat post mictionis actum, & nihil referat de renibus, siue ante, siue post id fiat, cum Hippocrates nullam mentionem ea de re

98 CONSILIORVM MEDICINALIVM
iniecerit. Nam, si ita dixisset, Post mictum in pueris concretio magis, quàm ante mictum, aliis potius ante mictum; videretur reuerà per comparisonem loqui voluisse de viris & pueris, vt in his aliter fiat quàm in illis. Sed secus est. Tamen & Galenus in comment. & Arnaldus, & ex veteribus plerique solent assignare distinctionem inter generationem lapidis in pueris, & in viris: quòd in iis in renibus fiat, in illis potius in vesica. Cuius rei demonstrationem petiisse videntur ex hoc Hippocratis Aphorismo.

Tamen coniectura à nobis priùs proposita non videtur à ratione aliena, vel quòd Hippocrates quæsierit, an quòd calidiores, quòd nimirum si hæc ratio valeret, quia calidi sint, idem de aliis ætatibus, præsertim iuuenibus intelligi possit. Vel potius, quòd cum nosset copiam excrementi parentem lapidis esse, & eius præsertim qui in vesica fit, non abs re dubitauerit, an caliditas eius lapidis causa sit, cum alia causa, eaque præcipua esse videatur. Quod autem de iuuenibus intelligi hoc posset potius, Galenus in comment. indicat, dum ait, Calidum in iuuenibus absolutè calidius est calido naturali quo abundant pueri: quocirca probabilius erat (si quidè caliditas concretionis autor sit) in adultis generari lapidem quàm in pueris. Sit ita sanè. Caliditas autor est causaque efficiens lapidis: sed an ea sit primigenia (quod nos demonstruros sumus polliciti) aperiamus. Quicquid eiusmodi est vt materiæ aliquam æqualitatem afferat quæ ad coagmentationem, quam læuitas adiuuat, conducere possit, & de materia educere aliquid tenue, id ad generationem calculi facere potest: nam, vt supra docuimus, requiritur aliquod agens ad coalitum istum. At calor naturalis, & quiuis calor mediocris id præstare potest: quod ratione, ac experientiâ doceri potest.

*Com. in
aphor. 15.
Ica. 3. li.
& Epid.* Autoritas Galeni est: *Vrinarum crassitudo creandorum calculorum in pueris prima potissimâque causa est, caliditas etiam mediocris ad spissandam materiam satis esse potest. Nam & in sponte aquis calidis, etsi moderatis tepidiores sint, topi concrecentes apparent. Itaque Hippocrates adiecit particulam NONNE, quoniam & tanta caliditas, quam ingentiam pueri habent ad coagmentandum aliquid facit: verum non ipsa præcipuè, sed materia ex qua fit lapis, qualitas, ipsius compactionis causa existit. Quo ex loco apparet ea nostra coniectura verisimilis esse, quâ paulò antè nobis videri dicebamus. Dubitandi par-*

ticulam ab Hippocrate additam esse, *an quòd calidiores?* Ac si dicat Hippocrates *αυτοματως* istius non tam causam esse calorem quàm materiæ spissæ, crassæque qualitatem. Quod & Galenus apertè demonstrat: licèt in omnium rerum productione habeatur potiùs ratio causæ efficientis quàm ipsius materiæ. Et addebat, *post mictum;* siquidem post excretam vrinam, vel post delapsam eandem à renibus tanta est in fundo superfluitas, vt minimo negotio cogi, aptarique possit.


Quæstio esse possit an tam facilè generari possit? Nam plerique putant necessarium esse calorem ingentem qui retorreat materiam, retostam in lapidè cogat. Tribus modis fieri potest, vno per modum obstructionis, vt in senibus fieri antè ex Galeno docuimus. Quia enim multa restant excrementa, ea tempore vel perse, vel à calore siccata non simul & semel, sed progressu temporis callosam acquirunt consistentiam, & vias angustas obstruunt. Et parùm probabile ostendimus esse id quod à Galeno dictum est, in senibus non cogi calculos, non quin adsit materia, sed quòd calor sufficiens desit. Altero modo per modum coctionis, in qua requiritur multus calor, & qui tempore cogat vt materiàm non lentam, viscidã efficiat, exhausto ferro, quem Galenus in Aphorismis constituit dum loquitur de lithiasi propria puerorum passione: & eundem modum agnouit Hippocrates libro de aère & locis, dum scribit eos calculosos fore quibus aluus exæstuat, vt paulò antè demonstratum est. Tertium modum ex hoc loco constituimus, in quo & Hippocrates & Galenus non tam recurrunt ad causam efficientem, quàm ad materiam, vt in pueris solam, vel præcipuam saltem vrinarum necessitudinem lithias eos causam ponant. Immò (vt ad quæstionem reuertamur an facilè generetur lapis) Galenus exiguum tempus ad coagmentationem requirit, præsertim cùm materia præsto est. Ita enim scribit, quod annotandum: *Crassities eiusmodi vrinarum collecta, & in vnum coeans. (supple in vesica, contra Fernelium) cùm semel aliquando non apto tempore excreta iniùs diutius remanserit, concrescendi initium capit: principio factò facile quicquid crassi in vesicam illabitur, priori agglutinatur, vt in sponte natis aquis cernitur, & in vasis in quibus aqua quotidie calfit. Notanda illa particula, cùm semel aliquando non apto tempore, &c.* Nam & facilitas generationis & incrementi apparet, præsertim vbi materia idonea. Vt non sit requirendus tantus calor, non diathe-

*Commẽ.
in apho-
rism. 15
lib. 6.
Ep scã 3*

sis aliqua parentum, ad quam tanquam ad asylum confugiunt qui potius morborum causas rimantur, quàm easdem amoliantur. Quis enim dubitat vsu casei primo quoque tempore non posse cogi calculum?

Redeamus ad nostrum calorem. Calor naturalis coquit, vnit, ad æqualitatem adducit, crassificat; nam coctio increffando fit: crassities illa in æqualitate spectatur, cum separatio est omnium partium *et es. Quæ.* Nam sæpè quod vltima in coctione apparet, tenue magis apparet quàm quod in prima: crassius tamen est, quia separatis heterogeneis partibus æqualius est. Si calor naturalis illud præstat, tantum abest vt non concurrat ad lapidum generationem, vt plurimum faciat, quâ præsertim ratione increffat. Quod Galenus conceptis verbis demonstrat: *Crassam materiam in pueris tenaciorem esse, quoniam magis ab insito calido elaborata est, rationabile est. Nam quæcumque à calore coquendo mutantur temporis progressu lentorem acquirunt, licet ab initio illum non habuerint.* Tamen contra id quod à Galeno modò dicitur obici potest ea ratio qua paulò antè eodem in commentario nifus est docere cur pueri in renibus calculum non generent. Pueri, inquit, in renibus calculos non generant, quia cum in iis omnes actiones naturales validæ sunt, humorum crassitudo funditur atque dissoluitur. Et paulò infra: In pueris cum multus calor sit insitus, & actiones firmæ, materia attenuata ad renes fertur, facile in vesicam percolatur. Ex quibus locis apparet calorem naturalem attenuare, fundere, dissoluere, nedum cogere, spissare, coagmentare. Immodò paulò infra, coagmentationis causam in pueris, illius præsertim materiæ quæ à calore attenuata fit, percolata per renes, & ad vesicam protrusa, vult vesicæ esse frigiditatem. Si frigiditas coagmentationem promouet materiæ aliqui à calore attenuatæ, si calor fundit, liquat, cur ergo & calor natius crassitudinis autor existit, & coagmentationis, cum contraria ei qualitas, nempe frigiditas, autore Galeno, id efficiat? Hæc herclè subtiliora sunt. Nam Galenus adduxit primam rationem, nimirum in pueris facultates validas & calorem attenuare, vt euerteret eorum sententiam qui dicebant in pueris lapides gigni ob meatum in renibus angustum. At Galenus; Si angustia hoc efficeret, potius in renibus cogerentur: At contra fit: immodò dubitando ponit ne in aliis quidem ætatibus angustiam istam causam esse, sed cruditatem, & infirmitatem: quæ cum

Comme
in part.
15. sect. 3
lib 6. E-
pid.



non fit in pueris tanta, non est mirum si in renibus non cogatur materia: immò eatenus eorum vis appareat quatenus validè depulsa est materia in vesicam, quæ ibi cogitur iuante quadam vesicæ frigiditate. Nam primùm per comparisonem tantùm vult tam validas facultates in pueris: nec vult calorem omninò fundere & attenuare: nam eùm primùm per modum digestionis cogit, tunc fundit, liquat, attenuat: sed eùm per modum coctionis, crassefacit. Sic in vno loco intelligi debet calor ille æqualitatem crassitiemque efficere eùm coquit. In altero fundere, liquare, dum per comparisonem eùm aliis ætatibus in quibus vires nec calor tantus est, hoc dicitur, & dum digerendi partes tenet. Quod autem vesicæ frigiditas coagmentationis causa dicitur esse, id tamen non excludit munia caloris naturalis in coquendo & inerassando. Nam frigiditas tantùm ex euentu cogit, præsertim si adsit inanis capacitas in qua materia diu resideat, quod vult Galenus. Calor per se crassefacit & cogit, dū videlicet ^{ερεος} ^{ουον} separat, & ^{ουον} congregat. Et licet materia attenuata sit, vt per renes percoletur, non propterea tamen efficitur quin diutiùs versando circa eam materiam præsertim excrementosam, nò illam cogat. Nam si illam assimilare posset vt in alimentum cederet, non vbique in calculum cogeretur: sed eùm sit excrementum, diutiùs resistens eam naturam acquirit. Ex his patet calorem blandum, mitem, mediocrem concretionis lapidis autorem esse posse, quod autoritate & ratione confirmatur.

Experientia est de aquis: in iis tepidiusculis aliquando lapides generantur: & in vasis nostratibus in quibus vulgò aqua incoquitur. Et Galenus earum aquarum duobus in locis mentionit: priore quidem: *Itaque si ex sola pituita crassa & viscida subsidentia facta sit, color cinereus erit, aliorum topthorum color similis, qui in aquis sponte calidis multis in regionibus lapidibus adnasci accrescere que cernuntur, & in vasis alioqui vbi aqua calefit.* Posteriore verò, *In calidis aquis sponte nascentibus calculi & topthi generantur. At dicet aliquis, non generantur nisi in aquis calidissimis.* Falsum est, & autoritate Galeni refutatum. ita enim eodem in loco scribit: *In sponte calidis aquis etsi moderatis tepidiores sint, topthi concrecentes apparent.* Eo autem loco conceptis verbis Galenus docere vult non necessariū esse vt aquæ calidissima sint, nec calor admodum vehemens vt lapis generetur.

Itaque vt oratio nostra terminetur: nec eorum placeat opinio qui in generandis lapidibus calorem acrem requirunt: nec quia solo calore naturali. Est enim vbi calor acer & mordax causa est efficiens, vt in picrocholis, & *δεξιμοχολις αιμα*. Est vbi calor blandus & mitis id efficiat longiore quidem tempore, & per modum concoctionis: alius calor acer per modum digestionis. Est vbi potius habenda sit ratio materiae, quam vllius causae efficientis; tamen illa quoque concurrat. Sed cum materia est multa, vt humor crudus & lentus, non est mirum, nec dubitandum (quicquid dicat Galenus loquens de senibus: nam postea sui memor sententiam suam temperauit) quinetiam exiguo praesente calore lapis concreascit. Est enim sedimentum multum, est & gluten aliquod, nempe pituita cruda, vt doctissime annotauit Hippocrates. Quod glutinum quod adest tantam habet vim, vt materiae alioqui diuisam diuisamque coire cogit; faciat, licet paucus calor sit. Et is quantuluscumque est calor longo tempore facit, id quod breuiore angustioraque vegetior & potentior calor moliretur. 9. Itaque non vbique accusandus calor acer, & propterea temperatis vtendum, non ideo renibus applicanda refrigerantia, cum potius ob sint, quam profint. Nam in pituitosis & praepinguibus in quibus concreascunt lapides, sed non frequentius quam in biliosis (contra veterum sententiam id dico) non est verisimile calorem illum acrem, quem lapidis parentem constituunt, abundare. Sed vno verbo inquiramus, an calor acer & febrilis iuuare possit ad generationem lapidis. In tetano, epilepsia, apoplexia calor febrilis coquit, digerit, euacuat, dissipat, frigus corrigit, & materiam frigidam ad aequalitatem reducit; item attenuat, & in

α. Epid. part. 10. sect. 3. halitum digerit. Et apud Hippocratem; *Quibus adsunt coryzae, si cum febre fuerint quae superuenerit, ea solvuntur, nec relapsum habent; quae cum febre non sunt, relabuntur.* quomodo id fit? Quia calor febrilis promouet coctionem. verba Galeni haec sunt: *αυπερὸς ὀπιθυσίου τοῦ αἵματος ἔστι βροχίτις βροχίτιος αὐτῶν πικρῶ πέλει.* Est ergo minimè consentaneum cogere, densare, & pituitosam materiam in calculum conflare. Videtur quidem hoc probabile, Verum tamen non est. Nam actio illa caloris praeter naturam non minùs pro se suadet & facit ad generationem lapidis, quam ad eiusdem prohibitionem; Siquidem positum est di-

gerere, attenuare, id quo tenue est elicere: at hæc requiruntur ad generationem lapidis. 10. Probatum enim est ex sententia Galeni, τὸ θερμὸν τῶν λίθων κίενν δεβερε κατὰ μὲν, id est, discutere, & exhalationem procurare. Quod si non fit multum contumax materia, procul dubio eam attenuabit, & in halitum digeret: alioqui conabitur quidem educere id quod tenuius, sed remanebit crassa pars; hinc calculorum prouentus. Ergo eâ ratione conferet ad calculos generandos. Præterea aliud est materiam in venoso genere aut neruis contentam esse, vt in morbis frigidis, & in conuulsionibus; aliud in capacitate aliqua, & angustis. Nam in venoso genere, aut neruoso, quia non est coactus humor, per halitum tandem digeritur: sed dum in capacitate aliqua contentus est, diutiùs maiore copiâ residens cogitur. Declarant arthriticorum tophi. Nam quandiu humor in genere neruoso est, vagus est: cum in pyxidem abiit, tum concrescit.

Ac disputationis continuata ex superioribus serie, agamus de reliquis partibus; de calculo an in renibus solum concrescere possit, & num omnis calculi rudimentum à renibus: item an ex hominibus aliqui obnoxij sint magis calculo, & quinam illi sint. Accedit & id, cur in hominibus & viris in renibus magis, in pueris in vesica potiùs concrescant. In renibus non concrescere calculum solum testatur experientia: nam nulla est corporis capacitas in qua calculus cogi non possit. Quod non est pluribus explicandum, & exemplis illustrandum. Si quidem & ex corde, intestinis, pulmonibus cysti cholidochæ, immò ex cerebro ipso excreti visi sunt lapides. Est enim illud verum quod à Galeno scriptum est (dum loquitur de concretionem lapidis in vesica)

Commē
in par. 15
sec 3. lib
6. Epid.

capacitatem, eamque inanem conferre ad generationem lapidis, sed an rudimentum fiat in renibus ignoramus. Si in partibus reliquis corporis agnouit Fernelius primus illius opinionis assertor, quæ defendit lapidis in vesica contenti rudimentum à renibus esse, lapidem concrescere posse, immò & in venis ipsis; cur ergo tam absurdè contra omnium veterum opinionem asseueranter affirmat omnis calculi generationis principium à renibus esse? Si veteres credidissent futuros quosdam esse, qui præiudicata suæ sententiæ pertinaces defensores assererent in renibus rudimentum fieri, probauissent credo, necessariò cogi posse in vesica: & vt solent, firmis rationibus suam opinionem roborassent. Probauerunt quidem & ratione caloris, & mate-

ria, & capacitatis ipsius vesicæ coagmentari in vesica; sed non elaborarunt in eo vt probarent primum rudimentum à vesica ipsa esse. At quis vnquam putasset fore quempiam ita à ratione alienum, qui negare aufit labefactando omnia veterum decreta cogi per se & primò in vesica lapidem posse? Si in alijs partibus cogitur, non repetitâ primâ origine à renibus, dicat cur non in vesica cogi possit & per se & primò, rudimento à renibus non mendicato? Non potior ratio videtur, immò probabilius est in vesica cogi posse faciliùs, quòd excrementorum corporis sit receptaculum, & mucosa substantia per se frigida, & caloris vim effugiens, omniam facillimè in vesica cogatur, coeat, ac coagmentetur: immò credo & faciliùs & promptiùs cogi, quàm in renibus; & breviori multò tempore. Primùm enim materia est, & sicubi alibi in vesica & redundat, & apparet: ac probauimus antè & ratione & experienciâ copiam materiæ muccaginosæ in loco etiam mediocriter calido cogi ac coalescere, & ex minima re tanquam fundamento aut semine per accessionem nouæ materiæ aliquid ingens cogi posse. II. Præterea & locus calidus est, immò & ratione suæ substantiæ frigidus: ad lapidis autem coagmentationem, transpirationem, concursumque caloris & frigoris vt ad lateres cogendos, plurimùm conferre, veterum autoritas iam pridem confirmauit. Præterea fieri potest vt in vesica & digestio fiat, & dissipatio tenuis substantiæ, tum ratione caloris, tum ratione excretionis quæ sæpè fit: nam id quod exclusioni paratum est magis, cum vrina excluditur. Quanquam abundè suprâ docuimus ex sententia Hippocratis & Galeni, in vesica calculos non cogi tam per modum digestionis (vt in renibus fit) quàm per modum coctionis, id est, elaborationis, & crassificationis, præsertim dum diutiùs in vesica vrina retinetur, vt annotat Galenus.

Cam. in
Apho. 15.
sect. 3. lib.
6. Epid.

Nec est quod respondeat, illud crassamentum inæquale facile à liquore vrinæ dilui, & per os vesicæ, quod Galenus ipse fatetur amplum in pueris, excludi; sic coagmentationis occasionem tolli. Nam & ex sententia Galeni superiùs demonstratum est, etiam in aquis *αυτοφύσι* calculos & tophos concrefcere. Itaque aqua suo liquore non impedit generationem tophi. Quid illud est? Si lapis in vesica à rene deturbatus augetur, & illud quod apponitur verè lapis sit & crassitie, & colore, omni denique ratione; immò durior sit quàm qui in renibus cogitur, vt nos ex-

perientia

perientia docet; cur non primò cogi poterit, vt rudimentum à renibus non repetatur: Eadem enim ratio videtur incrementi & principij, vt si materia & causa efficiens sufficiat ad augendā arenulam in tantam molem qualem in vesica videmus, eadem sufficiat ad generationem lapidis primò & per se? Præterea in articulis pituita lapidescit, nullo repetito à renibus principio, in vesica non cogetur, loco ad id apto, & quia veluti corporis sentina, & quia calidus locus? Quæ vrinæ grumosæ sunt, crassæ, multitudine paucæ, mucaginosa, confusæ, à vesica excernuntur, qualium meminit Hippocrates in suis distinctionibus, diutius in vesica retentæ non generabunt tophulum, & ab hoc sæpius aucto, calculum; illud credibile, scilicet. At dicet, si crassæ ita sint, grumosæ, paucæ, renes non transibunt, & ita in illis restitabunt, & stranguriam facient, & lapidem generabunt? idque maximè in pueris, in quibus credibile non ita ampla esse vasa vt sunt & in viris. Ratio hæc probabilis est, & autoritate Galeni confirmata. *Non absque ratione* (inquit) *crasse urine paucæ sunt multitudine, vt quæ nimirum vix renes pertranscant.* At bifariam respondere possumus: primùm quidem, si ita crassæ essent vrinæ quales paulò antè descripsimus, præsertim ita crassæ dum renes pertranseunt, verisimile esset puerorum renes non posse præterfluere, & ita illic cogi: sed crassamentum illud in pueris apparet, maximè in vesica ipsa; quod dicebat Hippocrates, *post mictum concretio.* Ac si dicat; post elapsam à renibus vrinam crassamentum apparere. Posterior ratio melior est, & autoritati Galeni adscribenda: nam commentario toties citato scribit puerorum actiones validissimas esse, calorem multum, qui fusos per venas humores attenuet, & ad excretionem per renes præparet, & actionum vim magnam esse quæ ad exitus celeritatem facit plurimum. Idem negat angustiam viarum causam posse esse in pueris cur in renibus lapis concreascit, immò ne in adultis quidem (quod fortè minus probabile videtur, & notandum est propter sequentem de viris disputationem) quo fit vt quantumuis illæ vrinæ sint crassæ, percolentur tamen: quanquam neget in pueris crassitiem esse quæ hoc efficiat in renibus; sed crassamentum ipsum attribuit corpori vesicæ frigidum.

Itaque ne Galenus rei veritate motus cogereetur fateri illuviem istam humorum remanere in renibus angustis, nimirum ratione ætatis, asserit & eos crassos humores attenuari; & nullam angu-

12. Sed ne indictâ causâ Fernelium condemnemus, licebit illius rationes in medium adducere, ac illas ad vnguem exigere. *Causam calculi* (addit ille) *omnes tradunt crassum ac frigidum succum, qui cum urina per venas in vesica capacitatem influit, in qua tanquam fax subsidens loci calore exarefactus statim lapidescit. At verò quid limum istud (nisi forte admodum angusta vesica. ceruix) tandiu possit remorari non video, cum & sanguinis grumus, & pus, & alia multa crassiora facillè illinc profluant cum urina. His argumentis adductus, cepi aliam causam inuestigare, ac tandem comperi omnem calculum in vesica conclusum quoddam rudimentum è renibus traxisse, è quibus per nephriticos dolores excidens, si grandiusculus est in vesica plerumque persistit, ac illic allaturum sordium adhæsu coagmentatur, cum perfectus fiat lapis. Et quicumque lapide vesica laborarunt, ij prius nephriticos dolores experti sunt. Et quoscumque calculos obtinui, in eorum medio nucleus repertus est, verum rudimentum è renibus exturbatum. Hæ rationes paulò debiliores sunt quàm vt à tanto Philosopho perfectæ videantur: Immò nisi eas tanquam probabiles tantum posuerit, videtur omnis fides eis deroganda. Quod his ratiunculis conficimus. Tribus argumentis nititur probare generationem lapidis primam fieri in rene, non in vesica. Primum est: Non videtur quicquam remorari posse crassum frigidumque succum lapidis parentem, in vesica, vnde concretio fiat: Est itaque probabile in rene coagmentationem fieri, quando quidem materia facillè vesicam pertransit: quòd autem probabile sit non posse remorari illum succum in vesica; hoc docet, quòd & pus & grumi sanguinis ab interna capacitate excernantur: Ergo multò magis succus crudus. Egregiam rationem quæ propterea Fernelium adduxerit vt credat calculum in vesica contentum primum sui rudimentum à renibus traxisse. Pus, sanguis concretus, & similia ab inani capacitate vesicæ excernuntur: ergo limus, & humor viscosus non potest cunctari in eadem capacitate, & adhærere spiri vesicæ? Hoc verum scilicet. Nam eadem ratione tuus nucleus, ô Ferneli, qui à rene deturbatur, & est futuri lapidis per allatarum sordium adhæsum, rudimentum à vesica excernetur: siquidem & ceruix vesicæ, Galeno autore, & præsertim in pueris satis patens est, & non minùs natura sollicitatur ad excretionem arenularum à renibus exclusarum; quàm puris, aut rei alterius alienæ. Et hoc argumentum contra Fer-*

nelium ipsum nititur: item & hoc: Ideò per te non remoratur glutinosus humor in vesica, quia eum vt pus, & alia crassiora probabile fit excerni: Ergo nec in renibus ipsis idem humor continebitur. Immò quia renum lapis magis fit per adhæsum arenularum, arenulæ autem non fiunt à tam glutinosa materia quàm ille lapis qui in vesica fit, cur non quotidie exeunt arenulæ à renibus, cum ab his & pus crassum, siue ab abscessu renum excernatur (vt ferè fit) siue à pulmonibus, vt Hippocrates i. Epid. annotauit, & Galenus lib. de locis affectis, in ruptione vomicæ sequatur, item & sanguis grumus exeat? Nec enim potior videtur ratio vt remoretur potius in renibus viscosus humor, quàm in vesica: aut dicat cur à renibus carunculæ, pus, grumus sanguinis, vrinæ abscessum aliarum partium soluentes, crassæ, grumosæ excernantur, arenulæ autem non excerni possint?

Ac de pure quòd à renibus excernatur, ita scribit Hippocrates; *Si sanguinem, aut pus quis meiat, aut vesica, aut renum exulcerationem significat. De carunculis & capillis, postea: Quibus in vrina crassa existente caruncula parua ac veluti capilli vnà exeunt, iis à renibus excretio fit.* Et Galenus in comment: *Quidam excreuit eiusmodi capillos longitudine dimidij cubiti: quia toto anno vsus fuerat fabis, orobo, caseo tenero, ac sicco. Item hoc fit adusto humore in renibus, & vocatur hic morbus, capillitium.* Et paulò infra, *Parua caruncula excernuntur cum hypostasies in vrinis semiles orobo excernuntur, & hoc contingit in febribus in quibus crassus sanguis in hepate, aut renibus exurit.* Quid aduersum dicat Fernelius? Nam conceptis verbis declarat Galenus aduri in renibus crassum sanguinem, pus contineri, grumos, & excernuntur tamen; arenulæ autem non excernuntur? Itaque idem de renibus & vesica necesse est intelligi. Nisi fortè respondeat: At ideò non exeunt arenæ, quia gluten est aliquod in rene, cuius operâ coagmentatio fiat. Cur non & idem gluten in vesica erit, immò maius? Siquidem totum recrementum in vesicam profluit, & renes corporis quidem superioris (vt ita loquar) excrementum excipiunt: sed vesica & corporis, & renum & suum denique continet. Accedit quod cum spermatica sit pars, & frigida, dum nititur conuertere in sui nutrimentum humorem, & voluptuatur vrina, necessum est multum lentum frigidum crassumque humorem cunctari. Et si ventriculus ipse quatenus spermatica pars multam pituitam coaceruat ex laudabilibus alimentis, cur vesica ex excrementis tota natura alienis

non multum coaceruabit? 13. Nec est quod recurrat ad angustiam renum, nam si angustia renum id efficeret, non ea excernerentur tam crassa ac glutinosa, quæ supra ex Aphorismis Hippocratis excerni probauimus. Præterea si ratio Fernelij aliquid haberet ponderis, quod nimirum si pus, grumus excernatur à vesica, eadem aut potiore ratione sæx excernatur, & sic tollatur occasio generandi in vesica lapidis primò ac per se: simili modo ageremus de pulmonibus, quòd nimirum non concreverent capilli, vt grando (quod ab eodem Fernelio obseruatum est.) Nam à pulmonibus pus crassum glutinosumque excernitur, excernitur grumus crassus ac magnus; ergo potius debuit excerni quædam pars materiæ glutinosæ, quæ in grandinem verti in pulmone nata est? Atque vt respondeamus (veritatis studio, non contradicendi desiderio moti) Fernelio ita in rebus his cæcutienti, & pus, & grumus, & crassæ urinæ, & carnes, & furfuracea, & *γαστέρα* (vt 6 Epidem. obseruauit Hippocrates) cum urina excerni possunt; non propterea limus & mucosus humor lapidis parens futurus non excernitur. Non quin excernatur aliquando pro conditione vesicæ, quæ aliàs atque aliter affecta est, sed etiam aliquando subsistit. Quemadmodum etiã istud pus (ô Ferneli) & grumus, & tua crassiora corpuscula aliquando excernuntur, sed etiam aliquando subsistunt. Vnde Galenus docet sæpe supprimi urinam à grumo sanguinis eius, præsertim qui à renibus excernitur, qui postquam in vesicam illapsus est, ibidem concreuit eidem Galeno) à pure, à carunculis, & similibus, siue à vesica sint, siue à superioribus partibus: At eadem, vt experientia docet, possunt & facile expelli, nec ullam aut *ιγερειαν*, aut *σπυρρειαν*, aut *δυσουριαν* efficiunt. Itaque non est necesse illum limum excerni, siue angustum sit osculum vesicæ, siue amplum. Accedit quod fieri possit vt pus, grumus, & similia facile excernantur, non sæx ista limosa & muccaginosa propterea, nam etsi & limus, & pus, & grumus, & alia id genus præter naturam sunt, tamen nec omnia eodem modo præter naturam sunt, sed alia atque alia magis. Nec alienum à veritate hoc loco dicemus, si limum glutinosumque, ac pituitosum humorem probauerimus non tam molestum sæpe esse vt est aut pus, aut grumus, aut caruncula, aut capillus (quæ omnia à vesica excerni videmus) immò pus etiam mediocris consistentiæ sæpe potius & citius, & facilius excernitur quàm phlegma admo-

3. de loc.
aff. cap.

ibid.

dum tenue; quoniam pus molestias maiores vesicę affert quàm phlegma. Si quod pungit, acere est, hinc dysurias, stranguriasque à pure & alia re præter naturam in vesica contenta oriri videmus, à phlegmate, aut pituitoso humore non ita (nisi salsum sit) : quod si ita est vt reuerá est, non est dubium quin & vesica magis labore in puris & similis rei excretionem. Nam in partibus omnibus acervatur humores frigidi ac crassi, plus, minusve pro natura & conditione partis, qui aliàs diutiùs in illis residesunt, aliàs excernuntur, præsertim si quam sortiantur qualitatem alienam quę facultati expellenti calcar ac stimulum addat. Itaque ratio Galeni de generatione lapidis in vesica multò potentior ac validior quàm recentiorum. Secunda ratio est de colicis, nephriticis quę doloribus, qui calculum vesicę præcedere solent. Nam si omnes qui è vesicæ calculo laborant, nephritici dolores necessariò exercuerunt, nec sine his visus vnquam cui in vesica lapis cogere tur, magnam vim id habet, & plurimum neruorum ad rationem istam stabiliendam ac roborandam. At quot pueris lapis excisus, qui nihil tale experti sint, sed residentis in vesica lapidis etiam incipientis signa edita sunt, nullo præeunt e signo affecti renis? Et vt plerisque in renibus lapides reperti, quibus immunis à vitio & calculo erat vesica: ita & in vesicæ capacitate repertus lapis quibus erant sani renes, & qui nihil lapidosum prætenderent. At si omnis lapidis rudimentum esset à renibus, fieri vix posset vt lapis ingens in vesica reperiretur, quin in renibus aut arenulæ, aut aliquid simile contineretur. Quod ergo dicit Fernelius, nunquam in vesica repertum calculum, qui ante nephritica non sit passus: id multà obseruatione eget, diligenterque sigillatim interrogandi essent calculosi, an aliquid simile passi fuerint. Nam de viris quidem, & iis qui in constante sunt ætate, constat quod maxima ex parte calculos in renibus generent ob causas supradictas, & quas paulò post fortè explicabimus; quos non mirum nephriticis doloribus cruciari. At pueri non ita in notitiam venire possunt, num nephritica sustinerint: & nondum obseruatum à quoquam vidi conquestos esse pueros de renum doloribus, qui eos tamen non effugerent, si à renibus prima vesicæ calculi rudimenta deturbarentur. Sic dubito de illa generali propositione Fernelij quam fortè ad fucum rationibus suis fulciendum confinxit;

Quicumque vesicæ calculo laborant, eos priùs dolores nephri-

110 CONSILIORVM MEDICINALIVM
tici exercuerunt. At viros fortè multos interrogauit: at iam di-
ximus aliam longè rationem esse virorum ac puerorum.

Tertia ratio Fernelij aliquid probabile habere videtur vt
conuincat omne calculi rudimentum à renibus esse: Quia,
ait, quotquot calculos manibus obtriui, in eorum medio nu-
cleus repertus est: at nucleum istum à renibus manasse putat.
Primò non est verum in omnibus nucleum istum apparere:
Reuerà in quibus à rene principium lapidis est aliquid sub-
rubeum & coactum, in medio calculi apparet; quod arguit
renem primum hoc rudimentū suppeditasse. Nam si id quod
medium est, diuersi coloris & substantiæ est ab inuolucro,
credibile illud à rene esse, vt hoc à vesica. At non vbique ista
& coloris & substantiæ varietas apparet. Nam etiam vidi-
mus lapides, quorum inuolucrum durissimum erat, grandio-
sum, lapidosum, non album (quod necessariò esset si à ve-
sica coagmentatio alba est Fernelio) sed tendens ad fuscum:
An non hæc omnia à vesica sunt, id est, & à calore vesicæ, &
à materia vesicæ, non mendicata aliunde occasione? Nam
quibus corpus biliosum est & æstuans, iis in vesica coagitur la-
pis ardore & vesicæ & totius corporis, vt autor lib. 2. de na-
tura hum. scripsit. Quam sententiam Galenus probauit. Re-
spondeat huic rationi Fernelius, si vesica cimenti autor est
& ratione causæ efficientis, & materiei, cur non principia,
causasque primas dabit? Quid respondeat Galeno de vrinis
crassis puerorum loquenti, cum vrinæ crassæ sunt, vrina non
apto semel tempore reddita, initium fit coactionis ac coag-
mentationis in vesica. Quasi verò hoc initium subacta, at-
tenuatâ qua materia non possit alia in parte fieri quàm in reni-
bus? Erroneum hoc planè, & anile. Quoties verò obseruamus
in febribus longis & quartanis, & in iis qui vino gulæque in-
dulgent excerni vrinas confusas, crassas, quarum contenta
sus deque lata rubent, ac si sanguinis fæx quædam ac limus
esset; 16. Et in vesica tale rubens recrementum moram aliquã
traxit antequam egeratur. Cur non in vesica calidiore cogi
poterit, agglutinari, coagmentari, cohærere, vt inde aliqua
moles exigua fiat? Quod si fit, cum materia illa fæculenta, li-
mosa, rubensque appareat, non est dubium quin lapis, aut
quicquid sit aliud, à tali materia ortum habens, referat colo-
rem ac characterem illius materiæ. Ruboris itaque in cal-

Part. 11.
lib. 2. de
nat. hum.

Com. in
part.
scilicet. 11.
6. Epid.

culo occasio non est repetenda ex renibus ipsis, quod placet Fernelio, sed à sæpe à materie ipsius qualitate. Quanquam non negamus & arenularum, & ruboris generationem à renum substantia dependere.

Hinc quæri potest, si per se & primò in vesica lapis generatur, an arenularum excretio fieri debet; & si fiat, an à renibus, an à vesica ipsa oriuntur? Plerisque persuasum est non posse oriri lapidem sine arenulis; contra & sabulum & arenulas oriri posse nullo nec præeuntes 15 calculo, nec sequente. Vnde melius esse putant excerni arenulas, quod *ουδὲ μάρτυς* & coagulationis occasio tollatur. Arenularum generatio accepta par. 18. ferenda est renibus, vt ex sententiis Galeni & Hippocratis conclusum est suprâ. Autor libri de natura hum. secundi, arenularum generationem ad calorem magnæ venæ cauæ descendens videtur retulisse: quod obscure fortè renes ipsos videtur indicasse. Nam quibus venæ caua continet sanguinem ardentem, his renum intemperies comes est. Tamen si in vesica lapis cogi potest non solum tendens ad albedinem, sed ad subrubrum & subcruentum, vt ex materie distinctione paulò antè explicuimus, potest aut arenula, aut aliquid simile generari, & præcedere calculi *τιῶν ὄστων*, & eandem sequi, fortè non alienum erit à veritate tales vrinas sabulosas dicere, vt & quæ venis calfactis excernuntur, at quæ renales sunt (id est declarant lapidosam calculosamque *ἢ νεφρῶν ἢ διὰ νεφρῶν* arenulosæ propriè vocabuntur. Ita enim distinctionis gratiâ distinguuntur hoc loco sabulosæ ab arenulosis.

Cur ergo in viris calculus potius renes occupat, & maxima ex parte nephritidos sæuissima tormenta experiuntur; in pueris autem vesicam occupat potius? Quæstio hæc difficillima est, & hæctenus multos exercuit. Ac operæ pretium est audire rationes veterum practitorum, quæ prætextu pulcherrimo sese nobis ostentant, cum erroneæ, ac falsitatis sint plenissima. Nam recurrunt ad angustiam vasorum, quam in viris maiorem esse censent, quàm in pueris: ac propterea materia calculorum in pueris ad vesicam vsque penetrat, vnde calculorum illic proventus: in viris autem resistit, ac hæret in renum viis, vnde illic arenule, coguntur glutino quodam, & lapis generatur. Alij, in quorum numero est Galenus, recurrunt ad naturæ infirmitatē & hoc fortè nimis est verum. Quis enim dicat eos qui iam præ

uectiores sunt, quos Galenus in comm. in particul. 6. Epidē.
Pueris post mictum, &c. τειλιος vocat, ita esse imbecillos, vt eā ra-
 tione in renibus hæreat materia, nequeunte naturā in vesicam
 vsque deturbare. In pueris autem cum & instrumentorum ma-
 gna sit mollities, infirmitas, multus humor, superfluitas magna,
 ecquæ illa tanta vis vt potius pellat in vesicam, quam in ipsis vi-
 ris? Si tanta ei vis est pellendi in vesicam, cur non & foras vnā
 cum vrina, cum Galeno in pueris adeo ampla sit vesicæ ceruix,
 vt cuiusque materie crassities facile excerni possit. Quod si ob-
 iiciatur Galeno sua ipsius opinio, scribit enim, *Alterantur pue-
 rorum dispositiones citissimè propter corporis humiditatem, & naturalis
 potentie infirmitatem.* Non est itaque cur recurat Galenus ad fir-
 mitatem actionum naturalium in pueris, quæ in viris deest. Ta-
 met si enim concedamus in pueris facultatem coëtricem vege-
 tam esse ob caloris naturalis vbertatem, quæ illis plurimum
 inest, tamen facultas expultrix quæ siccitate iuuatur ac roborat-
 ur, in illis deficit; at pellere, deducere vsque ad vesicā id quod
 ob infirmitatem in renibus subsisteret, facultatis expellentis
 munus est. Nisi dicat quis cum Galeno, non ad robur facultatis
 expultricis referri id, sed ad virtutem caloris multi qui, autore
 Galeno in comm. prædicto fundit atque dissoluit, quod in de-
 clinantis ætatis hominibus non fit; quia enim calor non ita mul-
 tus, ideo cogitur atque coagmentatur. Sed contra Galenum re-
 torqueri potest quod eodem loco scribitur, caloris naturalis vir-
 tutem contrarium potius effectum producere. Tantum enim
 abest vt dissoluat atque dissipet, vt contrā ad æqualitatem redu-
 cat, cogat, inspisset: crassam materiam, ait, tenaciorem in pue-
 ris fieri liquidò constat; quoniam magis ac magis ab insito cali-
 do elaborata est. Sic calor naturalis multus cogit potius quam
 dissoluat. Tamen quidquid fit, ex sententia Galeni aperte con-
 stat in viris lapidem in rene generari, in pueris in vesica potius.
 Ita enim ille interpretatur, *post mictum, &, ante mictum*: vt in
 viris ante mictum generetur lapis, supp. in rene; id est, antequā
 secreta omninò sit vrina à sanguine: post mictum in pueris, id
 est, in vesica; postquam percolata est vrina, & in vesicam lapsa
 est. Nam *επνος* hoc significat, non autem actum meiendi, vt
 falsò quidam putauerunt. Itaque ex sententia Galeni videtur
 probabile esse, si lac non conferret ad lapidem, si adeo crassæ
 non essent vrinæ, si tanta non esset edacitas, futurum esset vt
 ratione

Commēt
 in part.
 15. lib. 6.
 Epid.
 scē. 3.

ratione roboris facultatum naturalium in pueris, & caloris, patiente vesicæ ceruice, nullus esset prouentus calculorum. Et illa virtus in eo elucescit, quod saltem impediatur quo minùs in renibus cogantur: sed victa à crassitudine materiei, ab edacitatis occasione, iuuante quoque vesicæ frigiditate ob substantiam nervosam, vt antè dictum est, in hac coagmentatio fit. Quamquam qui calor fusionis ac dissolutionis causa est per se, idem quasi aliud agens coagmentationis ac coalitus causa esse potest.

Itaque angustiam vasorum Galenus eò loci causam coagmentationis lapidis in renibus reiecit: non quin angustia non adiuuet, sed hoc vult dicere, non propterea in viris potius in rene generari lapidem quam vesica, quòd meatum adsit angustia. Nam & in pueris angusti quoque satis sunt meatus. Accedit quod inter eos qui calculis obnoxij sunt, eos numerare soleamus qui biliosi sunt, & quibus calor acer & mordax est, & aridus. At horù venæ amplæ satis sunt, ex Galeni libris de Temperamentis: & Aphorismus de iis ab Hippocrate conscriptus videtur in Epidemiis.

Lib. 1. de aliment. admittit Gal angustiam vasorum cap. de punctore

Lib. 2. part. 4. lib. 6. Epid.

Qui ventriculo calidi, carnes habent frigidas, & graciles sunt. Isti venosi & iracundiores. Nisi fortè quis dicat venosos non appellari illo loco, quòd amplæ sint venæ, sed turgentes tantùm & conspicuas præ prauis sanguinis copiâ. Quæ interpretatio consentit Galeno: sed priore etiam modo accipi potest ex opinione Galeni in lib. de Temperamentis.

Itaque cum Galenus reiiciat vasorum angustiam, causam potius coagmentationis lapidis in renibus virorum, recurrit ad infirmitatem, addens sub finem commentarij: *Porro & in adultis casu frequentius videntibus lapides in renibus crebrò generari conspeximus.* Sed hoc nihil ad rem. Vt autem liberè dicam quod sentiam, mihi admodum mancus & minutus videtur Galenus in ratione exponenda cur potius in renibus generetur lapis in viris, in pueris in vesica. Hoc commentatione & dignissimum est, & cognitum difficillimum. Et cum hanc aggreditur disputationem Galenus aureos montes pollicetur, sed inde nascitur mus ridiculus. Nonnullam enim operam impendit in refellendis aliorum rationibus: sed sensa mentis non reclusit. Causari enim imbecillitatem vnam & cruditatem, idque dubitando tantùm, in viris vt potius renes calculo obsideantur, iuvenile hoc est, & tanto indagatore & demonstratore indignissimum. Ego verò cau-

farer potius acrimoniam caloris in viris, quam quicquam aliud. Nam cum a refectionis & digestionis modo cogatur lapis in materia crassa & cruda, causa efficiens est calor acer, mordax, digerens, arefaciens, qui quonia in adultioribus viget magis, 16. (in pueris enim est halituosus & blandus) & presertim in magnis venis, & in renibus; ideò ex facili & cruda materia coagumentatio fit. Quoniam verò ista acrimonia in pueris non adest, elaboratur materia fusa à blando calore; sed quoniam crassitudo magna urinae, sepositis partium excrementis in vesicam, quod fit ab acrimonia caloris in renibus virorum, non tantà existente materia, idem fit non tam ratione causae efficientis in vesica puerorum, quam occasione materiae. Sic in illis habenda potius ratio causae, quam materiae: in his, contra. Accedit quod viri vino vtentes multa in renes deuehunt: item varietate ciborum delectantur, caseis, leguminibus, & id genus aliis vtuntur: hos autem calculis obnoxios videmus. Quanquam & *diastis* à parentibus orta latenter & clam nobis multum iuuat.

Horum examen diligentius à nobis factum est, quoniam & ad diagnosin, & prognosin, & therapiam apprimè videntur pertinere. Nam cum & locus sit diuersus in quo generetur lapis, & materia diuerso modo affecta sit, & causa efficiens, aliàs calor moderatus, aliàs calor acer dicatur: item & in aliis atque aliis corporibus generentur, inquirendum de iis fuit antequam legitime medicina adhiberi possit. Accedit quod diuersa sunt tempora lapidis, pro quorum distinctione alia atque alia remedia vsurpantur. Nam nisi hæc omnia distinguantur, eo modo quo circumforanei & periclitatores vitam in discrimen adducemus. Nemo est qui audito lapidis nomine, non statim ad diuretica, & decoctum apij, petro. canis-rubi, bardanae, argentariae, seu argentinae recurrat, & in his magnum vitae ac curationis praesidium collocet. At si corpus biliosum, si renes praecalidi, si corpus excrementis scatet, si lapis factus iam est, quid proficient? Indurabitur lapis, corpus in febrem conicietur, deuehentur sordes ad locum patientem, & aliis incommodis corpus grauabitur. Quo loco subit mirari errorem Fernelij, qui omnis lapidis originem à renibus repetat per generationem arenularum, arefactionem, calcificationemque maximam; quasi verò in pueris eodem modo cogatur; quasi verò in senibus ita fiat & in pinguibus? Diuersa ratio, diuersi loci: ergo idea remediorum diuersa. Ac ne quis

parui momenti hoc esse putet, nihilque interesse siue primò in rene, siue in vesica generetur, errat si id credit. Et aliis topicis, aliisque remediis agendum, ne temerè pars remediis fatigetur, quæ nihil vitij contraxit. Si enim omnis à rene lapis, huic primò occurrendum. At quis adeò iuuenis & hebes, qui in obæfioribus, & pueris ad renes currat, & non potiùs de vesica sit solicitus, deque toto corpore in quo multa excrementa congeruntur? Ergo explodi debent eæ rationes quæ tam turpiter nos in ignorantiam traducere possunt: ac potiùs in veterum vestigiis manendum, quàm cum nouis neotericorum inuentis errandum. Non quin posteriorum labor meritâ laude fraudandus sit: sed iis aut est cum veteribus sentiendum, aut firmioribus rationibus noua dogmata sunt stabilienda.

In calculo spectatur generatio, transitus, & mora; Græcis, *γένεσις, διάφορα & διακίνησις*. Rursus aut curatio, aut præcautio. Sæpe cum formatus lapis, irrita sunt remedia, quod dum frustrâ aut deturbare, aut comminuere lapidem volumus, sæpè malum augemus, fusâ, liquatâque nouâ materiâ, eâque ad renes deuectâ. Cum præcautioni locus est, blandis ac lenientibus agendum, ne dum materia impetu mouetur, dolores qui priùs erant aut exigui, aut nulli, excitet ac irriter. Cum curationi, videtur Hippocrates vehementioribus vti, vt veratro. Quanquam dicat quispiam, non proinde sequi vt vehementius medicamentum vsurpemus, quod Hippocrates huius meminerit. Nam lib. 6. Epidem. etiam dum de puellis repurgandis agit, meminit elaterij. Sed verba Galeni satis indicant etiam intelligi posse satis validum medicamentum, alioqui reiecisset, & de leniente medicamento præscribendo cogitasset. *Iuuenes, inquit, veratro purgandi, consilio Hippocratis, cum antiquus affectus est, & quasi vectibus extrudendus.* Quanquam idem hoc præceptum etiam ad omnes affectu renum laborantes extendit: immò duo momenta curationis omnium morborum renum præscribit; tamen, ait, veratrum non detur ob crassorum humorum attenuationem, & corporum in renibus contentorum, vicinorumque solidorum mollietiem & laxitatem. Quod diligenter notandum.

Porrò non per omnia tempora lapidis dolor est: sed dum generatur, & transit, dolor acutus, dum manet grauis. Vtrumque dolorem explicat vno verbo communi Hippocrates: *in renem dolor grauis*. Nam Galenus argutè *ὀξείαν ὀδύνην*, & propriè *καταίαν*, cum

Comm.
in apoa-
rism. 6.
sect 1. 6.
Epid.

Vide cap.
4 lib. 2.
de loc. aff.
Isem cap
2 lib. 6.

sensus cuiusdam ponderis est, sub nomine ^{et Capéius dicitur} *com-*
pletitur. In eodem corpore renis & grauis est dolor, & acu-
 tus. Grauis, cum caro eius afficitur aut obstructione, aut in-
 flammatione: obstructione, vt cum infossus illi est calculus.

Commē.
 in aphor.
 5. lib. 6.
 Aphor.

S; inquit Gal. *carnea renū inflammatur substantia dolor grauis est ac si*
sensus ponderis adesset. Quod mirum est. Nam sine tunica non
 videtur inflammari posse ren. Quod si tunica patitur, eodem
 teste Galeno, acutus est. Nam proprie acutus aut cum arte-
 riæ, aut oscilla vasorum, aut venter renis, aut tunica patitur.

Eod. Co-
 ment.

Idem censet de affecto hepate, contra multorum sententiã,
 existimantium quomodo cumque affectum sit hepar, sensum
 tantum grauitatis inesse: sed toto aberrant cælo.

His ita positis, videndum quàm aberrant qui omnibus cal-
 culosis omni tempore diuretica præscribunt, sanguinem fun-
 dentia, & liquantia, omnibus corporibus, omnibus ætatibus,
 omni tempore, nullã factã obseruatione eorum quæ dicta
 sunt. Ac primùm sententiã Galeni docendum quàm grauius
 peccent plerique, qui promiscuè omnibus calculosis calida,
 acriãque præscribant: Primùm eo in capite contra omnium
 opinionem censet nihil eorum quæ valde calfaciunt, calcu-
 losis vlllo modo conferre. Et notat historiam cuiusdam ho-
 minis biliosi calculo laborantis, cui cum Medici calida præ-
 scripissent, tandem in marasum coniecerunt. Et ita conti-
 git, vt motus digitorum & manuum quodammodo præ sic-
 citate impedirentur, ita vt ossa cauum sonarent. Quod cum
 contigisset, alij multò imperitiores Medici paralyticon esse
 putabant. Galenus in crassis & pinguibus attenuantem vi-
 ctus rationem quidem admittit: sed quibus contrario modo
 affectum corpus in iis contrariæ sunt indicationes: vna à cor-
 pore squalido, siccoque, altera à poro seu calculo. Hic at-
 tuans & incidens requirit, illud tum ratione totius corporis,
 tum ratione intemperiei renum, contrariam rationem de-
 monstrat. At iam demonstratum maximam partem ^{de purioribus}
 & biliosos esse calculosos in renibus, si quid deliquerint, & à
 calore igneo vrentëque renum calculos cogi, vt duobus lo-
 cis præter ceteros demonstrat Galenus libris de Alimentis.

Cap. 11.
 lib. 6. de
 an. tuend.

Quodnam ergo operæpretium facturos putamus eos qui spe-
 ciosè sua diuretica venditant? Itaque optimum consilium
 Galeni, in lib. de sanit. tuend. vnâ eãdemque ratione & affe-

Cap. de
 pancreato
 lib. 1. &
 cap. de
 calculo, 13
 Cap. 11.
 lib. 6.

Cap. de pancreato lib. 1. & cap. de calculo, 13
 Cap. 11. lib. 6.

etui & corpori est prouidendum. Affectui, non præscribendo ea quæ uis cõsi sunt succi, ut etiam sunt carnes uolatilium domi nutritorũ. Quod notandũ. Valent autẽ hordeata, uolatilia, pisces saxatiles. Omnia à lacte temperandum, præterquam ab asinino: omnisque uictus ratio ambiget inter impinguantem & extenuantem. Quod optimum consilium, cui si omnes adhereremus, non ita turpiter in multorũ caput ignorantia nostra redundaret. Satis est hæc notasse. Nec enim consilium est omnẽ tradere rationẽ præcauendi, curandique calculi.

Tantum illud narrare oportet, cur Galenus statuens distinctionem inter arthritica & diuretica medicamenta, dixerit nil eorum quæ uehementer exalfaciunt, uilo modo calculosis esse præscribendum. Nam parum sibi omnino constare uideretur. Nam diuretica esse uult quæ & acrimoniam & calorem habent plurimum, ut *Imyrnium, petro. daucus, fefeli, phu, azaron, acorus*; quibus omnibus magna inest acrimonia. Omne diureticum fundit, & secernit, quod absque immenso non fit calore, ait Galenus: & propterea illa thoraci inimica, quod crassiorẽ redderent materiam ac contumaciorẽ. Sic tribus de causis aduersa sunt ea quæ uulgò diuretica; primum quia calidiora & sanguinem fundunt, secundo quia idem in renibus præstabunt quod in pulmonibus, nimirum secernendo serum, cõtumaciorẽ reddent materiam; propterea interdixerat 6. saniti. tuend. calculosis ualdè calida & acria. Tertio si Galenus acutè quidem dixerat idèd mensis mouentia calidiora, acrioraque esse debere, factã comparatione cum lac prouocantibus; quod in mammas & mittatur sanguis, & attrahatur: 17. uterus autem non attrahat, cum renes ex ceteris partibus attrahendi facultate plurimum polleant; quid opus tanto calore & tenuitate? At hæc discutienda sunt, alioqui errore non uacaremus: Quæ si à plerisque intelligerentur, non ita passim peccaretur ab iis qui quod audierint ab anubus aliquid diureticum esse, idèd id putant conferre posse calculosis. 18. Aliud est absolute dicere diureticũ esse aliquid, aliud conferre mouendæ uirinæ, & deturbando aut detereudo lapidi, aut materiæ lapidis incidendæ. Quod ut intelligatur, audiendus Galenus. Ille quodam loco ait: *Cum plurimam uirinam ducere nitimur, acrioribus & exalfacientibus magis quàm quæ sint in rebus uicendum.* Nimirum fun-

Gal. 13.
5.
de simpl

Gal. 13.
lib 5. de
simpl.

dentibus & liquantibus & fecernētibus, an hoc propterea vult, vt dicat hęc calculosis conferre? Nequaquam. Sed ex hypothesi loquitur, si vrinam multam ciere volumus. Propterea eadem interdicit asthmaticis. Item cū alio loco loquens de acribus tenuis substantiæ collatis cum iis quę sunt crassioris sub-

Cap. 19.
lib. 4 de
simplic.

stantiæ (quorum vis perniciofa) ait, *Acria tenuis substantiæ vim habent mouendi vrinas, sudores prouocandi, conferunt expuitionibus;* an ea vtenda consulit? Nequaquam; sed vires eorum docet, nam

Nota.

Cap. 22.
lib. 5.

alio loco illa non censet vsurpanda in asthmaticis, nisi cum forbitiōibus. Et hęc ratio colligendi, venandique authorum consilij. Nam aliud est vrinam prouocare velle, aliud expurgare velle, aliud calculum incidere, aut materiam tenuare. Quod Galenus ita abunde docet, Quę renes expurgant, ea incidunt, verū largā humiditate non egent. Quę callosas consistentias,

πρωτόδρασ γυμνασίου vocant, incidere sunt idonea, & ipsa incidunt quidem, sed minimū caloris habere debent. Nam caliditas poron exiccando contrahit, non incidit, nec diuidit. Et apertius alio loco hoc explicat. Quę non deficcant, & modicē excalfaciunt, lac generant. Quę plus calfaciunt, non tamen valenter siccant, menses cient. Vtraque vrinas prouocant. Item & ea quę calfaciunt & deficcant: Et propriē quę calfaciunt & deficcant, Diuretica vocantur; non quia sola moueant vrinas, sed solas, non etiam lac & menses, vt dictum est. Qui locus notandus est, nam paulò post ea diuretica quę & calfaciunt, & exiccant, ratione facultatis exsiccandi pulmonum morbis, & renum calculis non conferuat, ait Gal. quia nec calculi, nec asthmatici siccitatem postulant istam. Est ergo vbi diureticis locus est cū mouendarum vrinarum occasio postulat: est vbi aliis diureticis vtendum cū de incidenda attenuandaque materia cogitatur: Est & vbi iis quę *δριπτήρα* dicuntur propriē, non *διουρητικά* locus est, quorum vis paret in leniendo, vt est quatuor seminum frigidorum maiorum, maluæ, bismaluæ: quibus omnibus magna vis est in calculorum obsidione, vel potiùs renum. Nam cū calor est igneus, acerque, ad ea potiùs recurrendum, quàm ad ea quę & calfaciendi & siccandi vim habent, propriēque Diuretica dicuntur.

Ibidem.

Hęc omnia eo consilio à me dicta sunt, vt ratio conueniēter cuique medendi teneatur: ne temerē periculatorū more iis nos vitā dedisse existimemus, quibus nostris temerariis auxiliis non

ademerimus. Illud enim dolendum ac miserendum ita sæpe contingere vsu auxiliorum nostrorum, vt cùm frustrà pollicemur exturbationem calculi vsu calidiorum medicamentorum, arenulas multas excernentes, hac inutili fortuitaque excretionē ægros recreantes, contumaciorem multò calculum reddamus. Carè enim emitur tantula hæc excretio, quam natura per semoliri possit. Multa porrò remediorum exempla statuemus, quibus non est temerè in quibusvis vtendum: sed ad eas regulas & canones sunt reuocanda, quos longâ orationis serie sumus commentati.

Cùm dolores vrgent, valet id quod sequitur.

℞ succi amygdalar. dulcium sine igne extracti ℥ ij. emulsionis semin. 4. frigidorum maior. cum aqua & vino albo extract. ℥ ij. s. fiat potus.

℞. Syrup. de raph. de 5. radicib. & capill. ven. an. ℥ j. pulu. triasant. simpl. ʒ j. pulu. lumbric. preparator. ʒ s. cum triplo decoctionis radic. aper. fiat potus.

℞. semin. milij solis, bipin. bardanae an. ʒ s. lapid. iudaici ʒ j. nucleorum mespil. herba Iudaica, spina burg. an. ʒ ij. cinn. ʒ s. sacchar. ros ʒ j. fiat puluis.

℞. vini mal. ʒ iiij. olei nucum ʒ ij. confect. de baccis ʒ j. cum decoct. remoll. fiat clyster.

℞. rad. bard. asparag. gram. cypp. an. ʒ s. beton. bismal. tetius, an. m. s. sem. milij solis, aspar. melon. cucum. an. ʒ j. s. passul. ʒ j. ficus num. 6. fiat decoct. ad quart. tria. In colat. dissol. syrup. de raphan. oxymel. scyl. an. ʒ j. sacchar. ʒ iiij. fiat syrup. in modum apozem. aromatiz. ʒ j. s. cinn.

℞. rad. gramin. & petros. siccatarum & pulueris. an ʒ y. nucleor. mespil. ʒ ij. sem. melon. cucum. an. ʒ j. s. sem. mal. bard. & milij solis an. ʒ j. sacchari candi ʒ ij. liquir. ʒ ij. florum beton. ʒ ij. fiat puluis. Capiat ʒ ij. post vsum castia.

℞. aq. destillationis terebint. ʒ y. vtatur cum aqu. bipin.

℞. rad. cypp. gram. an. ʒ s. summit. alib. vritic. herniar. beton. an. m. s. sem. melon. cucum. an. ʒ y. sem. milij solis ʒ j. gran. alkek. ʒ j. fiat decoct. in qua dissol. syrup. de alth. & capil. ven. an. ʒ j. s. fiat apozema.

℞. ol. de sem. lini & lilior. & amygdal. dul. an. lib. ij. decoct. sem. lini, alib. melilot. florum viol. siymb. aquat. qu. suff. pro semicupio.

℞. medull. cass. ʒ ij. axungia cunicul. ol. amygd. dul. & de scorpion. cum medul. panis dissolute in lacte. fiat catapl.

In summo dolore inferioris partis spinæ & lumbarū in colica nephritica.

℞ palea hord. ros. rubr. an. ꝑij. tapfi barb. ꝑ. j. fiat decoct. in lacte. In colatur. dissol. vitellos ouorum.

℞. malu. bism. l. flor. chamem. meliloti sifymb. aquatic. foliorum raphan. petros. macedo. an. m. j. rad. lilior. alth. gram. petros. an. ℞ ij. sem. lini, fœnugr. alth. raphan. an. ℞ s. fiat decoct. passetur. In passatura adde axung. cunicul. anat. an. ℞ j. s. olei scorp. qu. suff. fiat catap. pro pube & renibus.

℞. aqu. destill. terebinth. & parietar. an. ℞ j. s. sacch. candi ℞ j. Cap.

℞. mith. ℞ s. conser. buglos. & capill. ven. an. ℞ j. Capiat bolum.

℞ conser. capill. ven. ℞ j. electuar. lishont. diatrag. an. ℞ j. Capiat parum vini vna.

℞ rad. petro. aspar. fœnic. gram. rub. tinctor. an. ℞ j. polypod. ℞ ij. sem. melon. cucum. bard. basiliconis, saxifrag. milij solis, alkek. an. ℞ ij. conseru. capill. ven. cichorij, ceterach, buglos. an. ℞ ij. puluer. diamarg. diatrag. ras. ebor. cornu cerui, an. ℞ j. aque decoct. duarum perdicum, & caponam duorum, cum mica panis quant. suff. Fiat destillat.

Citria incisa duo aut tria misceri possunt.

℞ succi corticum, raphani ℞ j. s. succi limonum ℞ s. syrup. de althea ℞ j. vini albi ℞ ij. terebinth. vsta & pulueris. ℞ ij. fiat potus.

℞ rad. rub. maior. gramina. acetosa, aspar. raph. petros. fœnic. macerat. in aceto, an. ℞ s. beton. adianth. ceterach, saxifrag. argent. an. m. j. summitatum vrtic. agrest ꝑ. j. cicer. rub. milij solis, an. ℞ s. alkek. gr. 15. semin. raph. vrt. mal. an. ℞ ij. fragorum marorum rubi. ideii, an. ℞ ij. succi cerasorum ℞ ij. Fiat decoct. In colatura dissol. sacchari albi lib. j. s. fiat syrupus.

℞ ol. sem. lini lib. j. terebinth. ℞ j. s. mellis ros. sacchar. rubr. an. ℞ j. Fiat clyster.

℞ parietar. beton. fœnic. alth. gallit. alx. an. m. j. rad. cyp. petros. macedon. bard. flor. genis. an. ℞ j. s. milij solis, rad. althea, glyc. an. ℞ j. fiat decoct. ad lib. j. In colat. dissol. syrup. de bism. de raphan. & oxymel. simplic. & scyllit. an. ℞ j. s. Fiat apozema. Itē catapl. ex pariet. berul. petros. maced. caulibus malu. bism. semin. lini, fœnugr. rad. lilior. floribus mel. chamem. contusis, additâ axung. gall. porci, cum ol. amygdal. dul.

℞ corall. vtriusque, cinam. margar. elect. cornu cerui, an. gr. ij. syrup. de limon. oxyf. simpl. an. ℞ s. aqu. buglos. & card. ℞ ij. fiat pot.

℞ syrup. de raph. & alth. an. ℞ j. aqua acetos. & chamem. an. ℞ i. s. fiat dosis.

℞ Enul. camp. mund. ℞ iiij. coque in duabus libr. vini albi, donec ad ℞ xij. redeat. Capiat quotidie unc. duas pro dosi, cum ℞ s. syrup. de raph.

℞ confer. rosar. symphy. an. ℥ s. margar. elect. cinam. cornu cerui, coral. rub. an. gr. iij. trochisc. alkek. ℥ s. cum sacch. ros. fiant tabellæ.

℞ alib. tot. foliorum acetos. an. m. j. sem. melon. genist. gallit. asp. an. ℥ ij. sem. milij ℥ j. s. rad. lapat. acut. cichor. an. ℥ s. pulp. tamarind. ℥ B. hordeip. j. florum genist. p. ij. fiat decoct. ad ℔ 5. In colat. infunde cass. non mundata ℥ ij. s. bulliant parum. In express. colat. per setaccum dissol. syrup. de alib. bys. & oxymel. scyll. an. ℥ vj. sacchar. cand. ℥ ij. fiat apoz. clarif. aromatis. ℥ ij. cinam. pro duabus dosib.

Litus ex mucagimibus & adipibus predictis in magna quantitate valet. Et quia imbecillior redditur ventriculus, sub horam somni valet syrup. de absynth. cum aqu. card. & scabiosa, iteratus sæpe.

℞ succi granat. succi lymon. & vini albi an. ℥ s. ambr. gris. gr. vj. fiat potus. Item bolus cum theriaca & mithridat. & syrupo de papauere.

℞ terebinth. ℥ ij. zedoar. pulu. ℥ j. cum diatrag. frig. fiat bolus.

℞ mal. vtriusque, pariet. florum genist. an. m. ij. nasturt. capill. ven. m. s. calamenth. an. p. j. cicer. rubr. ℥ s. fiat decoct. ad ℔. s. In col. dissol. syrup. de althea & de 5 radicib. an. ℥ j. s. milij solis puluer. ℥ i. s. fiat iulep. capiat in exitu baln.

Limatura ligni sancti non est aliena ab usu in lapide, presertim ad tenuandam crassam materiam quæ eum committit. Ideo olim hic syrupus commode prescriptus est. ℞ limatura ligni sancti quart. j. corticis eiusdem ℥ j. macerentur per horas duodecim in aqua fluuiialis lib. iij. deinde adde polyp. ℥ ij. rad. enul. camp. sicca & contrusa ℥ s. fiat decoct. ad medietatis consumptionem. In colatura depurata infunde folior. senæ ℥ iij. fructus alkekengi in vino albo per noctem temperatos num. 20. turbith ℥ s. bulliant. seruentur ad usum.

℞ sem. saxifrag. glyc. an. vnc. s. sem. carui, genist. petros. macedon. daucibrus. aspar. leuist. anisi. iunip. ruta, sesel. siler. mont. acor. baccar. laur. an. ℥ ij. azar. carpobal. cass. lig. granorum hederæ, sanguinis hirci prepar. xylaloes an. ℥ j. s. lapid. lyncis ℥ ij. zinzib. turbith. an. ℥ ij. folio. senæ ℥ j. Fiat puluis, de quo fiet electuarium per tabellas pondere vnc. s.

℞ rad. intyb. oxal. gram. aspar. brus. polypod. sem. carth. vuarum damasc. an. ℥ j. bipinel. adiant. trichom. lupul. aspar. mal. pariet. an. m. j. agrimon. beton. holerianæ, borag. buglos. an. m. j. fructus halicac. nu. 12. semin. 4. frigid. maior. apj, saxifrag. petro. milij solis, althea, an. ℥ ij. florum Spart. violarum, anthos. an. p. s. florum chamem. p. j. Elixentur omnia artis ordine. In colat. ad lib. j. dissol. syrup. de radicibus de alib. & raphan. an. vnc. j. Fiat apozema in 4 doses: adde my-

℞ rad. alibca, acetosa, petro. an. ℥ j. s. corticis burg. spine ramuscu-
 lorum eiusdem, limatura ligni sancti an. ℥ j. corr. rad. capp. ℥ ℞. anisi,
 fœniculi, luhosper. hypericonis, sem. cucum. cuscute, citry, an. ℥ iij. solior.
 alib. m. 4. beton. violar. malu. viriusque, adianti albi, asplenij, cuscute,
 an. m. j. intyb. sativi, latifolij, seridis, eupatorij, an. m. s. passul. integr.
 zyzipho. num. x. fructus halicacabi num. xxx. florum beton. hyper. mal.
 alib. vel cichor. an. ℥ ij. fiat decoct. ad lib. duas. in colat. dissol. sacchari
 albi lib. j. s. syrup. de lymon. acetos. simpl. an. ℥ ij. fiat syrupus.

℞ rad. maratri petroselini an. ℥ j. s. glycyrr. ℥ s. pass. mund. cicer. rub.
 an. ℥ j. s. sem. anisi macedon. ameos, milij solis, an. ℥ iij. fiat decoct.
 in vini albi veterrimi, & aqua an. partibus equis, ad tertie partis con-
 sumptione: dulcoretur oxymelitus diuretici ℥ iij. Capiat singula matutinis.

ANNOTATIO.

1 Non omitti debet illud quod Gal. scripsit in comm. lib. 4 Aphorism.
 de grumo sanguinis, & capillamentis, præsertim quibus fuit esus faba-
 rum & orobi.

2 Non solum alimentorum varietas confert ad cruditatem, & proinde
 ad generationem calculi, sed etiam aquarum. Quod minus probabile vi-
 deretur; siquidem aqua nil corpulentum habent cuius occasione concretio
 fieri possit. Tamen eam aquarum varietatem conferre ad generationem
 calculorum, Hippocrates primus scripsit lib. de aere, locis & aquis, cum
 scribit eos calculo obnoxios fieri, qui aquas bibunt de magnis fluuiis, in
 quos deriuantur alij. Nam, inquit, aqua aqua similis esse non potest: ac
 necesse vnã præcellere præ aliã. Vnde concludit ex ea varietate magnum
 sequi incommodum. Et quod de aquis dicitur, idem de esculentis intelli-
 gi potest. Itaque magnus debet esse defectus aquarum & ad præcautio-
 nem, & ad curationem calculi.

3. Cum hoc scribat Galenus, miror quod in mentem venerit Gorrao Me-
 dicarum Definitionum auctori, ut interpretans τὸν ἕξον ἀδὴν τὴν αὐτὴν dixerit ali-
 letas ut robustiores euaderent, solitos assumere cibos quoslibet, nullo ordi-
 ne, nullã lege. Hæc enim pugnant iis quæ dicuntur à Galeno.

4 Attendere oportet ad locum qui scriptus legitur lib. de flatibus, apud
 Hippocratem, quo explicat quã ratione fiat ut ciborum inæqualitas sed-
 tionem & tumultum in ventriculo faciat.

5 Pus quod à renibus & superioribus manat partibus, & à vesica, in hoc
 distinguitur, quod pus à renibus manans totum, toti urinae confusum est

& reſtractum in partes ob viæ longitudinem. Quod à veſica, vt à loco propinquiore quodammodo eſt integrum & totum, & in ſe conglomeratum coactumque, quod Græcis dicitur ἀπὸν, ſiue ἀπὸν ἐκπικνόν. Ita Galenus in libris de locis affectis diſtinguebat deiectiones dyſentericas à ſuperioribus aut inferioribus inteſtinis, quæque ab his forent, pus contineant non admixtum: Contra iis ſeſe habentibus quas ſuperiora inteſtina excreuerunt. Hoc præterea abundè explicat Galenus comm. in Aphoriſ. 35. lib. 7. Quibus infidens pingue & ſimul totum, ἀπὸν Græcis, iis renum vitium acutum ſignificatur. Comparatur enim vrina colliquatina partium ſuperiorum, cum vrina colliquatina renum, & veſica, ſi ita lubet. Nam quando adeps cum vrina à partibus rene ſuperioribus excernitur, is paulatim nec ſimul totus excernitur; ſed cum à renibus eſt, quia breuiter ſit excretio, ſimul totus eſt. Et hoc eſt ſignum διαγνωſτικόν.

6 Galenus comm. in partic. 6. ſect. 1. lib. 6. Epidem. textum hunc probat, & conceptis verbis exponit eo modo calculos in renibus gigni poſſe, qui ab Hippocrate eſt præſcriptus. Quanquam probat magis ab arefacta pituita cogi ac concreſcere.

7. Aphrodiſæus vult & ſenes & pueros calculis magis obnoxios, problem. 41. ſect. 2. ſed hoc minùs verum eſt præſertim de ſenibus. Inter cetera occurrit locus in Coacis aduerſariis quo ſcribit Hippocrates à quadrageſimo anno ad 63. non fieri ſtrumas in ſenibus, nec lapidem in veſica, niſi priùs exiſtat. Vbi vititur verbo ἰνδῆ, quod fieri, generarique ſignificat. Ergo contra Ferneliũ, lapis ſit in veſica.

8. Si quis putet illud ἰνδῆ intelligi cū vrina è veſica excreta eſt, nimiv̄ reliquo excremento in veſica remanēte tanquam lapidis materia, illud probabilitatem habet. Sed magnã habet difficultatē quomodo intelligatur illud ἰνδῆ. Si enim nomen ἰνδῆ ſumatur pro actu meiendi, in utroque loco, videtur hic ſenſus minùs quadrare. Nam dicere ante miētũ fieri concretionem in viris (vt Galenus vult) id eſt ante actum meiendis hoc vt niſi veriſimile habet, ita nec dignum eſt ingenio Hippocratis: idē meliùs interpretari oportet vtrumque, vt hoc loco ſumus interpretati.

9. Quis enim dubitat quin quidam in renibus calorem habeant ex eñētu, quod carne ſint denſa, compactaque: Atque impedimentum diſſationis, caloris eſt augmentum. An tunc refrigerantium vſus tutus eſt.

10. Et Galenus 9. Method. cap. vlt. citra calorem non poteſt digeri in halitum corpus vllum manente ſubſtantiã compactã. Non tamen per calorem omne, ſed quod aptum eſt in halitum digeri, vt humidum.

11. Nam Galenus vltimo cap. lib. 9. Method. lapidum ſubſtantiã conſtans ſtabilisque propter ſiccitatem, & frigus eſt. Sic & materia ipſius fri-

224 CONSILIORVM MEDICINALIVM
giditas, & aliquantula vesica frigiditas non potest non conferre ad generationem lapidis. Sed de renibus potest dubitari. Nam in calidissimis coguntur lapides tantum, ut omnes volunt.

12. Non est equum ut aliquis videatur doctior aggredi clariores & doctiores sine causa, vel ut detrahatur eorum laudi, vel ut ambitioni nostra satisfiat. Itaque si quando excusare nos velimus quod in Fernelium scribamus, accipiendum erit exordium libelli Gal. aduersus Iulianum, inter libros extraordinarios.

13. Hac in pagina docemus in multis corporis humani partibus calculos posse generari: quod tamen impugnat Galenus. Et mirum, tantum virum hoc non obseruasse. Ille cap. 5. lib. 1. loc. affect. disputans de iis affectibus qui his aut illis suis partibus contingunt, ait suffusionem solis oculis contingere, & lapidem solis renibus & vesica: quamquam ex quorundam opinione dicit in colo nonnullis lapidem repertum esse.

14. Quidam appositè & contra sententiam Fernelij dicunt colorem arenularum & lapidis non indicare locum in quo generatur lapis, sed potius materiam ex qua. Fieri enim potest ut in vesica rubens materia cogatur.

14. Contra Gal. cap. 5. lib. 1. de locis affect. utraque vlcera signum dat, ita & sabulosa urina lapidis sunt argumentum.

15. Dicimus in vesica fieri lapidem, in renibus calculum & arenulas. Lapis, quia quod est durius & grandius, locum tenet medium inter arenulas & calculum. Nam materia lapidis durior est quam arenularum & calculi.

16. Mirum cur hic dicat Galenus vterum non attrahere. Nam Hippocrates lib. de vet. med. ait vesicam, caput & vterum semper attrahere, & plena esse humiditatis.

17. Disputationem de diureticis, mensis mouentibus, & lac generantibus, Manardus prosequitur epist. 5. lib. 11. Epistolarum.

CONSILIVM XXXIII.

De Epilepsia.

AD MIRABILES naturæ conatus sunt in morbis profligandis. Nec enim solum depulsa longè materia natura solatium quærit, sed sepe excusâ in partem ipsam affectam materiâ. Quod ne cui mirum videatur, huc celebris historia Equitis

Torquati pertinebit. Hic cum crudelissimis Epilepsiae insultibus saepe decuteretur, suppetias nulla ex parte nactus est. Ac quod sua prudentia & consilio ars medica non consequitur, id instinctu solo bruto natura aptissime contigit. Nam cum furibundum reddidit, furendi tandem & breui tempore finis fuit. Ab eo tempore epilepsiae molestias non sensit. Et illud est quod scriptis celebrauit Hippocrates, *Epileptici sunt melancholici, & conitâ*. Sed illud maiore admiratione dignum videtur, quod ab Hippocrate scriptum est, *A furore difficultas intestinorum, vel aqua intercus, vel mentis alienatio, bonum*. Quomodo fieri possit ut mentis alienatio furori succedens, bonum sit, & furendi finem faciat? Nam alienatio mentis furoris videtur, & revera est incrementum, ut etiam asseuerat Galenus. Item mentis alienatio, continuus definitur & vehemens furor: Ergo tantum abest ut bonum signum existat, ut contra, pessime agrum furem afficiat. Mentis alienatio ^{in se} Græci vocant, fit confertim lato humore bilioso per omnes partes cerebri. Et cum aliqua ex parte affectum esset cerebrum, unde furor simplex adesset, conatu ipsius naturae, orgasmo ipsius materiae ^{auti & mater} succedit ^{in se}, quod quodammodo criticum est. Nam si natura valida est, si cerebritemperies bona, & quae ab impetu pessimi illius humoris tantum sit alterata, non autem alienata; futurum est ut breui tempore sequatur solutio furoris. Ita nimirum in morbis acutis (ait Galenus) terrificis symptomata ac vehementissima subito oborta crises salutes inuehunt. Saepè enim id quod imperita stoliditati terrori est bona spe nos consolatur. Hoc notatum volumus, quod Commentarius Galeni ea de re scriptus admodum obscurus sit, & mancus.

ANNO TATIO.

1. *Simile quid in Coacis. In furiosis conuulsio accedens solutionem facit.*

2. *Mirum quomodo aqua intercus furori succedat. Nam materia furorem faciens pauca est & biliosa, quomodo hydropem accersit? Notatu dignum hoc est. Quia modum & nos epilepticum piscatorem factum obseruauimus, qui esset hydropicus, à translatione materiae ad caput. Nec interit tamen; quamquam dicat Galeni praeceptor Hippocrates, Ab hydropicis epileptici, perniciosum, in Coacis. Tamen in libro de locis, in homi-*

126 CONSILIORVM MEDICINALIVM
ne apud Hippocratem legimus à cerebro hydropis generationem aliquãda
pendere, quod sit materia quaedam in cerebro contenta, in eo quaedam ex-
citans symptomata, in partes inferas feratur, potest in his aut hydropem,
aut quid simile accersere. Non quod inde hydrops propriè dictus consequa-
tur, sed species hydropis, aut tympanites, materiã nimirum existente su-
rribunda & flatuosa. Quidam vt istum aphorismum excusent, dicunt non
legi videri, sed id eor. id est sudor. Et Hippocratis locus est præclarus scilicet.
5. lib. 2. Epid. ubi annotat quomodo epilepsiam mania soluit.

CONSILIVM XXXIV.

De Alui fluore.

IN morbis multa contingunt, quorum obscura ac implicita
est ad eò cognitio, vt acutissimorum Medicorum aciem elu-
dat. Quod non modo in acutis vsuuenit, in quibus exiguis in-
teruallis magnæ mutationes incidunt, sed & in longis, immò in
longis tantæ sæpe occurrunt difficultates & latebræ, vt licet eo-
rum, autoritate Galeni, causa sit fixa stabilisque, sub obtutum
tamen oculorum non cadant, nec mente comprehendantur. In
eiusmodi autem, meo quidem iudicio, plus natura quàm ars
potest; vt non sit mirum si olim Chirurgiam licet artem mecha-
nicam, præclaræ arti Medicæ prætulissent, immò hanc præ illâ
nihili duxerint. Quinetiam Chirurgiæ euidentem profectum
esse volunt, quod ea quæ manu administrantur sese offerant ac
promittant. In medendi arte, quæ ratione & agitatione assiduâ
mentis nititur, fortunam dominari contenderunt, quod in lon-
gis morbis si quid voto respondeat, id naturæ, quæ temporis fle-
xu cursuque morbi victrix est, attribuendum sit. Nam quod ars
vno veluti impetu agit, id natura cunctando ac tardando scilicet
successu consequitur. Tamen vt arti nimis multum attribuere,
cùm in multis manca sit, ac deficiat, vitio non caret: ita tantum
ei detrudere vt nil possit ipsa per se, errore non vacat. Atque
vt quæ paulò antè dicuntur generalius, in angustum cogantur,
exemplis appositis magis elucebunt. Eorum autem explicatio
ac enodatio magnum ad bene medendum adiumentum affer-
ret. Ita enim & morbi longitudinem artificiosè prædicemus, &
non frustra medicamentis ægros exercebimus, cùm materiæ

mitificatio expectanda fit. Miratus sum saepe ægros conqueri de dolore ad orificium stomachi, cuius doloris circumscriptio brevis admodum est, nec explet latitudinem duorum digitorum. Purgationibus non iuuantur multum: vomituriunt: pulsus habent languidum: corpus pigrum ac iners: noctes insomnes ducunt. Ventre plurimum sunt astricto, in modo præ dolore superior pars hiat: inferior astringitur. Superioribus paginis annotatum est de quodam, cui dolor fixus erat ad regionem stomachi, quem nullâ ferè arte sedare ac compescere potis fuit. Plura illò loci sunt legenda. Non ita pridem Piscator post ærunas aliquot & labores incidit in febrem ferè typi expertem. Sæpeleipothymiâ prehendebatur. Quadraginta penè dies laborauit: summa virium ruina: partium extimarum refrigeratio. Hinc alius subducta est excrementis modò liquidis, modò chylois, & mucaginosis. Incredibile dictu. Tribus aut quatuor diebus tres & quinq; pelues satis capaces implebat. Non alleuabatur. Perpetuò alius, siue ventriculus ei laborabat. Profluuiû hoc aluinum nobis videbatur veluti leientericum à mucaginosis humoribus, corrupto chylo, ac fortè totum corpus exonerabatur modò roborato ventriculo, modò rhabarbari vsu alleuabatur. Et cum cogeretur ad prima munia, redire ob egestatem, agebat quidem sine decumbendi necessitate: tamen & pallor, & sitis, & partium imbecillitas remanebat, immò & deiecta appetentia. Quæ omnia morbi relapsum ob reliquias designant. Percipiebatur dolor ad eam stomachi regionem quam prædiximus. Tandem prouocato vomitu, & aliàs sponte naturæ excitato, excreta sunt biliosa, viridia, glutinosa admodum, & quæ in longum ducerentur facilè. Sic alleuatus est. Vbi locorum tanta materiæ copia contineretur? an in ventriculo? fieri non potuit: sed in partibus vicinis ventriculo, à quibus tandem à natura victus, cum alioqui coërceretur in angustiis, ad eam capacitatem raptus est humor; hinc doloris sedatio aliqua cõtigit.

Robertus Sangermanus Regi à secretis, dolore intolerabili cruciabatur: colicam falso putabant. Erat conclusa materia eo modo quo in superioribus æruginosa, acris, præsertim ærunas & mastitiâ secuta: dolores repetebant ex interuallis: nõ eos ferendo. Medici rati colicos esse dolores, calidissimis illû frustra exercebât: & quoniâ vomebat perpetuò, styptica foris admouebant. Alij postea mitiùs egerunt, & materiam illam efferam

sibi aliquam cystin machinatum fuisse crediderunt: ita blandis ac temperatis vtentes medicamentis, educta vomitione est bilis vitellina, putris. Alleuatus est, & sanitati restitutus. Eum morbum rarissimè in homines inuadere dicebant. Tamen Fernelius tale aliquid sub finem februm & morborum typicorum contingere asseuerat. Item vidua in claustro Ecclesie Parisiensis commorans, mater D. Ellenij clarissimi collegæ, cum agrè coniugis sui vicem doleret, præ mœrore in morbum incidit qui clarissimis Medicis admirationem excitauit. Expers erat febris: Ex interuallis sentiebat aliquam auram venenatam ab infimis partibus tiliarum: deinde stuporem: tum dolores ad ventrem superiorem à ventriculi regione ferè ad vmbilicum paulùm ad lienem declinando: tunc sine voce & respiratione decumbebat: cum sudoribus, defectione pulsus, palpitatione. Duodecim horas paroxysmus perseuerabat. ³ Morbus hic animum & plus eo afflixit. A paroxysmo erat satis alacris, sapor & gustus toto morbo aderat quasi æruginè & æs degustaret (quod notandum). Difficilis admodum fuit inuestigatio illius morbi. Quidam ex Medicis affectionem hysterica putabant: alij relictum esse aliquid ex purgamentis ab aliquo partu. Alij contorsionem vteri esse. Consultæ obstetrices. Tentata & explorata res est: nihil omninò alienum in illis partibus inuentum est. Tamen quotidie per metrenchyten iniecta sunt vterina. Per os, aqua vitæ aromatizata cinamomo. Nil profectum est. Ex Medicis oculatior fuit vnus, qui primam mali originem ab vtero non repetebat: sed aut dicebat suspicionem melancholice hypochondriacæ, aut conclusam putrem, malignam & venenatam materiam in hypochondriis & partibus vicinis ventriculo, quæ non ita citò, sed tempore vomitione excludenda foret. Nec aliter contigit. Nam cum diurnitatis morbi omnes pertæderet, consultum tandem est, vt recreatis paulùm viribus manè iniiceretur clyster acris: tribus post horis, cassia daretur. Natura irritata, sursum deorsum excreuit. Sursum quidem æruginosam, pallidam, ac varij coloris bilem, & mixtos alios humores adeò insigniter corruptos & foetentes, vt nemo odorem ferret; immò locus totus inquinatus est. Ab eo tempore alleuata. Tamen perseuerauit alui fluor continuis decem diebus. Ac plerosque alios pari modo affectos vidimus, præsertim de orificio ventriculi conquerentes. An ybi dolor, ibi morbus? Nequaquam

aliter in pituitosis: Cum enim morbus ex crudis est humoribus, hypostasis multa est: si ex biliosis aut nulla est omnino, aut omnino minima, sed sufficit enæorema (vt dictum est) corpulentum & candidum: hoc si sufficiat, cur quotidie in acutis hypostasin expectamus? In acuti morbi paroxysmo pulsus insignis mutatio, vrina tenuis apparet: eodem desinente, pulsus remissior fit, vrina coloratior, nonnihil in medio suspensum habens, nunquid id naturæ declarat victoriam? Ac iam diximus aliud esse *ώμας*, aliud *ἀπεισιν*. Crudus humor ad hypostaseon multitudinē facit. Incoctus non ita sæpè, sed sola sæpè numero repressione & contemperatone naturæ gratiam recipiens, per quandam occultam viam excluditur. Exemplo erunt erysipelata, & phlegmonæ, illa non quantitate, sed qualitate humoris sese produnt: hæ quantitate potius. Et quæ *αἰαλόγια* inter vtraque, eadem inter biliosos & pituitosos morbos: in biliosis enæoremata iudicandò aut indicandò satis sunt. In pituitosis hypostasis necessaria est. Porrò est vbi enæoremata signa sunt incipientis coctionis, est vbi signa sunt perfectæ. Nam & enæorema & nebula quarto aut septimo die apparens, futuram hypostasin vndecimo aut decimo quarto docet. Contra in sanis dum coquitur alimentum, & aliquid coctionem fugit, hypostasis multa est: cum absoluta coctio, aut nebula tantum est, aut enæorema. Et in morbis cum diu hypostasis multa apparuit, quò propius ad sanitatem acceditur, eo minus aliquid subsideat, & aut enæorematis, aut nebulæ occasio est. Sic idem est signum incipientis & perfectæ coctionis, sed diuerso tempore. Accedit quod in sanis hyeme plurimum est sedimenti laudabilis, æstate minus. Et quod de sanis dicitur, idem de ægris dici potest. Æstiu morbi enæoremate contenti sunt, hyemales multam hypostasin habent. Rei huius causa cognita, ad id quod querimus plurimum facit. Vnde commentum est credere hypostaseos materiam partem esse alimenti præsertim in febribus. Initio febrium pulsus retrahitur.

Com. ad
part. 26 lib.
1. prognos.

vrinæ tenues sine enæoremate & nebula; in vigore
 æstus, pulsus vt in abscessibus, omnia acerbiora. Sub fi-
 nem paroxysmi vrinæ tinctæ, crassæ cum enæorema-
 te aut hypostasi: febris soluitur. Annon id de materia
 morbi? A mesenterio vapor aut quid tetrum surgit, cu-
 ius viti signum est in vrina. Cum materia pestilens,
 nil horum paret: An symptomaton cessatio fiet, quia
 cibus benè coquitur, cuius pars hypostasin facit? non:
 sed quia materia mala domita est, & pus velut facta.
 Sic hypostasis analogæ est puri: In febribus est velut
 venarum abscessus: In longo morbo materiæ ratio po-
 tius habetur, ni fortè ad diathesin recurras, in acutis
 qualitatis potiùs, & falli potest in bilioso humore iudi-
 cando. Sæpè excernitur humor colore biliosus, qui
 consistens est pituitosus & *μυζώδης* & facere potest
 hypostasin. Per alterationem aut calor imminuitur,
 aut elanguescit: & crassa materia hypostasin facit cum
 cocta est & mitificata. Et in biliosis morbis spectatur
 turgens materia, aut aliqua res es & ignaua. Illa cau-
 sa crit coniuncta, hæc antecedens: Illa per venas & ar-
 terias fertur, aut vasis continetur, aut egreditur, vt in
 phrenitide, hæc in mesenterio manet, à quo vapor ma-
 nat in has aut illas partes sequens: si partem illam te-
 nuïorem spectas, sufficit enæorema, & si vrina in co-
 lore & consistens sit laudabilis salutem promittit, imo
 solus sudor aliàs sufficit. At crassior pars materiæ vel
 in mesenterio stabulans, aut morbum protrahens, aut
 nouum accersens, aliam crisin, & aliud in vrina requi-
 rit, antequam perfectæ curationis spes assit: hinc die
 indice ægri magnis symptomatis liberantur represso
 humore morbifico & impetu sedato, & tamen nõ sunt
 planè restituti: & aut lenta febre laborant, aut ta-
 bent, aut ex acuta in aliam labuntur *ἢ τὴν μετὰ τὴν*,
 aut in hæmitritæon qui morbis longis succedit: Et in
 his non nebula sufficit, sed hypostasis necessaria est. Ex
 his alij abscessus magnos, alij profluvia ventris aut vri-
 næ patiuntur. Quæ omnia sunt symptomata, ni ap-
 pareant coctionis argumenta. Cum vapor excitatur pu-

tris febrem inducit, hoc excussio paroxysmus finitur. Quod remanet, si putre & crudum est, morbum etiam fouet, donec aut reprimatur putredo, aut humor coquatur, qui totus excludi debet. Si *ευήθης* est, gratiam naturæ recipit. Si *κακίθης* non solum mitificari debet, sed & excludi, alioqui molestias infert. Cleonactides acutè initio febricit, febris remittit, & ad sexaginta dies durauit ob duplicem materiam in mesenterio fortè stabulantem, quod longorum morborum penu & sentina est omnium iudicio. Fernelius huius rei inuentionem sibi arrogat. quasi verò veteres ignorarint mesenterium esse fontem melancholiæ hypochondricæ, diarrhœarum, & infinitorum aliorum morborum, & huic semper satisque consuluerunt. Imò nil est tam vulgatum, quam quod vulgo fit. Vt perpetuo in expurgando mesenterio laboretur. Ac credo omnes penè febres (symptomaticas quasdam excludo) causam habere in mesenterio inclusam. Vt ad rem redeamus, materia illa quidem & serum quod per venas sparsum organum facit, non facile quidem in pus aut aliquid simile puri conuertitur, sed reliqua materia crassiuscula quæ residet & restagnat, & quæ cocta subit venas, & proinde renes, & contentum vrinæ fit, potest. Quid si obiiciamus Fernelio pleuritides sæpè suppurato curari? At maxima veterum pleuritidum pars à bile est. Declarat tertianus paroxysmus: Est enim & pleuritidi & phrenitidi proprium vt tertio die potius suas habeant exacerbationes. Præterea & constitutio partis suscipientis id satis indicat: Cum enim dura ac membranosa sit, non facile admittit crassos humores, tenues, cuiusmodi est bilis, facillimè: quæ omnia aperte demonstrat Galenus, & authore Hippocrate à pleuritide ad causam facilis fit transitus. Id facit humoris maxima analogia: huc accedit, quod apud veteres & peripneumonia, & pleuritis absolute significabatur nomine *ϕ* *χολῆς*: & *η* *χολῆ* pleuritid *κατ* *ε* *ζ* *ο* *χ* *η* significat, non tam sæpè peripneumoniam. Hæc si quidem à pituita potius est putrescente, cuius tenuior

Com. ad A-
pho. 12. l. 1.
Aphoris.

Com. ad A-
pho. 33. lib. 6

Lib. de locis
in hom.

pars accensa ætus summi & febris causa est. Accedit, & quod cum pulmo bilioso sanguine nutriatur, parsque dicatur temperie biliosa, eius excrementum aliquid habens cum parte, cuius est excrementum, *συσπνυξ*, ad naturam biliosam accedat. Præterea quid dicat Fernelius, si ei obiciamus eruptionem parotidon, quæ tamen criticè in morbis maximè biliosis apparent? Et quod mala sit crisis, id non fit quod non fit aliquid de materia morbifica, sed quod locus non sit capax, & quod tota non excludatur. Accedit & principatus loci cui finitima est parotis. Galenus autem eò vituperat parotides quod abscessus ad partes inferiores non fiat. De parotidibus longa & perplexa esset disputatio, tamen obiter vnum quærendum, cuius nimirum humoris naturam retineant, an calidi, an frigidi. Si humor frigidus est, & ægrè suppurabilis, vt passim euenit (licet caloris sensus adsit) cur in morbis acutis sæpiùs eueniunt, quod experientia obseruatur? Si calidus, cur tam difficulter ad suppuratum ducuntur, & in iis maximè febribus continuis obtingunt, in quibus affectio quædam est veteriosa, vt Hipp. scripta testantur? Quanquam alio loco asserit in fastidiosis quibusdam vigiliis parotides excitari. Sed hoc omnino verum non est nisi alia concurrerint. Reuera vt difficultatis nodus soluatur ita res breui explicanda. Parotides & à calido humore esse videntur, & in calidis morbis, & naturis calidis. De naturis calidis ita ex Hippocrate apparet. Cum esset austrina tempestas, in qua humor subfrigidus foret authore Gal. oboriebantur parotides non omnibus, sed iunioribus & athleticis. Humor è genere eorum erat, qui mediam naturam retinentes æquè proni sunt ad motum deorsum atque ad ascensum, ideo sola ætas calida & vitæ institutum humores incitans & calefaciens hunc motum adiuit. Et passim alibi apparet abscessus ad caput fieri in calidis naturis, & vbi humores fuerint calidi & subtiles contra eueniunt abscessus deorsum, si materia fuerit frigidior & calor non multus. Contra tamen quis obiciat

*Com. ad
par. 68.
sect. 3. lib. 1.
prorrh.*

*Part. 66.
sect. 3. li. 1.
prorrh.*

*Part. 64.
sect. 3. lib. 1.
prorrh.*

crisin per excretionem fieri in morbis acutis per ab-
cessum in diuturnis & frigidioribus, at parôtis absces-
sus est, vnde Galen. abscessuum omnium commune
est, quod diutius ægrotanti superueniunt: Deinde si
materia deses fuerit & deorsum vergat, ad pedes fiunt,
si calidas & sursum repat, vel ceruicis capitique graui-
tates fuerint, & dolores & faciei rubor, ad caput ten-
dit abscessus. Quicquid sit videtur parotidis non nisi lon-
giore iam facto modo erumpere. Hinc Gal. rationi cõ-
uenit, vt ægro cunctante ex conuulsis & comatosis,
vbi protraxerint, parotides oboriantur. Tandem alio
loco concludit, siccis ad caput recurrentes calidi qui-
dem & tenues desipientiam & hæmorrhag. excitant,
crassi autem & frigidi comata & parotides. Et in Epid.
suppurationes ex aliis occasionibus fiunt, vt quæ in fe-
bribus obueniunt, in quibus humores sunt acerua-
multi, crassi, crudi, qui ob vehementiam & acuita-
tem & copiam febrilis caloris caput petunt: Dein-
de hoc in aurium adenas natura deponit, vnde paroti-
des oboriuntur. Ac si dicat materiam sæpe esse crudum
succum & crassum qui superiora petit ob acuitatem,
vehementiam & copiam caloris febrilis ab eo veluti
attenuatum & contractum. Nam comata, & surditates
& parotides etsi aliquando a materia ipso in capite cõ-
tenta oriuntur, tamen non minus, immo magis cau-
sam agnoscunt materiam a thorace & ventre manan-
tem: & Com. ad Apho. 74. lib. 4. Quibus caliditas ma-
ior magis materiam subleuauit, vel hæmorrhagia, vel
parotidis inde sequitur. Est enim verisimile in febribus
& pulmonem, & caput, & alias partes quæ in se conge-
runt excrementa sese exonerare: hoc dum fit, si febris
non adest parotides & excrementa pulmonum, minus
mala sunt contra, si febris adest. Nam peiora reddit
omnia excrementa febris. Sed est alius locus vberior,
obscurior tamen ob dictionis Græcæ obscuritatem, &
lacunam quæ temporum iniuria cõtingit. Arguit autho-
rem libri prorrh. quod signa parotidon, ita confusè
pertractarit, nam & surditatem, & iactationes, fasti-

1a Com lib.
6. Epid.

Ad part. 64
sect 3 lib. 1.
prorrh.

Ad part. 69
sect 3 lib. 1.
prorrh.

Ad part. 75
eiusdem li-
br.

Ad part. 16.
sect 1 lib. 1.
Epid.

diacque in febribus eruptionis parotidon dant indicia, præsertim si carotica sit affectio. At Gal. contra hæc signa nempe surditatem iactationem summam, ceruicis & capitis grauitatem, & alia id genus non minus signa esse desipientiæ & phrenitidis, quàm parotidon esse contendit, sed hunc diorismum affert: In biliosis quidem humoribus idque ab initio morbi hæc desipientiæ signa erunt potius, in crudis crassisque humoribus morbo procedente, & magis vbi occupasse parotidon generatio apparuerit, ipsarum parotidon signa erunt. Hoc nempe vniuersale caput est in parotidibus, si non amplius lateat quod inuasit, ita vt æger impetum infectantium humorum caput petere sentiat. Locus meo iudicio malè tralatus est, & obscuritas summa est in dictione περιεσκηός, quambis hoc in loco vsurpauit. Nam cum dicit *καὶ μάλιστα ὅταν φαίνεται περιεσκηόα ἢ ἢ παροτίδων γένεσις*, ita vertit Interpres, vbi occupasse parotidon generatio apparuerit. Nos γένεσις περιεσκηόα dicimus: apparentia quædam signa tumorum pone aures. Et cum dicit Interpres, vniuersale caput in parotidibus est, si non amplius lateat quod inuasit. Lacuna est ita restituenda, *εἰ μὴ λαθάνῃ τὸ περιεσκηός*: malè vertitur, si non lateat quod inuasit, melius, si non latuerit, id quod aggreditur ac præoccupat, supple. locum pone aures, vt *τὸ περιεσκηός* ferè idem sit ac γένεσις περιεσκηόα, id est generatio parotidon sese representet ac sistat, vt & tumor aliquis & dolor oboriatur circa locum quem occupare solent parotides. Et malè etiam Interpres vertit aliam periodon, *ὡς κλίμαται τῆν ῥοστὴν τῶ ἐνοχλήσαντων χυμῶν εἰς τὸ περὶ τῶν κεφαλῶν τόπον ἐχει*: vt æger impetum humorum caput petere sentiat, melius vt potè cum æger impetum humorum infectantium habet ad locum qui circum caput est. Aliud est dicere *τῶν κεφαλῶν*, aliud *τῶν ἀδὲ τῶν κεφαλῶν τόπον*: hæc periodus monstrat vim πρὸ ἀδὲσκηόα, quod aggressionem & parisiuxta caput obfidionem significat, interpres malè prætermisit. Ac difficile est de parotidon materia statuere. Ac fortassis earum materia

Com. ad
part. 66.
sec. 3 lib. 1
prohib.

LIBER DE VRINARVM HYPOSTASI. 135

generatione calida est, & morbi biliosi vera materies, sed ob mutationem loci & naturam suscipientis loci refrigerescit, vel materia initio morbi calidior, progressu incrassatur, nec enim parotides aut abscessus apparent, nisi affecto progressoque morbo, vna tamen exceptio est. Nam in laboriosa febre ferè initio argumenta abscessus apparent, & illius febris proprium est, vt cito abscessus fiat. nec longius tempus expectetur, vt in aliis febribus Gal. vt redeam. Sudoris materia à calido loco est, & sæpè calida, statim frigida sentitur: dum bilis aut alius humor cum sanguine confunditur, & vi caloris partis mittentis, & incendio recipientis ad cerebrum fertur, ibi moram trahens cogitur ac congelatur. Dum in propinquas frigidas reiiicitur, refrigeratur magis & hinc suppurati difficultas, in continuis febrib. post vigilias quas acer calidusque humor committit, cataleptica & carotica contingunt, & alteratione cerebri, & vi opprimentis humoris & attracti, & elati, & in cerebro coacti & refrigerati: declarat curatio. Nam euacuationibus & alui profluuii morbi molestiis liberantur, nisi sola alteratio aut alienatio in causa sit. Ergo si biliosi morbi parotidas cient, non initio, non cum bilis feruet, sed promotio morbo, & cerebro malis exhalationibus repleto, vt bilis quodammodo temperetur, cur non idem humor materiam hypostasi suggeret, bilis enim ita *φλεγμα τούτοι*: errat qui id non credit. Pater quod aliàs natura solo putredinis repressu contenta est, aliàs requirit exclusionem materiei à calore cuius. Id indicant abscessus morbos soluentes, & copiosæ vrinæ ab abscessu liberantes: hinc Hippocrates abscessus qui non solunt ad primas crises, longitudinem morbi signant. Græcè *σπυγγήματα μη λύσιμα*, vox λύσιμα ab aliis actiue redditur, ab aliis passiuè vt dicant, abscessus qui non soluntur. At quis sensus est? melius actiue qui abscessus non solunt suppl. morbum protrahunt. Ni velis ex Hippocrate passiuè explicare, quibus ad aures abscessus non suppurantur, *ωπείων* *επαλασσομένων* fit relapsus, id est, nisi suo modo sol-

Com. ad
aph. 74. l. 4

Lib. de in-
dicat.

uantur & euanescant, sic λυομένην ἕξει ἀπαλλασσομένην
affine quid habent. Sed hæc aliàs.

Secundum argumentum est, febris materia in statu morbi non excernitur purulenta aut alba, sed flaua atque biliosa: Ergo si qua est hypostasis, non est pars materiæ quæ putruerat. materia antecedens febrium ardentium non est humor omnino biliosus, sed crudus mittens exhalationem febrem accendentem. Idem humor subiens venas potest exalbescere non exacta albedine quæ in alio humore requiritur: Nam sunt diuersæ hypostates: & licet alboris meminit Hippocrates non excludit flauitiem quandam pro natura humoris morbifici modo adsit læuor & æqualitas. In biliosa pleuritide sputa flaua sunt, cocta tamen & æqualia sunt. Et licet sputi crassamentum purulentum album sit, minima bilis affusione fit auruginosum. Bilioso profluuium morbi biliosi soluuntur, tamen non excluditur vrinarum crassarum & cœctarum commoditas, imo aliquando morbum soluunt. Et Hippocrates de Causis loquens, alios ab ichoribus repetit, alios à pituita salsa & putri vno modo non soluuntur morbi biliosi cum dispar sit materies: Et si vniusmodi foret materies, cur medicamenta cholag, & phlegmagoga simul damus? Ergo ἐπιπορεύς π̄ spectamus. Tenuior quidem pars bilis aut serum febrem accendit, & tunc hypostasin vix expectamus, quanquam potest & esse: si hæmorrhagiâ morbus biliosus soluitur, sudore, alui fluore, parotide, & vno eodemque tempore, cur ad hypostasin materiam non suggeret?

Tertia ratio hæc est cuius fundamentum iam conuellisse nos existimamus. Si materia in statu excidit non autem initio. ego crassior in statu foret, at hoc falsum: Nam initio confusa est vrina, in statu acutarum tenuior. Hæc ratione se conficere posse putat Fernelius hypostasin non esse partem materiæ morbum comitentis. Nam oporteret vrinas esse crassiores morbo tendente ad crisin: Contra initio morbi confusæ sunt & crassæ, attenuantur autem declinante morbo. Ea-

dem

Tria hoc loco iure quæri possunt, quorum enodatio plurimū afferet adiumenti & voluptatis. Primum, ecquid fuit, cur tam subito symptomata hæc funesta apparuerint, cum tamen nihil postea tale contigerit. Vnde hoc? Secundò, an cum febres periodicæ finiunt diebus suis criticis, & non apparet paroxysmus quartus, septimus, vndecimus, hoc sit tutum? Præterea, an quarta accessio, aut septima, aut alia similis, cui aliqua decernendi vis tributa est, breuior, mitiorque esse debeat quam aliæ intercalares? Tertiò, an sudores ita conferti, & frequentes in febribus intermittentibus longitudinem designant; illud in omni morbo terrificum esse debet, cum morbi initioprehendunt cum prauis symptomatis, declarant enim latens aliquod venenum. Nec enim credibile tam subitam esse causæ morbum efficientis generationem, vt est prompta & facilis ipsius morbi generatio & inuasio; quod sæpe experienciâ deprehenditur. Quoties enim comitati prauis symptomatis morbi inuadunt, ferocitque, de his vereri oportet. Et commemoratu dignus est locus qui legitur scriptus apud Galenum, comment. in historiã 4. section. 3. lib. 3 Epidemior. quo scribit Galenus interpretans cur quidam initio statim morbi phreneticus factus fuerit, & interierit tertio die. Scribit (inquam) *delituisse in illius agri corpore humorem lethali veneno similem, qui agens moram, & opportunitatem nactus statim funestum symptoma excitauit.* Esse itaque debet venenati humoris suspicio, quoties citra causam vllam manifestam cum tanta symptomaton sæuitia morbi quamprimùm inuadūt. Quod suspectum fuit in ista puella, cuius nunc historiam explicuimus. Conuulsio ista & terrificata symptomata, aut summam neruorum imbecillitatem declarabant, aut malignæ materiæ ferociam & translationem ad genus neruosum, aut vtrumque. Contulerat autem ad huius morbi generationem puellæ ingluuius, & subita ad noua edulia conuersio post ablaetationem. Vnde etiam muliercularum crebris sermonibus vsurpatur, necesse esse cuique puello ablaetato grauissimè laborare. Omnis enim ad contrarium victum conuersio, immò & mutatio omnis, licet non ad deteriora, suspecta esse debet.

De periodis febrium dicam vno verbo: In nonnullis obseruauit accessiones criticas (voco autem criticas, factâ comparatione cum acutis) vt quartam, septimam & ceteras eius generis euauisse planè, & tamen relapsi non sunt. Non quin restiterint

138 CONSILIORVM MEDICINALIVM
aliqua quæ ægrum non immunem planè redderent. Sed an hoc
tutum est? Reuerà tutum non videtur esse. Nam si ex sententia
Galeni in lib. de diebus decretoriis, analogia est & proportio
inter particulares accessiones morborum redeuntium typo, &
acutorum morborum criticos dies: cur si septimus dies in acu-
to morbo criticus nihil ostendens, immò sine excretionem eua-
nescens suspectus est, malè que fidam crisin facit, cur septima
periodus non apparens suspecta non est? Et tamen videmus ter-
tio paroxysmo finire tertianam, aliquando quinto paroxysmo.
Bifariam respondere possumus: In acuto morbo quò magis
tenditur ad septimum, aut vndecimum, eò magis ad crisin ten-
ditur, id est, subitam mutationem ad salutem, aut ad mortem.
Hæc autem subita mutatio, quia litem controuersiamque mor-
bi dirimere debet, non potest fieri citra euacuationem aliquam;
ideò si dies illè dispareret, infida crisis foret, quia crisis necessa-
ria est: At in morbis interuallū quietemque habentibus non ita
fit. Nō enim *επιτοια*, sed *λυσις* hinc spectatur. At lyseos ratio ea est, vt
non desideretur aliqua subita mutatio. Satis est si tempora ad-
sint, vt sit vigor, incrementum, & declinatio. In febre autem
tertiana (quæ etiam cum acutis morbis aliquid commune habet)
fieri potest vt quarta accessio sit valida, vigoris rationem obti-
nens: Sic septima periodus quæ in exquisitis tertianis vixdum
expectanda est, erit mitis, blanda, nihil molestiarum ægro affe-
rens: immò videmus eos sæpè quos periodicis febribus defun-
ctos vocamus, tum cum solita munia obeunt, iis diebus quos
suspectos habere deberent, non nihil prioris morbi persentisce-
re, cum tamen verè non febricitent. Altera ratio: Apud Hip-
pocratem, tertius, quintus, & nonus dies nonnullam iudicandi
vim habent: immò qui sudores illis diebus apparent, boni iudi-
cantur ab Hippocrate: cur non febris tertiana cum sudoribus
non desinet tertiâ accessione; quinta & nona, quod & sæpè ob-
seruatur? Tertium accedit, quod nimirum si verum est, vt iam
ante docuimus, & verum esse deprehendimus, tum cum à febre
nos immunem esse credimus, non nihil etiam sentire prioris mor-
bi, aliquando leniter perhorrescere, aliquando fiti vexari, de-
clarat hoc non necessarium esse morbos periodicos eodem sol-
ui modo, quo & soluantur critici & acuti morbi: id est, non est
necesse criticas periodos sæuiores grauiorè que aliis, præsertim
cum de vltima periodo quæ criseos videtur, nonnullam habere

rationem, intelligitur. Tamen in puella nostra obseruauimus septimam & vndecimam periodon non apparuisse, vnde recurrit postea. At in Domino Magno Sangermano tertiana febris tertiam periodo finiuit, cum tertia vehementissima fuisset. Abundè repurgatus fuerat: sudores conferti, & quamplurimi: immò primà accessione, illà etiã ineunte, ita corpus difflebat, vt planè videretur exolui. Vnde tertiã quæstio oboritur de sudoribus. An non tuti salubresque illi sudores, qui tantâ copiâ apparent ineunte morbo? An longitudinem portendant? an non aliquid aliud? Ea de re paulò pleniùs dicemus. Copia sudoris, ex sententia Hippocratis sect. 4 Aphorism. aut copiam alimenti, aut humorum superuacuorum expurgationem sui requirentiũ docet, aut morbi longitudinem. De tribus his aperiendum est. Cùm quis à somno multum sudat, vt non sit aliqua *ἑπίδρωσις ἀλλὰ ἰσθμὸς πρὸς τὴν ἐξέλιξιν τοῦ σώματος ἐπιγερόμενος*, siquidem *ἑπίδρωσις* sumitur pro particulari sudore, *ἢ τὰς πολλὰς*, declaratur assumpto multi alimenti nequeunte naturâ subigere ac domare tantum alimenti. Sin autem *ἰσθμὸς τὸ ὄνειρον*, (quod non significat finem somni, sed dum quis iam somno comprehensus est) aliquis sudat, *ἰσθμὸς τὴν πολλήν*, non præsumpto multo alimento, hoc purgationem significat. Sed Hippocrates aliam distinctionem affert; scribit enim; *sudor multus feбри superueniens, qui febrem non soluit, longitudinem morbi significat*; quasi dicat: Sudor plurimus per se longitudinem non declarat, vt plerique sine diorismo solent affirmare; sed si febrem, aut alium morbum in quem incidit non soluat. Atque ex hoc loco erui potest distinctio quæstionis quam hoc loco afferimus, *An sudor multus ineunte morbo tutus & salubris?* In plerisque morbis initio erumpunt sudores multi, qui longitudinem morbi non significant. Nam cum symptomaton alleuatio sequitur, non est dubium quin sudorum copia ad morbi breuitatem appareat. Etenim & meatuum libertatem designat, & materiæ præparationem, & vim naturæ maximam. Si autem non sequitur sedatio symptomaton, sed post sudores, si partium imbecillitas quædam & veluti perfractio quædam, sudores boni non sunt, sed imbecillitatem naturæ, & contumaciã materiæ significant. Expirat enim quod tenue est, remanet strigmentum quoddam, quod morbi parens est & author. Itaque quod peculiariter dicebat Hippocrates, scribens, *Sudor multus feбри superueniens, febrem non tollens, morbi*

140 CONSILIORVM MEDICINALIVM
longitudinem significat, id in omnibus intelligi potest. In omnibus enim morbis excretionis omnis ea debet esse ratio, & æstimatur, vt inde sequatur alleuatio aliqua, aut nulla. Si illo modo, bonum, hoc, malum est; immò verò plerique Medici secuti Hippocratem, qui ephidrosin vbique damnat, cùm partem tantùm sudare vident, hoc in bonis non ducunt. Errant autem plurimùm: nam si vbi morbus, ibi sudor, & vbi sudor, ibi morbus: cur in capite solo emanans sudor non erit dicendus in bonis? Et hoc experientiâ notum est, sæpe particularis sudor plurimùm confert. Quod autem Hippocrates in parte manentem sudorem damnet, illud debet intelligi, vbi generalis sudor esse debet, & in parte tantùm apparet, non est dubium quin malus sit. Sed si pars aliqua peculiariter laboret, quid obstat quominus circum partem illam sudor manet optimâ ratione apparens? Ceterùm videndum ne mador nos decipiat; nam in plerisque morbis mador apparet opinionem faciens veri sudoris, sed perperam. Itaque cùm de sudoribus pronuntiandum, temerè id non præstandum.

ANNOTATIO.

*Antè de sudoribus abundè diximus, ac nodum istum explicare enixi sumus, quò fiat vt quartanariis iam valdè siccis, squalidis, ac strigosis redditis tantis sudoribus corpus diffluat. Id quod M. Guillelmo Archicoco contigit. Primùm iis qui febre laborant quartanâ, vt iam febris hectica improprie dicta sit rudimentum aliquod, partes interna iam aruerunt, & ignem conceperunt: & more proprie dictorum hecticorum, cùm ab alimento humectantur incallescunt; quoniam caliditas arida ab humida substantia humectatur: sed rationem eandem forè adducere oportet tam copiosi sudoris quam in hectica Empyicorum febre attulit Galenus ad part. 60. lib. 2. Prognost. Copiosi sudores eliciuntur (ait) in empyicis ob virium debilitatem, eo quò diductum ac distributum alimentum discutitur. Leonicens scribit, eo quòd alimentum deticiatur. In Græco legitur *ἄταρραξις τοῦ σπυγίου*. Legatur iste commentarius Prognosticon.*

CONSILIVM XXXVII.

De Febre purpurata.

CVM paulò antè nobilis puellæ historia ob oculos poneretur, iniecta est mentio de horrifico symptomate quod illam in-
 cunte morbo non sine veneni suspicione inuasit. At in eare
 Galeni sententia explicata est. Narratum est quomodo vene-
 natae qualitatis suspicio esse debeat, cum sine vlla manifesta
 causa morbus adoritur symptomatis grauissimis comitatus. Nil
 enim tale contingit nisi aliquid subsit latens & deses quod viru-
 lentiam suam statim explicet. Quod non ita pridem in quodam
 apparuit manifestò. Cum paulò liberalius genio indulgeret in
 aulico comitatu, in morbum incidit. Valetudinarius degebat:
 lateris doloribus erat obnoxius. Paulùm recreatus Lutetiam
 venit: liberaliter fatis vixit, & consuetudinem cum vxore ha-
 buit. Circa mediam noctem febricitauit. Horâ diei octauâ ma-
 tutinâ febricabat admodum, facies intumebat: dolitabat hypo-
 chondrion sinistrum: oculi feroces. Circa meridiem abdomen
 totum de repente intumuit: labascebant vires: tumor pedum
 disparuit. Sextâ venâ maleoli exiit sanguis putris. Octaua serò
 cum suffocationis periculum immineret, ne quid in capite no-
 stro cuderetur, initum est consilium. quoquò res euasura esset,
 de aperienda vena. Circa quartam nocturnam interiit. Extin-
 ctus statim intumuit. Corpus exaratum erat & defœdatum pu-
 stulis, aut maculis potiùs liuescentibus Cardiacis pugnatum est.
 Memoratu dignissima hæc historia, tum ad prognosin, quæ hîc
 maximè commendatur, tum ad declinandam calumniam. Oc-
 cultum in corpore venenum delitebat.

CONSILIVM XXVIII.

De Melancholia hypochondriaca.

DE Melancholia hypochondriaca antè disputatum est, ac
quæsitum an in eiusmodi affectu vehementi cathartico

locus foret. Vbi per diorismum dictum est in nonnullis affectibus melancholicis vehementer purgandum, in aliis clementer. Ac multi melancholiæ hypochondriacæ meminerunt, & huius morbi nomen crebrò vsurpatur, sed quod propriè significet, quis locus affectus, cur ita appelletur, cum non sit necesse melancholicum humorem in vitio esse, an intemperies sola sit, an morbus in conformatione nondum satis definitum. Magnâ tamen dignum est commentatione, quod id plurimum ad curationem conferre videatur. Affectus ille Melancholia Hypochondriaca vocitatur, morbus flatuosus, & dispositio hypochondriaca. Quod videtur indicare focum sedemque mali in hypochondriis existere. Hypochondriorum autem nomine intelligitur hepar, lien, mesenterium, epiploon. Galenus 3. locor affector. scribit, *Affectus Melancholia vocari solet, indicant nomine humorem qui morbum committit.* Si nomen indicat cuiusmodi humor sit, dubium esse non videtur quin aut atrabilaris humor sit, aut melancholicus simpliciter; quasi dicas sanguinis facem. Tamen in contrariam partem potest adduci id quod à Galeno scribitur eodem loco: *Circa ventriculum prima incipiunt accidentia, & ipsis auctis melancholica sequitur affectio, & alui deiectione, & vomitu, proba coctione & ructibus is leuatur qui laborat.* Si circa ventriculum prima rudimenta apparent, si cruditas multa quæ correctione & mitigatione indigeat, non videtur consentaneum vt aut atræ bilis, aut humoris melancholici copia adsit, quæ flatuosum morbum generet. At bifariam responderi potest: Cruditas illa tantum ex euentu fit; fit enim ob obstructionem: obstructio autem ob calorem: sic in angustiis viarum heret humor, qui tempore recoquitur & aduritur. Secundo loco ita respondeo: Cruditas illa non constituit hyperxin melancholiæ hypochondriacæ, quæ & flatuosus affectus à veteribus nuncupatur: sed flatus qui generantur, tum à calore præter naturam in hypochondriis contento manant, tum à materia semicocta quod commisit obstructio. Et quod dicitur circa ventriculum prima apparere accidentia, non est hoc dicere vitio ipsius ventriculi melancholiam hypochondriacam incipere: sed cum obstructio sit primarum venarum quæ pyloro proximæ sunt, sese primum ostendit & exerit morbus in ea parte. Accedit quod pars ea sit exquisito sensu prædita, hinc fit vt in ea facillè appareant dolores, & excitentur symptomata. Sed ne absque autore quicquam

in medium adducamus, confirmanda prima est ratio; qua dicebamus cruditatem tantum ex cœntu fieri, quod nimirum ratione obstructionis contingeret: obstructio autem præ calore in partibus illis contento. Audiendus est Diocles 3. locor. affect. cuius sententiam probat Galenus, in eo tantum imminutum Dioclem ostendit, quod cum præclare sentiret de melancholia hypochondriaca, eiusque naturam & ingenium ostenderet, non dixit tamen quomodo fiat ut in melancholia hypochondriaca fugacia sint in cerebro spectra & phantasmata. *Oritur à ventriculo morbus, qui flatuosus & melancholicus dicitur, quem sumpto cibo maximè coctu difficili & caustico sputum multum idemque humidum comitatur; item ructus, status, æstus in hypochondriis: interdum ventriculi dolores vehementes, qui nonnullis ad dorsum usque procedunt, concoctis cibis mitescunt, mox aliis ingestis recrudescunt; interdum ieiunos, interdum à cena molestant: euomunt crudos cibos, phlegmata, acria, acida, ut eis dentes torpedine afficiantur. Ceterum flatuosos istos necesse est habere plus caloris in his venis, quæ alimentum à ventriculo excipiunt, & sanguinem crassorem factum esse, &c.* Item & addit illud Diocles 3: Aiunt nonnulli os ventriculi quod intestinis continuatur in hoc morbo inflammari, ac ob inflammationem obstrui, ac prohibere ne alimenta statuto tempore ad intestinum descendant, & ita diutiùs in ventriculo quam decet manentia, timores & æstus, & reliqua similia efficiunt. Hæc sunt quæ à Diocle scripta sunt. Vbi notandum est velle Dioclem in hypochondriaca melancholia affici ventriculum, & primam mali labem ab eo esse. Verba enim hæc sunt; *Oritur à ventriculo morbus*: Ac si diceret, & in ventriculo, & à ventriculo eum manare. Quod tamen verum non est; siquidem ventriculus integram suam habet temperiem, & quæ cruditas adest, non est ad ventriculum referenda ut innocentem, sed ad prohibitionem distributionis alimentis ab inflammatione & obstructione. Sed Galenus eodem locorem paulò plenius explicat. nam conceptis verbis ita scribit; *Circa ventriculum prima incipiunt accidentia, ac iis auctis melancholica sequitur affectio.* Ac si dicat: Elucent in ventriculo & partibus vicinis melancholici flatuosique morbi prima rudimenta, quod illic primum mali seminarium, non à ventriculo ipso, sed à venis pyloro vicinis, inflammatis & obstructis: non quin afficiatur aliqua ex parte ventriculus, sed non tam affectus est initio ad generationem mali, quam progresso morbo afficitur ad mali

incrementum: id est: Cùm in hypochondriis malum figitur, & confirmatum est, ac tum verè vocatur Melancholia hypochondriaca, malum serpit ad ventriculum, & tunc creditates multæ fiunt ob contractum in consortium ventriculum: & sic malum malo additur. Sed in principio hypochondriacæ melancholiæ, ventriculus quidem in sese non laborat, sed tantùm ratione obstructionis viarum quæ à ventriculo excipiunt chylum & cremorem: Et dolores maximè excitantur dum natura molitur *ad id idem* illius cremoris. Itaquetamet si & prima rudimenta circù ventriculum apparent, & coctione, mitificationeque alimenti in ventriculo malum & dolores sedentur, item à Diocle dicatur à ventriculo natus morbus, non est accusandus ventriculus tantquam primus melancholiæ hypochondriacæ autor.

Alia maior oritur difficultas, quid velit Dioclis oratio hæc, Inflammatur os ventriculi quod intestinis continuatur. Opinio quidem aliorum est, sed illam Diocles sequitur, & Galenus. Et quoniam maioris autoritatis est sententia Galeni, utpote singula exactius estimantis, in eius verbis hæcemus. Duobus ex locis, aut tribus potius conuincere possumus hypochondriacam affectionem à phlegmone (ita enim *πάχυωσις* nomen vsurpauit Galenus) pylori, & partium vicinarum: vt inde obstructio fiat, & ab obstructione alimenti distributio impediatur. Primus locus est is; *Videtur quidem in pyloro ipso inflammatio esse, sanguis autem in parte inflammata contentus, & crassior, & maioris melancholicus fit.* Locus alter est, dum rationem reddit cur affectiones & perturbationes melancholicæ eorum mentem percellant, qui hypochondriacâ passione detinentur, scribit, *sublatâ euaporatione ab atrabile fuliginosa, melancholicâque in cerebro accidentia pullulare.* At atrabilarius humor non illic generatur nisi per affationem & adustionem. Adustio autem ab immodico fit calore. Tertius locus est: Melancholiam hypochondriacam, & melancholiam cerebralem (ita enim loquar clarioris Doctrinæ gratiâ; cùm nimirum per se & primò melancholicum est, dum explicat Galenus, eandem generationis rationem esse vult, sed diuerso loco constitui, nam illic in hypochondriis fit, hic in cerebro. At dubium non est quin ea passio melancholica, quæ cerebrum primò ac per se occupat, generetur per immoderationem caloris in parte frigida, cerebro nimirum. Quod si ita sit, cur non idem continget in hypochondriaca? Audiatur Galenus de cerebri melan-

cholicâ passione loquens: *Fit melancholica cerebri passio affecto prius calidis dispositionibus cerebro, aut aestuatione, aut phlegmonosâ passione, aut phreniide, interdum à sollicitudine, mœstitia, cum vigiliis.* Quæ cùm ita sint, paulò accuratius videndum quomodo intelligatur eaperiodus. De phlegmone pylori & partium propin quarum, vt eam necesse sit adesse duabus de causis, tum ad assandum, re-
coquendumque alioqui pituitosa affectio esset tantùm (si sola obstructio foret) non autem atrabilia, tum ad obstruendum, vt & Galenus & Diocles explicuerunt.

Sed si phlegmone sit aliqua, aut phlogosis, cur hîc apostema non sit, cur non adest febris? immò necesse esset morbû acutum esse, cùm fieri non possit quin inflammatio pylori non afferat febri acutissimam. At Melancholia morbus longus est, & lento gradu procedens, maciem & mortem tandem afferens. Quæ causa est cur ex recentioribus Rondeletius, & Dioclis & Galeni opinionem reiiciat. Nam si inflammatur pylorus, & ob inflammationem sequitur obstructio, & ab obstructione prohibitio distributionis illius cremoris, qui à ventriculo decidit distribuendus in venas mesaraicas, necesse est illam satis insignem esse.

Atque vt quo animo, eò certè beneuolo veteres aliquid scripserunt, quo tanquam nobili hereditate posteritatem carere noluerunt, eodem illud ipsum excipiamus. Honorarji arbitri vices obeuntes, veterum opinionem cum posterorum scriptis conciliabimus, vt plus veritatis ratio & nomen apud nos possit, quàm præiudicatâ cuiusquam opinio.

5. Qui sunt corpore squallido, macro, sicco, pulsu satis infirmo, aut qui prærubri sunt *ἄρρυθροι* Græci vocant (de quibus etiâ Galenus 3 locor. affector.) ij melancholiæ hypochondriacæ sunt obnoxij. Item qui curis, ægritudinibus, perturbationibusque animi concutiuntur, qui generosis vinis dediderunt sese, eos in melancholiam hypochondriacam præcipientes ruere testatum satis est. Quò fit vt mirum non sit si desideretur inflammatio aliqua in partibus illis, quæ & retorreat in hypochondriis humores, & ita obstruat. Inde hypochondriorum æstus, inæqualitas in calore & frigore, vincente victoque calore, & materiâ superante calorem, & ab eodem superatâ. Itaque nomen phlegmones non ita strictè accipiendum, vt illic tumor sit, sed pro phlogosi vsurpandum. Non quin ille calor qui eò loci exu-

berat, & materiam contumaciorem reddat, exueto tenui quodam humore in tetrum vaporem degenerante, tandem coaceruet aliquid quod proximè in flatus faceffet, partimque tumorem aliquem in partibus illis excitet. Accedit quod dominatu illius caloris quodammodo febrilis vasa quadatenus cõnuent & concidant; hinc maior coaceruatio, hinc obstructio, hinc alimenti impedita distributio. Sic nimirum hypochondriaci dum vel minimum alimenti sumpserunt, videntur impleti, fatiatique, nequeunte distribui alimento ob viarum angustiam.

Itaque cum recentioribus statuendum est vitio splenis, mesenterij, & intestinorum melancholiam hypochondriacã contingere: Intemperies enim est mesenterij, vel venarum mesaraicarum, quæ ad intestina & ventriculum deducuntur. Et intemperies illa potius iuncta est cum caliditate & siccitate aliqua; item cum obstructione à crassiore sanguine, cuius pars tenuior halitus modò à calore adurente excitata summittitur in cerebrum, crassior autem defes, ignauaque resistit, & calorem obruens, & gravitatem in partibus illis afferens. Itaque vt de Curatione verbo dicatur; Temperatio illius caloris acris, obstructionis libertas omni ratione est procuranda. Optima autem victus ratio primas hinc tenet; quandoquidem in omnibus illis morbis qui partes illas obsident quæ nutritioni dicatæ sunt, præcipuum curationis momentum in optima victus ratione consistit.

ANNOTATIONES.

1. In melancholia hypochondriaca vnum quoque obseruandum est, ne similitudinis errore decipiamur, nimirum quod in thorace dolores sentiuntur ac si pleuritidis argumenta aliqua forent. Et ignari Medici ad remedia male confugiunt pleuritidis, cum dolor iste per hypochondrij sympathiam oriatur. In mercatore de Montargis hoc est obseruatum. Vide pag. 15 huius libri.

2. Nota spūationem multam in iis quibus est affectus hypochondriacus, quoniam cum ipsam spūationem vident Medici, sepe ad caput catarrhum recurrunt.

3. Delirare melancholicos non est dubium, cum melancholica passio desinat per delirium febris expertis. Quamquam si materia acrior sit, et adusta, vt sepe fit, suppressaque in corpore, non potest non adesse febris, et

annotauit Aëcius: sed illa febris erit conclusa, latensque, prout natura humoris morbi efficientis efflagitat. Idē humor videtur & melācholicā & epilepticam affectionem efficere: quod annotauit Hippocrates 6. Epidem. dicens, Melancholici fiunt epileptici, & contra: prout humor vel in hanc, vel in illam partem repit. Nam si in corpus, epilepsia fit: si in mentem, melancholica passio. Mentis nomine temperamentum intelligitur, & cum dicitur ladi, actiuarum qualitatum ^{reps} leditur. In qua crasi & temperatione ratiocinatio consistit, & ratiocinandi partes probè exercentur. Sic lesio hoc temperamento ab humore prauo, delirium fit. Hic don queruntur preclara. Prius, si idem humor, sed diuersis partibus contentus, Epilepsiam & Melancholiam inducit. An humor melancholicus & atrabilarius utramque affectionem inducere potest, Galenus cap. 7. lib. 3. de locis affect. hoc vult ex Hippocratis sententia. Sibi itaque consentiat Galenus, qui narrans illud, In febribus ex somnis timores, & conuulsiones, malum. aphor. 67. lib. 4. scribit: Si vaporum, humorumque multitudo ad atrę bilis naturam vergit, pauores fiunt; si talis non fuerit, labores ac conuulsiones. Ergo magna humorum distinctio melancholica pathemata & conuulsua efficientium. Nisi fortè dicat quis conuulsionem illam non eam verè dici que Epilepsia dicitur: sed communi nomine pro quauis contractione. Hæc autem contractio non ita fit ab humore atrabilario ut ab aliis, quod tamē falsum videtur. Nam atrabilarijs humoribus abundantes vidimus sæpe conuulsos. Melius esset si diceremus verba hæc Galeni per comparisonem esse intelligenda, ^{καὶ δὲ τῶν ἄλλων} καὶ τῶν ἄλλων. Nam cū humor atrabilarius est, potius melancholicas affectiones quàm ^{καταρῶδες} efficiat.

Posterius quod querendum dicebamus, si idē melancholici delirant, quia in his obsidetur anima, id est, pars in qua anima, ratio & iudicium versatur, quā parte lesā, alteratāque ratio cessat, illesa verò constat. In Epilepticis verò non afficitur temperamentum cerebri, sed leditur cerebrū ut pars organica, non ut similis. Quare Epilepsia desinitur Conuulsio non perpetua cum mentis & sensuum oblatione. Questio hæc pulcherrima. Item, Si carus ladi actiones potius quæ sunt in cerebro; Apoplexia que sunt à cerebro, quod de Apoplexia dicitur, aliqua ratione de Epilepsia dici potest.

4. Ratio hæc est Rondeletij, si fit phlogosis, febris adest, eaque acuta. Erat tamen. Nam Galen. comment. in partic. quandam 2. Prorhet. ait: Neque ventre, aut hepate, aut septo inflammato febris maligna est: forsan acuta est, sed ne hoc quidem perpetuum est: Sic ratio Rondeletij nulla est.

5. Galeni verba sunt cap. 7. lib. 3. locorum affect. & petita sunt ex Epidem. ut monet Gal. comment. in Aphor. 14. lib. 2. Prophet. ubi docet quomodo ^{ἐξ ὀξεία} malum saepe signum sit: & ut qui sunt prærubri, sint melancholici.

6. In mania, qua affectui melancholico est affinis, hic syrupus est præscriptus.

℞. rasura lign. sancti quart. j. cortic. eiusd. ℥. j. infunde in aqua fluuiialis lib. iij. per sex horas, addendo polypod. ℥. s. enule camp. ℥. j. folior. senna ℥. ij. turbitih gummosi infusi in vino albo cum pauco Zinzib. ℥. s. colocynthid. ℥. j. Bulliant omnia in vase fictili luteato ad consumptionem mediæ partis. fiat col. ad lib. 1. Capiat ℥. iij. pro dosi.

CONSILIVM XXXIX.

De Hydropo.

DE aqua intercute olim à primariis Medicis disputatum est: ac præsertim quomodo vel primò fieret, vel alteri morbo succederet. At disputatiõis huius prima hæc pars est, An nullus hydrops contingat quin affectum sit hepar per se, aut per sympathicam: id est, quacunque in parte conceptum sit vitium, quod hydropis parens esse possit, nisi illud ad hepar perueniat, hydrops necdum generari, dicique potest. Nam cum illius ^{ὀξεία} in ἀκροτηρία τῆς αἰματώσεως consistat, hepar autem prima illius officina est, necesse est affectum in se iecur vt hydrops causam principiumque sumat. Posterior pars est vt inquiretur de modo quo aqua in ventrem abdomenque repit, vt inde tumor fiat. Vt de priore dicatur aliquid: In commentario in Prognostica, vbi ex professo de hydropo agitur, Galeni ea constans est assertio, vt nunquam hydrops generetur quin affectum sit hepar ipsum. Tamen duo genera hydropis constituere videtur; vnum quod ad splenem pertinet: alterum quod ad hepar. Et quoniam (ait Galenus) in Prognosticis ceptum est agi de acutis morbis, non autem de splenicis morbis, ideò de hydropo per affectionem ventriculi agitur. Vt Galenus videatur inducere alium hydropem per vitium ipsius splenis non affecto hepate. Nam si omnis hydrops sit affecto hepate, omnis hydrops ad acutorum morborum classem pertinet, vt quoties de hydropo

agatur, toties de hepate, si modò vera est Galeni opinio. At commemorabilior est locus lib. 3. de symptomat. causis: illic Galenus docet *tympanitem visio proprio ipsius ventriculi generari: immò & ibidè, hydropis generationè venarū ipsarū vitio tribuit.* Quod si ita est, non accusandū est hepar perpetuò, nec temerè nostris remediis exercendum, cū saepe in vitio non sit. Frustrà enim adhibentur remedia, nisi primā mali sedem illis oppugnemus. Quoniam tamen communis ea est omnium veterū consensio, vt citra affectum ipsius hepatis hydrops non fiat, quicquid contrà afferri possit, in eo est consistendum.

De posteriore parte plenius paulò dicendum, quod & plus habeat vtilitatis, & voluptatis. Quoque difficilior est illius explicatio & examen, eò vberior fructus qui inde manare potest. Galenus non dubitat quin intemperies frigida hepatis hydroperem generet: sed de obstructione maior dubitatio. Si obstructio aliquid facit, erit villorum & tenuium staminum quibus intertextum est hepar, quorum beneficio transumptio fit à simis ad gibbas, alimenti & sanguinis. Nec enim dubitat quin communicent extremitates venarum & villorum illorum, sed quā ratione per ora sua coniungantur, non facilè intelligi posse affeuerat. Sit ita sanè; obstructio omnis impedit transitum humoris, siue illa ab inflammatione sit, siue à scirrho. Quod cū animaduertent veteres, rationi consentaneum esse dicebant, vt pars quæ in sanguine magis tenuis & aquosa est, transmutatur, atque vehatur per vniuersum corpus: syncerus autem sanguis propter suam crassitudinem in caua visceris parte permanet. Et in hanc opinionem facilè secederet, nisi absurdum aliquod contingeret. Non est dubium quin aquosa pars sanguinis deuehatur in venam cauam, & ab ea in abdomen rapiatur: sed non est verisimile remanere limum sanguinis, aut potius puriorem sanguinem. Nam si interceptus sanguis remaneat in angustis viarum, morbus aliquis sequeretur à plenitudine sanguinis, cum tempore multus cumuletur sanguis. Præterea continget crassiorem illum sanguinem in visceris venis præ illarum angustia retentum ad intestinum ieiunum, tenue, colon & cæcum deferri, fortasse & per aluum. In leucophlegmatis, & anasarca, & tympanite nil cruentum per aluum excernitur: sed spatium abdominis aqua impletur. Hoc itaque absurdum contingeret, quod nimirum in hydropticis cruentæ essent deiectiones.

Gal cap.
7. de loc.
aff lib.

Sed dicet quispiam: An ignorauit Galenus hydropem contingere & ab inflammatione & à scirrho hepatis? Si ignoraret, summæ inscitæ arguendus foret. Quid ergo sibi vult hoc loco, dum contendit docere per refrigerationem hepatis, & intemperies humidas, aut siccas, aut frigidas hydropem generari? Reuerâ non ignorauit à scirrho, & obstructione hepatis nasci hydropem, alioqui contra eum ageremus ipsiusmet verbis tanquam ob signatis tabellis. Sed qua de causa & consilio id dicatur, breuè aperiendum.

Veterum de hydropē ea duplex fuit opinio. Quinto locorum affect. quidam putauerunt hydropem generari cum obstructio, aut inflammatio, aut tumor est in hepate præter naturam, & horum ratione præterfluit tenuis & aquosus humor in abdominis spatium, remanet, hæretque mediis viis sanguis. Altera opinio fuit eorum qui à solo scirrho, tumoreque hepatis hydropem fieri putarunt: in quorum albo fuit Erasistratus, vt videre est lib. 2. de natur. facultatibus. Qui priorem sententiam sequebantur, non eiusdem planè opinionis (meo iudicio) fuerunt, cuius fuit & Erasistratus; nec enim à solo tumore & scirrho hydropem oriri voluerunt, aut saltem Galenus non id in iis reprehendit: sed aliqua ex parte admittit eorum opinionem, alia ex parte non admittit. Negat enim illam fieri transcolationem aquosæ substantiæ, remanentes sanguine crassiore, quod duplex absurdum sequeretur: prius quidem, quod ille sanguis remanens suppressus, morbū aliquem à plenitudine efficeret: posterius, quod cruentas in hydropicis deiectiones apparere esset necessum. At neutrum in artibus operibus apparet. + Quod autem illi non crederent à solo scirrho nasci hydropem, vt Erasistratus, ex eo credibile, verisimilèque fit quod melius cum iis multò agat quàm cum Erasistrato. Nam hunc inscium, ignarum, imprudentemque vocat: illos autem excipit, & eorum sententiam conciliare, ac subleuare nititur. Nisi quod sub finem demonstrare voluerit à refrigeratione hepatis potius quàm à scirrho aut tumore nasci hydropem. At debuit potius in eo laborare, an ille generationis modus hydropis, quem veteres fingeant in inflammatione, obstructione, scirrhoue hepatis esset verisimilis, non autem in eo, vt probaret non probabile esse à timore hepatis cum nasci: adducto tanquam obiectionis loco, & mulierū profluio suppresso, & hæmorrhoidibus suppressis, cum vtrumque

(ait) hydropem afferat, non præsumpto conceptoque tumore villo in hepatis parenchymate. Sed meo iudicio voluit vnâ eademque operâ illorum veterum fundamentum positum in opinione quâ ab Erasistrato fluxerat, euertere; nimirum de tumore hepatis, qui aut præcipua causa, aut sola (vt Erasistrato visum est) hydropis crederetur. Huiusce rei coniecturam facit id quod scriptum est apud Galenum cap. i. lib. 6 de locis affect. vbi ex professo eorum explodit refellitque opinionem, qui crederent à solo tumore lienis hydropem fieri, non attracto hepate: item & icterum solo hepatis vitio, citra lienem. Vtrumque falsum est, ait; nam & vitio vtriusque visceris icterus fit. Et non solo vitio tumorêque lienis hydrops. Quod vt apertius ostendat, exemplum eorum affert qui acuto morbo laborant, qui vt explerent sitim magnam egelidæ copiam hauserunt: hi hydropici euadunt nullo in liene vitio concepto. Sed per modû obiectio- nis respondet pro illis veteribus, quorum maiorem partem Erasistrati opinio imbuerat. Ea autê erat eiusmodi. Nulla pars afficitur (dicebat Erasistr.) nisi vel tumor aliquis, vel vlcus in ea consistat. Sic nullum ab intemperie morbum nasci putabat. At debuit Galenus in aliena sententia redarguenda non ita esse indus- trius. Si quid durius, aut indoctius ab Erasistrato dictum sit, conari debuit illud polire, illustrare, & malè coherentem sententiam adaptare. At mirum in modum conuellendæ, labefa- ctandæque opinionis Erasistrateæ desiderio detinebatur Gale- nus. Nam si turpiter lapsus est Erasistratus, statuens nullam partem citra aut vlcus, aut tumorem laborare, reprehendatur & Hippocrates, qui omnem morbum, vlcus constituat. Quam ta- men à veritate alienam sententiam temperauit Galenus lib. de inæquali intemperie. Multa quidem à multis veteribus dicta sunt, in quibus magis videndum quid sentiant, quàm quid dicant. Quod maximè apud Hippocratem obseruari debet. Et cur non eodem iure cum Erasistrato agetur?

Itaque Galenus putat se abundè euertere dogma Erasistrati ascribentis omnem hydropem à tumore & scirrho hepatis causam, principiumque ducere. Quod vt faciat, proponit suppressas hæmorrhoides, proponit profluuium muliebri. Hæmorrhoides (inquit) suppressæ hydropem inducunt nullo præcunte in hepate tumore. Erronea itaque est Erasistrati opinio, existimantis sine scirrho hepatis hydropi locum esse non posse. At

Galenus suâ ipsius sententiâ se conuincit; nam interpretans aphorismum 12. lib. 6 Aphorism. dum reddit rationem cur suppressio hæmorrhoidæ non prius fluere consuetarum metum hydro-
 pis afferat, iuxta Hippocratem, scribit, sanguinem hæmorrhoidalem refluerè, & hepatis duritiem inducere, multitudinèque calorem partis obruere, hinc hydrops. Ergo non est, ô Galene; cur occurras de hæmorrhoidibus utpote hydropem afferentibus, cum ipse scribas; idè suppressam hæmorrhoidem metum hydro-
 pisis afferre; quod & hepatis, & lieni (nil enim differt) duritiem inducat, & calorem obruat. Non sibi constat Galenus: nisi dicamus utrumque contingere posse, & suppressionem hæmorrhoidæ sine tumore visceris hydropem euocare, & eandem suppressionem tumorem prius inducere, & à tumore hydropem.

Paulò obscurior videri possit ea perodus, quâ scribit, ut euer-
 rat eorum sententiam qui tenuem humorem aqueum præterlabi substantiam hepatis assererent ad generandum hydropem, resistante in ipsius visceris angustiis crassiore sanguine; scribit, inquam, consequi necessariò ut deiectiones cruentæ sint: Nihil autem cruentum vlla in specie hydro-
 pisis (inquit) obseruatum est à nobis. Non est dubium quin si illo modo fieret hydrops, aliquid cruentum secederet: sed videndum an non in speciebus hydro-
 pisis aliquid secedat cruentum; siue hoc modo, siue alio generetur hydrops: hoc enim obseruatione dignum existit.

⁵ Hydrops maximam partem coniunctam habet hepatis imbecillitatem: hæc non modò in *αιματοπυιτιχη* consistit, sed & in attractione, & retentione attracti alimenti. Nequit enim fieri ut diu temperies iocineris labefactetur, quin actiones lædantur. Quanquam contingit ut vna actio lædi possit, illas à integrâque alterâ. Itaque cum constet ob refrigerationem & imbecillitatem hepatis excerni excrementa liquida, hepatica, & illius officinæ characterem aliquem præferentia, non dubium esse potest quin excerni non possint cruenta loturæ carniū simillima: proptereaque illud Galeni decretum experienciâ confirmatum minùs constans est, quo scribit nihil cruentum excerni solere in hydro-
 pisis affectibus. Quinetiam si cruentæ vrinæ virtute naturæ aut symptomaticè potius in hydro-
 pisis excernantur, ut experientia sæpè docet; cur non & deiectiones tales apparebunt nequeunte hepate ob imbecillitatem, aut tumorem aliquem robè hæmatosi incumbere.

Duo ista diligenter inquiri debuerunt, nempe an à solo scirrho nascatur hydrops: posterius, an nihil cruentum hydropici excernant. Nam magni interest an à tumore, an ab inflammatione, an à scirrho; item an tantum ratione lienis, vt quidam volebant, an tantum à vitio hepatis, cum variet curatio pro ratione horum omnium. Item an nihil cruentum excernatur, an contra, ne dysenteria falsâ persuasione & opinione seducti, aliud remedium pro alio supponamus. Sed horum diligentius examen in aliud tempus reuocetur.

ANNOTATIONES.

1. De aqua intercute hoc notari potest. Videmus hydropicis quibusdam aluum fluere, aliis astrictam admodum. Vtrumque malum: & pessimum, si aluus cum libera sit, abdomen non detumescat: quod in seruo quodam obseruauimus. Illud autem quod diximus malum esse scribit Hippocrates in Coacis: Quibus hypochondria eleuantur aluo suppressa, malum, maximè in morbis tabidis, & quibus alui humectantur, (supple) malum est, dum videlicet aluo fluentetumor remanet.

2. Cap. 7. lib. 5. de locis affect. conceptis verbis explicat Galenus. Ac inter cetera, annotat quarum partium vitio afficiantur partes gibbe hepatis ad hydropis generationem: & quarum partium vitio sine ad eandem generationem. Hippocrates lib. de morbis primo, hyposarcidion vt & tabem inter morbos necessariò interuinentes numerat.

3. Quia enim hepar est continuum, si sit inflammatio in sima, aut gibba, non distinctè & exactè cognoscitur ob carniū hepatis continuationem.

4. Argumentum hoc validum. Et miror cur Fernelius disputans de Ascite dicat necessariò rupturam fieri aliquam vasorum: & propterea, aut supra, aut infra excerni sanguinem. Quod falsum, & Galeno repugnat. Et Fernelius ita in errorem Erasistrati incideret, qui nullam partem labefactari credidit, nisi aut à tumore, aut ab ulcere. Quasi ipsa intemperies frigida causa non sit.

5. Vt liberè dicam quod sentiam de iis quæ hoc loco continentur, an in nulla hydropis specie aut deiectiones, aut vomitiones cruenta appareant. Quod placuit Galeno. Ita distinguere oportet. Si quo modo voluerunt veteres, hydrops fieret percolato sanguine, & remanente crassa sanguinis parte in medijs visis, oporteret cruentum reuici aut per os, aut per aluum, immò iniitio etiam. At hoc non fit. Et ita debet intelligi locus Galeni: Non quin in hydropicis deiectiones cruenta, aut vomitiones apparere possint,

154 CONSILIORVM MEDICINALIVM
duabus de causis: Vno, progressu temporis adducto in summam imbecilli-
tatem hepate, unde hepaticæ fiant deiectiones, non ratione transsumpti
tennioris seri ad generationem hydropis, & refluentis sanguinis ab he-
pate ad os aut aluum. Alio modo per ruptionem, aut exesionem, aut
ab aquis acribus & ferè purulentis, aut ab usu medicamentorum acrim
qua usurpari solent in hydropicis. Quod nos obseruauimus in Renato de
Sequenille hydropico, cui & vomitiones & deiectiones cruenta contige-
runt. Si autem hydrops fieret eo modo quo voluerunt veteres, quod Gale-
nus exagitat, de essentia ferè esset hydropis ut sanguis excerneretur. As
potest hoc accidens illi esse, sed non pathognomicum. Vide quid de Ascit-
te sentiat Fernelius, cum explicat quinam Ascita sint obnoxij.

CONSILIVM XL.

Pro muliere grauida, quæ peperit, & conuulsiones
passa est.

NOBILIS mulier nunquam dolores partus experta, cum
legitimum pariendi tempus iam elapsum foret, decimi-
que mensis pars prima aduentaret, grauissimè laborat. Exactis
horis duodecim partus sese offert. At quia primus erat propter
dolorum insolentiam, & ossium pubis angustiam, mirum in mo-
dum diuexatur. Interim dum enititur, aut translato sursum hu-
more affatim, aut latitante eodem in cerebro, sed magno im-
petu diffuso, incipit toto corpore concuti ac conuelli. Idem pa-
titur ac si morbo caduco laboraret. Facies tota in molem intu-
mescit, horrendâque visu sese ostendunt symptomata. Vix sex
hominum nisus impediunt quominus concuteretur ac conuel-
leretur. Repetitante partum, præsertim dum foetus mediâ
viâ sinus pudoris hæreret, subsisteretque, epilepticus paroxys-
mus quinquies, aut sexies: edito partu bis aut ter cum grauissi-
mo mortis metu. Dum res, ita vrgerent, cogitareturque po-
tius de sepulchro quàm de lauacro; dubitabant Medici num lu-
uandus esset partus, an potius conuulsioni occurrendum.
Item, an occasione partus conuulsiones prehenderent, an
verò eiusmodi dispositio prius in cerebro defes latiraret,
quæ occasione minimâ sese prodidit. Ac mors immine-
bat proxima nisi conuulsiones illæ substitissent. Meo qui-

dem iudicio, si illa conuulsioni obnoxia foret, non tanto opere periclitabatur, quàm si nunquam aliquid tale experta fuisset. Etenim qui epilepsiâ corripî solent, licet sepius eodem in paroxysmo conuellantur, non propterea tamen decedunt: At illud obseruatum sæpe, eos sæpe fato fungi, qui aut propter ingentem plethoram conuellantur, aut à maligno explicato, suscitatioque tetro humore qui deses restagnansque imo præcordiorum delitescibat. Et qui morbis eiusmodi corripî solent, exiguâ admodum occasione tentatur, immò solo forinsecus vapore feriente. At qui nil dum tale senserunt, non ita facîle paroxysmoprehenduntur; vehementem enim causam esse oportet, quæ insolens hoc symptoma afferre possit: nec enim facîle cerebrum nunquam epilepsiâ tentatum eam labem contrahit. Eadem itaque operâ & partus iuuabatur, & conuulsioni epilepticæ manus porrigebatur, ne illius vi citò interiret.

Causæ hæc tanquam procatarticae facere poterant ad inducendum horrendum symptoma nunquam antea visum: Plethora corporis summa, & vsus vini hippocratici tempore grauiditatis: suppressio alui quinque aut sex dierum ante partum: Enixus quoque ipse, qui etiam in habitissimis mulieribus solet semper aliquid terrificum inducere. Accedit quod nunquam peperisset. Subiecto acriusculo enemate ex hiera substiterunt conuulsiones, & ab eo tempore nil sensit eiusmodi. Larga admodum copia sanguinis fluxit per sinum pudoris: quod suadet facîle nõ tam occasione dispositionis & impressionis cuiusdam quàm copia materiæ, orgalmo, raptu, & nisu maximo inter pariendum hoc contigisse. + Itaque cum Medici animaduertent euacuato humore repressum esse symptoma, immò suppressum omninò, ducti sententiâ Galeni lib. de locis affectis, cum quid excernitur in morbis, & ab excretionem morbi cessant, credibile illud causam fuisse morbi, cogitauerunt de purgatione. Itaque tale medicamentum institutum.

℞. expressionem ꝛ ijsrhobarb. electi infusi in decocto passul. glycyrr. femin. frigid. maior. endiuie, scariola, in qua dissol. syrup. rosar. pallid. ꝛ j. diaphan. ꝛ iij. fiat potus.

Quidam putabant vtendum valdè calfacientibus, etiam inter purgandum: cuiusmodi sunt ea quæ vulgò epilepticis præscribuntur: alij contrà refrigerantibus ad domandum, sedandumque ferociam humoris. Et posterius hoc consilium melius. Nam

quoties paroxysmi epileptici aut similes morbi occurrunt, non statim ad vulgaria remedia veniendum, ac si vnus morbi in specie eadem causæ essent specie: sed sæpè nouum captandū consilium. Alij Medici hoc poculum præscripserant.

℞. rad. dictamn. aristoloch. an. ʒ. s. bistorta ʒ ij. sem. pæonia maior. ʒ ij. rad. pæonia ʒ iij. flor. cardui p. j. conseru. anthos & saluie an. ʒ j. rasura eboris, cornu cerui, an. ʒ ij. fiat decoct. ad lib. s. In colat. dissolu. theriaces optime ʒ ij. rasura unicornis ʒ j. syrup. de stæchad. ʒ j. s. fiat potus pro duabus dosibus, aromatizatis cinamom. & nuce mosc.

Postridie partus propinatum medicamentum, deiectiones multæ: primùm effusiones quædam. Vocat autem Dominus Magnus effusiones ex sententia Hippocratis cum excernuntur talia qualia excernere solent vaccæ: item & vliginosæ fuerunt deiectiones. Qui euerunt omnia: non propterea tamen iusserunt Medici secure dormire. nam ita res agitata est: morbus hic tametsi suppressus videatur, non propterea de eo securos nos esse oportet, tum ratione partis obsessæ, afflictæ que prioribus paroxysmis: tum ratione morbi ipsius. Pars cerebrum est. Si ad illum morbum affectum procliuè dispositum que fuit: maior relapsus metus esse debet, minimâ enim lochiorum suppressione, aut reliquâ materiâ prioris paroxysmi facilè morbus recurret. Si non erat dispositû, meliùs quidem agitur, sed securitas tamen magna esse non debet. Nam morbus is (vt de eo tâquam de posteriore diuisionis nostræ membro dicatur) relapsus ferè particeps est. Et duabus de causis facilè recurret. Prior est: In prima lunæ quadraturaprehendit paroxysmus, lunaris morbus est, ergo tutos nos esse non oportet, nisi secunda quadratura relapsa fuerit, donec luna sit *ἀπότομος*: in eiusmodi enim quadraturis mutationes, inclinationes que fiunt. Sic omnia tuta timere oportet. Accedit altera causa: Quarto die lac ad mammas capitur, fertur, & attrahitur: ratione duplicis motus; & quia calidum est, & supprimitur in hac muliere vtpote non lactanti; metus est ne fumi summittantur qui paroxysmum reuehant. In confesso enim est quod scriptum ab Hippocrate, à sanguine in mammis collecto furorem contingere, præsertim cùm sanguis ille in lac non vertitur, aut propter abundantiam nimiam, aut propter feruorem; quod diligenter annotandum est. Si furor itaque eam ob causam imminet, cur non & conuulsiones, & aliquid simile contingere poterit, eo præsertim tempore quo lac

ad mammas deferetur? Ratio hæc vrget admodum.

Itaque prouidendum vt aluus libera semper fit, raptus sanguinis ad mammas cohibeatur, malignæ qualitati consulatur, vitentur omnia fumida, graucolentia & suaucolentia, ne caput impleant, feriant que. Videndumque vt purgationes à partu contentur semper. Atque in eam rem comparata hæc sunt.

℞. rad. rubia tinctor. asparagi, gram. oxylapat. an. ℥ s. angel. m. j. passular. mundat. ℥ s. florum comm. p. j. semin. pæonie ℥ ij. buglos. borrag. omnium capill. an. p. j. fiat decoct. ad lib. j. In colat. dissol. syrup. capillor. ven. ℥ ij. Fiant tres doses aromatiz. paucio cinam.

Item ℞. conseru. anhos ℥ s. conseruæ rosar. ℥ ij. sem. pæonie ℥ j. s. fiat opiata cum syrupo conseruat. citrij. additus est ℥ s. pulueris scobis unicorn.

Item ℞. rasura eboris, margar. elect. an. ℥ j. rasura unicorn. ℥ s. spuluer. Elect. triasantal. & diamargar. an. ℥ j. cum saccharo dissol. in aq. angel. aut decoction, eiusdem. fiant tabella.

Item ℞. aquar. stillatitiar. angelica & morsus, aut decoct. angel lib. s. aromatizet. parum cinam. ad vsu ex cochleari.

Interea fotu aquæ tepide procuratum est vt citarentur lochia. Omnia odorata vitata sunt.

Puellis recens natis mel deglutiendum aut lambendum porrigitur optimo vsu, vt prouocetur aluus, & vitentur tormina.

Item ad vitandam conuulsionem cui obnoxij sunt, cum pulte miscetur corallium & puluis margaritarum.

Purgationes à partu cumulatè, & vt decuit, exierunt. Magna copia toto illo tempore sanguinis exiliit. Interiectis diebus iniecti clysteres. Tamen ne quid alienum contingat, deinceps de purgatione cogitatum. Ac dubitatum an lauacro vtendum sit, vt à partu nostrates mulieres solent. Repurgata est rheo & catholicon. Quanquam suspectum sit catholicon, quod in suspicionem Epilepsiæ & cassia & catholicon suspectum sit, vt doctissime à Rondeletio & Hollerio annotatum. Idque annotatum puto aut communi quadam prudentiâ cui experientia suffragatur. Et vt cum è lecto surrexerit, repurgetur adhuc, visum est è refore si apozema per decem dies vtendum præscriberetur.

℞. rad. fæniculi, petros. aspar. cichor. acetos. an. ℥ j. exule camp. ℥ ij. melissa, omnium capill. an. m. j. buglos. borrag. glycyrrh. passul. an. m. j. ceterach, scolopen. an. p. j. semin. pæonie & radices eiusd. an. ℥ j. s. sem. sefeleos ℥ j. florum, p. j. agripalma m. j. s. fiat decoct. ad lib. j. In colatur.

Quod attinet ad vsu balnei, ne quid fortè contingat præter opinionem, præsertim si muliercularum balneum vsurpetur ex face vini albi aut rubri, ex alumne, & similibus, visum est iuterdici debere vsu eiusmodi balneorum. Nisi fortè balneo dulcis aquæ recreari velit: & pro omni deterfitorio fiat pulvis ex amygdalis contusis & hordeo contuso, quâ corpus leuiter fricetur. Ita enim detergebatur corpus, & nihil incommodi afferetur. Nam cum balneari vsu caput vaporibus impleatur, & grauiter in iis vsurpandis peccetur; si quid peccatur, facillimè autem omnium hîc peccatur, contentos nos esse oportet simplici frictione. In quibus autem paroxysmi epileptici metus est, in iis cautos esse oportet in balneorum vsu. Quodenim veteres epilepticos & melancholicos ad lauacra miserint, id factitatum esse asserimus cum, corpus, aut caput intemperie aliquâ calidâ siccâque affectum est, cum in partibus omnibus squallor. Hîc enim dubium esse nõ potest quin balneis locus sit ad correctionem calidæ sicceque intemperiei, quæ multorum, magnorumque malorum autor est & parens.

ANNOTATIONES.

1. Quod à translatione potius sit, declarat eius accidentis repressio ac cessatio cum primum alius descendit.
2. Non est dubium quin mulieres affectionibus capitis magis sint obnoxie, cum multis de causis, tum propter capillorum exactam nimum diligentiam & studium, quod annotat Cælius Aurelianus in Chronicis.
3. Nam qui à dispositione cerebri epileptici fiunt, & concidunt, minima occasione &prehenduntur, & releuantur: sed cum quis nunquam aliquid tale sustinuit, magnam oportet adesse causam que hoc symptoma afferat: nam vel est summa plenitudo, vel summa corruptela, ut contigit de eo qui primo die phreneticus contigit, & tertio interiit à maligno, ut Galenus doctissimè interpretatur. Itaque cum quis epilepsiâ prehendi solitus est, minus morte periclitatur, sed aut nunquam, aut ægerimè eo morbo defungitur. Si nunquam expertus est, periclitatur morte ob dolores acerrimos, & virium casum: & quia pars princeps occupatur. Si semel hoc sustineat, non ita facile relabatur. Quod autem periculû aliquando creet

cam non contigit, videtur Celsus indicasse lib. 3. cap. 23. Interdum (ait) cum hic morbus recens est (id est nunquam adorsus) hominem consumit. Hippocrates lib. 2. Prorrheticam differentias magnas morbi sacri proponit, ut in iis, quam in iis periculosior, soluique difficilior existat. Ac inter cetera ait solutu difficillimum morbum sacrum qui à puero ad virilem aetatem peruenerit. Quod absurdum videtur. Nam aphorif. 45. lib. 2. mutatione aetatis pueros adorta Epilepsia curatur, & mutatione viuendi rationu: praesertim cum puellis menses erumpunt, & maribus cum venetem agnosunt, ut Celsus ait cap. 23. lib. 3. At hoc accidit cum attingunt virilem aetatem. Ergo sibi dissimilis videtur Hippocrates. In illo loco vitur verbo *αυτοματην* Hippocrates, quod non significat ad virilem aetatem peruenire. tunc enim, si nunquam alias, soluitur morbus: sed vocat *αυτοματην* *αυτοματην*, quasi dicas conuiescere, id est corroborari, confirmari cum aetate virili. Alias haec falsa sunt.

4. Quo excretio ilico dolor sistitur, hoc doloris causam censei par est. Galenus cap. 2. lib. 1. loc. affect. Tamen hoc potest esse fallax. Sape enim in torminibus clyster educit recrementum, cum tamen hoc doloris causa continens non sit. Nam postea educitur doloris causa.

5. Notandum quoque hoc loco vnum est, & tempore grauiditatis, & tempore partus, & post partum multa multis mulieribus insolentia contingere possunt. Nam audiimus multas mulieres epilepticas concidisse dum grauida essent, quae liberae a saeu nil unquam tale sensissent; siue id fiat ob suppressos menses, siue ob collectam multorum prauorum humorum illuuiem, quae de repente horrendum hoc symptoma inuehit. Quemadmodum quoque aliis in mulieribus contingit ut cum utero gestant, immunes sint à sauis doloribus, quos prius dum utero non gererent, ferebant. Ita enim nouimus mulierem hemigraniae conflictari solitam grauisime dum utero non gerit. Cum primum utero concepit, nil tale sentiebat: Quod mirum est. Et id primus Hippocrates 5. Epidemior. obseruauit de muliere cui caput circumdolebat, nec alleuabatur nisi cum uterum gereret. De illis mulieribus epilepticis tempore grauiditatis (cum ab eo affectu plane immunes essent) Fernelius cap. de Epilepsia in Pathologia.

CONSILIVM XLI.

Ad fœtorem oris & anhelitus.

MVLIER annos nata quinquaginta leui de causa in morbum incidit. Ab eo releuari recrearique vix potuit. Inæqualiter corpus afficiebatur, modò calidiusculum, modò temperatum. Noctu, ac præsertim vesperi febris recurrebat. Eò tamen ventū est, vt cõtabescere videretur. Sed paulò pleniùs res tractanda, & à capite arcessenda, vt id quod instituti est nostri clariùs elucescat.

Illa ferè à primis vnguibus, teneraque ætatula fœdo tetròque anhelitu laborauerat, vt vix quisquam in os loqui auderet fœtore oris territus. Et cum illi incumberet propter eum quem in republica locum tenebat, cum primariis hominibus consuescere, eam tantæ molestiæ sæpe pertæsum est. Nil non in eam rem excogitauit ascito illustrium Medicorum concilio, præscriptis eò variis formulis que in parato forent ad fallendas, leniendasque eas molestias. Quidam eam vsu carniū omninò interdixerunt, alij aliud consuluere, quorum cum lubenter consiliis paruisset, nihil præter fucatam oris tantum suaueolentiam retulit, cum frustra in oris gratia concilianda fuisset elaboratum.

Nos ab eo fœtore contumaci auspicari voluimus, quod quæ causa eum primis annis fouerat, ac aluerat, ea non minore liberalitate sui extrema senectute copiam fecit. Immò morbum aut morbos potiùs fœcundâ sobole parturiit, quibus in depellendis multum operæ insumptum est: sed hæc omnia frustra. Itaque cum leui quodam morbo tentata esset, efficacibusque remediis contra pugnatum esset, nihil dum sensit solatij: immò ægrescere medendo videbatur. Recruduit ille vetus oris fœtor, palatum, gingiuæ, faucèsque ipsæ limoso cœnosoque humore tanquam vligine quadam erant oblitæ: & cum is humor aut muccor potiùs teter deterfus esset, citiùs dicto alius aderat qui deterfas illas partes retineret, ac occuparet. Vrinæ velut purulentæ profluebant: ex interuallis ardor urinæ eam exercebat. Febris aderat è genere hecticarum putrium: inappetentia magna: virium amissio, mox earundem recuperatio: marcor totius corporis: squallidus habitus. Edendo nihilum proficiebat, ta-

metſi euehymis vteretur. Dubitatum eſt de ſede huius mali, de affectibus, aut implicitis, aut diſiunctis: de marcoris tanti cauſa, de remediis: & quis tandem foret euentus illius morbi ita occulti ac inueteraſcentis. Morbus omnis cùm actionem primò ac per ſe lædat, tolli, excindique debet: nunquam tolletur niſi cauſa continens, quæ eum fouet, adimatur. Nectantùm in cauſa continente adimenda occupatos nos eſſe oportet, quòd hæc morbum proximè foueat, ſed per analyſin quandam continuatione quadam ad alias cauſas ſenſim progrediendum, quæ morbum primum fouere dicantur. Tametſi enim & cauſa morbi continens ſublata, & affectus ipſe ſublatus primam Medico laudem tribuant, & nil poſtea repullulet, non propterea aliarum præcedentium cauſarum tanquam continentis cauſæ parentum inueſtigatio negligenda. Quoties enim longior quædam continuatio ſeriesque cauſarum exiſtit, vt alia ex alia naſci & exiſtere videatur, & omnes inter ſe aptæ connexæque videbuntur, tanquam conſpirantes in cauſa continentis affectusque ab ea naſcentis generationem, tanquam in commune quoddam opus, ſuo quæque ordine excutienda ac demenda, & ab ea curationis exordium duci debet, quæ ortu prima, ſed inuentione poſtrema videatur. Nam in curatione, ratione, & ordine ſuſcepta ita captari debet conſilium, vt sæpè id negligatur quod poſtremo loco duxeramus faciendum. Alioqui fruſtrà in tollenda continente cauſa laborabitur, cùm ea nimium occulta, contumaxque ſit, & cùm à primis aliis cauſis pendeat, harum demolitio illius euerſioni antepoſenda eſt.

Ita coniectura artificioſa, quam *συναγωγή* Galenus vocat, aſſequi oportet, primum mali fontem, & in eum digitum immittere. Quod vt exemplo pateat, eſto aliquis, cui æſtuans ſit ventriculus, & prætereà acribus, piperatisque, & ſemiputribus caſeis sæpè vtatur; vnde putrium bilioſorumque humorum colluuias: ab ea obſtructio, ab obſtructione putredo, à putredine quoque febres. Sit ita fanè, viſu medicamentorum putredinem emendes, obſtructionem liberaſ, an propterea febris illius ſcaturiginem, primumque principium tolles? Itaque ad ventriculi intemperiam corrigendam erit veniendum, immò prauum illud alimentum cauſæ externæ catenus rationem habens erit adimendum; fruſtrà alioqui de tollenda febre ſudabitur.

In hac noſtra muliere affectus qui occurrunt, ſunt ſummus

oris fœtor, febris hectica putris: renum abscessus quidam: totius quoque corporis præter rationem consumptio. Hic analyticâ methodo vtendum ad sedium affectarum notitiam. Hæ autem dignoscuntur aut signis syllogisticis, aut pathognomonicis, aut consequentibus, aut excretis. Excreta autem vel partium ipsarum partes sunt quæ ab iis defecantur, vt pulmonis frusta; vel quæ in ipsis continentur, nonnunquam aliquid quod morbosam dispositionem sequitur, vel solam, vel semper, vel vt plurimum. Ac in affectorum locorum inuestigatione tria maxime sunt aduertenda, & tanquam canones proponendi ob oculos, quos semper intueamur: *Locus, Affectio & causa, Accidens.*

Quæ tria cum animo comprehensa erunt legitimo ordine ad affectarum sedium cognitionem deueniemus. Ac locus ita sese nobis insinuat. Si affectio esset in cerebro (exempli gratia) vel per consensum fieret, vel per protopathiam. Si per consensum, fugacia essent symptomata; si per protopathiam, vel intemperie laboraret, vel solutione continui, & sic talia aut talia occurrerent. Idem de hepate sentiendum, & suis se signis ostentaret morbus, tum sedem, tum affectionis ideam indicantibus. Affectus & causa ita veniunt à nobis excutienda. Si inflammatio esset, quæ sese offerrent eius essent generis; inflammationis enim consequentia hæc sunt: si scirrhus foret, talia sequerentur; si inflammatus esset pulmo, eiusmodi essent symptomata & signa, quibus notitiam ipsam consequeremur. Ab accidentibus autem ita eruitur cognitio rei: Dolor est eiusmodi, hoc itaque denotat: Aphonia est, necesse igitur id subesse, morsus est orificij ventriculi, illinc aut inde contingit.

Quod in nostra muliere exerceri debet: fœtor est oris, ergo aut à cerebro est, aut à pulmonibus, aut à ventriculo, aut à præcordiis. Si à cerebro est; à destillatione & rheumatismo est; ac credibile esset tussiculam adesse. Nam quæcumque materia est quæ fœtorem habet, ea putris est; si putris, exulceraret, ac proinde mok sta foret aut œsophago, aut tracheæ arteriæ. Si huic, tussis esset; si illi, praua chylosis fieret, à praua chylosi fluores alui, deprauatio omnis alimenti, extenuatio. Si à pulmonibus est, aut vlcus, aut siderationem thoracis significat. Si vlcus, argumenta iam pridem innotuissent: at nulla hæctenus. Si sideratio esset, non tam diu cum affectum pertulisset. Si à ventriculo est, per deprauationem alimenti, assumpto cibo cessaret fœtor,

vacuo ventriculo appareret. Nam inanito ventriculo fumi sursum efferuntur, qui graueolentiam afferunt. Quod multis contingere Aristoteles in Problematis scribit. Credibilis est eum foetorem & à thorace esse, & à ventriculo. A thorace esse potest, non concepto vlcere vlllo in pulmonibus. Etenim verum id est quod scribitur à Galeno, in partibus ipsis citra inflammationem, tumorem, aut obstructionem vitium concipi, quod à tota substantia dicitur. Quod & in pulmonibus verum esse potest, cum fieri possit vt proprio quodam pulmonis vitio, & ob coactionem humidioris materiae spiret aura foetens. Tamen si vitium esset totius substantiae in pulmonibus, credibile non esset eam tandiu vixisse. Ac Gordonius annotauit oris foetorem à pectore nunquam curabilem esse. Quod bifariam potest intelligi, aut quod foetor à thorace vlcus, aut quid simile significet & iam inueteratum, vnde necessario interitus consequatur. Nam sputum foetens, mortem in propinquo significat: Aut quod cum foetor est à pectore, ob remediorum difficilem ad pulmones penetrationem, causa illius foetoris immedicabilis manet. Idem autor communem quandam foetoris oris causam memorat humorem phlegmaticum. Nam nec humor biliosus ita aptus est, nec melancholicus, cum ille sua acrimonia & calore putredinem facile arceat, hic suo acore contra foetorem istum sese quodammodo obfirmat. Vnde quibus foetor oris est, iis & palatum, & dentes quodam mucroesunt oblii & infecti. Quod huic mulieri contigit. Incredibile enim dictu est quanta copia coenosi humoris quotidie in os recurreret: quod tetrum humidumque halitum à pulmone aut ventriculo potius elatum indicaret. Nam qui à pulmone est, exhalationem refert potius: qui à ventriculo & praecordiis, vaporem & halitum. Credibile in hac muliere à vapore potius quam exhalatione, declarat satis copia excrementi. Ac quinque de causis phlegmaticus humor omnium facillime foetorem inducere ita colligitur: Prima, quia frigidus, & ideo facile suo genuino calore destituitur. Secunda, quia humidus, quod facilem ad putredinem concipiendum inclinationem affert: Tertia, quod omnium facillime (ratione copia, est enim multus, & superfluus in corpore) rheumatismum faciat: Quarta, quod omnium facillime ratione prauae dietae, quam quotidie instituere videmur, accumulatur ac succrescat. Quinta, quod post sanguinem abundet maxime.

Et annotat idem Gordonius, foetorem à ventriculo non esse continuum, quòd assumpto cibo paulùm quiescat: Cùm à pectore continuus est, & vlcus pulmonis significat, & lethale est. Quod non probabile esse satis abundè paulò antè indicauimus, nam fieri potest vt in pulmonibus putrescat materia exitum nõ habens, quæ oris foetorem afferet.

Mirum tamen esse possit, cur in febribus halitus non foeteat, cùm pituitosus humor sit, qui putris sit, hinc efflatio putris esse debet, & anhelitus: si quæ prius dicta sunt, vera existant. Respondet Gordonius, bisariam fieri putrefactionem; vno modo per ebullitionem & incendium quoddam à calore præter naturam: & ea putredo non inducit foetorem, cuius generis esse solet in febribus: Et alia est per substantiæ corruptione. Sic in febribus cùm foetor anhelitus est, mors significatur, quòd non solum humida substantiæ ebullitio significetur, sed propriæ substantiæ corruptio. Sed pace tanti autoris dicam, hæc minus congruè, verèque dicta sunt. Nam quis dubitet in febribus continuis, putridis, aut intermittentibus non simplicem esse ebullitionem? Nonne excretos humores sursum deorsumve in putridis febribus foetidos, corruptosque videmus? Et tamen in iis facta est simplex ebullitio, per Gordonium: Quasi verò cùm foetor aut à pulmonibus, aut à vetriculo est, maior sit (manete præsertim vita) propriæ substantiæ corruptio, quàm in febribus putridis in quibus excretiones sæpe cadauerosæ & putres admodum apparent? Non est credibile, nam si halitus foetens à ventriculo manans, tantam corruptionem significat, quomodo tandiu maneret vita? Respondeat Gordonius de sudoribus, in febribus præsertim pituitosis manantibus, tam graueolentibus, vt vix quisquam eos ferat? & tamen non foetet anhelitus. Itaque alia quærenda est distinctio. Nam non est dubium quin humores, si præsertim pituitosi sint, à calore præter naturam multum corrumpantur, & non tantam acquirant malam qualitatem quanta requiritur ad foetorem oris. Cur ergo, inquires, non foetet os? an quia simplex ebullitio, vt vult Gordonius? Nequaquam, sed quia humor qui febres committit, conclusus est in visceribus, non autem in partibus thoracicis, aut capite, aut ventriculo, aut ore: E quibus partibus necesse est spirare aliquid ad foetorem oris. Quod si qui humor febres committit, in iis partibus contineretur, dubium non esset quin foetorem oris ac-

cerferet. Nam si conclusus humor in præcordiis leipothymias
 ob tetrum vaporem, cardiogmos mortem denique inferat, cur
 non in superioribus partibus contentus foetorem afferre possit?
 Si per sudores erumpens tenuis eius pars, aut per vrinas, quæ
 sæpe foetentes sunt admodum, tetrum vaporem feriat sensus no-
 stros, cur idem humor sursum repens, & thoracicas partes oc-
 cupans, non tetrum odorem oris inferat? Hydropici graueolen-
 tissimos in abdomine humores continent, nec tamen tetrum
 spirant: Ergo quia humor in partibus ventris conclusus est, &
 non partes superiores capessit. Vnde videmus mulieres quibus
 suppressi sunt menses, aliquando tetrum spirare, & colligimus
 eas grauiter ægrotaturas, quòd tantà sit humoris putrentis co-
 pia, vt non solum partes inferas, sed & superas occupet: in su-
 peris tetrum halitum, in inferis febres accersit. Ergo idem hu-
 mor, & eius putredo non distinguitur. Quod autem in febribus
 maximam partem nec sudores graueoleant, nec halitus pro-
 pterea fit, quia maxima febrium pars à bile est; quod Hippo-
 crates non minùs breuiter quàm verè scripsit; quanquam hoc
 ab eo dictum plerique malè feriat homines non intelligunt.
 Bilis autem aut flaua, aut acida: neutra tetrum spirat ex se, aut
 illud paucum admodum. Contrà in quotidianis & pituitosis, &
 vetularum febribus, & malus gustus est (vt vocant) ob tetrum
 halitum & putrentem in ventriculo humorem, & foetentes sunt
 sudores. Quod arguit non modò magnam humiditatem requi-
 ri ad tetrum halitum, sed & occursum materiæ ad partes oris,
 siue cerebrum sit, siue pulmo, siue ventriculus. Quod autem
 humores biliosi, aut melancholici non ita tetrum ex se emittant,
 vt & pituitosi, satis apparet sensui, ex alliis, cepis, pipere, syna-
 pi. Nam & allia & cæpæ, & piper ferè eodem gradu calidà esse
 veteres autumarunt: cur tamen ex iis alia tetrum spirent, alia
 non? Id fieri propterea asseuerant veteres, quòd allia, & cæpæ
 multà humiditate prædita sint, quæ facillimè digeratur ac cor-
 rumpatur, nequeunte calore illam coërcere ac mitigare: idè-
 que graueolent: à pipere autem & zinzibere nihil foetidum
 exhalet, quòd non tanta infit humiditas, & quantula est cumque
 facillè superetur à calore. Quod idem humoribus contingit.
 Nam biliosi humores analogiam quandam habent ad piper &
 zinziber, pituitosi ad allia & cæpas: & quæ humidiores sunt tem-
 peramento, & calore mediocri, maximam partem hircum re-

dolent. Et mulieres vetulæ, quibus superfluit multa humiditas, spirant malum odorem, & anhelitu asthmaticos pueros faciunt: Et quibus gingivæ & os humidius est, iis teter odor est. Quo fit vt concludamus multam humiditatem requiri ad foetorem oris, & præsentiam illius humoris in partibus ori vicinis, alioqui conclusus manebit humor, & nil tetrum in os mittet; vt malè concluderit Gordonius in febribus putridis non tetrum esse halitum; ob simplicem humoris ebullitionem: & quia qui illum halitum commissurus est, aliã malam qualitatem ab ea quam febrilis materia nacta est, concipere oportet. Idem est putredinis modus, vt diximus. Quãquam non negamus fieri posse vt in foetore oris, præsertim à malè affectis pulmonibus non adesse solùm putredinem simplicem, sed alienationem planè à temperamento, & perfectam *diapnoxi*. Quod nos obseruauimus in auriga ad ripam Sequanæ, cuius ex ore foetor (incredibile dictu) totam domum inficiebat, & cadaueyosum olebat. Vnde non ita longè post fato concessit, siderato toto pectore. Et hæc sunt quæ contra Gordonium agitari potuerunt: cui tanquam hominidoctissimo habenda gratia, quòd disputandi fenestram aperuerit.

Atque vt ad rem redeatur, de remediis illius foetoris pauca dicenda. Gordonius causam maximè constituit humorem pituitosum Mesuæus cholericum quoque constituit; vnde pro materiæ biliosæ conditione instituit ea quæ humectandi vim habêt, & contemperandi; vt est syrupus de pomis, & rob, de acetositate citrij, diacytonites: At in corporibus biliosis, ficcis, in quibus abundat calor febrilis, videtur potius in contemperacionem versandum. In materia phlegmatica, ea quæ calfaciunt, instituuntur; vt confectio tryphera quæ ex aromaticis constat, caryophylli, cypperus, lignum aloës, calamus aromaticus, & quæ sint eius generis.

Ergo cum febris illam mulierem exerceat, foetor oris, inappetentia, vrinæ ardor quidam, atque vrinæ veluti purulentæ funderentur, quanam methodo vtendum? cum quo agendum priùs? An affectus est compositus, an complicatus? de iis breuissimè dicendum.

In morbis omnibus aliquid est quod sub sensum cadit, aliquid verò quod sensum fugit. Id quod sub sensum cadit, sym-

ptoma est; quanquam sæpe est inuolutum ac implicitum, vt an huius, an illius morbi sit tertò definiri non possit. Si symptoma sub sensum cadit, nullo est opus signo quo sese nobis detegat. Sensus enim fidem facit. Id quod sensum fugit, causam morbi est, & morbus ipse: Morbus quidem generali quodam modo sese nobis ostentat, nimirum actionis læsione: sed quia occultus sæpe est, & causa recondita, intusque latens, idè concurrere debet signum quod vtrumque detegat, atque demonstret. Signum enim est id quod sensibus nostris obuium factum, aliud quippiam latens & occultum comitatur, id enim illius signum censetur. Symptoma autem, quia conspicuum est, interioris, occultique morbi ex quo fluxit, expressum est signum. Quia autem similitudines bonis & eruditis Medicis imponunt sæpè, ob morborum, causarumque complicationem, ac confusionem; idè in signorum ac symptomatum dignotione accuratos esse oportet: item in morborum aut connexionem, aut complicationem Maximum autem momentum habent signa in salubria in morbis, quod & speciem morbi, & sedem, & causam alia atque alia designent.

Porrò morbus aut vnus est; aut multi: vnus simplex, aut compositus. Simplex aut solitarius, cum nulla efficiens causa adest, nullumque graue symptoma quod curantis consiliū ad se reuocet; vt Intemperies simplex, Comitatus, quem continens causa intus fouet; vt obstructio, aut quem horrendum symptoma comitatur, vt cum morbo dolor ingens afficit. Compositus morbus est, qui ex multis eidem parti connexis constat. At multi morbi sæpius vnà nos exercent. Eos autem aut implicitos, aut connexos, aut coniunctos, aut disiunctos vocamus. ² Connexi, coniuncti, & consequentes idem significant. Disiuncti coniunctis sunt contrarij. Impliciti & Coniuncti distinguntur. Impliciti dicuntur cum variæ quidem partes afficiuntur, sed quæ in communem actionem omnes conspirent; implicantur enim, & communia elucunt symptomata, quæ que vix distinguas an id potius quam illud laboret. Vt cum difficilis est respiratio & tussis, quia hæc & in pleuritide, & in peripneumonia promiscuè incidunt, ea per se non satis indicant an costa, an pulmo afficiatur. ³ Sunt enim *ὁμοῖον*, siue *ὁμοειδῆ*, vt loquitur Galenus: item & sputa, quæ tanquam aliquid indicatura excernuntur, sæpe difficultatem

iudicandi afferunt, an hæc potius quam illa pars afficiatur, quod promiscuè indicent & costarum, & pulmonis, & asperæ arteriæ affectus, vt Galenus loco supra adducto probè recenseret. Affectus autem complicatos indicat hoc exemplū, si quæpiam sit ceratoïdis erosio; rhagoïdis exitus, pupillæ distortio, & apparens suffusio, tamen si omnes hi affectus vno eodemque tempore consistant, non tamen morbum oculi compositum efficere dicuntur: sed sunt morbi impliciti, id est variis partibus insident, quarum tamen in vnum opus est conspiratio. Sed cum morbus compositus dicitur, in eadem parte sunt multi morbi simplices: vt cum hepar intemperies sicca & calida cum tumore aliquo occupat, quia vni eidemque parti illi multi morbi inbærent, morbum compositum constituunt, non simplicem. Propterea que impliciti & compositi morbi eo tantum discrimine distinguuntur, quod cum simul simplices & multi sint morbi, si variæ partes in vnam communem actionem conspirantes occupantur, tunc morbi impliciti vocabuntur: Si autem vna tantum pars afficitur (nomine partis tamen non ita in angustum structumque adducta) tunc compositus morbus dicitur. Vt pleuritis & asthma simul existentia morbos implicitos efficiunt, quod vni eidemque functioni incommodent. Et ex recentioribus quidam morbos compositos ab implicitis accuratè distinxerunt, quod à paucis obseruatum viderent hoc discrimen: quod tamen magni interesse existimarent. Nam quod ad curandi consilium & indicationes pertinet, in composito morbo scopum vnum curationis proponi volunt, in complicato & inuoluto morbo diuersum: Exempli gratia, in tumore præter naturam & intemperies est, & vitium conformationis, & solutio continui. Huius tumoris cum cura suscipitur, tamen si varia sese nobis offerant, vnus tamen scopus est curationis, nisi fortè quosdam particulares effingere velis. At cum luxatum est brachium, & iuncta est inflammatio, & partis conuulsio, non hunc morbum compositum dices, sed implicitum; propterea que diuersi curationis scopi proponuntur. Hoc discrimen non agnouit Galenus disputans de morborum differentiis, confunditque morbos compositos & complicatos. Rectè quidem distinguit morbum partis similis à morbo partis organicæ, siue simplex, siue sit compositus. Vt tunicæ ad-

Quid
 propriè
 implicitus morbus.

Cap. 1; de
 morbor.
 differ.

natae inflammatio, non oculi morbus per se tanquam totius instrumenti dicitur, sed primùm & per se tunicae adnatae dicitur, secundò totius corporis ipsius oculi tanquam instrumenti. Nam partium simularium morbi per se, ex euentu tantùm toti instrumento accidere dicuntur; siue morbi ipsi singularum partium sint simplices, siue compositi; vt cùm in pupilla est contortio & inflammatio: Et morbus compositus totius instrumenti bifariã dicitur: vel cùm vna tantùm pars morbo composito afficitur; tunc enim totius oculi affectus dicetur, sed tantùm secundariò: vel cùm partes omnes oculum constituentes simplici morbo laborant; tunc enim ij omnes affectus morbum vnum compositum oculi totius dicuntur constituere. Sed recentiores non compositum morbum, sed contra Galeni mentem morbos implicitos vocant. Galenus de ea re nil primum statuit, sed aliorum assert opinionem. Nam cùm vnguis & lippitudo est, cùm erosio corneae, cùm vnea prolabitur, hoc totum vocant quidam morbum oculi compositum, alij diuersarum partium diuersas affectiones. Et vtrorumque probabilem sententiam asserit, mirumque est quomodo dicat Galenus nihil interesse siue hoc totum morbus compositus dicatur, siue plures morbi diuersis auxiliis egètes, quoad pertinet ad curationem. Falsum enim hoc est. Cùm autè satis abundè demonstraerimus interesse plurimùm ad curationem si morbus compositus dicatur, & si morbi complicati; in his quippe & illis diuersi omninò scopi sunt. Sed Galenus non ita exactè intelligendus. Nam ex eo appellandi morbum oculi compositum occasionem sumi vult, quòd cùm oculus vna sit pars ex particulis multis constituta, quae omnes ita congruunt vt in vnum opus conspirent; propterea hæc simplicium morborum congeries & syndrome non ineptè compositus oculi morbus dicitur. Sed clarioris doctrinae & intelligentiae causa appellentur multi morbi particulares & impliciti: Vt nomen [impliciti] diuersas morborum ideas per se exhibeat: quomodo Galenus aliud esse docet febres compositas, & implexas, siue implicitas. Galenus autem in illo libro de differentiis morborum, postquam aliorum sententiam proposuit, vt eos inter se conciliet, videtur quid sentiat aperire. Quod vt faciliùs præstet, à morbis simplicibus incipit, quorum quidam totius oculi primò esse dicuntur, alij secundariò tantùm, & *vt supra libello.* Exepli gratiã: Suffusio totius instrumenti morbus est per se: at cera-

*2. de diff.
ferens.
febris*

170. CONSILIORVM MEDICINALIVM
toïdis exulceratio, instrumenti morbus esse dicitur ex euentu
tantum; per se enim ad corneam tanquam similem partem re-
fertur. Sed longè aliud statuit discrimen de morbis compositis.
Nam ex compositis morbis quidam sunt proprii totius instru-
menti, nempe oculi, primò & per se: alij ex accidenti; vt, adna-
tæ inflammatio propria est tunicæ affectio, ideò ad totum ocu-
lum non refertur, nisi secundariò: Ergo, vt vult Galenus, pona-
mus plures oculi partes simul vnâque affici, vel vnâ tantum
partem, vt patet in inflammatione tunicæ adnatæ: cum vnâ tan-
tum pars, ea affectio dicitur morbus compositus vnus partis
per se, & totius instrumenti secundò tantum: cum multæ simul
oculi partes, morbus dicitur totius instrumenti primò & per se,
ait Galenus: quod falsum videtur. Nam ceratoïdis erosio, rha-
goïdis exitus, pupillæ distorsio, morbi sunt singulares, multas
oculi simul partes (si fors ferat) occupantes, primò per se, an-
quia in cumulo sunt, propterea dicentur primariò referri ad to-
tum instrumentum; quod vult Galenus: Si ceratoïdis erosio per
se ad partem vnâ referatur, & pupillæ distorsio per se ad alte-
ram partem, secundariò autem vterque affectus ad instrumen-
tum totum referatur; cur potiùs cum singulæ per se æstimantur
ad partes suas primò & per se attribuuntur, coniunctæ autem
ad oculum totum reuocantur? Sed dicet quispiam: Cum Ga-
lenus vult morbum compositum totius instrumenti vocari, cum
multæ simul partes afficiuntur ipsius oculi, non hoc est intelli-
gendum cum partes multæ afficiuntur affectu sibi proprio, pe-
culiarique: sed affectu qui per se & primò & simpliciter ad to-
tum oculum referatur. Nam suffusio per se ad oculum refertur,
sed si ad suffusionem alius morbus generalis oculi, vt vnguis, &
rhœas accesserit, hi omnes morbum compositum efficient to-
tius oculi primò & per se, quia singuli per se morbi priùs in se
considerati ad totum oculum referebantur. Sed Galenus non
vult tantum morbum totius instrumenti vocari, cum omnes,
aut multæ simul partes afficiuntur morbis, quorum singuli pri-
mò erant totius instrumenti; vt suffusio, vnguis, rhœas: sed cum
morbis quoque detinentur, qui singuli in se spectati peculiarem
ad partes singulas rationem habent, & secundariò tantum cum
foli spectantur, ad totum instrumentum referuntur. Verba
autem Galeni hæc sunt loco supraposito: *Cum plures eodem tem-
pore partes oculi morbo aliquo afficiuntur, morbi ipsi primò totius instru-*

menti esse dicuntur, atque eo magis si unusquisque morbus antè erat primò & per se totius instrumenti. Hæc verba, atque eo magis, indicant affectiones aliarum partium peculiare, vt distorsionem, exitum, erosionem commixtas inter se posse totius oculi primò & per se morbum compositum efficere. Vnde antea dixerat nihil interesse an quis dicat eas affectiones (quarum vnaquæque propriè & primò ad oculi partes, non autem oculum totum referretur) morbum compositum oculi efficere, aut multos morbos aliarum partium. Sed tandem vt hanc nos disputationem terminemus, quoniam fortè noluit Galenus rem tam exactè disquirere, dicemus quid nobis videatur de morbis compositis & complicatis. Quod tamen non expressit Galenus, licet tamen id ipsum ex illius scriptis elicere & venari: vt non sit cur ea in parte recentiores sibi palmam decideri oportere existiment, ac si eorum hoc esset inuentum, & huius tantæ rei autores essent ac principes. Cum multi morbi occupant varias oculi partes, siue per se sint simplices, siue compositi, vt tunicae inflammatio, aut illi morbi cum simplices considerabantur ad partem hanc aut illam peculiariter referebantur, aut generaliter ad oculum ipsum totum. Puta vnguis simplex morbus, & rheas ad totum oculum attribuitur, nomenque dat: Ergo si multi tales morbi complicantur, morbum compositum totius oculi primò per se efficient. Sed pupillæ contorsio, rhagoidis hic aut ille affectus, cum secundò tantum ad instrumentum totum referatur, si multi tales morbi peculiare in hac aut illa parte, peculiarèque denominatione inducentes, complicantur, morbum efficient compositum totius oculi: sed vel dices istum morbum compositum non propriè & primò totius oculi dici, sed secundò tantum, quod seorsim spectatæ affectiones hæc aut illas partes attingerent: vel potius vocabimus multos morbos multarum partium, vel implicitos morbos vni oculi functioni generaliter officientes. Sed hæc sufficiunt. Ergo morbi multi aut impliciti dicuntur, aut conexi, seu consequentes, aut disuncti. Impliciti, vt dictum est, sunt, quorum ea est ratio, vt per se distinguantur: sed qui tamen ita inter se conspirant, vt vni eidemque actioni incommodent: vt de morbis vnam vnius oculi actionem lædentibus dictum est. Item pleuritis & asthma, quia duo sunt affectus partium respirationi dicatarum impliciti morbi dicuntur (cum simul inuadunt): quia communia quæ dā habent symptomata, vt tussim, & diffi-

cilem respirationem. Connexi, & consequentes idem significant recentiorum opinione; quanquam nomen *Consequens* paulò latius manat quàm *Connexum*. Exempli gratiâ: Morbi cōsequentes seu connexi dicuntur, quorum vnus posterioris est causa & autor, & vterque morbus simul manet: Vt cū affectus est ventriculus, & ei affecto caput condolet, & morbi consequentes, & connexi dicuntur. Quod fit aut propter morbi naturam, vt cū pleuritis necessariò febrem continuam aduocatum habet, & dicuntur morbi consequentes & connexi: Aut ex partium conditione, quia quæ sunt propinqua, quæque communia, ea primum & maximè affici solent, idque aut generis similitudine, aut vasorum communione, aut operis societate, vt passim annotauit Galenus. Cū itaque ea est morbi ratio, vt vnus alterius causa sit & autor, atque ita vt nisi adempto vno, alter non tollatur, propriè connexi morbi illi dicuntur: sed in ratione consequutionis, quia euenire potest vt commutatione quadam morbus alteri succedat: vt cū peripneumonia pleuritini sequitur, hīc non connexi, sed consequentes dicentur. Obseruatur siquidem consecutionis ratio, ac connexionis nulla est. Sic nomen *Consequentis* longiùs patet quàm *Connexi*.

De connexis, consequentibus hæc dicta sint. Sed vt scrupulosus è cotibus tandem oratio nostra enatet, de disiunctis separatisque morbis nihil dicemus, quod satis disiuncti intelligantur, qui in separatis partibus versantur, quarum non est ea communio quam supra diximus. Qui morbi in ea muliere, cuius gratiâ hoc susceptum est, satis innotescunt. Nam & in ore fœtor erat à prolapsu putris pituitæ à capite, adiuuante quoque tetra exhalatione à partibus inferis: & renum male affectorum ac purulentorum magna quoque fuit suspicio. Atque omnia ita erant occulta, vt morbus potius in diaphthora consistet, quàm in manifesta aliqua intemperie diceretur. Febris erat lenta, cuius seminarium aut renes malè affecti erant, aut mesenterium semipatre. Illud obseruatum in ea quod 6. Epid. scripsit Hippocrates: *Omnis extenuatio laxat cutim, deinde distendit: Resectio verò distendit, deinde laxat.*⁴ Extenuationis causæ, alimenti penuria, exercitationes plures, vigilia, agitationes, dolores, morbi colliquantes, euacuationes, prauitas humorum in vasis, vt narrat Galenus in historia de muliere extenuatissima, 6 Epid. In hac muliere corruptionem esse aliquam testantur omnes ex

cretiones omni ex parte. Accedit quod in omnis morbi diu-
 turnitate per Galenum, comment. in aphor. *Acuti morbi in
 quatuordecim diebus, &c.* est obsidio partis alicuius, cuius occa-
 sione fouetur tam longus morbus. Et cum caloris & frigoris
 magna sit vicissitudo, declaratur vaporis suscitatio è materia
 corrupta. Sic Galenus docet in Epidemiis. Sic morbus latens
 est ex insidiis inuadens, & corpus frangens. Immo annota-
 uerunt quidam ex veteribus, in vetulis sæpe ita humores cor-
 rumpi, vt expiret ab iis teter vapor, qui pueros teneros asth-
 maticos reddere possit. Quæstio est, an esset febris hectica.
 Aliquando refrigeratio contingebat, sed recalfactio illa so-
 lemnis, quæ in nutritis hectis apparet, non aderat. Si recal-
 factio non aderat, an non hectica? Erat hectica putris, à qua
 non excluditur leuis perfrigeratio, quæ *μεολιξία, ἀσπίφωσις* di-
 citur. Aut dicemus manifestam calfactionem in iis apparere
 in quibus viscera sunt robusta, non autem si vieta & efflemi-
 nata sint. Hæc omnia indicabant cogitandum potius esse de
 prognosi, quàm de vita protrahenda. Salutis enim exigua ad-
 modum spes supererat. Nam cum morborum securitas aut
 ex parte ipsius affectus petatur, aut corporis subiecti, aut vtri-
 usque: quodlibet horum spectaretur, de salute nil sperabatur.
 Morbus autem sui indicationem exhibet, aut *τῆ ἐνθελαί, aut κακότητις*.
 Subiectum, cum vis aliqua est restibilis: nam cum specie &
 ingenio morbus malus est, & subiectum malè constitutum,
 malè præfagiendi occasio sese offert. Et cum omnia in anci-
 piti forent, de que funere potius quàm de vitæ sænore cogi-
 taretur, in eam itum est discessum que sententiam, vt oppu-
 gnanda in putredine laboraretur, & viribus adaugendis. Ita-
 que ratione putredinis breues & faciles ex rheo purgationes
 sunt institutæ. Vt autem corpus & vires recuperaret, serapiū
 instaurans ex testudinum carne est præscriptum.

His ita institutis, domitā paulum putredine, ne conta-
 gione putriū humorum lactis asinini bonitas superaretur,
 consultum est vt exactis aliquot diebus ad ipsius lactis vsum
 veniretur. Hoc ita factum est. Recreata natura surrexit,
 morbumque occultum tandem vicit, & præter omnium Me-
 dicorum opinionem superfuit; Vt mirum non sit si præiudi-
 cata Medicorum iudicia sæpe non ita magni fiant, cum ab iis
 prouocare & liceat & conueniat.

ANNOTATIONES.

1. *Comitatus morbus, ut cum febre fouet atque alit obstructio continua, comitatus est morbus.*
2. *Quaquam multi morbi consequentes dicuntur, qui necessario connexi non dicuntur, ut pleuritis sequitur peripneumonia. At propterea connexi non dicuntur morbi.*
3. *Cum signa sunt communia, & haec & illa significancia, oportet Medicos diligenter suam intelligentiam exercere, ne decipiantur.*
4. *Si corpus capit multum alimenti, & tamen non bene nutritur, vel corrumpitur alimentum, vel non distribuitur, vel consumitur ob ingentem calorem naturalem.*

Consultabant Riolanus, Magnus, anno 1573.

CONSILIVM XLII.

De pulmonum affectibus, in quo queritur, an ad pulmonum morbos quadret tenuis diæta.

HIPPOCRATES optimus instituendæ diætæ architectus, in libris de Diætâ acutorum, disputans de pleuritide, exactam diætam præscribit: Immo primis diebus ita accuratam illam esse vult, vt quandiu morbus siccus manet, tenuissimè viuendum censeat. Siccum autem morbum vocat, cum nil dum excernitur materiæ morbificæ, cum sputum in os nondum occurrit. Quinetiam tantum periculi creari vult vsu solius cremoris ptisanæ, sicco manente morbo, vt inde homines suspiriosos fieri asseueret. Et quod de pleuritide dictum est, idem sanciri debet de omnibus morbis acutis. Pleuritis enim pro omni morbo acuto in exemplum subiicitur. Item cremor hordei pro alimentorum ceterorum examine proponitur. Et quoniam inflammatio pulmonis ex acutissimorum morborum numero censeri debet, quæstione digna res proponenda, an ea lex quam Hippocrates in pleuritidis cura sanciuuit, tenenda, confirmandaque in inflammatione pulmonis? Duabus enim de causis idem iuris

esse videtur. Prior est, quoniam Peripneumonia acutissimus morbus est, citò litis controuersiam dirimens: Posterior, quoniam, ex sententia omnium veterum & recentiorum, eadem diætæ ratio & therapias seruat in curanda peripneumonia & pleuritide: immò eorum plerique leuiter tantùm attigerunt de peripneumonia, & peculiare caput non descripserunt, volentes peripneumoniæ curandæ rationem ex capite de Pleuritide depromi. Atque hoc non ita relinquendum est intactum, cuius explicatio & enodatio plurimùm profectura est ad curationem morborum, quam omnes diligenter, & prout nostri muneris est prosequi debent.

Galenus locus obseruatione dignus est. *In pulmone, (ait) spiritus tenuis est, & leuis, & quem coerceri oportet, sanguis verò crassus, & quem in singulas pulmonis particulas dimitti opus sit.* Nam pulmo copiosiori alimento eget quàm partes ceteræ, tribus aut quatuor de causis: Prima est motus perpetuus: secunda, caliditatis copia. Caliditas autem & propter cordis viciniam, & propter motus assiduitatem & constantiam Addo, & natiuam, vernaculamque caliditatem, cum & spirituosa sit pars, & rara. Et paulò post, tria adiuenta (ὀπκιώεις Græci vocant) ad affluentiam alimenti ad pulmonem ipsum, idque necessariò. Primum copia vernaculæ caliditatis, quæ efficit vt alimentum omne in partes minimas comminuatur, diffundatur, ac citiùs euaporetur. Alterum, pulmonis dilatatio est in inspirationibus, quæ efficiat vt ex densissimis instrumentis (cuiusmodi est vena arteriosa) violenter quippiam arripiatur. Tertium ac omnium maximum ab eo sanguine qui soli pulmone a corde mittitur priùs in illo planè confecto atque extenuato. Tertia hæc periodus implicita est atque obscura, nec intelligi potest. Nam propositio illa, *Ab*, in textu Græco non reperitur, & interpres malè conuertit genitiuum Græcorum absolutum. Ita enim legitur in Græco, *πρὸς τὴν καρδίαν ἀπὸ τῆς καρδίας ἀπορροήσῃς ἐν τῷ πνεύμονι τὸ αἷμα πρὸς ἀρχὴν ἐν ἐπιπέδῳ καὶ λεπτοσμίῳ καὶ λελεπτοσμίῳ.* Ita interpretor, Tertium autem, idque maximum (supp. ad affluentiam alimenti ad pulmonem pertinens) est quod sanguis à corde mittatur ad solum pulmonem exquisitè in illo priùs elaboratus ac attenuatus. Et cum dicit tria esse præsidia ad affluentiam alimenti ad pulmonem, hoc bifariam potest intelligi, vel quòd tres illæ causæ recensitæ hoc efficiant vt multum alimentum affluat: vel potiùs cum præcedentibus

hæc connectantur, hoc efficiunt, vt multùm affluere debeat. In utroque sensu periodus hæc intelligi potest. Redeamus ad rem. In pulmone (ait) spiritus tenuis est, sanguis crassus & grauis, quem ad omnes pulmonis partes ferri oportet; siquidem pulmo ob causas tres multo alimento præ ceteris partibus indiget. Quorsum hoc scribit? Vt occurrat obiectioni eorum qui tueri velint frustra à natura constitutam esse venam arteriosam, & arteriam venosam. Nam si spirituofus halituofusque sanguis in pulmone contineatur, necesse est eum arteriâ durâ robustâque contineri, alioqui effluet vt in aliis partibus continetur. Item si crassus sit sanguis, & grauis, vtpote nondum elaboratus, quid attinet venam arteriosam architectatam fuisse, cum simplex tunica, vt in partibus aliis fuisset satis? Tacitè autem fatetur Galenus eas rationes probabiles esse, vt conuincatur frustra machinatam fuisse naturam ista vasa ab aliis eiusdem generis diuersa. Nam in partibus aliis arteria dura est, ne citò effluant spiritus per corpus arteriæ: mollis vena, ne diutiùs insitât sanguis (siquidem per tunicam venæ nutritio fit, ex sententia Galeni) & ita nutritio retardetur: tamen natura necessitate adducta arteriam venosam, & venam arteriosam est machinata. At ampliorem disputationem de vena arteriosa in locum alium non longè reiciemus, explicantes an legitime, optimâque ratione vena arteriosa à natura sit instituta. Nunc autem quod instituti nostri est explicemus, nimirum copiosiore alimento vti debere pulmonem quàm partes ceteras, & ratione caloris tum sui natiui, tum alieni à corpore cordis mendicati, tum constantis perpetuæque agitationis. Si enim hoc verum est, exquisita diætâ in pulmonis inflammatione non est tuta, licèt morbus sit acutus, quod & à ratione alienum non videtur. At dicat aliquis: Quid tum vero pulmo copiosiore alimento egeat quàm ceteræ partes, an propterea tamen exquisitæ diætæ locus non est in pulmonis inflammatione, vt & in pleuritide ab Hippocrate sancitû est? Nam cum Galenus vsum venæ arteriosæ docet, necessariamque pulmoni alimenti copiâ non vt affectus est pulmo, sed vt sanus, sermo habetur. Nos autem non negamus quidem iniici mentionem de sano pulmone: sed tamen ex ea sententia desumimus postulatum ac hypothesin ad id quod instituimus maximè pertinentem? Etenim diætæ instituendæ ratio reuocari quoque debet ad naturalem symmetriam partium. Nam si in vsurpandis medicamentis dum pars

laborat,

laborat diligenter sanæ partis naturâ ac symmetriâ inquirimus, vt quoad fieri potest maximè parti consulatur: idem in diætâ factitari debet. Illud enim est quod Hippocrates monebat, dandum consuetudini, quod non solum de consuetudine intelligitur, sed de pristina natura partis. Vt si cerebrum laboret intemperie humidâ, & siccam victus rationem instituimus, quæ à nobis siccandi vi prædita diætâ præscribitur, non talis est, qualis in aliis partibus seruetur, quæ minùs humidæ forent. Nam etsi intemperiem humidam in parte humidissima corrigere consilium est, tamen intra limites consistimus. Sic in calida intemperie partium calidarum natura, impensè refrigerare non debemus. Idem quoque in diætâ instituenda obseruari debet. Nam positis in hypothese duabus partibus, quarum vna copiosiore alimento eget, altera non item: In paribus affectibus non par diætâ præscribi debet. Nam in affectibus eius partis cui copiosius alimentum natura concessum est, liberaliores paulò nos esse oportet. In affectibus autem eius partis cui minùs alimentum suppetit, paucos nos contentos esse oportet. Nam vt multum alimentum in aliis requiritur, ita paucum abundè est. Quod & in vniuersi corporis nostri nutritione dum morbo detinemur, obseruari debet. Nam qui paucos contenti cibo dum integrâ fruuntur valetudine, viuunt, in iis nos accuratiores, parciores, restrictioresque esse oportet: sin minùs multo copiosoque cibo vitam propagarent, in iis dum infirmi iacent liberaliores simus ratio postulat. Immò Hippocrates iis congruentibus dum de qualitate cibi scribebat, monuit in diætæ præscriptione deteriore paulò cibum consuetum, suauiore esse ægris magis bono non consueto: adeò nos sollicitos esse oportet, vt & consuetudini, & temperamento, & vitæ instituto aliquid tribuatur.

Itaque si sanus pulmo copiosiore cibo dum sanus est, eget, quàm partes ceteræ, vt hepar, & ventriculus, dum inflammatione tentatus est, minùs exquisita diætâ definiri, describique debet inflammato pulmone, quàm aut hepate, aut ventriculo. Cuius rei confirmatio & fides desumi potest ex Galeni autoritate, si huic ea in parte fides abroganda non est: *Non sicut in iecore & ventriculo, ita in pulmonibus tenuissimo victu utendum est. In ventriculo enim & iecore alimentum coquitur, metusque est ne ipsis plegmonæ laborantibus nutrimentum ritè non concoquatur, & phlegmone augeatur: in pectus vero tantum alimenti iam cocti peruenit, quantum vni*

ipſi particula nutrienda conueniat. Hic locus admirationi eſſe poſſit: Etenim Hippocraticæ diſciplinæ è directo contradicere videtur. Si enim ideò exquisitiſſimo victu vtendum non eſt in pulmonis inflammatione, qui locus morbum acutum producit, quod tantum alimenti ad pulmonem affluit, quantum ipſi conuenit tantum, cur non idem continget in tunicæ coſtas ſuccingentis inflammatione? At in pleuritide accuratam multum victus rationem præſcribit, & dolore præſente, & dum ſiccus manet morbus, non multum dare ptiſſanæ iubet, ne natura à collatione auocetur, ne dolores augeantur, ne anhelofus æger reddatur. Ita enim ſcribit: *Quibus cibus, (id eſt ſtercus) ſtatim incluſus, ſi quis non vacuato ea ſorbitionem aederit, dolorem, ſi a deſt, augebit, ſi non a deſt, protinus inducet, frequentiorque reddetur ſpiritus; quod malum eſt: nempe pulmonem exiccat (quia augetur reſpiratio ab uſu cibi) & fatigat hypochondrium, tum ventrem imum, tum ſeptum tranſuerſum.* Et ob ſimiles cauſas qui totâ vtuntur ptiſſanâ ſeptimo die, vel celerius moriuntur: alij mente laſi, alij ob difficultatem ſpirandi ſtertoreque præſocati. Sed hic locus an alteri ſuperiori contradicit, qui negat Galenus locum eſſe tenuiſſimo victui in pulmonis inflammatione (quod idem de pleuritide intelligi debet, cum Galenus & in peripneumonia & in pleuritide ſiccitatem ex eo iudicet, quod ſputum humidum non procedat) cum hoc loco ne ptiſſanæ quidem locum eſſe neget? Nequaquam hæc pugnant. Sed ex collatione locorum intellecta conceptaque eſſe oportet. Vtrumque conciliabimus, ſi priùs vnum explicuerimus.

Cauſa hæc eſt cur pulmo inflammatus reſpuat exquisitum victum, non autem iecur & ventriculus, quod in ventriculo & iecore cibus coquatur: ſi plenius nutrimentum ingeritur, nec bene coquetur ratione morbi, & augebitur inflammatio. Hęc ratio Galeni eſt. Altera ratio petita ex eodem Galeno, vt antea abunde monuimus, pulmo ob motum perennem, calorem, copioſiore eget alimento quàm partes ceteræ: ſi dum ſanus eſt copioſius cibandus pulmo eſt quàm partes reliquæ, ob eas cauſas, dum laborabit ea conſuetudo, & temperies pulmonis erit inſpicienda. Nam Galenus conſilio niſus Hippocratis, non vult quicquam peccari nec in commoda vniuerſalis nec particularis natura. Et quæ ratio vnius partis, eadem & totius corporis; & quæ totius corporis, eadem & vnius partis. Ita enim ſcribebat Hippocrates: *Qui bis die ciba, i conſuenerunt, bis ptiſſanam dare, &c. COL-*

Part. 32.
Comm. 1.
in lib. de
Diat. a
autox.

Part. 20.
comm. 1.
in lib. de
acutis.

fert statum ægrum cum statu sano (vt ita loquar) Et paulò post: *Inter initia neque multam, neque crassam ptissanam dare oportet, sed quantum & ob consuetudinem, & ne multa fiat vasorum inanitio,ingere conuenit.* Ac si dicat Hippocrates: Etsi principium morbi, aut adiectionem magnam suadeat, nimirum si vigor longè abesse videatur, vt cogere in vigore morbi sufficiat ne in illo cogamur præter rationem accedere ad nutritionem, aut detractionem alimenti, si vigor nempe in procinctu sit, & non est metus læsionis magnæ virium: tamen ita se gerere oportet vel in substrahenda ptissana, vel in eadem aut simpliciter danda, aut augenda, vt consuetudinis ratio habeatur: Huius enim magna vis est, ne aut temerè inaniamus, aut repleamus. Ita enim veteres quidam magnis mutationibus magnas opponere volentes, aliquando perfectam inediam præscribebant, aliquando tantillum dabant alimenti, vt cogerentur tandem cibum in medio vigore morbi adiciere non citra damnum ingens.

Ergo pulmo sanus multo eget alimento. Cùm itaque erit inflammatus, habita ratione consuetudinis, non ita exquisita diæta erit præscribenda. Scitum enim illud Hippocratis 6. Epid. *Attarctio pulmo incendium, euacuatum siccatur somnus multus.* In eius textus enarratione cœcutire mihi videtur Galenus; vult enim coniungi eas duas voces, pulmo incendium; quasi dicat Hippocrates: *Attractio fit cùm in pulmone est incendium.* Hoc quidem verum, sed non est sensus Hippocratis. Itaque sic legendum, *Attractio, pulmo, incendium:* id est, incendium per se attractionis causa est: pulmo autem vna est ex partibus quæ attrahit maximè vnde libet, à capite, à partibus inferioribus, ob calorem, & motus perpetuitatem; quæ duo pulmonem reddunt attractionis capacissimum. Pulmo itaque inflammatus seipso propter phlogosin calidior effectus expetet copiosius alimentum, alioqui arefcet motus perpetuitate, & maiori celeritate propter idem incendiū ichores attrahet à partibus inferis. Quo pacto libris de sanitate tuenda scribit in hominibus biliosis ob inediam capitis dolores oboriri, attractis sursum missisque vicissim vaporibus. Præterea facile colligi licet vim potentiamque pulmonis ex calfacti ex eo loco Hippocratis in libris de differentiis morborum, aut potius de morbis, præsertim cùm agit de erysipelate & inflammatione pulmonis. Docet enim tenuissimum sanguinem à magna vena attrahi cùm ardet pulmo, vnde

inflammatio fouetur: at blandâ anathymiasi, id est halitu, vapo-
réque succulento cibi humectatur paulùm pulmo, ac proinde
refrigeratur. Atque huc facit maximè quod dictũ à Galeno,
tantum attrahi alimenti ad pulmonem, quantum vni parti
sufficit. Vt propterea ei non sit metuendum à paulò pleniore
diætâ.

Nunc autem locus postulat vt locorum Galeni & Hippo-
cratis sensum venemur ac colligamus, ne temerè aut adicia-
mus, aut detrahamus: quod vtrumque cauit Hippocrates, vt
mirũ nõ sit modò adiectioni, modo detractioni attēden dũ esse
cēseat. Locus Galeni est, *In inflammationibus pulmonis tenuissimo vi-
ctui locus non est, quod in pectus tantum attrahitur alimenti cocti, quan-
tum vni parti tantum satis est.* Alter prætereà locus dum de vsu
venæ arteriosæ disputat, quo scribit præ partibus ceteris cor-
poris pulmonem largiore alimento frui debere: Hippocra-
tes autem in pleuritide & inflammationibus thoracis, id est,
& membranarum & pulmonum exactam admodum ac statã
diætã imperat. Si, ait, *lateris dolor assiduus est, calidis fomentis
non remittitur, sputum non procedit, sed citra coctionem glutinosum est,
nisi dolorem vel alui subductione, vel sectã venã solueris; si hic ptissanam
das, agrum iungulas.* Immodò si totã vtuntur ptissanã, vel septimo,
vel citiùs intereunt. Et paulò ante dixerat: *Si quis sorbitionem
dederit non vacuatã aluo, dolorem, si non adest, inferet; si adest, augebit:
maior difficultas spirandi orietur, & pulmonem exiicat, &c.* Vbi vide-
re licet accuratum admodum esse Hippocratem in præscri-
benda diætã pleuritide laborantium, immodò ne cremorem
quidem ptissanæ concedit: & vt à præscribēda ptissana auer-
tat, proponit terrificã symptomata quæ talis ptissanæ vsus est
statim allaturus. Si per Galenum tantum affluit ad pectus ali-
menti quantum vni parti satis esse potest, quorsum & in peri-
pneumonia & pleuritide plenior cremoris hordei vsus perti-
nemetur? Quorsum reformidatur vaporum, flatuosique spi-
ritus sursum reciprocatio, & praua ad partes thoracicas di-
stributio, quod annotauit Galenus in quodam commenta-
rio? Immodò si pleniorẽ victum in acutis morbis tenuiori, ex-
quisitòque anteponeit Hippocrates, curiosa illa sollicitaque
ptissanæ præscriptio locum in medendo est habiturã?
Vt res tota decidatur, ac lis controuersiaque dirimatur,
dicimus non abs re exquisitissimã diætã in inflammatio-

Part. 33
comm. 1.
in lib. de
Diætã
acut.

Comm. in
part. 32.
comm. 1.
in lib. de
Diætã
acut.

nibus thoracis ab Hippocrate præscriptam ac sancitam, & non abs re à Galeno in inflammationibus istis pleniorẽ cibum requiri. Sed quo nexu hæc inter se cohærere copularique possint; paucis explicamus.

Hippocrates aliàs pleniorẽ diætã præscribit, aliàs tenuiorẽ, pro robore, natura, temperamento, morbi temporibus, in eodem morbo circumstantiis & occasionibus, morbinatura, consuetudine ægrotantium: Etiam eodem tempore morbi aliquando accuratus victus consulitur, aliquando paulò plenior: immò in vno loco adiectionem in morbis cõmendat, in alio eandem reiicit, habetque rationem vniuersalis & particularis naturæ. Quæ omnia si minùs attentè audiuntur, auidâque aurè non minùs accipiuntur, quàm prudenti sagacique mente exiguntur, in infinitorum errorum syllam non præcipites delabemur. Atque id tantæ difficultatis in vnius diætæ præscriptione oboriri mihi videtur duabus de causis. Vna est, quòd difficilis admodum coniectura quam quisque prudens Medicus habere debet de morbi ingenio, vigore vel statim futuro, vel longè post, item difficilis cognitio naturæ vniuersalis & particularis cuiusque, consuetudinis, antea actæque vitæ, ne temerè ab otio ad negotium, aut contrà, conuersio fiat. Quæ in primis omnia magnum iniiciunt scrupulum prudenti Medico omnia ex arte facturo. Vt exempli gratiâ, si intra triduum futurus vigor sit morbi, non est dubium quin tridui, aut bidui in ediam ferre possit, & ita in exquisitissima diætã perseuerandum: sin longiùs absit, quis dubitat ineunte morbo plenius alendum esse ægrum, vt morbum ferendo esse satis possit, ne quòd cauet Hippocrates sub vigoris tempus pleniorẽ cibum offerre magno incommodo cogamur. Item, si quis ter cibum capere consueuerit, cum morbo præditus fuerit, eodem iure velit agere ac cum eo qui semel aut bis ceperit: Ille cum ægrius alimenti subductionem ferat, hic eiusdem adiectionem non bene fert.

Altera ratio tantæ difficultatis est, propter veterum in ea re ancipites, ambiguasque controuersias: Nam nullo ferè adhibito iudicio, nullòque diorismo, modò absolutam tridui, quadriduiue in ediam præscribebant, & sic fame ægros miserè necabant: & sub vigoris tempus cibum offerre cogebantur, aut cum intelligerent ineuntibus morbis adiectioni po-

tius attendi debere ægros saturabant, pleniusque cibabant: unde incommoda sequerentur, quæ nulla ferè ars corrigeret ac emendaret. At Hippocrates singulari iudicio præditus, neutris calculum additurus, exquirere diligentissimè & maximè artificiosè diætã in acutis ex ratione temporum morbi, consuetudine ægri, morbi indole, priuatâ, vniuersâque cuiusque natura, cuius maximum est in medendo momentum. Itaque sententiam suam ita protulit; *Non intempestiuè oportet*

Part. 32. fortis vasorum inanitiones moliri, nec cum morbi urgent feruentiq; cibum
comm. 2. offerre, nec repentiè in hanc illamve partem mutare licet. Quæ ratio pri-
su lib. de mãm conuellit ac labefactat veterum ea de re latas sententiã.
Diaeta
Acutor.

His itaque positis, an sine distinctione & temerè Hippocrates in inflammationibus thoracicis, vt ex illius verbis constat, exquisitissima diætã retinenda? Nequaquam. Sed primò hoc censeretur debet, ineunte morbo, aut in principiis morborum (nomen autem principij latè funditur) dum sicci manent potius in curam eorum incumbere debemus, quàm paulò pleniore victu naturæ consulere. An propterea inedia præscribenda, vt quidam volunt? Nequaquam. Nam cum dicimus, potius, aut magis, non excluditur omnis cibi adiectio. Primò enim in Aphorismo 5. *In tenui victu ægri delinquit, ait, & error qui committitur magnus, maior fit in tenui victu, quàm in pleniore,* duabus de causis, ait Galenus; *Quia natura à tali victu debilitatur plurimum, & quia ad infuetam diætã tenuem conuersio fit.* Nam cum ita tenuis diætã non præscribitur perspectâ morbi naturâ, & viribus ægri, contingit nos vires eas tridui inediã frangere, & cibi accessionem adiungere affecto iam morbo, cum minimè sit opus ac deceat. Cum enim grauiores sint mutationes quæ fiunt ab otio ad negotium, quàm contrariæ, sic grauius in se peccat qui defraudato genio repentiè ciborum pleniore manu indulget, quàm qui à saturitate ad cibi abstinentiam sese conuertit.

Prætereà idem Hippocrates 1. de Diætã acutor. satis aperte docet non ita amplecti se ineuntibus morbis exquisitam diætã; *Qui in morbis piissanà utetur, ne vno die vasa inaniri permittat, nec ab usu desistat, nisi propter medicamentum, aut clysterem, aut sectam venam.* Tunc loquitur de morbis nondum validis. Nam si dolor vrget, vt locus sit medicamento, aut sectioni venæ, non ita plenâ manu cibandus æger. Sed dandum vult consue-

tudini; vt si bis cibum capere confueuerit, bis detur ptiffana, vt duabus vicibus, propter confuetudinem tantū expleatur, quod ſemel ſi morbus non adefſet, expleri deberet. Paulò poſt ſubiicit, initio non multam & craſſam ptiffanam dari oportere; ſed videndum qualis confuetudo, tum ne magna vaſorum inanitio fiat. An illud eſt tam accuratum eſſe in diæta præſcribenda? Nam dum de morbi ficcitate paulò poſt loquitur, quæ videatur alioqui abſtinentiam ſuadere, quoniam cruditatem ſignificat, ſcribit, ſi morbus ficcior ſit, non multum dare oportet. Aliud eſt dicere, in morborum cruditate, de qua hoc loco mentio iniicitur, non multum dari alimenti oportere, aliud eſt dicere omnimodam abſtinentiam à cibo præſcribi, vt Prodicus & Diatriarij Medici factitabant. Hippocrates enim illâ ſuperiore ratione, & quia vtitur in hoc morbo (de cæteris idem iudicetur) alimento medicamentoſo nec tenuiùs nec pleniùs alit: ſed mediam quandam formam, & æquabilem retinet, tametſi Teſſalus eum hoc loco egros implere aſſeueret, & Eraſiſtratus eodem fame & inediâ necare. Eſt enim in morbis thoracicis cibo conſulendum, viribus & ad educationem, & ad actionem: eſt & naturæ conſulendum, ſubducta alimenti portione ad mitigationem, materiæque præparationem.

Cautiones autem iſtæ, cibare oportet in morbis, niſi vel clyſteri, vel medicamento, vel venæ ſectioni locus ſit, indicant apertè detrahendum quippiam de cibo, ſi dolor abſit, vt eius occasione aliquod illorum præſidiorum uſurpandū ſit. Nam ita occurrimus obiectionibus quas prius mouimus, quasque educat quis ex duobus illis Hippocratis locis quos paulò antè enarrauimus: ſi incluſo cibo, id eſt, ſtercore diu retento, vt ait Galeus, ſorbtionem quis det, ſtatim dolorem augebit, ſi ad eſt; ſi non ad ſit, inferet: Nec enim hoc impedit quo minus adiciamus aliquid alimenti, ſed cum aluus aſtricta eſt, quoniam aſſumptæ ptiffanæ exhibitæ diſtributio prohiberetur, vult præmitti clyſterem, aut ſecari venam, priuſquam de nutritione cogitetur. Si enim in ſanis aluo minimè liberâ ingeſtio eſculentorum ſepe tormina ac conſorſiones afferat, multò magis dum aut morbus ad eſt, aut imminet. Alter autem locus videtur vrgere paulò amplius; Si lateris dolor aſſiduus eſt, calidis fomentis non cedens, ſi ſputum non procedit, niſi quis vel ſubductione alui, vel medicamento dolorem laxauerit, ptiffanam autem dederit, in pern-

ciem precipitat ægrum. Itaque, dicit aliquis, in peripneumonia, in pleuritide cum dolores adsunt, cibum dare nocentissimum, sed omnino inedia præscribenda est. Non hic est animus Hippocratis. Atque eum locum bifariam intelligimus, obiectionemque diluimus: Prior quidem ratio, illic de vigore morbi agit Hippocrates in superioribus textibus, vt demonstratum est, plus minusve ptissanæ exhibuit ineunte morbo, docens non multum dari oportere si siccus manet morbus, nunc autem omnium dolorum & symptomatum vehementiam proponit, & vigorem morbi designat, quis ad eò hebes sit, qui cum dolores vigeant ad nutriendum se conuertat, cum præmonuerit alendum ægrum plus minusve pro re nata.

Altera ratio, scribit, Nisi quis dolorem, vel medicamento, vel phlebotomiâ soluerit, hoc satis indicat vrgentibus doloribus vigentibusque succurrendum esse præsidii artis cum illis symptomatis vires deterreatur, priusque ptissanâ exhibeamus, præsertim iulepum, id est, priusquam plenius cibemus. Præmissio autem clystere, & lectâ venâ, tum de cibando consuletur. Ex quibus manifestò patet eam nunquam fuisse Hippocratis mentem, vt velit etiam in pleuriticis exactam admodum diatâ obseruari, præsertim initio morbi. Cum dubium esse non debeat, in omniû morborû vigore ac statu, cum dolorum summa sunt omnia, tutius esse morbi depellendi prouinciam naturæ committere, quàm adiectis cibus eandem ab instituto auocare.

Hæc satis sunt, ac priusquam disputationis finis fiat, conciliare locos duos Hippocratis in animo est, qui planè dissentire videntur. Prior est Aphorismorum lib. I. vbi in morbis adiectioni ciborum attendendum esse vult, ac in tenui victu delinquere ægros potius scribit quàm in paulò pleniore: Alter ei planè contrarius est. In libris acutorum ciborum adiectioni intendendum multò minus. *Nam subtrahere omnino sepe expedit, cum æger sufficere possit, donec morbi vigor mature scat.* Huic & similis est apud Galenum: *In quibus morbis vigor primo quaternario adesse debet, modo natura fortior sit, integram inediam seruare debemus: In quibus non ultra primam septimanam forti naturâ existente solo utendum meliorato. Si naturæ robori non fidimus, ptissana utemur succo. Quasi verò succus ptissanæ multum ad robur naturæ addendum sit collaturus. Ex aduerso pugnant duo illi loci. Sed si mens Hippocratis intelligatur, satis abundè omnibus factum putabimus.* Docui-

Aphor. 5
lib. I.

Parti 37
com 2. in
lib. de
Diatæa-
cut.

rius antè non abs re Hippocratem aliàs paulò pleniorẽ ciborum adiectionem concedere, aliàs eandem planè dissuadere, ob grauiã quæ inde sequerentur incommoda. Atque id duabus de causis: priore quidè, quòd ex veteribus in edendi magistris quidam absolutè plenam dietam instituerent, alij verò omninò cibum subtraherent: quos vtrosque vt errare ostenderet, est vbi paulò plenius in morbis cibet, est vbi tenuissimè. Sic modò vnum consulit, modò alterum, non immemor, ac dissimilis sui, sed vt ostendat quam erroneum sit aliquid ea in re statum ratuque statuere. Posteriore autem, quòd cum cognosceret praesidioꝝ singulorum quantitatem artificiosã egere coniecturã, hanc autem assequi coniciendi vim difficillimum esse, & ad eam pertinere, qui omnium quæ in arte sunt vires norit, maluit in ea re ancipitem, dubiamque sententiam suam proponere, quam aut hoc, aut illud certò definiendo, multis errandi occasionem portexisse.

*Comme-
ntario pra-
dit-
ta hac
scribitur*

Itaque dum primo Aphorismorum paulò pleniorẽ victum laudat, vniuersalem planè non proponit regulam, vt hæc est quam in libro Acutorum scripsit, cum ciborum adiectioni in morbis multò minùs attendi oportere dixit. Nemo enim dubitat corpus ægrum non tam indicare refectiõnem sui, quam ablationem morbi quo occupatur. Vt enim cibus sano corpori praesidio est & robori, ita ægrum morbosumque corpus offendit, ac lædit. Sed offensio est maior minorve, prout plus minùsve cibi offertur. Itaque 1. Aphorismorum vult euertere dogma eorum qui magnis mutationibus magnas mutationes opponere in animo habentes, initiis morborum sine vllò delectu in ediam absolutam praescribebant, & quòd citra damnum fieri non poterat, tempore vigoris cibum adiciere cogebantur. Satius autè esse vult Hippocrates, initio morborum alimento vires recreare, vt cum ad vigorem ventum sit, absolutã in ediam minùs æger offendatur: ita tamen vt si breuè vigor futurus sit, tantum demamus de cibi adiectione quanto propinquior is videatur. At libro acutorum praesceptũ generale ponit in morbis dum multò minùs adiectioni attendi debere opinatur, quòd adhuc per comparisonem dicitur, vt nil temerè & absque ratione dicere confuevit. Quoniam, vt dictum est antè ex comm. Galeni in hanc particulam, artificiosa coniectura quam consequi debet quisquis quantitate remediorum rationem ad vnguem tenere velit,

difficillimè omnium attingitur. Accedit quod scribit Galenus ibidem. *Quod plus est (ait) & exuperat, noxas inemendabiles facit, quod verò minus est, facillè emendatur: nempe si virtus labascere videatur, cibi exiguum ministrare debemus. Quod in ventrem iniectum est, tollere est difficillimum.* In illis locis conciliandis & ad legitimam medendi formam reuocandis diligenter laborauit Manardus epist. 2. lib. 5.

Id quod in quæstione erat positum nunc absoluiamus; nimirum an in inflammationibus pulmonis, quod vult Galenus, tenuissimo victu vtendum non sit. Iam docuimus in pleuritide, quam pro exemplari & typo morborum acutorum proponit Hippocrates, quatenus adiectioni, aut detractioni ciborum studere oporteat. Cùm Galenus non vult tenuissimo victu vtendum in pulmonis inflammatione, notari primùm debet quod tantum per comparationem loquatur. Ait enim, non est tenuissimo victu vtendum in pulmonis inflammatione, vt & in iecoris & vetriculi phlegmone. Nemo enim negauerit duos hos morbos accuratissimum victum exigere, quod ratione inflammationis iniectum alimentum corruperetur: & quia officiales sunt partes, & in quas alimentum integris viribus iniicitur, magis offenderetur. Pulmo autem pars naturalis non est officialis saltem, & ad eum, autore Galeno, tantum alimentum aduehitur quantum vni parti alendæ sufficit. Quocirca non ita incommodum sequeretur ex pleniore cibo. Dicemus autem ad hanc contouersiam dirimendam, aliud esse considerare pulmonem inflammatione laborantem tanquam morbo acuto, aliud esse eundem laborantem conferre cum ventriculo & iacineri. Priore enim modo cum acuto morbo affligatur, non est dubium quin quâdiu morbus siccus erit, diæta reuocari debeat ad eam quam de pleuritide Hippocrates explicauit: Posteriore autem, reuera accuratior victus esse debet in ventriculo inflammato ac iecore, quam in pulmonis inflammatione.

Duplex tamen dubium hoc loco esse possit: Prius, an hoc verum sit in ventriculi & iecoris inflammatione tenuissimo victu vti nos debere, quod pars officialis & naturalis. Immò, dicit aliquis, quia penu est & promptuarium omnis alimenti, & quò nisi agente, & alimentum partibus ceteris ministrante animal breui concidat, plenius eâ ratione alendū est: alioqui alia partes qua mutuas ad opus curationis tradunt operas, fatiscerent,

ac laberentur. Pulmo autem & cerebrum, & partes aliæ; quia naturales non sunt, nec ciborum promptuaria, parcius cibandum, quod ventriculus integer sit, & alimoniam ad tempus sustinere possit. Aut sit ita sanè alatur pleniùs corpus, aut tenuiùs, quid intererit? Dicimus ideò tenuissimè hïc alendum in inflammatione hepatis & ventriculi, quod morbi omnium sint acutissimi, propterea que extremos habent labores. Vigor enim in propinquo est. Et hïc plus occupatos nos esse oportet in oppugnatione morbi qui plurimi est momenti, quàm naturæ corroboratione, tametsi magna virium iactura sequatur. Præterea ex euentu tenuissimæ diætæ occasio sese profert. Cùm enim partes illæ extremè laborent, dubium non est quin in eis alimentũ corrumpatur: corruptio autem illa ægris damnum est magis auctura, quàm si in totum alimento abstinenceatur.

Posterius dubium, an omninò verum hoc sit, nullâ factâ cõparatione cum inflammato ventriculo, in pulmonis inflammatione morbo alioqui acutissimo, & suam historiam statim absolvente locus sit tenuissimo victui? Videtur ita, quia in iis morbis qui extremos statim labores habent, extremè tenuis diætã conferat: Item quia exhibita etiam ptissana homines *πνευματικά* fiant anhelosi. Præterea cùm à corde nutriatur pulmo, si multum ingeritur cibi, plurimum ad cor sanguis deferretur: & ita ad pulmones attrahentes adinuicem, sic inflammatio augebitur: in omni autem inflammatione iis abstinendum quæ multum sanguinis generant. Videtur quod non, dum sanus pulmo multo copiosoque alimento eget cõparatione cum partibus aliis, ex mente Galeni. Ergo, vt antè docuimus, cõsentaneum erit vt non ita parcè ac duriter peripneumonicos nutriamus. Præterea calfactus pulmo multum consumit, multum attrahit etiam ratione caloris & motus aucti, si desit ob inediã alimentum pulmoni vndelibet rapiat, immò potiùs ichorosos humores ex quauis parte; sic augebitur peripneumonia, præsertim biliosa: venæ enim arefactæ biliosos & ichorosos humores ad se ex aliis partibus attrahunt, sic & pulmo: præterea arefiet cor raptis & sanguine, & spiritu ob incendium pulmonis, vnde peripneumonicos animo deficere videmus. Etsi autore Mesuæo peripneumonia fit aut à pituitoso, aut à bilioso humore: si à pituitoso, tanquam ab excremento; si à bilioso, tanquam à nutrimento: in biliosa peripneumonia pleniùs cibare oportebit: & quod

nutrimentum adesse parti oporteat, non tantum quantum quidem si sana esset, sed vt in sanis robur alimento augeamus, saltem in ægris seruare quoad possumus, debemus. Item quòd biliosi ichores ferociunt magis, proteruiuntque detractò alimento: nutrimentum enim temperat eos, humefacit, & expectorationem promouet humectando. Sed horum omnium explanationem venari possis ex ea longa oratione quam nos de induria habuimus.

Quod paulò antè sumus polliciti nos præstaturos, illud nunc exoluendum. Cùm enim de vsu venæ arteriosæ, ac arteriæ naturam & conformationem venæ referentis, mentio iniiceretur, ne disputationis ordo euerteretur, pleniorè ea de re disputationem in tempus ac locù aliquàto commodiorem reiecimus. Ad quam nos accingemus, quoniam plurimum habet vtilitatis & voluptatis. Vtilitatis quidem ad cognitionem eorum quæ dicta sunt de obseruatione diætæ in inflammationibus pulmonum, quòd pulmones multo vberè què alimento ad recreationem sui indigerent. Voluptatis autem in inquirendis contemplandisque naturæ operibus, quæ cùm cæca, bruta ac temeraria videatur, tènquam mirus & ingeniosus artifex in iis condendis appareret: siue quòd ei mentem tribuere nos cogat diuina operù præstantia, quæ citra rationem, intelligentiam, ac consilium temerario fortuitoque nisu talia euadere nequiverunt, sen potiùs quòd Deum & numen in iis suam vim ac potentiam explicuisse necessariò fateri cogamur. Quòd si renuerimus, id nobis inuitis extorquebit admirabilis & naturæ superans effectio, quæ quotidie in oculos nostros incurrit.

Res autem quæ proponitur eiusmodi est, cur non vt in partibus reliquis eam venam quæ à dextro cordis ventriculo derivatur, non autem oritur non vt ceteras effinjerit, sed arteriæ conformationem ob tunicæ crassitiem quæ quintuplo aut sextuplo crassior est sortita fuerit. contrò vero arteriam quæ sinistro cordis sinui implantatur, raram, subtilemque, & proximè venam referentem esse voluerit. Si rationem conformationis venarum & arteriarum perstrinxerimus, earum quæ partibus ceteris inferiunt, facile causam sumus reddituri, cur in pulmonibus vtrumque vas contrariam suæ naturæ conformationem nanciscatur. In partibus quidem ceteris venæ simplex est tunica, arteriæ verò maior crassior quàm quæ venarum est. Huiusratio hæc

est, quoniam si qui in arteriis continetur spiritus tenuis, calidissimus, ac incitatus maximè, crassis, compactisque vasis nõ coerceretur, euaporaret statim, ac euolaret. Sanguis autem quoniam piger, crassus, & grauis est, nisi vasè maximè perspirabili contineretur, non bene nutritio fieret. Nutritio porro fit non modò per venarum oscilla, sed per tunicas, trãsumpta scilicet materia quæ partes irroret, adhæreat illis, & propter adhæsuum tandem in earum naturam cedat atque fa-cessat: Ac contrariam multùm in effingendis pulmonum vasis rationem habuit. Nam & aliam nutriendi rationem notã perspectamque habuit, & alimenti copiam supereffe pulmõni oportuit, & spiritus communicationem non ita difficilem vť est in partibus ceteris. Itaque crassæ venæ conformandæ & arteriæ raræ ac simplicis consilium hoc fuit.

Vnumquodque simili nutritur apposito cibo: pulmonis autem carnem raram, mollem, spirituosãque esse nemo nescit: Eòque factum consilio, vt vena crassior esset, vt diutius sanguis restitaret in ea, & sic elaboraretur. Si enim mollis fuisset tunica qualis à corde manaret sanguis, talis perspiratione & transsumptione celerrimã in nutritionem pulmonis concederet. Accedit quod in aliis partibus non est ea motionis agitationisque perpetuitas, & continuatio, quæ efficit vt calfactus impensè pulmo vi quadam vel ex densissimis vasis sanguinem arripiat. Tamen ea crassities validam pulmonis attractionem quodammodò retardat atque eludit, vt nihil nisi quod tenuissimum est, è vena arteriosa elaboratur.

Arteria autem rara effecta est duabus maximè de causis: Tertiam ac quartam in orationis ractu explicabimus; vt nimirum suppetias venæ arteriosæ ferat. nam quoniam non ita multum promptumque alimentum vena arteriosa præ sua crassitie & opacitate tribuit, id arteriæ tenues, raræ resarciunt ac compensant. Secunda ratio, quoniam ceteris partibus nõ ita confertinã affatimque concedi sanguinem arteriosum cõuenit, idèò crassæ effictæ sunt arteriæ, pulmo cum ex superioribus rarus ac spirituosus esse dicatur, oportuit arterias non ita crassas, vt quæ perpetuò sinere debeant effluere sanguinẽ eum ad pulmonem reficiendum, qui multùm consumit. Tertiò ob motum perpetuum, & attractionem aëris externi, eiusdẽque exclusionem obœdientes esse arterias fuit necesse. Præ-

cipuum autem hoc munus in pulmōnum arteriis spectatur; nam nobis inspirantibus expirantibusve continenter ac facile vchi, reuehique sputum oportuit: quò maximè contulisse videtur vasorum arteriosorum mollities & obsequium. Venas autè non necesse fuit contrahi & dilatari vt & arterias, quod notandum.

Præterea crassities venæ hoc affert adiumenti, quod non ita facile effluit sanguis è vena arteriosa præ crassitie, & quia diutiùs remanet, duo affert commoda; vnum antè dictum est, quòd nihil nisi elaboratum finit elabi: alterum quod dum diutiùs manet, diutiùs fruitur pulmo, minùs quidem habet alimenti ea ratione, sed habet diuturnius: si enim rara esset tunica, absumeret statim ac exorberet: plurimo enim egere alimento demonstratum antè est.

Sed dicet aliquis: Ergo commodè non est efficta ista crassities, quoniam minùs effluat alimenti, propterea que suo defraudatur pulmo genio. Huic inopiæ (id est quod non multum alimentum simul, sed paucum paulatim, sensim, & quod Græci dicunt *εὐμαρῶς μακρῶς*) duabus rationibus occursum est: Vnà quidem, quoniam arteriæ supplet id in quo deficit vena arteriosa propter suam crassitiem; hæc enim impedit quo minus trasportet alimenti à vena arteriosa ad pulmōnes nutriendos; arteria autem venosa raritatis suæ ratione redimit hoc, refarcitque tenuem vaporosumque spiritum tribuendo. Alterâ ratione, natura occurrit dum construxit venas in pulmōne maximas: ita enim effectum est, vt quantum iustæ nutritioni propter tunicarum crassitudinem detrahitur, id venarum magnitudine expleatur. Ostensum enim est crassitiem venarum, quatenus talis consideratur, efficere vt minùs quidem alimenti simul & semel affluat, sed diuturnius est & elaboratius.

Dicat aliquis: Si arteria venosa supplet id in quo ob suam crassitiem deficit vena arteriosa, satius fuisset venas naturales esse, vt quæ luculentum dedissent alimentum ratione tenuitatis, & arterias quoque crassas & compactas vt in aliis partibus, vt quæ tenuem & vaporosum alimentum dedissent, non ita affatim vt faciunt cùm tenues sunt & venosæ; siquidem venæ ipsæ suppleuissent. Nam & pulmo calidissimus & mobilis facile ex arteriis crassis attraxisset etiam sequacem sanguinem spirituosum, quod ex rationibus Galeni patet, qui dilatationem pulmōnis sufficientem causam esse ait ad attractionem, etiam ex den-

fiffimis venis. Eę quidem rationes fatis per fe virium & ponderis habere videntur ad efficiendum naturam fruſtrā architectatam eſſe aliam conformationem venarum & arteriarum in pulmonibus, aliam in aliis partibus. At illa flexilitas & obœdientia quę deſiderabatur in arteriis ob continuam inspirationem & expirationem, vnde deductio ſpiritus & exhalationis foris, intrō, intūsque foras impedit fortasē quominus idem artificioſum in vaſis pulmonis appareret, ac aliarum partium. Quod paulō poſt pleniūs demonſtraturum recipio.

Quicquid ſit: Natura conformando & arteriam venoſam, & venam arterioſam, id ſemper penſi propoſitique habuit, vt pulmo & vberẽ alimento abundaret, & conuenienti. Conueniens appello ſpirituoſum, vaporoſumque. Diu enim ſanguis in vena arterioſa reſiſtit vt attenuetur, & ita familiare reddatur alimentum; arteria autem venoſa ſit vt & luculentē & in promptu pulmo fruatur ſpiritu & vapore. Quod non ita liberum fuiſſet, ſi arteria ſextuplo maior, id eſt craſſior fuiſſet.

Atque quoniām hęc diſputatio noſtra adducta eſt, vt de qualitate ſanguinis qui continetur in vena arterioſa diceretur, quęrendum nunc an talis ſit. vt ſit ſubtilis, vaporoſus, tenuis; an verō craſſus, in craſſo corpore contentus; & minimē alendo, reſiciendōque pulmoni idoneus, qui ſubtili attenuato ſanguine refocillatur & delectatur? Quęſtionis huius prima diſputatio tanquam leuioris armaturę excuſſio facta eſt, nunc eam pleniūs excutere ac climare lubet.

Pulmo nutritur ſanguine halituoſo tanquam familiari proprioque alimento. Omne autem alimentum cū tribus quatuorve modis ab Hippocrate dicatur, illud demum alimentum dicitur quod nutrit proximē, quodque iam nutriendę parti aſſimilatur. Ita nimirum id quod ingeritur nunc potulentum ac eſculentum reape ſimile non eſt rei nutriendę, ſed cū initio abſimile ſit, multiplici alteratione tandem aſſimilatur, idem que ſit. Eadem ratione qui in vena arterioſa ſanguis continetur aſſuens à dextro cordis ventriculo non neceſſariō eſt ſpirituoſus initio, ſed cū craſſus ſit, & in craſſo opacoque vaſe cōtentus, nempe in vena arterioſa, quia non citō effluit & tranſibitur ob vaſis craſſitiem, datur ſpatium attenuandi, comminuendique in partes minimas. Dubitatur autem an cū à corde rapitur ſanguis, non iam attenuatus ſit & craſſus. Occurrunt enim loca

contrarij apud Galenum in lib. 6 de vsu part. Prior locus est:

Cap. 10.
6 de vsu
part.

Omnino, opinor, in pulmone spiritus tenuis est & lenis, & quem coërceri oportebat, sanguis crassus & grauis, & quem in omnes pulmonis partes ferri oportet, ut qui copiosiore vititur alimento quam partes cetera. Hic abundè patet Galenum docere velle sanguinem rudem ac crassum esse, cum probat verisimile esse venam debuisse esse simplicem in pulmone, vt in partibus ceteris. Atque vt verè dicā, vas crassum redditum est non ratione sanguinis tenuis ac foras exiliat, sed vt diutiùs retineatur in vasè, nec effluat quin elaboratus sit: eo accedit quod pulmo ratione & motus & caloris attraheret sanguinem incoctum, nisi vasis crassities impediret. Locus alter est planè contrarius eodem capite. Nam dum reddit rationem Galenus cur pulmoni copiosum ac vberimum alimentum conueniat, tria affert locupletissima argumenta. Primum copiam caliditatis vernaculæ, vnde alimentum faciliè cōminuitur, ac diffunditur: alterum, pulmonis dilatationem in aspirando: vnde attractio fit alimenti etiam ex densissimis corporibus: tertium ac omnium maximum, quòd mittatur sanguis à corde ipso priùs attenuatus ac elaboratus. Itaque priore loco vult sanguinem rudem ac crassum, & indigentem crasso vase vt attenuetur: Posteriore hoc vult à corde attenuatum ac elaboratum mitti. Ergo inutilis constructio venæ arteriosæ in eum præsertim finem vt nihil ab ea effluat & resiliat quod non ad vnguè extenuatum sit. Ita conciliare oportet eos locos. Cùm dicit indigere multo alimento, quoniam à corde mittitur elaboratus & attenuatus, vnde facilis eius fit & alteratio, & dissipatio à parte præsertim calida, illud per comparisonem debet intelligi cum sanguine aliarum partium. Nam si ab hepate immediatè mitteretur sanguis, non est dubium quin diutiùs nutrirer: minùs alimenti daret ob crassitiem (vt abundè docuimus antè) sed diuturnius. Oportet autem diuturnius alimentum esse, alioqui pulmo contabesceret. Nuncautem quò magis sanguis procedit, eò magis elaboratur, præsertim si non attingat ad venas (vt de lacte constat) qui in dextro sinu continetur, elaboratus est comparatione cum seipso dum ab hepate fluit, nondum est elaboratus, si comparetur secum postquam moram traxit in vena arteriosa: Et si liberè dicam quod sentio, ego existimo venam arteriosam ita crassam effictam esse, non tam vt subtilior accuratiórque reddatur sanguis ad nutritionem pulmonis, quam vt non ita re-

penet à pulmone arente, calente, & dilatante se rapiatur, atque consumatur. Quod mihi videtur probabilius. Ita enim vena arteriosa non sinens ob conformationem citò exugi, abripique sanguinem est veluti penu & promptuarium sanguinis ad nutritionem pulmonum. Quanquam & ad hanc rem magnitudinem & copiam vasorum effectam esse vult Galen. vt quod iustæ nutritioni ob tunicarum crassitudinem detrahitur, ipsarum venarum magnitudinæ compensetur.

Quod autem sanguinem qui continetur in vena arteriosa sit necesse paulò crassiore esse, & paulò crassiore vase coerceri, satis abundè apparet ex his incommodis quæ consequi solent, quæque apparent in iis qui sanguinolentum sputum è pectore extundunt. Omitto casus, vlcuscula, diauroseis, quæ sæpe *quarto* *Asiæ* promouent, persequor tantùm cõmentationis ergò eos quibus aut arteriosa vena tenuior, delicatiorque est, aut sanguis qui è corde ad venam arteriosam confluit spirituosus halituosusque magis. Positum enim antè est, quod diligenter debet annotari, nutritionem per tunicas vasorum fieri, si per tunicas fit, si vas rarius, pulmo continenter attrahens potest facillimo negotio id educere quòd tingat sputum: præsertim cum aut exercitatio violenta præcesserit, si generosiori vino indultum fuerit. An eiusmodi cruenta excretio formidanda? Non herclè; Siquidem tenuitas sanguinis, & vasis raritas facilè hoc inducunt. Vnde frustrà fatigantur venæ sectionibus, frustrà incutitur metus tabis ab vlcere: quod cruetam expectorationem sequatur necessariò vlcus: vt cum meitur cruentum falsò comminiscuntur vlcerationem securam. Tantum enim abest vt illi iuuentur sectione venæ, vt contrà illis eò pulmones debiliores reddantur, & sanguine tanquam fræno in eius generis hominibus detracto bilis proteruit, ferocitque magis, vt placuit Arabibus, quicquid contra dicant veteres aliquot, & recentiorum nonnulli. Tamen si enim obiiciant in ardentissimis febribus Galenum misisse sanguinem, cum in illis vberimæ bilis impetus atque impressio appareat. Respondemus in illis febribus ardentissimum sanguinem detraxisse Galen. non simpliciter, id est, non parçâ manu, ad euacuationem tantùm nonnullæ materiæ, & refrigerationem nonnullam, sed ad animi vsque deliquium, vt refrigerationis ratio omninò habeatur. Quod diligenter no-

tandum. Nam qui in biliosa febre parcè detrahit sanguinem, is furem magis bilem reddit: at si liberaliter, non est dubium quin sequatur magna refrigeratio, & bilis temperatio. Arque cùm in biliosis hominibus cruentum expectorantibus ob sanguinis tenuitatem sanguis mittitur, parcâ manu mittitur; vnde ex superioribus patet eos offendi non leuiter. At dicēs, iuantur tamen? Quid tum si id temporis iuantur? Sape enim sectio venæ, & calfactio, & dolorum per narcotica sedatio vno tempore tentatur, & fit cùm clam, occultè & furtim lædatur plurimùm æger: & læsionis argumenta non nisi longo tempore apparent. Vnde videmus eos quibus pro aliquare nata læguis mittitur ad obeūda munia ineptos, pulmones habere imbecillos. Iuabātur quidem olim his remediis, sed pleniorē fidem faciunt quæ sequuntur. Præterea in prauam consuetudinem corpus adducitur, vt Galen. lib. de consuetud. doctissimè annotauit. Itaque quibus ea hæmoptysis cōtingit, consuli deberet humorum potiùs temperatio, cùm eis potiùs sit metuendum ab ariditate pulmonum quàm ab vlcere, vt falsò plerique comminiscuntur ex reiectione sanguinis, quàm vt anteuertant, statim sanguinem mittunt.

4. Ariditas autem sequetur, & ex sanguinis tenuitate, & vasorum non legitima conformatione vt si vena arteriosa sit rarior: præterea ex frequenti sectione venæ quæ celebratur falsò & erroneè. Illud enim confirmari potest experientiâ, omnem venæ sectionem partium propinquissimarum parti à qua detrahitur sanguis, imbecillitatem afferre. Ita enim cùm vena puppis aut temporum aperitur, multorum iudicio & imminutio memoriæ, & imbecillitas partis aliqua consequi solet. Et quibus in malleolo mittitur sanguis, non ita liberi gressus sunt potentes vt antea. Quare: quoniam detractio sanguinis imbecillam reddit partem in qua feritur vena, & eas quæ sunt propinquissimæ. At cùm hepatis remotum sit à vena gibberi, non ita infirmatur. Pulmo autem quoniam proximus est venæ mediæ & basilicæ, siquidem immediatè ferè mittitur sanguis (vt testatur subita sedatio, quiesque doloris secta in pleuritide vena) nemo inficiat eat crebrâ frequentique detractio sanguinis & spirituum, & laterum robur, & neruos, & pulmonum vim relaxari ac debilitari. Vnde quibus in pleuritide liberaliùs detractus san-

guis, i sæpè dolores lateris experiuntur, & illis paulùm sæuientibus è vita abripiuntur.

Itaque vt redeat nostra oratio, de his meliùs natura meruit quibus sanguis paulò crassior est, quàm quibus ita tenuis. Cùm enim tenuis est, promptius sufficitur in locum deperditi, & alimentum ad manum dat, sed breuiùs nutrit: cùm crassior, diuturniùs, sed minùs; Hoc autem optabilius est.

Et vt de vase arterioso dicatur, adhuc aliquid, dicimus venam arteriosam non affatim quidem præbere alimentum, sed continenter: & crassities venæ facit vt tenuissimus detur sanguis: raritas arteriæ venosæ vt copiosus spiritus, & affatim: quod huic parti necessarium in primis fuit.

Est & aliud notandum, nimirum quod subiungit Galenus, commodum non visum fuisse naturæ vt à vena caua statim & immediatè sanguis ad pulmones ferretur: vel quia in caua vena crassior sanguis est quàm qui alendo pulmoni sit idoneus. At in cordis dextrò sinu elaboratur aliquantum: aut quia necesse aliquandiu retineri antequam ad pulmonem affluat, ne statim absorbeatur, & propterea à sicco pulmo laboret. Item si ita immediatè ad cor ferretur per continuationem quandam vasorum, nulla vena arteriosa fuisset, & nullæ epiphyces membranarum, sed vena quæ vulgò arteriosa dicitur, verarum venarum naturam expressisset.

Possèt quis obiicere, frustrà naturam machinatam fuisse venam arteriosam. Prima ratio: Sanguis qui à corde ad pulmonē affluit, tenuis & elaboratus est; non necesse itaque fuit crassam fuisse venam, & arteriæ similem, nè inelaboratus sanguis ad pulmonem allabatur. Sed huic rationi validissimæ ante responsum est. Altera ratio: Sit ita sanè, sanguis qui in venis continetur pulmonis, esto crassus, & grauis, non propterea tamen necessaria fuit vasorum densitas ad elaborationem: pulmo enim quia calidissimus est & per se, & ratione vicinæ cordis, & quia mouetur perpetuò, comminuit faciliè sanguinem quantumlibet crassum & grauem: quin si crassus, transfluitur ante tempus, quia diutiùs in partibus hærebit, minùs siccabitur pulmo, sed præfens habebit alimentum circa quod sese exerceat. Huic rationi ita respondebitur: Non fuisset necesse pulmonem in eo occupari vt crassum illum sanguinem in venâ simplici contentum, & ab ea assumptū comminueret; grauior enim eâ ratione

196 CONSILIORVM MEDICINALIVM
fuiſſet, ſuóque muneri deſuiſſet, quod in eo verſatur vt reſfri-
gerium cordi aſſerat, & inſpirationi, expirationíque inſeruiat.

Ad duas rationes accedit hæc de euertenda arteria venoſa.
Si arteria talis fuiſſet qualis naturaliter in aliis partibus exiſtit,
id eſt craſſa, meliùs pulmoni conſultum fuiſſet; nam & non ita
ſpiritus exinaniti fuiſſent, & ſatis abundè ſuppetiuiſſet ſpiritus,
quia pulmo calidus ex denſo corpore arteriæ attraxiſſet, & per
ſe ſpiritus ſatis ſequax eſt. Perperam enim id fit quod ſcribit
Galenus, arteriam venoſam ſuá tenuitate ſupplere id in quo ar-
terioſa vena propter ſuam denſitatem deficit. Nam ſi vena na-
turalis fuiſſet, ſuppleuiſſet id in quo arteria propter ſuam craſ-
ſitiam defecuiſſet. Vera quidem hæc ſunt, & quæ pro euertendo
naturæ inſtituto ſufficiant: ſed aliud eſt præterea conſideran-
dum. Nam quòd arteriam venoſam inſtituit natura, non eo
conſilio id fecit, vt ſuppleat aliquid pro vena arterioſa; id enim
tantum ex euentu fit. Sed cum pulmo fit pars ſpirituoſa, & quæ
ſpirituoſi inſtrumenti rationem habeat, oportet illam abundè
ſpiritum ſuppeditare: non poteſt autem commodiùs id fieri,
quàm ſi receptaculum ſpiritus rarum feciſſet. Altera ratio po-
tior eſt, quæ eò naturam induxit, nimirum quòd neceſſarium
fuerit arterioſum vas obſequens & flexibile eſſe ob inſpiratione-
nes & expirationes. Nec enim dubium eſt quin niſi ea ratio im-
pediret, arteriam venoſam optimum fuiſſet craſſam eſſe vt diu-
turnius eſſet alimentum, & diutiùs ſpiritus ſuppeteret. Quæ
omnia à nobis exagitata pertractatæque ſunt vt in veterum li-
bris: ſi quid fit ſcrupuloſum, eruatur, ac innotefcat. Abundè
autem id fit expanſis orationis velis.

ANNOTATIONES.

1. Ergo perperam faciunt qui in morbis thoracicis multum ſanguinis
detrabunt, quia fraudant alimento.

2. Nam quemadmodum in generali diætâ præſcriptione non ad un-
quam obſeruatur diætâ Hippocratis, vt cum extremi labores fuerint,
extremè tenui diætâ utamur; ſed ſæpe, & temporis, & idæa morbi, im-
mò & peculiaris naturæ ægri ratio habetur: Ita in ſpeciali diætâ præſcri-
ptio peculiaris ratio harum aut illarum partium initur.

3. Vena arterioſa, ait Fernelius, nil intercedit cum vena cana: quo-
ntiam duplex ſimplici non continuatur, nec cohereſcit. Sic totam hanc ve-

nam arteriosam ex corde nasci oportebat.

Arteria venosa sic condita, quoniam qui aër attractus in cor irrepit, nondum spiritus modo attenuatus est.

4. *Item in iis quibus spirituosus sanguis, fatiscit pulmo, arefcit, & adheret costis, vt experientia docet. An quia aliquando cruentum spumit, sanguis mittendus? error est sædissimus.*

CONSILIVM XLIII.

De ventriculi gangrana & syderatione.

ABVNDE alio loco docuimus verum esse quod scribit Hippocrates, similitudines bonis & eruditis Medicis fraudem facere: quod artem Medicam coniecturalem admodum facit. Etsi enim in plerisque rationationi locus est, demonstrationisque leges sunt certissimæ: in aliis multis ita ambigit ac fluctuat ratio ipsa ob signorum complicationem & verisimilitudinem, vt quod tenendum vix explicatum exploratumque sit. Id cum aliàs à nobis expositum est in variis morbis, tum in hoc vno quæ explicandum suscipimus à nobis præstandum est.

Iacobus Gallus annos 50 natus, melancholico temperamento præditus, cum olim biliosus fuisset, conqueritur de dolore ad vmbilicum. Solemnis illi erat excretio cuiusdam materiae purulentæ per anum, quòd in recti intestini extremo pene vlcusculum ibi conceptum putaretur. Duodecim penè annos post illatâ vim recto intestino illatâ eo fluore recreatus est aliquantum. Restitit ille, aut non eodem modo perseuerabat. Doloris illius ad vmbilicum defidentis causam referre poteramus ad illam suppressionem. Clysteribus, medicamentisque est alleuatus. Non ita paulò post deiecta appetentia, vomitiones, langor, partium extimarum quædam leuis perfrigeratio, tamen incedebat. Et liquida & esculenta vomitu reiciebat. Veneno infectum putabant. Ac reuerà præterquam quòd manifestâ leipothymiâ non prehensus est, assumpti veneni argumenta aderant pleraque. Tamen eum eâ suspitione liberauimus, quòd nullam de feris occasionem præcessisse videremus. Per dies quadraginta penè perseueravit vomitio illa. Quod mirum fuit, nec yllâ ratione alleuari potuit. Digito indicabat sedem affectam, nempe

superius orificium ventriculi & pylori regionem. Sensum quendam ponderis habebat. In horas marcescebat, facies concidebat, & totus venter collapsus est, præsertim qua parte subiacet ventriculus. Quidam, vt aliquid afferre viderentur, iecur & lienem putruisse dicebant: alij ad mesenterij obstructionibus plenum confugiebant. Et illud commune Medicorum asyllum est, sine quo vix rem, lucrúmve facere possint. Sed id non sine magna ægotantium clade, & Medicorum opprobrio: quasi verò in illis duabus partibus solùm omnium morborum sedes existat. Ad syrupum de cichorio solemnem confugitum est: sed omnia frustra. Tamen qui paulò accuratius rem inspicerent, cùm viderent tandiù perseverare vomitionem, dolorem ad ventriculum non admodum urgentem, nil profici fotu, litu, delectu ciborum, balneo quoque ipso, necessariò pylori vias obstructas collegere. Satis aptè quidem. Sed vnde obstructio: an à scirrho, an ab inflammatione: Et si ab inflammatione, cur febris non erat acuta, & cur non perimebat intra paucos dies?

I. Interiit tandem planè emaciatu ac si sphacelatum corpus esset. Aperto cadauere, illud vtrumque viscus, lien & hepar, quod fomitem malorum falsò iudicabant, satis erat integrum; quanquam fortè intemperie quadam, malàque diathesi vtrumque affectum erat, non ita tamen vt mortis inde occasio nasceretur. Ventriculi facies extima erat vermiculata, pylorus talis & penè restrictus, facies interna corrupta & putris, & statim laceratus est ventriculus, adeò (quod mirum fuit) in tota sua natura erat putris & cadauerosus. Humor qui in eo erat, nigricabat. Gangræna & syderatio erat ventriculi, quod nunquam ferè contigit. Et mirum, cùm tam malè affecta esset illa pars, & eius vis deperdita, quomodo tamen facultas eius expultrix in citando vomitu vige ret. Vomitio illa planè erat contra naturam, non à facultate excretrice vegeta, sed à retentrice deperdita, agente superiore orificio ventriculi, obdurata pylori via, hinc residua vi quantula cumque in ea parte, statim remeabat id quod in ventriculum iniectum erat.

Quæstio esse potest, vnde illa syderatio ventriculi, an ab inflammatione, an à veneno, an ab alia qualitate: Si ab inflammatione, febrem adesse oportuit, quod præsertim ea

pars inflammaretur, quæ locum maximum in corpore obtineret. Ille cum genio indulgisset, & generosissimis vinis vsus esset, credibile ventriculū tandem vitium aliquod concepisse, siue per se, siue per refluxum materiæ ab hepate, aut occasione suppressæ illius materiæ, quæ solemnī euacuatione excernebatur. Ita enim ventriculus vt & alia pars potest in tota sua substantia affici & corrumpi, vt & partes aliæ. Accedit quod phlogosis quædam potuit oriri in pyloro, & eius contagione affici ventriculus, citra tamen febrem continuam ardentem. Docuimus enim antè id contingere in melancholia hypochondriaca laborantibus, in quibus pylorus phlogosi detinetur citra manifestam febrem. Quod est notandum. Quod autem verisimile sit in ventriculo & partibus ei vicinis illam phlogosin conceptam fuisse, satis indicauit refrigeratio partium extimarumque viginti quinque dies perseuerauit: & quinque diebus antequam è viuis excederet febris apparuit in omnibus partibus.

ANNOTATIO.

1. Eodem penè modo interijt Dominus Vignerou, in vico Templi qui per sex hebdomadas laborauit, & de Stomacho tantum querebatur. Sentiebat pondus quoddam, nec in latus alterutrum decumbere poterat. Vomebat sepe. Aperto cadauere hepar superiore parte adharebat diaphragmati, & id ipsum hepar putre erat, & pulmones ferè.

CONSILIVM XLIV.

De venæ sectione in febribus tertianis.

ARABVM hoc fuit decretum, In tertianis febribus non miti debere sanguinem nisi exacto iam tertio paroxysmo, & postquam sanguis putruerit. Quod fortè non abs re dictum est; nec credibile ita veteres Arabes, aut alios aliquid sine ratione, aut experiētiā pronunciauisse. Eiusmodi autem decretorum linanda eruendaque ratio, vt ea boni æquique consulantur. Videmus plerisque ante tertium paroxysmum missum sanguinem magno quodam profectu: aliis non item. Sed cur expectandum donec putruerit sanguis? Nunquid satius est statim ce-

mere sanguinem, vt natura recreetur, & non expectare quoad sanguis contaminatus fuerit? Si plethora est, eaque natura molesta, soluatur is habitus, & pertundatur vena: si cacochymia, relicto alio solemnio remedio, de purgando corpore cogitetur. Quanquam non desunt ex recentioribus qui nitantur & autoritate veterum, & ratione docere non posse cacochymiam adesse, quin adsit simul & pleonexia si non ad vasa, ad vires saltem, quòd ij prauis humores non solùm suâ qualitate infesti sint (à qua cacochymia nomen desumitur) sed etiam suâ quantitate. Sed iis salebris relictis, quæramus num in febribus tertianis (quod & ad alias à putri humore natas febres extendi potest) tutò vena secetur ante tertium paroxysmum. Materia quæ committit tertianas, extra vasa est: humor est primùm laudabilis suâ naturâ, sed qui per putredinem quæ tempore aggreditur, & per gradus quosdam naturæ infestus fit: febris essentia & *ἡ παρὰ τὴν* in ignea natura consistit (vnde absoluto nomine *πῦρ* vocatur) materia quæ accensa calorem illum fouet, conscripta conclusaque loco est, an ea educitur sectione venæ? Hic multa occurrunt quæ limatiùs excuti possent, & longiore tempore, sed non est huius loci atque instituti. Primum, an quia in maioribus venis materia nõ continetur, quæ intermissionis participes febres committit, id eò locus sit sectioni venæ? Quod quoniam à Neotericis disputatur, & contrà à maiore eorum qui cum nominis celebritate, & ægotantium auxilio Medicinam faciunt, agi solet, hac disputatione sumus superfessuri. Constituatur enim tanquam postulatum in intermittentibus febribus, venam tutò ac ex arte secari. Quæstio tantùm est de tempore, & an expectanda sit humorum putredo, antequam aperiatur vena, vt Arabum familiæ placuit. Quod diligenter intelligendum est, ne quid hic temerè fiat & peccetur. Humor qui hodie paroxysmum committit, an putris, an imputris? si putris erat, quare superioribus diebus non committebat febrem? si imputris, & intra naturæ limites contentus, quomodo febrem putrem committit? Quia putrescit (inquies;) ergo quandiu aderit putris humor, tandiu perseuerabit accessio? Verum illud est; nam diffatur humor qui in hac accessione putruerat, vnde perfecta *ἀπορροή*. Quæ non contingeret nisi discuteretur humor putris; hinc confusæ vrinæ, hinc sudores. Ergo reliqui humores imputres sunt? Quorum itaque expectandum donec putruerint humores? Nam

tantum humoris putris, quantum vni accessioni satis est. Et sic humores non educuntur venæ sectione nisi laudabiles in causa antecedente (vt aiunt) & illaudabiles in causa coniuncta. Sic multa paruo quasi suscitabulo quæstionis genera excitantur, quæ non erit facile delere nisi maior occasio & otium nobis superpetat, cum eorum alioqui euolutio & explicatio magnum sit alatura commodum iuxta ac voluptatem. Sed non possunt omnia vno loco. Vt autem paucis terminetur quæstio, quæ paucis fomitibus excitata in immensum excrescere possit, id quod ratione & experientia percepimus, apertè declarabimus. Non est in eo diutiùs hærendum, in quo dubitatur, si in vnaquaque accessione discutitur totum quod putret, vnde in quartanis & tertianis perfectam esse apyrexiam, Galenus ostendit (nisi quòd in quartanis die intermissionis raritas & tarditas in pulsu manet.) Si totum quod putret discutitur, quid est quod expectemus huc aut illum diem, hunc aut illum paroxysmum, donec sanguis putreat? Nam finita accessione humores reliqui expertes putredinis manent, vt videtur, contra tamen fit. Aliud enim est humorem paroxysmi autorem putrere, aliud est massam sanguinis vitium concipere. Etsi enim humor qui accessionem committit nondum putruerat, & post paroxysmum totus discutitur, tamen aliud est vitium in sanguinis massa tanquam causa antecedente morbum diutiùs alitura, futuraque, cuius occasione demendi sanguinis captatur occasio. Quotiescumque enim in corpore febris concepta est, febrilis caloris vi humorum moles facillè corrumpitur. Vnde sæpe secundo aut tertio morbi die missum sanguinem laudabilem deprehendimus, progresso tantisper morbo apertâ venâ putrem ac virentem fluxisse: quod argumento esse debet minimis momentis magnas in corpore ori mutationes in hanc aut illam partem. Sic ratione illius putredinis sanguinis celebratur venæ sectio. Quorsum itaque ante putredinem in massa conceptam celebratur? ratione plethoræ. Sed iuuatne expectare quousque vitium in massa conceptum fuerit? illa quæstio est de qua disputatur. Id duabus rationibus aut tribus fieri debet. Prima est, si incendij concepti in humoribus maior habetur ratio, quàm copiarum humoris morbifici in præcordiis. Nam cum in paroxysmis vrget æstus, apertâ venâ ille præcipitatur, præuertiturque; vnde minus empyreuma, minus postea incendium & febris: sed si maior occasio ma-

202 CONSILIORVM MEDICINALIVM.
 teriæ in præcordiis, ad purgationem veniendū. Secunda, quoniam cum vitium massæ sanguinis communicatum aut ratione caloris febrilis, aut ratione vaporis, paulò tum morbus dicitur maturior, & natura irritatur magis: atque ita irritata natura per missionem sanguinis illius putris paulò post reficitur ac recreatur. Nam post eiusmodi euacuationes sequitur aut alui fluor, aut sudor, qui faciliè morbi reliquias discutit. Tertia ratio est eiusmodi, cum plethora adest, aut ad vasa, aut ad vires, sine vlla mora ferire venam oportet: nam præsentè incendio febrili, & sanguinis copiâ faciliè strangulatur calor naturalis, hinc suffocationis periculum: hinc raptus humorum sursum, deorsum, & symptomatum augmentum.

Ratio quæ efficiat sæpe vt primæ venæ sectionis nulla ferè sit utilitas, est quòd parcâ manu nimium ea celebretur. Si enim liberaliùs sanguis mitteretur, dubio procul manifestior foret utilitas. Cetera alio loco fusiùs poterunt explicari.

ANNOTATIONES.

1. Ne quis fortè litera Arabum vim afferat, imponâtque, vt quidam solent facere, contradicendi studio, nos ipsius Principis verba referemus. Nec enim absolutè tertiam accessionem prætermittendam vult antequam venam secemus. Verba autem eius sunt dum curam instituit febris tertiana vera, si possibile est vt non phlebotometur ager nisi post tres paroxysmos. Non est itaque cur absolutè quidam dicant Principem in febribus tertianis non secuisse venam nisi post tres paroxysmos: Galenus 1. ad Glaucon. in cura tertiana vera non meminit venæ sectionem, totus ferè est in alterando. Paraphrastes ait illo loco non multum Galeno piacere enarrationem, quæ fit aut per venæ sectionem, aut per vehemens medicamentum. At dum ex professo tractat de febre tertiana notha, meminit venæ sectionis. Sed notanda verba sunt, quoniam circumstantiis plena sunt. Sunt autem hæc: Si sanguinis missione opus est, nec est ea omittenda, sed initio statim destrictes, distinctis iis quæ probe nosti: id est, videndo an ex collatione virium cum morbo, & huius cum illis ager sufficere queat profligando hoc morbo: item obseruâtâ etate, tempore, & ceteris. Rondeletius carpit Galenum, quod is voluit in febre tertiana (de exquisita loquitur) expectandum esse tertium paroxysmum antequam vena aperiatur. Quod falsò à Rondeletio dictum est. Nisi fortè ex cap. 15. lib. 11. Methodi hoc desumpserit. Sed hoc verum non est, nec de ea re audiendus est.

2. *Mirum quod scribit Galenus commen. in aphor. 43. lib. 2. de diata quibus sanguis copiosus & nondum insigniter immutatus in naturam alterius humoris, iis detrahendus etiam audacter: quibus vero iam mutatus est, non detrahendus. Tamen contra factitamus, liberius vacuamus & audacius cum videmus alteratum, quam cum purum. Immo Galenus in melancholia audacter sanguinem mittit cum videt sanguinem in habitu esse melancholicum. Et nisi ille locus de pleuritide & inflammatione parvis intelligatur, non potest tolerari. de quo est videndus comm. in aphor. 10. lib. 2. de diata acut.*

CONSILIVM XLV.

De Lethargo.

VIDVA Domini Garnier Procuratoris annos 45 nata in morbum incidit. Habitu erat fatis succulenta, alba, genis rubentibus. Ægritudine aliquâ animi detinebatur quâ sese eximere faciliè non poterat. Circa æquinoctium autumnale, cum præcessisset temporis constitutio inæqualis (qualem pauci admodum animaduenterant) putredinis parens, in morbum incidit. Primum totum corpus maculis rubris, ac si morbillis laboraret, aut si ingens æstus foret, erat defœdatum, nonnullus corporis torpor, appetentia deiecta, ignauia, rerum omnium contemptio, cum alioqui prudenter rerum omnium satageret, & ad omnia obeunda mûnera esset alacris: Quod magnâ morum dissimilitudinem significabat, & ad iudicandum de dubio ancipiti que exitu occasionem porrigebat. Febris continua fuit, de nocte maximè exacerbabatur, nec exacerbationis nullum signum erat quod anteiret. Sed confusa erant omnia. Magna non ita febris apparebat, vt ea nos moueret Febres eo tempore grassabantur mali ingenij. Vrinæ fallaces erant: nam nec incendij indices erant magni: & sedimentum laudabile fatis, & enæorema continebant. Comatosa erat, nec nisi interrogata respondebat: alieni tamen iudicij nullum erat signum. Capiebat fatis bellè cibum oblatum: Diebus iudicibus nil natura mouit, nihilque excreuit nisi arte sollicitata. Deiectiones variæ, putres admodum: sanguis bis missus planè putris: vires plurimum deiectæ apparebant, præsertim animalis, cuius etsi non

204 CONSILIORVM MEDICINALIVM
magna necessitas est, in morbis, autore Galeno in Methodo me-
dendi: tamen ad iudicandum nobis magnam præbent occasio-
nem. Primis decem diebus exactis, omnia satis moderata, pa-
cataque fuerunt: sed ab vndecimo aut duodecimo die magnū
apparuit incendium, ex interuallis graucolentissimæ deiection-
nes, leuia deliria, oculorum lacrymæ inuoluntariæ: genarum,
ac præsertim sinistrarum rubor sature admodum. Tandem
cūm vrinam redderet inuoluntariam, aut retineret aliquando
ac si suppressa esset, inuoluntaria quoque alius descenderet de-
cimo quarto morbi die ab illa exacerbatione manifesta: vicesi-
mo autem totius morbi historiæ die, cum sudore magno (nullus
autem toto tempore febris apparuerat deliria, risus, taciturni-
tas sūma, tremores, & quasi subsultationes manuū aderāt. Potus
omnes sine discrimine admittebat, non sitiebat grauiter fe-
briens, potus veluti in profundum descendere videbantur: cūm
colluere os aquā iuberetur, non poterat ore reicere: bene ratio-
cinabatur) Interiit.

Hac historiā intelligi volumus sæpe morbum satis securum
apparere, cūm tamen per se funestus sit, nec satis prauæ diathe-
seos argumenta apparent. In plerisque initio morbi obseruau-
imus totam corporis cutim maculis rubris suffusam, quibus ta-
men nihil præterea alienum contigit. Sæpe enim aut sanguinis
æstus, aut cum feruore quodam iuncta malitia aliquid tale pro-
mittit: sed illum nihil periculi iunctum habet, sola aut sectione
venæ, aut blando cathartico quicquid est præuenitur. Tamen
tribus quatuorve argumentis malignitas & cacoethia morbi de-
prehendi poterat. Primum in eruptione illorum exanthematō
positum erat. nam nisi ingentis incendij tanquam manifestæ
occafionis excusatio subfit, quoties apparēt aliquid maligni sub-
esse demonstrant: Secundum, in deiectione virium subita. Quo-
ties enim vires nō constāt, nulla præsertim præeunte euacuatione
manifesta, aut simili aliquā re quæ iacturam virium faciat, aut
cūm febris vehemens non ad est, malum illud est vt signum. Ar-
guit enim aliquid aliud subesse latens ac reconditum, quod mi-
nimo momento magnam in viribus ac œconomia naturali mu-
tationem afferat. Et, quod notandum est, quodque Medicis
fraudi fuit, facies non concidebat vllō modo. Hippocrates
in Aphorismis scriptum reliquit, *Febricitantium non enī nūdō leuiter
corpus idem permanere, & nihil minus, vel etiam plusquam postules*

ratio contabescere, malum: nam illud morbum fore longum significat; hoc autem imbecillitatem. Vbi Galenus vult non abs re adiectum esse *μη πάποση ὀπισθαιώς*: quoniam hyeme, & cum plenitudo magna est, non collabitur habitus corporis, & tamen malum signum non est. Sed cum mediocris febris est, & tamen non mutatur corpus, nec in colore, nec mole, nec caractere: aut cum in his omnibus immutatur plus iusto, dubium non est quin hoc malum non sit. Nam non concidere ac collabi, & meatuum densitatem significat, & contumaciam materiæ. Concidere autem (quod Græcè dixit Hippocrates, minus propriè vsurpatur verbo *πυπῆκεσθαι*) plus quàm ratio postulet, imbecillitatem magnam significat; ita tamen vt collapsus illius non sit causa aliqua externa, quam *σανεῖαν παρῳασιν* aliis locis vocauit Hippocrates: & cuius in *ἐπιγνώσει ἐξ τῶν νοσημάτων παρῳασιν* maximam idem vult rationem haberi. Nam & ætas consideranda venit, & morbi aut breuitas, aut diuturnitas, & tempus, & regio, & notanda effatūque digna euacuatio, vigiliæ, exercitationes, muneris gestiones, aliæque id genus. Quibus non perspectis, si quis ausit absolutè pronuntiare de imbecillitate aut viribus naturæ pro extenuationis ratione, aberraret plurimum. Extenuatio illa (sic enim Leoniceus malè vertit *πυπῆκεσθαι*, contabescere, cum sumatur *ἀπὶ τοῦ κεφάλου*). Et Galenus comment. in aphorismum 10. lib. 3. Aphorif. *φθίνοντας* verbum ab Hippocrate positum pro *ἐπιγνώσει πυπῆκεσθαι* sumi ait, vtens verbo *πυπῆκεσθαι*, pro simpliciter extenuatis) quæ præter rationem euenit naturæ infirmitatem significat. Sed hoc *ἀδύνατος* non est intelligendum. Aliquando enim extenuatio est, vt causa ad imbecillitatem relata, aliquando vt signum. Nam cum cutis raritas, & humorum tenuitas extenuationis causa est eiusdemque celerrimæ, tunc illa extenuatio infirmitatem corpus; atque ita imbecillitatis causa est extenuatio. Sed cum nec raritatis cutis, & humorum tenuitatis suspicio non est, corpus autem præter rationem collabitur, ac concidit, illa extenuatio solum agnoscit virium infirmitatem, vt ex Galeno patet.

Atque vt ad scopum redeamus: In muliere proposita febris erat *ὄψα πάποση ὀπισθαιώς*, & tamen non concidebat nec moles, nec color mutabatur, nec caractere: an hoc ad securitatem, & diuturnitatem apparebat, cum vicesimo quarto die interierit? Nequaquam. Et hinc duo annotatione dignissima sunt: prius quidem, quod ille dies 24 erat decimus quartus dies ab exacer-

Comment.
in Ap. 10.
28. l. 3. a.
A. 2. 10.

batione. Nam, vt antè diximus, per vñdecim dies fatis alacrier habebat, & in actionibus naturalibus & animalibus, ac omnia pene securitatem pollicebantur. Sed quod intus venenum latebat cùm natura nil mouisset, cepit suę malignitatis signa edere; hinc febris continuã, acerrimi caloris perfusio, mox eiusdem contemperati significatio. Atque ita morbus acutus fuit, si ratio habeatur exasperationis morbi, non totius historiae. Posterius, dicendum est verisimile fuisse morbi quidem ratione citius illam interire, sed ætatis ratione quæ adhuc constabat factum, vt qui morbus antè perimere deberet, prorogaretur. Ita nimirum accuratè disputauit Galenus in Epidemiis, narrans historiam Hippocratis de Sileno. Hic enim cùm à causis procatartâticis in morbum incidisset, non tam lethali morbo est implicitus ob causas procatartâticas, quàm quia occasiones alię essent quæ corpus morbo oportunitum reddebant: alioqui ratione externarum causarum in leuem febriculam lapsus fuisset. Sed lethalia symptomata quæ primùm atque statim apparuerunt, iudicio fuerunt restagnare materiam malam, quæ à causis illis externis excitata lethali morbo ægrum implicuit. Ita intelligendus Galeni locus in lib. de febr. cùm ait causas procatartâticas putridarum febrium non esse autores; id est, procatartâticæ causę *προκαταρτῆος* dictæ, per se non solent putridas febres concitare, sed si corpus morbo sit oportunitum, ex euentu producant & excitant febres putres. Ergo ille Silenus cùm funestissimo morbo detineretur, eius tamen vim sustinuit propter etatem ad vñdecimum diem.

Comm.
in histor.
2. sect. 3.
lib. 1. Epidem.

Cap. 7.
lib. 1. de
differen.
febr.

Hoc addam, antequam extremum persequamur, de faciei caractere & mole quam in illa muliere non concidisse dicebamus: sepe & optimus color, & caractere in egris apparet, cùm tamen morbus ad interitum tendat, tribus de causis. Primã ratione, aliquando ipsius febris quæ sursum multum tenuem vaporem effert, qui viriditatem aliquam faciei, fallacem tamen, afferre solet: Secunda, si febris ea non sit ingens, aut *συντεταμένη*. Obseruauimus enim aliquando febres *συντεταμένης* & pestilentiales (quas in quodam loco Galenus vocat pestilentiales hecticas) primo quoque tempore in speciem quandam marasmi ægros coniecisse: Tertia, si qui ægrotat, pulmonum vitio non sit obnoxius. Qui enim ita affecti sunt, rubore sæpe suffunduntur, qui Medicis minimè aduertentibus imponit maximè. Quod cùm

aliàs, tum maximè in hac muliere apparuit; nam cum paulò increuerat febris, rubore multo erant saturatæ genæ, præsertim verò sinistra. Aperto autem cadauere, vt postea dicemus, reperi sunt pulmones veluti putres, costis adherentes. Accedit ad rationes superiores, quòd qui præpingues sunt ac optimè habiti non ita facîle collabuntur: aut si extenuentur, illius extenuationis & *επιπίεσις* (collapsus interpretor) magna non seprodunt argumenta.

Atque vt reuocemur eò vnde digressio facta est: Tribus de causis patuit, sed non manifestò malignitas morbi & *κακότης*. Primum ob eruptionem papularum, quas *καθίματα* Hippocrates vocauit in Epid. Illa enim eruptio (nisi fortè ob causas alterâ paginâ dictas aliud significet) malignum, & *κακότης* subesse declarabat. Et videor eorum quæ scripta sunt ab Hippocratis interprete Galeno narrare historiam 4. in sectione, tertia 3 Epidemior. Ait enim, initio sæpe morborum lethalia symptomata apparere, non quidem ratione ipsius morbi qui clemens & mitis apparet: sed propter latentes prauos humores, qui virulentiæ suæ semine excitato, in lethaliibus symptomatis elucescunt. Secundum argumentum est positum in tam breui virium casu. Nam cum alacris, expedita, robustaque foret, breui attonita, stupida, comatosa, omnium obliuiosa reddita est, & delirata. Tertium, quoniam in diebus criticis nil natura mouit, nullus sudor solâ *επιπίεσις* quæ in morbis istis suspecta esse solet. Quartum coma quodammodo vigilans, non tam ab oppressione tuit, vt falsò Medici putabant, tametsi multa in cerebro humiditas contineretur, quam in infirmitate facultatis nati animalis in cerebro sedem habentis. Testis inuoluntaria excretio stercoreis. Testis quoque esse potest quod medicamentis, & sectionibus venæ ex arte rectè præscriptis nil alleuatum sit cerebrum: quod contingere non solet cum ab oppressione tantum laborat. Nulla enim tam valida cerebri est oppressio, quam medicamenta, & sectio venæ commodè præscripta non minuant. Quintum illud addâ de meo. Obseruaui enim sæpe eos aut extreme laborare, aut interire, quibus acris calor, & eiusdem temperati ex interuallis vicissitudo est. Nec enim vicissitudo solùm caloris & frigoris mala est, vt in Coacis & Prorrheticis voluit Hippocrates: sed vicissitudo acris calor, & remissi mala quoque. Et illam vicissitudinem explicat Hippocrates, cum vtitur vocibus *τα πλά,*

Nec enim vertere oportet, non omninò, sed τὰ πολλὰ, ex interuallis, vt modò hoc fiat, modò illud. Vel meliùs, τὴν πολλὰ, magna ex parte. Vt non sentire, non ratiocinari, non fitire τὰ πολλὰ, id est, magna ex parte: id est, ratiocinandi, & desipiendi viciffitudo est sentiendi, & non sentiendi, sitiendi, & non sitiendi. Quod autem multò meliùs & accommodatè magis, τὰ πολλὰ, ver-
 tamus, per verbum. Viciffitudo, vel magna ex parte, illud abũ-
 dè declarat aphorismus Hippocrat. in Coacis: ἀρεὰ ταχὺ ἐστὶ ἀμ-
 ερότερον μεταπίπτειν, ἢ διὰ ποικίλης ποικίλης. Vocat enim ἀρεὰ μεταπίπτειν.
Extremæ partes modò refrigerantur, modò recalescunt. Vel, Extremæ
 partes magna ex parte calidæ sunt, & magna ex parte frigidæ.
 Et eodem loco διὰ τὴν μεταπίπτειν vocat, sitis, & non sitis, seu potius
 sitiendi, & non sitiendi viciffitudinem: ita nomen μεταπίπτειν hoc
 loco sumitur pro mutatione viciffitudinaria in contrarias par-
 tes; vt cùm quis delirat, postea non delirat: cùm nunc sitit, mo-
 dò non sitit: modò calfit, modò tepidus est aut refrigeratur. Ita-
 que cùm Hippocrates in Aphorism. scripsit, ἰσότης ποικίλης πρὸς αὐ-
 ματος, τὰ πολλὰ ἔστι πόνον μὴ αἰδανόνται, &c. Idem est ac si dicat, vt
 τὸν πόον sit μεταπίπτειν: vel vt meliùs dicam, sit ἢ αἰδίσσης μεταπίπτειν.
 id est, sentiendi, & non sentiendi viciffitudo aliqua. Vt totius
 aphorismi ea sit conuersio: Qui parte corporis aliquâ laborât,
 & magna ex parte dolorem non percipiunt, mentem his ægro-
 tare constat. Hęc pluribus explicari voluimus, quoniam horum
 enodatio latiùs manatura est.

Sed quæritur, an verum quod antè diximus, non solùm ca-
 loris & frigoris viciffitudinem in acutis malam esse, sed si calor
 modò acris appareat, modò temperatus & tepens, quod ἀσθεν-
 μόνειν vocat Hippocrates? De viciffitudine caloris & frigoris
 quòd mala sit, non dubium est, præsertim in acutis. nam signi-
 ficat hoc extinctionem caloris naturalis, qui vnusmodi cùm
 sit, partibus omnibus blandè aspirat, & dominium febrilis calo-
 ris, qui cùm expanditur ad partes, eas calfacit; cùm ad centrum
 reuocatur per modum inflammationis, easdem partes deserens,
 ex euentu refrigeret. Ita enim quidam Philosophi frigus per
 caloris priuationem & absentiam definiebant. In acutis itaque
 malum hoc. Nec mirum si in acutis tantùm meminero; ac si quis
 velit in omni morbo eam refrigerandi & calfaciendi viciffitu-
 dinem perniciosam esse: quod non ita est. Et ad eam rationem
 impulit me aphorism. 40. lib. 4. Aphor. *Vbi in toto corpore muta-*

tiones (vtitur enim nomine \dagger μεταβολῆς) etsi corpus refrigeretur, & modo calfiat, aut coloris mutatio fiat, longitudinem morbi significat. Aliud enim est ista viciffitudine longitudinem morbi significari, aliud periculum. Nam in acutis periculo non vacat, in mitioribus morbis, longum fore morbum significat. nam & focum multiplicem significat, & materiam $\epsilon\pi\epsilon\sigma\sigma\upsilon\tau\iota$. Positum itaque & demonstratum viciffitudinem istam contrarij malam esse: sed dubitatur, an malum quoque sit modò calorem acerrimum sentiri, modò temperatum.

⁶ Hac de quæstione nil vnquam scriptum reperi, eaque propter ego liberè quid sentiam enucleabo. Solemne est in multis febribus, præsertim in phlegmaticis calorem acrem apparere, & eundem temperatum præsentente febre: hoc tamen malū non est; nam aut varietatem tantum materiæ declarat; aut caloris in materia viridi oppressionem nequeuntis emicare, quod appositè $\alpha\lambda\lambda\acute{\alpha}\mu\alpha\tau\epsilon\upsilon$ vocat Hippocrates: Nec malum quoque significat in febribus cum catarrho coniunctis, in quibus sæpe obseruamus modò emicationem caloris, modò eius teporem. Item fieri potest vt calor naturalis modò superet febrilem, & contra fiat; hinc acrimoniæ perceptio, hinc teporis: & tamen hoc vacat periculo. Sed his breuì satisfiet.

Cum de viciffitudine agitur, videndum quod corpus, quis morbus, & qualis sit viciffitudo, an frequens, an non. Nam in biliosis corporibus, in quibus calor totus acer est, non est expectanda viciffitudo caloris acris & moderati: sed si morbus perniciosus est, pro moderati caloris perceptione, frigoris sensio sufficitur. Breuì enim calor blandus si quis est, extinguitur. Sed in corpore $\alpha\upsilon\pi\acute{\alpha}\rho\chi\omega$, quadrato, subfrigido, muliebri (quod nunc explicandum suscipitur) frigidis aut temperatis humoribus scænti, non est quod expectemus extimas partes refrigerari, vt in aliis corporibus biliosis fit, nisi fortè diutiùs ægrotent: tunc enim refrigerium apparet. Itaque quod apparet viciffitudo frigoris in biliosis & extenuatis, idem esse potest moderati tepidique caloris sensio. A materia enim vapor effertur, qui cum putris sit, sensum acrimoniæ affert; cum calidus, caloris sensum. Quod autem absolutè & per se frigus non appareat, id facit cõtinuitas febris. At continua est, dices, in biliosis? verum: sed duo consideranda sunt: Vnum quod in biliosis incendium & calor intus conceptus facilè reuocat calorem diffusum ad suum

centrum: Item non sunt humores moderati in quibus fouetur perpetuò febris. Sic videmus quadratos semper calere hyeme, nec multùm calere æstate: siccos, macilentosque hyeme algere in extimis, æstate ardere. Algent autem in his extrema; quoniam caro multa non est, quæ sit pro velamine & præsidio aduersus frigus ambientis. Sic Galenus in comm. in 1. Aphorism. eos qui carnem habent multam, & succulentam, ventresque calidos hyeme, & tamen non algent, vt macilenti, comparat cum iis qui niue perfunduntur: qui cum breui frigeant, reuocato per *αυξηματιν & επωδονου* calore, calidiores solito redduntur. Atque idem contingit iis qui pituitosi sunt, & funesto morbo corripiuntur. Non enim in iis sensio apparet frigoris, sed tepor quidam, vt modò incalescant, breui tepent, quod satis malum est signum, in iis præsertim si vicissitudo ista sit frequens. Nam si vicissitudo ista frequens non est, malum non ita est signum. 7. Sed cum frequens, inanem conatum naturæ declarat, putris materię copiam, à qua modò effertur vapor, modò non effertur. Idemque contingit quod in fimo putrente. Nam dum teter malignusque vapor effertur, sensio fit acrimoniæ: cum non effertur, febrilis calor tantùm restat qui partes calidas reddit. Ergo dictum est de corporum varietate & de vicissitudine. Nunc de morbo dicendum breui. Cum acutissima & manifesta est febris in corpore calido sicco breui perfrigerationem extimarum partium affert: cum autem maligna est febris, in partium imbecillitate summa posita, & humorum prauitate; nec acuta ita est acutici vim habens in calore, sed toto genere maligna, minitans aut parotides, aut abscessum alium morbo imparem, aut pustulas (quod contigit octauo die Sileno, 1. Epidem. & tamen undecimo interiit) non ita partes extremæ alger, præsertim si corpus carnosum sit (quod impressio caloris à sanguine & spiritu faciliè in carne remaneat) sed febris perseverans teporis, & acrimoniæ sensum exhibens: tandem cum calido sudore corpus tollit. Ita enim videmus quosdam interire cum perfrigeratione partium & sudore frigido (vt contingit siccis & extenuatis) alios cum toto febris tepore non sudauerint, aut leuiter tantùm, sine vlla perfrigeratione, cum vniuersali sudore, multo, calido occidere: quod & huic mulieri contigit, & cuidam Flandro mercatori febre pestilenti confictato.

item & dominæ illustri febre quoque pestilenti laboranti: de qua abundè narrauimus pag 34. huius libri. Atque ita minimè opinantibus nobis multi moriuntur, quoniam non vident vllam partium perfrigerationem, quam in aliis quondam obseruauerunt. Nos autem obseruauimus istam partium perfrictionem in morituris, cùm corpus siccum calidumque est, calore igneo & acri, quod Hippocrates τὸ θερμὸν absolutè vocat, & eo præditos calore τὰ θερμὰ, καὶ θερμοκοίτης. Item in iis obseruatum est quibus in partibus internis conceptum est incendiū. Nam & cùm sudore frigidissimo moriuntur, & cùm summa partium refractione: vt vidimus in vico S. Antonij, in quodā nobili viro, cui aliquid erat erysipelatodes circum ventriculum. Quòd autem corporum distinctio afferat varietatem criseò, siue ad mortem, siue ad salutem, siue per sudores, siue absque sudoribus; siue cum calidis sudoribus, siue cum frigidis, siue cum extimarum partium perfrigerio, siue sine eodē, multis & autoritatibus, & rationibus potest roborari. Vnus autem aphorismus Hippocratis hinc abundè erit, præsertim quia nos breuitatis studium recreat: Οκοπίσι θερμὰ καὶ πεπλεγμένα φλέγα καὶ ἕρπια αὐτῶν ἰδρωτῶν τελευτῶσι, &c. *Quorum cutis arens, & præsicca circumtensa est, ii sine sudore moriuntur.* Contrà autem, vt idem aphorismus notat, cùm cutis laxa & rara est, cum sudore moriuntur. Quod satis indicat pro ratione cutis & subiectarum partium, quibus aut multum humoris inest, aut cum sudoribus, aut sine sudoribus homines iudicari. Et antequam hinc pedem efferimus, notare volumus parum acutè Plantium Galeni interpretem ex Philothei sententia verbum τὸ τελευτῆν, vertere noluisse, mori, sed, iudicari. Vt τελευτῶσι ponatur loco verbi κρίνονται. O acutum hominem! τελευτῆν significat desinere, mori, terminari, iudicari. Nil interest an mori, an iudicari, veritas; siquidem mors non fit sine crisi: & crisis æquè ambigit, tenditque & ad salutem, & ad mortem. Si τελευτῆν αὐτῶν τῆ ἀποθνήσκου sumas, angustior, restrictiorque erit aphorismus, si αὐτῶν τῆ κρίσεως latior & multò generalior.

Præter hæc quæ superius posita sunt, tria possunt quoque hoc loco pertractari, quorum in explicatione operæ aliquid lubenter ponimus, quòd inde plurimum adiumenti consequi poterimus. Primum est de comatosa affectione cum vigiliis: & cùm dormiret, quamuis comatosa, facillè tamen excita-

batur, & interrogatis respondebat. Secundum est, qui fieri possit vt malè affecti cerebri tot essent argumenta, nempe coma quodammodo ἀγρυπνία, tremores nonnulli, risus, deliria, excretionés inuoluntariæ: obliuio & despectio omnium rerum, dissimilitudo morum omnium, & impotentia (quam in Coacis Hippocrates ἀδυναμίαν vocat, quamque κενότατος καὶ ἐόντος, malam esse ait, id est, si præeuntis euacuationis alicuius nulla excusatio possit afferri.) Si, inquam, tot tantæque fuerint malè affecti cerebri argumenta, qui fieri potest vt tamen ratiocinatio integra fuerit? Cur deliria ista, comæque non euerterunt ratiocinationem? Quæstio hæc viro crudito dignissima. Tertium est de murmure ventris inferioris, & tensione, cùm tamen aliud ferretur: immò quò diligentius de aluo subducenda cogitabatur, eò magis venter intumere videbatur. An hoc bonum fuit? Nam ventrem inferiorem non collabi ac deprimi in omnibus morbis bonum esse scripsit Hippocrates. Sed hæc longiore explicatione egent.

Apho 35
lib. 2.
Aphor.

De primo paucis aperiam. Coma aliud simplex est, aliud vigilans. Vigilans ab vno humore non fit, omnium iudicio, sed à mixtione humoris tenuis calidi, & crassi frigidi. Tamen, quod diligenter notandum est, reperio apud Galenum comm. in partic. i. primi Prorrhætic. Comatis vigilantis duplicem causam: vna est sanguinis copia: hic sanguis ratione copię comatosam affectionem inuehit: ratione autem tenuioris substantiæ, quæ in illo est, vigiliæ quoque accidunt: Altera cùm bilis mixta est pituitæ. Vtrum deterius? quibus signis discernitur causa vtraque. Quod à remissione pituitæ cum bile deterius est. His autem signis deprehendes à sanguine esse, præter ea quæ dominatum humoris, aut in parte aliqua, aut in toto corpore denotant: Nimirum si primis diebus celebrata ex arte sectione venæ, aut vsurpato alio remedio, & copiam sanguinis euacuare solito, & acrimoniam tenuioris eius partis temperare consueto, non cesset coma vigilans, talis symptomatis causam statuere oportet bilem pituitæ commistam. Quod eò loci pluribus Galenus explicauit. Hoc autem subindicarat obscure Hippocrates illâ primâ sententiâ Prorrhæticæ: *Comatosus vigilantibus cum hypochondriorum dolore & colli stillatio è naribus perniciosa, tum alias, tum si quarta ceperit die.* Ac si dicat Hippocrates, comatosos illos vigilantes verisimile est in eiusmodi affectionem incidisse à solo do-

minatu sanguinis. Si ergo peius habeant quarto die (quod stillidium sanguinis denotat) quo præfertim tempore cessare, aut mitescere deberet morbus solemnibus vsurpatis remedijs, significat hoc non solâ sanguinis copiâ, sed bile & pituitâ cerebrum occupari. Cuiusmodi affectio fuit mulieris nostræ.

Secundæ quæstionis explicatio vberior em continet fructum, maioremque voluptatem est allatura. Qui fieri possit vt integra esset ratiocinatio, eum tamen in imaginatione erraret, comatosa esset, corpus non pene moueretur? Immo si quod occurrebat delirium, excitata statim ad se redibat. Nec respondendum quod scribit Galenus comm. in particulam illam: *Mense aberrantes, acutè superfebrientes.* &c. In priore Prorrhethici, quod cum humores biliosi aut alij feruntur in cerebrum; animum perturbât, cum reuocantur, in aliâmq; fluunt partem, eundem restituunt. Nam affectum esse cerebrum per se, id est *νεροπυθίαια* Græcis. continuitas affectionis indicabat: nisi quod ratiocinatio integra foret. Quod vt intelligamus, altius hanc quæstionem repetere conuenit. Nimirum qui fieri possit vt cum vnus partis vnus sit temperamentum à quo actio manat, quodque tanquam fons est; tamen in vna actione læsum sit aliquid, seu pars læsa, in alia actione illæsa ac intemerata. Si vnum temperamentum, cur sunt actiones contrariæ ab eo prodeuntes? Et cum ab eo tanquam principio actiones manent, cum vna salua est, læsâ aut abolitâ alterâ? Quæstionem hanc diremisse Galen. videtur in cap. 3. lib. 3. de symptomatum causis, & in aphorismis. Scribit enim, ex actionibus quæ ab eodem principio manare cernuntur, quasdam magis vna qualitate gaudere, quam altera. Vt coctio, quia sine motu aliquo fit, in calido & humido consistit potius: attractio, expulsioque, quoniam cum motu aliquo imperûque fiunt, in sicco potius consistunt. Ita nimirum ventriculus multum calidum & humidum coquit optime, sed non trahit nec expellit facile. Contra si ficcus pellit ac attrahit potentiùs, minimè autem coquit. Renes in diabete quamuis summè laborent, non desunt tamen serosam humiditatem attrahere; immo in iis maior attractio cernitur fieri, quanto siccitas calorque ceteris qualitatibus antecellit. Ita enim ex actionibus quædam sunt *νεροπυθίαια*, & vt sunt eiusmodi, aut illiusmodi, ita qualitatibus aliis *νεροπυθίαια*, & vt sunt eiusmodi, aut illiusmodi, ita qualitatibus aliis *νεροπυθίαια* que magis minusve gaudent. Contra tamen afferri potest locus Galeni, quo videtur negare facultates quatuor

Comm. in
aphor. 20.
lib. 2. A-
phor.

Comm. in
aphor. 20.
lib. 2.

Cap. 3. lib.
6. de loc.
affect.

1. Ca. lib.
3. de rem.
peram.

primis illis qualitatibus esse addictas, sed quicquid in corpore agitur, præsertim quod ad nutritionem pertinet, illud ipsum toti substantiæ ascribendum esse censet. Quod si ita est, rationes nostræ superiores parum acutæ videbuntur. Verba autem Galeni hæc sunt: *Quatuor corporis propriae sunt facultates, attractrix, retentrix, alteratrix, segregatrix: ac eadem facultates totius in quouis corpore substantiæ sunt, quam substantiã ex calido, humido, frigido, siccoque inter se mixtis fieri existimandũ.* Ille locus planè conuincit attractionem, coctionem, & sic de ceteris, non referendas esse ad qualitates has aut illas, sed ad totam substantiam. Nã vt postea subiungit Galenus eodem loco, loquens de nutritione quam à tota substantia fieri contendit, medicamentum autem non nutrire, quòd à tota substantia non immutetur, sed ab vna tantum qualitate. *Si corpus (inquit) vna earum qualitatum quas in se habet, corpus sibi admotum mutaret, id ipsum tota substantia agere non est, nec quod ab eo mutatur, ei assimilabitur.* Sed locus ita conciliare alienum non est: Bifariam autem respondere licebit: illo loco tantum pro hypothese ponit quatuor illas facultates totius esse substantiæ, vt doceat medicamentum quodammodo alterari à corpore, sed non ita alterari vt in alimentum cedat; quia id tantum per qualitates præstatur: sed cum nutritio fit, cuius administræ sunt attractrix, retentrix, expultrix, ea à tota substantia fit, vt id quod mutatur, principio quidem dissimile, tandem reipsa pars fiat, ex carne & pane os, recipiatque ipsius partis *contentum*. Sed fit ita tantum loco *positum* hoc sit, quam non probavit, verisimilior hæc ratio esse videtur: Quatuor facultates totius sunt substantiæ, quia resultant in composito ex mixtione quatuor elementorum, & conspirant in nutritionis officium: nõ proinde tamen sequitur quin commoditates sequantur ex vna potius qualitate quam ex altera, vt licet & siccitas & humiditas ad actionem conferant, tamen siccitatis potentia & energia eluceat potius in attractionis & expulsionis munere, quam in procuranda concoctione. Vel ita scrupulus hic tollendus: Vel consideramus facultates quatuor in genere, vel in specie: In genere, cum vna conspirant in publicum munus coctionis, nutritionisve: vel quatenus in se singulæ spectatæ magis aptæ sunt ad hanc actionem adiuuandam quam ad illam. Priore modo considerauit Galenus illo loco libri tertij

de Temperamentis: posteriore verò in aliis locis.

Vt autem hanc longam satis disputationem nostro instituto accommodemus: quemadmodum in vna qualibet parte variæ eduntur actiones tanquam ab vno communi principio manantes, sed quæ tamen facultates diuersas ei parti tributas & confusas: ita fieri potest vt actio vna pereat, alterâ incolumi necnon integrâ parte. Ita nimirum in cerebro phâtasia valet, cômunis sensus valet, & tamen iudiciû & ratiocinatio agra est: quod pluribus explicandû nō est. Impraesentiarû autê sufficiet illud exemplû de melancholicis, quorû meminit Galenus. Horû enim quidâ se testam esse putabat, ac vicitim inclamabat, vt omnes fugerent, ne aliorum tactu pressive collideretur. Quatenus enim se testam putabat, eatenus ratiocinatio laborabat minimè, sed phâtasia. Nunquid enim præclarè ratiocinabatur læsum iri se aliorum pressu, si terreus, aut vitreus foret? Mirum itaque non sit si de qua disputamus mulier ratiocinandi facultatem integram haberet, cum tamen in ceteris cerebri functionibus malè satis haberet. Huius autem rei mihi probabilis hæc ratio esse videtur.

Aliud est lædi offendive cerebrum in iis functionibus quæ animales esse dicuntur, clarioris doctrinæ gratiâ, & ad cerebri ipsius temperamentumque pertinent: aliud verò lædi in iis quæ ad eam partem pertinent quæ mentis & consilij est. Priore modo dicitur læsum in animalitate: posteriore in ratiocinio. Hoc autem indicabit historia cuiusdam Polemarchæ generosissimi D. de Brissac. In hoc omnes actiones cerebri offensam receperant; non mouebatur, delirabat, in summo æstu non fiebat: magnum & rarum spirabat, immemor sui erat. Hæc omnia læsum cerebrum indicabant, & tamen commodè ratiocinabatur, ac præclarè de rebus diuinis sensa mentis exprimebat. Spiratio tarda imbecillum cerebrum declarabat, rara imbecillam ratiocinandi facultatem; nec enim intelligebat se magnâ inspiratione aëris ob æstum indigere. Sed quod attinet ad consilium, & animi vigorem, apparuit semper vis eius patris quæ ratiocinationis præclaro munere quoque proximè deos attingit, sese ostentat, cum satis supina, languidâque esset vis illa quæ corpori & appetendo, & respirando prouideri consilique debet: id est, vis animi quæ bonis cogitationum epulis & consiliis alitur, ac reficitur, vigebat: quæ autem à cerebri naturali temperie pendet, quæque corporea esse magis videtur, languet.

ſcebat. Quod ſolum argumentum immortalitatem animæ contra Epicureorum gregem conuincit. Nam in animo duplex vis apparet, vna diuina planè, non aliunde mēdicata quàm ab ipſo cælo: altera paulò pinguior ac terrena magis, quæ elucet quando in corpore anima detinetur. Poſteaquam abſoluta eſt corpore, prioris vis elucet ac eminet. Ac ſic intelligere oportet Hippocratis & Galeni varios locos. Nam modò animum ægrotare ait, modò eundem in ſomnis feriari ac otiari, modò in iſdem ſomnis erigi ac vigere: quæ quoniam admodum controuerſa ſunt, non erit abs re ſi eos locos conciliauerimus. In Aphorifmis mentem ægrotare dicit, vtitur nomine $\psi\acute{\omega}\mu\epsilon\varsigma$, quæ idem eſſe cum nomine $\delta\alpha\beta\acute{\omega}\iota\varsigma$ ſcribit Galenus. Quid hoc eſt animam ægrotare? an ægrotat? Videtur idem Hippocrates negauiſſe in libris de Diæta, *Impoſſibile eſt*, inquit, *naturam obſcuram transformare*, id eſt, immutare. Prius enim locutus erat de altera natura manifeſta quàm in temperamento & quatuor primarum qualitatum ſymmetria conſiſtere demonſtrarat. Quid ergo eſt, mentem ægrotare in Aphorifmis? Eſt $\alpha\gamma\epsilon\tau\acute{\omega}\nu\ \tau\omicron\ \alpha\iota\delta\eta\tau\iota\omicron\iota\omicron\upsilon\varsigma$, phantafia, forma, $\epsilon\iota\tau\epsilon\lambda\acute{\epsilon}\chi\epsilon\alpha$ ipſius cerebri, & vocatur $\psi\acute{\omega}\mu\alpha$ ab Hippocrate, à Galeno in comment. $\delta\iota\acute{\alpha}\nu\omicron\iota\alpha$, propterea quòd (vt ego autumo) in debita temperie & ſymmetria ipſius cerebri conſiſtit $\psi\acute{\omega}\mu\epsilon\varsigma$ $\tau\acute{\epsilon}\tau\epsilon\ \epsilon\sigma\tau\iota$, $\tau\eta\varsigma\ \delta\iota\alpha\upsilon\tau\iota\alpha\varsigma$, vis & robur. Atque in eodem ſenſu Hippocrates in Epidemiis ſcripſit, *Melancholic i ſunt Epileptici, & contra*. Vtrumque autem ſit prout in hanc aut illam partem affectio repperit. Si enim in corpus, epileptici; ſi in mentem, melancholici ſunt. Notatu autem digniſſima ſunt verba Græca, $\lambda\acute{\omega}\ \mu\acute{\omega}\ \tau\omicron\ \alpha\pi\acute{\rho}\omicron\sigma\tau\eta\mu\alpha\ \rho\acute{\epsilon}\lambda\eta\ \epsilon\iota\varsigma\ \tau\omicron\ \mu\acute{\omega}\ \alpha\pi\lambda\eta\tau\omega\iota\ \gamma\acute{\iota}\nu\omicron\iota$, $\lambda\acute{\omega}\ \delta\prime\ \epsilon\iota\varsigma\ \tau\eta\eta\ \delta\iota\acute{\alpha}\tau\eta\mu\alpha\ \mu\epsilon\lambda\alpha\chi\omicron\lambda\iota\kappa\alpha\iota$. Mentem $\delta\iota\alpha\upsilon\tau\iota\alpha$ vocat, id eſt cerebrum ipſum quatenus conſideratur tanquam pars ſimilaris. Cùm ergo ſcribit *Qui parte aliquâ laborant, &c. iſ mens ægrotat*; non intelligit de ea mente quæ immortalis, & ortus neſcia, ab eodem Hippocrate $\phi\acute{\upsilon}\sigma\iota\varsigma\ \alpha\sigma\pi\acute{\alpha}\eta\varsigma$, natura obſcura vocitatur. Nomine enim laboris ſenſum intelligit ſolum, & $\pi\omicron\iota\acute{\upsilon}\tau\alpha\varsigma$ vocat eos qui ita in parte aliqua offenſi ſunt, vt niſi delirio mens detineretur, dolerent, vt Galenus idem interpretatur. Nam dolor duplex, vel enim in affectu partis aut corporis impreſſionem recipientis conſiſtit: vel in eius apprehenſione, quæ ſentientis animæ eſſe dicitur, per mediam imaginem hominis de eò iudicantis. Si enim dolor ratione cauſæ grauſ vehemensque eſſe debeat, leuis tamen apprehenſio

Com. in
aph. 6.
lib. 2.

Lib. 1.
de Diæta.
ca.

ſect. 7.
lib. 6.

Cap. 6.
l. 7. de
placitis.

prehensio est, morbus leuis dicitur; vnde Stoici malum opinio-
ne metiebantur.

Et qui humili sunt animo, effœminato, ac eneruato, illi sta-
tim dolore languent ac franguntur, ac sæpe malâ opinione me-
tiuntur. Ita Zeno Eleates perpeffus est omnia animo forti ante-
quam conscios delendæ tyrannidis indicaret. Calanus Indus Cic. lib. 2
Tusc. col.
quæst. Barbarus, in radicibus Caucafi natus sua voluntate viuus com-
bustus est. Nos, si pes dolet, si dens, ferre non possumus. Opi-
nio enim quædam est effœminata ac leuis, nec in dolore magis,
quàm eadem in voluptate, quâ cum liquefcimus, fluimusque
mollitiâ, apud aculeum sine clamore ferre non possumus.

Loci autem de mente in somnis planè à seinuicem diffiden-
tes hi sunt. Libro de flatibus scribit, *φρονις* & mens nobis dor-
mientibus immutatur, multæ & peregrinæ nobis vndique ob-
uersantur imagines, varij errores & discursus fiunt. Contra
libro de insonniis: *Inter vigilandum mens in varias partes diuidi-
tur, nec sui iuris est: dum somnus obrepfit sua presidia ac vires iam iam
recolligit, ac aliùs contemplatur.*

Tertiam iam quæstionem paucis explicemus, quâ fieret vt
venter non detumesceret, quamuis abundè aluus ferretur. An
ista ventris eleuatio conferebat? *In quouis morbo, scribit Hippo-
crates, partes quæ ad imum ventrem & umbilicum attinent, habere
crassitudinem, bonum esse ait, extenuari verò ac collabi, malum.* Apho 98.
lib. 2. Col-
lapsus enim ille malus, & vt signum, & vt causa: vt signum, quo-
niam indicat ea extenuatio naturæ imbecillitatem: Vt causa,
quoniam cum partes subiectæ à succulento, quadratoque aqua-
liculo cum iuuentur, casu illo ac extenuatione deterius habeât,
ac propterea nec bona in vetriculo *χρως*, nec in hepate *αιματωσις*
fiat. Itaque ab æquali hypochondrio iuuatur & coctio, & excre-
mentorû expulsiõ. At in ista muliere an laudabile? Nequaquam.
Nâ cum è natura habet molle & quale esse debet: nec depressum,
nec elatû, nec calidum, nec frigidû; non durum, non meteorum,
nec cum borborygmis, qui aut aluo humectatâ, aut vrinæ pro-
fluio, aut flatu cessant in febribus essentialibus (nâ tum motu
naturæ fit) non autem in symptomaticis, cum aut pulmo, aut
iecur, aut lien laborat (nam tum symptomatis rationem habet,
& inani conatu id fit) Hippocratis sententia 4 Aphor. At con-
tingit in ista muliere vt aluus flueret, tamè falsam speciem æqua-
litis hypochondrium referebat: & murmura obaudiebantur,

218 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 quæ vt prædixi, non cessabant vlla excretionis ratione. Sic sus-
 pecta erat illa hypochondrii elatio. Aperto cadauere, inuenta
 intestina plena fugaci tetròque flatu, cum serosis humoribus in
 spatiis & inanibus foraminibus abdominis, qui meteorismum
 inferebant. Sic elatio, subductiòque alui non quicquam de me-
 teorismo detrahebat. Ac primus Hippocrates in Coacis obser-
 uauit meteorismum in morbis, & aluo suppressa, & aluo subdu-
 cta. Vtrumque malum. Verba eius sunt: *Quibus præcordia eleuan-
 tur aluo suppressâ, malum, maxime autem in morbis tabidis longis: &
 quibus alui humectantur: id est; Quibus alui humectantur, & præ-
 cordia etiamnum eleuantur, malum. Eleuantur enim tam a ma-
 ligno, siue sit flatus, siue humor tenuis, serosus, putris. Et pro-
 pterea in illa parotides expectabamus; ad tale expectandum in-
 uitabat alia Hippocratis sententia in Coacis: Hypochondriorum di-
 stensio cum sopore anxiòso in caput dolente parotidem excitat.* Sed
 quoniam graucolentissima excernebantur elato manente hypo-
 chondrio, comate perseuerante, si parotis contigisset, malum
 vt signum apparituram credebamus. Verum enim quod scribit
 Hippocrates: *Ex hypochondrio diu afflicto, & aluo graucolenti; abscessus
 circa aurem occidit.*

Plura vnus huius historiae fides proponeret, & ad mentem
 Hippocratis aecommodaret, vt nil temerè inconsultòque ab
 Hippocrate scriptum appareat: sed non vnus locus omnia ca-
 perè potest. Alia sese præstò offeret occasio, in qua orationis
 ac sensus vela pandere licebit, ac explicare: ne si nimis multa in
 recula describunda effunderemus, confingere ac comminisci
 existimemus: & quasi nobis ipsis ostentandæ industriæ nostræ
 frustrà ac iuueniliter occasionem porrexisset.

ANNOTATIONES.

1. Quomodo tandem inuenerimus hanc à pulmone lethargicam fuisse,
 vide in libro Ephemeridon nost. 2.
2. In hac muliere fallaces fuere vrinae. Nam satù laudabile sedimen-
 tum semper habebant; mirum cur interierit. Nam Galenus cap. 3. lib. 3.
 de crisis aut obseruasse se quemquam interisse qui iudicaretur cum
 vrinis coctis. Et hinc colligunt quidam neminem interire posse apparen-
 tibus signis actionis in vrina. Aliter tamen res habet. Nam Galenus vult
 non solum requiri coctionem, sed & excretionem. Tameñ enim sit & co-

Et a. & secreta materia, tamen nisi excernendo natura sit satis, interibit etiamnum aeger.

3. Cùm Hippocrates dicit *μὴ πῦρ ἀποστὶ ἐπιπλοαίως*, intelligit de febribus quæ sunt media inter acutas & leues.

4. Verum illud comperi: Qui à leui sudore somni sunt expertes, & rursum ardore febrili conflagrant, malum. Nam qui bene indicantur, suauiter dormiunt: Et quod leuis sudor inanem conatum natura significat, quam melius esset pepasmo incumbere, quàm frustra excretionem moliri, quod in hac agra maximè apparuit.

5. Nullus est locus in quo melius & clariùs declaret Galenus qua ratione mutationes celeriter facta mala sint, quàm comm. in aphorif. 8. sect. 2. Prorrhetic.

6. Huiusmodi caloris reuocatio, & absentia; febris exacerbatio, & sine causa manifesta remissio solet esse frequens in febre, quam Hippocrates *τεταροφῶν* vocat, quàm mulier mihi visa est laborasse. Et inter ceteros locos est is commemorabilis, cuius veritatem percepimus in hac agra, scriptus com. in part. 25. sect. 2. lib. 1. Epid. Quod nimirum in febribus tertianam referentibus continuis tamen hoc obseruetur, quod in diebus decretoriis illa febres deteriores fiant. Item proprium hoc malignis. Alterum quod initio saepe magnus calor & respiratio proportionata, statim calor remittitur. Et putant hoc è re agrorum esse cùm mortis signum existat. Et Galenus com. in Prorrhetic. meminit iactationes febrium malignarum esse proprias, easque aut insignens calorem febrilem significare, aut orificij superioris ventriculi affectionem.

7. Ego rationes istas meo veluti Marte comparaueram, sed fortè contigit easdem penè legere, sed disertè magis à Galeno explicatas comm. in aphor. 8. lib. 2. Prorrhetic. ubi ait eam reciprocam sensationem caloris & frigoris esse, quia in extremis illis partibus in quibus celeriter hoc fit, calor ferè naturalis extinctus sit, & tanquam à flamma excitata anathymiasis caloris febrilis dominantis pars illa recalescit, sed statim euaporat ille calor. Plura leges comment. in partic. 16. lib. 4. acutor.

8. Galenus duas causas statuit imbecillitatis repentinae citra manifestam euacuationem, aut quantitatem materiae, aut principiorum corporis intemperiem.

9. Corpus sparsum erat maculis, sed erant liuida. Et antè notauimus initio varias similes papulas apparuisse, quod suspectum erat necessario. Idè videtur Hippocrates huius morbi euentum prauidisse, cùm scribit in Coacis: Qui circum articulos rubicundas in superficie pustulas habent, insuperque rigent, hi circa ventrem rubesciunt &

inguina veluti ex plagis dolorosis, & moriuntur.

10. *Quæ excernebantur erant graueolentissima, propterea que non poterant non sollicitare facultatem expultricem intestinorum: & tamen non meminerat querere matulam. Quod arguebat impotentiam iudicij & rationis euerfionem. Inuoluntaria enim erat excretio. Huius duas causas Galenus reddit comment. in particulam quandam comm. 2. lib. Prorrhætica. Aut cum mens ægrotat, aut cum partes per quas excretio fit, non sentiunt: addo tertium, cum humor per se mordax non est, ita ut sponte feratur: quanquam vix fieri potest quin sentiatur si intestina valent. Textus Hippocratis est; Si ex ventre tenuia ægro non sentienti exeat, si extra se non sit, malum ut hepatico; id est, Excretio illa tenuis materia, non sentiente ægro facta, declarat vel non generari biliosum humorem ob imbecillitatem hepatis: vel si generetur, non excernitur (quanquam hepatica excrementa maxima ex parte acria sunt) sic declarat propriam affectionem hepatis. Non abs re autem adiectum est, si æger apud se sit, ne quis putet istam inuoluntariam excretionem lasâ ratione fieri; ita enim signum imbecilli hepatis non ita esset manifestum, sed præterea denotaret affectum cerebrum. Item non declaratur vlla offensa generis nervosi, propterea quod integra sunt intestina. Si ergo inuoluntaria sit illa excretio stante ratione, non lasis intestinis, signum est imbecilli omnino hepatis.*

CONSILIVM XLVI.

De renum calculo.

QUIDAM orthopnœâ laborare videbatur, vnde grauissimè haberet. Nonnulla erat suspicio affecti pulmonis, non tamen certa erant argumeta quibus appareret vitium in pulmonibus conceptum. Tamen cum orthopnœicus ac anhelosus maneret, quaesitum quæ illius difficultatis causa esset: multis ad vnguem pertractatis, in eam ventum est tandem opinionem, vt nil tale in pulmonibus consistere crederetur quod eam difficultatem inuheret. Sed vt plerique sunt aliis oculatiores, dictum est suspicionem magnam esse calculi in renibus. Quod cum contingit aliqua tû difficultatis spirandi species apparere potest. Consultum renibus est: Deturbatus remediis conuenientibus calculus libertas respirationis est restituta. Causam autem eius

rei esse volunt, quòd neruulus est à sexta coniugatione peruadens diaphragma, & ad renès vsque perreptans, qui oppressus vt in opposito femore stuporis sensum infert: ita in partibus superioris difficultatem nonnullam respirationis afferre potest; nam renes ambigunt inter partes superas atque inferas. Et nos vidimus mulieres aliquot & viros, quibus familiaris renum dolor est grauis & pungens, qui sæpe còquerūtur de dolore lateris ac si pleuritis aliqua nothas costas occuparet, cùm tamen nil sit tale: sed ob obsidionem renis à calculo, aut eiusdem oppressionem ab aliqua re obstruente ratione nerui implantati in renis corpus, idem fit quod & in lienis aut hepatis tumore, aut obstructione; Nam circum clauiculas dolorem sentiunt tensuum. Quærat quis, cur non id omnibus calculosis contingit, aut quibus præpediti sunt renes? Non est necesse. Nam sæpe insigniores sunt nerui in aliis atque aliis, ac errore quodam naturæ in eã sedem partis alicuius inferuntur, in qua sensus viget magis, ac consensus maior est cum partibus vicinis. Nec enim quibuscumque contentus in capacitare renis lapillus est, iis obiectum oppositumque femur stupet, tametsi stuporem tanquam *συνίον* *πυρὸς πέτρῳ* lapidis in rene contenti constituat Hippocrates. ². Eiusdem quippe morbi varia atque varia in aliis atque aliis corporibus signa apparent: quod efficit vt ars nostra planè sit *εὐχαιρῆς*, non autem *ἀποδεικτικῆς*. Oportet enim multa *συντεκμύσις*, id est, probabilibus quibusdam rationibus atque apparentibus signis colligere; non autem *ἀποδεικτικῶς* & *συνλογικῶς* concludere, ac si aliter contingere non possit in Socrate atque Sophronisco: variæ enim sunt humorum idæ, variæ spirituum, variæ eorum, variæ morborum. Quæ omnia imprimis artem nostram difficillimam reddunt, & immensam planè.

ANNOTATIONES.

1. Arculanus cap. de renum apostimate, docet alia esse symptomata; si ren dexter laborat, alia si sinister. Si dexter, hepar compatitur, & partes potius superiores; si sinister, ad partes potius inferiores malum pertinet. Addit quod si abscessus occupat panniculos renum & suspensoriam, magnificatur dolor, & fit fortis, & prohibet erectionem, tussim, & sterutamentum, & difficile est inuenire locum. Hac omnia notanda, vt non temerè accusentur partes superiores innocentes alioqui, cùm malum

2. Hippocrates part. 5 lib. 6. ſect. 1. Epid. v. *ἡ νόσος τὴν μὲν ἔχει τὴν, huius ſtuporis duplex eſt cauſa: Prima, compreſſio muſculi ſcōs dicti, cui renes ambo incubant: altera, compreſſio nerui qui in cruris muſculos inſeritur. Hanc autem à calculi duritie & pondere fieri hinc patet, quòd incipiens calculus ſtuporem non inducat.*

CONSILIVM XLVII.

De ſanguinis per os reiectione ex coſtarum vulnere.

SEPTVAGENARIVS vilibus muniis occupari ſolitus ingentem ſcarcinam concinnare volebat, ac circumquaq; illigare. Funes mediū ingenti conatu immiſſo in tranſuerſum baculo rumpuntur. Baculus coſtas illidit, atque ita proſternitur. Dolor quibuſdam lenitur; non nihil tamen doloris circum læſas partes percipiebatur: nil poſt eum quaſſum ictumque excernitur per menſes quatuor aut quinque. Tandem per aliquot dies appetentia imminuitur: nauſea a deſt: membra laſſantur; dum nil tale cogitaret, per os excernitur magna copia ſanguinis nigri, fœculenti, grumofi, cum animi defectio nibus: pulſu imbecillo, & intercalari intermiſſione. A reiectione quieuit. Denuò animo deficitur, ſyncopeprehenditur, ſudor frigidus, vomitio magna ſanguinis multò deterioris quàm ſit ſuperior: dolor ad notharum coſtarum regionem. Omnes interiturum credebant; conualuit tamen.

¶ Vnde ſanguis ille? Cùm cauſa procatartica præceſſiſſet, cur non aut primo quoque tempore excernebatur, aut non in pus concreuerat? Si concreuiſſet in pus, cur non malignitatis ſuæ ſigna priùs edidit? Credibilène in capacitatem fluxiſſe, & tanto tempore manſiſſe impunè? Cur non factus abſceſſus? Credibile non affatim coaceruatum eſſe, nec per modum ruptionis vasis exiliſſe è vasis. Sed cùm pars icta fuit læſa ac concuſſa, hic accumulatus ſanguis, tandem communicatione & tranſudatione in partibus vicinis conceptum vitium: alioqui & leiþothymie præceſſiſſent. Immò ſi menſtruis ſanguis in muliere ſtato tempore non exeat, non multùm poſt furit, impetumque mouet, adeò facilis eſt ſanguinis redundantis, ac eius præſer-

tim qui in partem aliquam fufus eft præter naturam, orgasmus, impetus, ac ira, idque propter corruptionem quam de facili cõtrahit. Accedit quod lenex erat, squalidus ac ficcus: propterea que non tantus est humoris impetus quantus in iunioribus: & ratione ætatis non tanta est humiditas & calor, quæ ad facile contrahendam putredinem esse possint. Sed inquiramus cur non interierit, cum Aphorismi Hippocrat. & in Coacis, & in libro Distinctionum contra eum facere videantur?

In 4^o Aphorismor. scribit, *Morbis quibuslibet incipientibus si atra bilis supra vel infra exierit, lethale.* An hic aphorismus contra eum fecit? Nequaquam; idque tribus de causis. Primum, quia morbus non erat vllus: id est, nec inflammatio, nec febris, nec vitium in hypochondriis, cuius morbi causa esset ille humor qui excernitur. Qui quoniam non excernitur legitimo tempore, id est nec naturâ coquente, nec secernente, nec propriè euacuante; totum illud est symptomaticum. Natura enim nil excernit in principio, aut si excernit, symptomaticum est id. Ergo id quod excretum est, materia morbi non erat. Quis enim nescit sapere naturam citare aluum sine morbo, vomitiones prouocare, cum id nec symptomaticum, nec criticum propriè dici debeat? Sed cum morbus est, si materia quæ excernitur morbi est, malè id fit initio.

Secunda ratio, id quod excretum est, non erat atra bilis, sed sanguis niger: at vt inter atram bilem & sanguinem nigrum multum interest; ita magni refert initio atram bilem, aut sanguinem quemdam sæculentum excerni.

Tertiò, primo quoque tempore excretio facta est, cum haberet *ap. de cr. lib. 1. de cr. lib. 1.* nec id tempus principium dici debet morbi, cum morbus non sit: aut sit ita, se quatur morbus postea, cum vituperatur excretio initio morbi: voluit Galenus principium morbi non ita angustè accipi, sed cum paulum progressio facta est. Quanquam non negamus aliquando primo quoque tempore lethales excretiones esse, & lethalia symptomata, quod auctore Galeno in corpore humores sæpe deliteant veneno ad aquãdi. Sic in Aphorismis damnat deiectiones sponte venientes, qualis sanguis niger, siue cum febre, siue sine febre. Quanquam hæc conditio, sine febre, magni sit momenti, quòd multa excernantur modo minimè laudando, ad quem si accessio quoque febris fieret, multò res deterius haberet: quod paulò post ape-

224 CONSILIORVM MEDICINALIYM
ricinus. Deiectiones autem venientes sponte prauæ sunt, aut
quòd sùmmum frigus designent, aut incendiũ ingens, aut corru-
ptelam. Quod in pestilenti constitutione accidisse assueuerat

Com. in Galenus.

Aphor. 2.
lib. 4

Est alius aphorismus qui contra ægrum nostrum stetit vi-
detur: *Quibus ex morbis acutis aut diuturnis, vel vulneribus, vel quo-*
dammmodo extenuatis, nigra bilis, seu uti sanguis niger desubter exierit,
postridie moriuntur. Læsus erat, contusus, vulneratus quodam-
modo (quanquã in Græco ponitur nomẽ *νερόματος*, quod insigne
vulnus significat) excernitur vti sanguis niger (nec enim atram
bilem propriè excreuit, vt paulò antè diximus) quare nõ po-
stridiè interiit? Mirum est quod Galenus hunc narrans apho-
rismum, istam particulam, *ἢ ἀ λας λεκεπισυμείους*, generaliter retule-
rit ad omnes alias particulas per distinctionẽ scriptas: ac si dicat
Hippocrat. *Quibus ex morbis acutis extenuatis, quibus ex lógis*
extenuatis, quibus ex vulneribus extenuatis: nõ autè per distin-
ctionẽ hanc; Quibus ex morbis acutis, aut lógis, aut extenuatis,
aut vulneratis, &c. vt sit ea mens Hippocratis. Quibus extenuatis,
aut à longo aut acuto morbo, aut vulnere, atra bilis exierit, &c. Vt exte-
nuationis nomen explicet propriè mentẽ Hippocratis, & exte-
nuationis verbũ verè doceat cur mors sequatur necessariò. Ita
enim vult Galenus eos interire quod talis excretio iis cõtingat,
qui sunt *εργάτοις λεκεπισυμείοι*, non simpliciter vulneratis, non sim-
pliciter laborantibus morbo aut acuto, aut longo: sed ita in ex-
tenuatis cõtingit, quòd adeò natura imbecilla, vt nec coquere,
nec excernere, nec secernere possit. Et cum ob morbi magni-
tudinem nequeant contineri, effunduntur necessariò. Ob im-
becillitatem autem mors anteuertit vel initio, vel augmento,
non autem morbi declinatione, aut statu expectato; vt in aliis
morbis euenire ait Galenus. Sic cum æger noster extenuatus
non esset, de eo intelligi non potuit aphorismus.

cap. 5
9. lib. 11.
de cris.

An alius aphorismus intelligitur? Sanguis, suprà qualiscũque
fuerit malus, infra autem bonus. At suprà excretio facta: ergo
mala. nam aut ruptionem, aut apertionem, aut exesionem valis
significat. Nam mala est quòd per os, & mala quòd affatim. nam
cum per comparisonem excretio sanguinis per inferiora lau-
danda censetur, Galenus non vult etiamnum sanguinem largè
profluere, sed pedetentim, adeò vt tarditate gressus nigrorem
acquirat sanguis, non quòd reipsã talis sit. Textus Leonicensi
deprauatus

deprauatus est; legere enim oportet pro eo Leonicensi textu, *Melius est, ut infra exeat, & neque huc per modum disrupti sanguinis, sed paulatim fluentis exeat.* Ita ego interpretor: Satius est per inferiora secedere; non ita tamen ut illac feratur eo modo quo in hæmorrhagiis affatim, sed sensim fluat. Atque cum qui præcesserunt aphorismi de ægro nostro non intelligantur, hic verè intelligi potest. Nam omnis per os excretio sanguinis mala, si mulieres exceperis, in 5. Aphorism. & in hoc reuerà mala: Sed securitas ex eo est quòd febris non adesset, si verus aphorismus Hippocratis est. *Quicumque euomunt sanguinem, si sine febre quidem salutare; si cum febre, malum.* Propriè autem nomen *αἱματόν* hoc loco non sumitur, sed pro eo quod dicitur, *αἱματώδης*, comparatione cum ea excretionem quæ è pulmone fit, quam planè vituperat Galenus in comm. in hunc locum.

ANNOTATIONES.

1. Sanguis tam venarum quàm arteriarum extra vasa effusus, aut foràs in aliquam corporis capacitatem, ut asperas arterias, thoracem, ventriculum, intestina, uterum, vesicam, subito propter fibras concrescit in grumos, aut putrescit: quorum alterutrum cum accidit, grauissima oriuntur symptomata. Optimi enim corruptio pessima esse solet. Sic seminis quàm sanguinis aut putrescentis, aut suppressi in hysteriis mulieribus grauiora sunt symptomata, quia purius semen & magis spirituosum. Sic humanum cadauer, omnium pessimè olet; quia corpus humanum ut functionum perfectione cetera animantia superat, sic temperamenti præstantia ob formam omnium nobilissimam, rationalem scilicet animam. Ita alimenta quantò sunt meliora si corrumpantur, eorum corruptio deterior esse solet quàm eduliorum quæ deteriora sunt & *δυνατώτερα*.

2. Vixit annum & dimidium post: nullumque diem præterit in quo molestiam aliquam in parte læsa non senserit. Tandem ruptio veluti abscessu aluus feculentis excrementis descendit, iisque foetidissimis. Visus est allenari. Iterum aluus lata est, & dum recumbere vult, statim aphonos redditur, medià horà post interit. Mortuo excretio fit per os, & deorsum magnà copià, ac præsertim grumosus sanguis excernitur.

3. Hic locus plenior libro Definitionum Medicarum Galeni, vel cuiuscumque sit autoris. Hæmorrhòis est delatio sanguinis paulatim facta per dissultationem. Hæmorrhagia abundans è naribus effusio. Notanda hæc

voces, quod ad hunc locum intelligendum faciunt plurimum.

Nota excretionem per inferiora (quam de hamorrhoidali profluvio veteres vult intelligi Galenus) laudari, si duae adsint conditiones. Prior, si sensim fluat, quod mirum, cum opus sit naturale: posterior si excernatur niger, non quod talis sit ex se, sed quod tarde fluendo talem nigrorem acquirat. Quod vel ex Galeno falsum convincere possumus. nam lienosi qui hoc fluore iuuantur, nigrum cumulant, ergo excernunt. Verbum, vomere, proprie sumitur, sed ~~etiam~~ quidam etiam ad excretionem à pulmonibus esse referendum volebant. Galenus autem omnem excretionem à pulmone sanguinis non salutarem esse ait, id est, non curatu facilem, ut interpretari licet, siue sit febris, siue non sit. Si sit febris, omnino malum: si non sit, non paulo post sequitur. Sed cum vomitio est sanguinis sine febre, non mala ita est (ut in hoc egro de quo loquimur hic apparet) nam collectionem tantum sanguinis, non autem perennem generationem, & prouentum ad excretionem significat: sed cum febris est, bisariam mala, & ut signum, & ut causa: ut signum, quia declarat subesse inflammationem in partibus internis, quae talis excretionis causa sit: ut causa, quia dum humores à febre accuntur, maior excretio sequitur. Nam quaecumque excretionem cum inflammationibus sunt ac febribus, non solum vix curari possunt, sed nec in eadem magnitudine perdurare, maiores enim sunt ac maligniores. Sic locus reponendus qui à Leoniceno male conuersus. Dictum est quidem ante verbum ~~quidem~~ in aphor. 37. lib. 7. non sumi pro ~~quidem~~, ut quidam voluerunt: quia, ut ait Galenus in comment. in hunc locum. Omnis excretio à pulmonibus sanguinis est ~~omnis~~ tamen minor quomodo Galenus non legerit aphorismum in Coacis, qui si nullum aphorismum est 37. allegato, ubi Hippocrates utitur verbo ~~quidem~~. Huius verba sunt: Sanguinem spuentibus, confert si sine febre, & tuffiant, ac doleant leuiter, & ut sputum fiat ad dies bis septem tenuē: Febrile verò & tuffire, ac dolere pertinaciter, & recentem sanguinem semper spūere, malum est.

CONSILIVM XLVIII.

In quo quaeritur, cur multi valde valeudinarij viuant, alij integrè sani, alij in statu neutro.

CORPVS nostrum agrum est, aut sanum, aut neutrum. **A**gro corporis quaesita est quae morbos praesentes arceat

ac profliget? Sano, quæ conferuet; Neutri, quæ in alterutrius officio ambiguè versetur. Par enim ratio aliquando videtur & curationis, & conseruationis, aliquando dispar ac dissimilis. Inter eos qui viuunt, quidam integrâ perfectâque valetudine vtuntur; alij lubricâ admodum, & quibus minimis momentis de sanitatis præsidio decedendum est. Tertij aduersa valetudine conflctantur. Ac primis quidem viscera, partésque solidæ, robustæ, integræque sunt, quarum in virtute ac legitima symmetria sanitatis ipsius thesaurus reconditur, ac consistit. Secundis partium natia est infirmitas, vt quæ foris occurrantibus causis morbificis, aut internis in nobis nostrisque visceribus genitis minimè resistant, contrâque facillimè cedant. Tertios autem morbus ferè occupat, quòd inter partes quarum potentiâ corpus sustinetur ac administratur, vna sit aut altera quæ in vitio sit, vt cum aut proprio pulmõnis vitio phthifici decumbunt, aut cum catharrhosi ob innatum cerebro vitium, aut alia atque alia ratione afficiuntur. Inter morbosos quidam ita sunt affecti, vt peculiarivitio partis principis, aut cerebri, aut hepatis, aut ventriculi, aut lienis, aut mesenterij (latius enim patet nomen Principis partis, quàm à quoquam veterum dictum sit) facilè in morbum etiam grauem incidant; alij in febres facilè, quod notandum. Vitio partis quidem, vt cum obstructionibus obnoxius lien est, aut cum primæ venæ facilè impediuntur, vt de melancholicis hypochondriacis patet, statim & veluti in procinctu morbus adest tracto in sympathiam ventriculo. Et cur non precipuæ cuiusdam partis mesenterium ipsum, per se quidem abiectum & vile, si præsertim conferatur cum aliis partibus, quarum nobiliora præstantioraque sunt munia, cum impedito obstructoque mesaræo, tam citò occurrant morbi? Ita enim quibus primæ venæ cremori ventriculi excipiendõ destinatæ obturantur, obstruunturque, vomituriunt sæpe, malè coquunt, leipothymiisprehenduntur; an non magni est momenti? In singularum partium vitiis exquirendis immorandum non censo: satis fuit indicasse morbosos valetudinariosque quosdam existere peculiari vitio partis. Alios valetudinarios vocamus, vt qui promptissimè à febribus communibus humanæ naturæ hostibus præhendantur. Nam siue ludant, siue irascantur, siue paulò liberaliùs genio indulserint, ecce in insidiis stat febris quæ in eos quamprimùm grassetur atque inuolet. Contra verò alios

minimè omnium valetudinarios vocamus, qui feбри non ita patient. Eorum autem qui febribus tanquam communissimo omnium morbo vtpote in omnem ætatem omnèque tempus incidente corripuntur, alij facile eo morbo defunguntur, alij non. Sed cum sæpè in febrē incidant, leduntur tandem plurimum; nam & calor febrilis varias in corpus mutationes inuehit, & morbus tam sæpe recurrens cum actionum læsione non potest non partes offendere, penuriã alimentũ, & officij intermissione.

Quæ causa autem sit cur aliqui in febrē non incidant, aut raro, aut in eam perbreuem, cum tamen inter morbos febris omnium facillimè occurrat, breuiter strictimque aperiendum. Ex generibus februm, quædam putredinem agnoscunt parentem, vnde putres febres; quædam simplicem intemperiem. Illis continentur Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ. His synochi imputres, hecticæ, diariæ. His aut illis obnoxia sunt corpora, aut non. Natis quidem ab intemperie squalida, hirsutaque, & biliosa corpora obuia sunt. Putribus autem ea quæ obstructionibus plena sunt, calida humida, præsertim si perspiratione careant, aut aère frigido degant. Obstructionibus autem peruia corpora sunt, aut conformationis vitio, vt cum coacta angustaque sunt vasa, & viæ mesaræ (mesenterium enim maxime fons, seminarium, & scaturigo putridarum februm & morborum à putredine à nobis constitui solet) aut diætæ vitio. Qui itaque in neutro peccant, id est nec immoderato victu cultuque vitam degunt, nec à natura ipsa obstructionis facilitatem ac procliuatatem hauserunt, non ita facile à putridis febribus impetuntur ac occupantur. Contra autem quæ contrario modo affecta cernuntur. Itaque mirum non est si ex mortalibus quidam quadragies febribus putridis corripiantur, alij ne semel quidem, tametsi ex iis quidam satis pituitoso corpore sint, quidam vero non ita pituitoso: immò sunt qui nisi quotannis ter quaterve repurgentur, putridis febribus corripiantur; alij ne purgantur, nec corripiantur tamen: immò quadraginta annos penè sani exigunt. Reperti sunt quibus contra normam & naturam februm putridarum decimoquinto die contingeret. Quod annotauit Rhases Antipater Sidonius Poëta apud Plinium, singulis annis vno die tantum natali nimirum febrē corripiebatur. Dominus de Masséparault supplicum libellorum in Regia Magister mihi affirmauit magna cum celebrium Medico-

rum admiratione, certo quodam die singulis annis grauer se laborare ac si hecticâ febre præhenderetur. Et ego ipse dum hæc scribo, commentorque, illius quod nobis quotannis accidit facillè ac lubenter meminero. Quater in anno in magnis quatuor temporum anni mutationibus febriculâ tâquam diariâprehendor, cum totius corporis grauitate, inapetentia maxima. Videmus qui nunquam se febre manifesta prehenso assueuerunt: Alii nisi quater in anno repurgentur minima occasione in febrem præcipites ruunt: siue quod propter consuetudinem purgationis id contingat, seu potius ob intemperantem victus rationem. Scribit enim Galenus melius esse multò si de cibis detrahant, si sese exerceant: non enim ratione consuetudinis contingit vt illis euacuatio proficit: sed quoniam ex deprauato victu multos humores crudos ac prauos collegere.

Lib. de
consue-
tudin.

Quæ hætenus dicta sunt in eum maximè finem spectant vt paretur muniaturque via ad historiam cuiusdam Nobilis Iuuenis qui in grauissimum morbum incidit, cum nunquam laborauisset. Ecce dum in suis muniis, solitòque versatur officio, febre præhenditur: primo quoque tempore vires labuntur, vrina supprimitur, fandi impotens ferè redditur, tanquã stipēs inanis in nullam partem versatilis iacet: denique hîc potius de sepulchro quàm de remedio cogitatur. Idem filio Præsidis Boherij contigit: nam vnde uicesimo ætatis anno in febrem incidit, primùm languidam ac sepultam. Nihil excrementi redditur. Non nisi post 24 horas vrinam faciebat: animo facillè deficiebat: ne minimum quidem sudorem ferre poterat, tamen vehementes purgationes satis alacriter tulit. Febris sine typo, postea tertianam referebat. Primis diebus sine perfrigeratione, sequentibus aliquando: rigor prehendit, facies non concidebat. Alius non nisi sollicitata reddebat. Quærat aliquis, quâ fieri possit vt qui olim tandiù integrâ sanitate fruitus est, nunc in morbum lapsus tam grauer laboret? Cur primæ vires hætenus morbo non afflicte non apparent: Qui diurnis morbis sunt afflicti ac impliciti, si fortè recidant sæpè etiamnum nouos morbos experiuntur ac sustinent; cur non alacrius ferant ii qui nihil de viribus amiserunt, qui semel morbo tentati sunt? Alia longè ratio est: nam qui in morbum relabuntur ac recidunt, non longè qui-

dem à priore morbo absunt; & ii fractis iam viribus impetuntur; quo fit vt ferendo non sint, sed aut grauius ægrotent, aut ferè moriantur. Sed qui sæpe morbis implicantur, ii ferè robustiores existunt tanquam in ea re exercitati, & leui de causa in morbum incidentes. ² Contrà qui toto ætatis suæ cursu aut nunquam, aut semel, bisve ægrotauerunt, idque leuiter, grauissimè maximam partem laborent, tum propter inexperientiam & insolentiam morbi, vt sic dicam. Nam qui labores ferre consueuerunt, etsi imbecilli, aut senes, iis qui non consueuerint, vel etiam si iuuenes fuerint, multò sunt robustiores. Item quia cùm diutissimè integrâ sanitate freti sint siue ob partium integritatem, siue ob laudabilem temperatamque vitæ rationem, siue ob vtrumque, de suæ sanitatis gradu non nisi magna de causa deciderint. Oportuit enim causam validam esse quæ corpus hoc tam sanum de primo statu deiecerit ac depulerit: Siue quia idem contigerit quod habitui athletico euenire solet. Corpus enim quantumuis incolume ac sanum, tandem ad summum bonitatis prouehitur, vt necesse sit illud in deterius decidere. Vnde narrant quidam scriptum esse ab Hippocrate (sed locum non legi ³ vnquam) quosdam ætatis annum summa cum sanitate exigere & attingere; sed propter quasdam quæ in ætatibus contingere solènt mutationes, eos ferè mori. Quod si scriptum est ab Hippocrate, notandum maximè, & illud quidem experientiâ obseruatur.

Sed ad institutum redeundum est. Qui diu sani fuerunt quatenus tandiu integrâ freti sunt sanitate, satis indicant firmitatem ac robur partium, accedente probâ diætâ, quæ etiâ corruptam naturam conseruare & instaurare potest. Quamquam accidit nonnullos intemperanter, omnique cum luxu viuere; tamen sanos ætatem suam degere. ⁴ Ac si tantò firmiores stabiliorsque partes redderentur, quantò deprauatio deteriorque vitæ ratio existat. Vt contrà, plerique cū moderato victu cultūque suos annos exigant in summa imbecillitate versantur, immò si eorum sanitati conseruandæ quidam Asclepiades præficiatur. Quod cur contingat, huius quidem loci est ac instituti, sed non huius temporis cū pleniore in eare temporis vsura vti debeamus. Nunc autem vno verbo explicemus, cūr qui diu sani sunt, semel in morbum

lappi tam grauiter laborent, immò vitâ periclitentur, id præ-
 terrationes paulò superiùs adductas non alia ex occasione
 nasci videtur, quàm quia temporis diuturnitate per conge-
 stionem quandam in corpore accumulantur humores qui
 non statim putrescunt, nec proteruiunt, sed leui de causa ir-
 ritati & moti ferociunt ac turgent. Atque cùm copia
 multi sint, natura aggrauatur, & cùm eiusmodi motum ac
 putredinem nunquam senserit, illius rei insolens, pugnam
 detrectat, ac succumbit. Hinc morbi sæuities, præsertim ob
 magnam virium iacturam.

Illud abundè aperuit història illius iuuenis, cuius nomine
 suscepta est hæc disputatio: qui cùm nunquam, aut leuiter
 admodum laborauisset, oborto morbo non ita vehementi
 concidit quasi fractus & consternatus. In totum naturales
 euacuationes substiterunt. Et cùm inter ceteras vrina tres iã
 dies fuisset suppressa, frustra curatus est tanquam ischuriã.
 Tamen vt sæpe multa ab imperitis temerè & contra artis
 præcepta fiunt, quorum non est omninò sinister euentus: ita
 in hoc ægro temerarium factum prospero euentu sese auspi-
 catò prodidit. Datus est illi potus ex terebinthina destillata,
 syrupo de althea, succo limonum: eodem die vrina largè pro-
 fluxit. Paulò post aliquantum releuata natura, sed postea cõ-
 eidit. Itaque remedia quæ naturâ fatifecente præscripta fue-
 rint, & quæ eadem paulùm erectâ hîc adseribemus.

℞. Mithridat. opt. ℥ j. conseru. bugloj. viol. an. ℥ ℞. fiat empla-
 strum pro corde.

℞. rasura ebor. ℥ j. unicorn. gr. 4. cornu cerui ℥ j. syrup. granat. ℥ ss.
 aqua cardua ℥ ij. s. fiat potus.

℞. olei rosati ℥ ij. aceti ℥ ij. pro ventre. Erat ætus ingens.

℞. destill. restaur. lib. j. syrup. viol. & de limon. an. ℥ ij. s. passetur
 cum ℥ j cinam. vtatur sæpe.

℞. rasur. cornu cerui ℥ ss. sacchar. rosa. tabul. quod sufficit. fiat puluis
 viuendus sæpe.

℞. syrup. granat. oxysaccha. an. ℥ ss. aqua card. & scab. an. ℥ ij. s.
 mithridat. confect. ab. ermes. an. ℥ j. rasur. cornu cerui ℥ j. fiat potus pro
 duabus dosibus.

Iniectus chyster blandus:

℞. rasur. ebor. cornu cerui, margar. elect. unicorn. an. gr. vj. syrup. de
 ymph. ℥ vj. destillat. restaur. ℥ ij. s. fiat potus.

Item ℥. aqu. card. lib. j. ad vsu[m].

℥. syrup. de cichor. compos. sine rhabarb. oxyf. simpl. an. ℥. j. s. cum decoct. gramin. passul. glycyrr. fiat iulep.

Item fiat iulep ex syrupo de granatis & de limonibus.

℥. mithridat. ℥. ij. theriaces ℥. j. conseru. rosar. buglos. viol. borag. an. ℥. ij. decoct. vnus capi alterati cum buglos. borag. lib. iiij. carnem vnus capi, aqu. card. ℥. iiij. fiat destillat. in balneo Maria. Vtatur addendo syrui violati sextam partem.

Item repurgatus rhabarbaro infuso in destillato restauratiuo. Bis, tervè repurgatus, recreata natura.

Primis diebus pro desperato relictus est. Et in hanc historiam attentos nos esse oportet, vt discamus non temerè negligendos relinquendosque morbos qui primo quidem obtutu tanquam immedicabiles sese nobis offerunt: Nec prætereà de morbis præcipitanter esse pronuntiandum. Suspendi enim oportet iudicium in prognosi præstituenda, nisi certè constet: præsertim cum hoc tempore propter ingluuiem morbi pullulent, veteribus nunquam cogniti, & contra quàm factitatum sit à veteribus, nulla dierum criticorum habita ratione subinde ac identidem, variis remediis ægros oneremus, vt omnem naturæ studium ac ordo peruertatur ac pereat: & magna cum nominis sui calumnia multi etiam ex primariis Medicis, aut eos morituros, falsò præferunt ac prædixerunt, qui non tamen non ita longè post à malè lata sententia tanquam prouocarent, superfuerunt, & contra multos victuros pronuntiarunt, quos non ita longè post mors secuta est.

ANNOTATIONES.

1. Caput hoc scriptum est vt quaratur ratio cur multi valde valetudinarij viuant, alij integrè sani, alij in statu neutro. Et quibusdam præsto semper sunt Medici & remedia, & tamen non valent. Aliis contra, & integrè viuunt. Item cur multis quinquagies secta est vena, profluvia alui, & aliæ excretiones contigerunt, alijs nil tale, cum etiam non integrè sanitate fruantur. Tandem y qui obstinato animo licet ægri noluerunt sibi venam aperiri, æquè diu viuant. Quomodo de ractio multa sanguinis in multis aut non detrimentum attulit, aut quibus nulla facta est periculum non contigit?

2. Huius rei demonstrationem petes accuratam ex cap. 4. lib. 2. de præsig.

presag. ex puls. ubi Galenus de comparatione intermissionis pulsus in iuuenibus, aut in senibus & pueris agit.

3. Locum illum tandem legi lib. 1. de Diata, dum loquitur de iis qui in optimo habitu sani diu viuunt. Qui autem morbi à quadragesimo anno à morbo aliquo correpti fuerint, nunquam ferè euadunt. Sed quoniam ille locus obscure ab Hippocrate scriptus est, idè longiore & tempore & orio maiore indiget, horum explicationem in alium locum reuertentes, nodum qualiscunq; sit dissoluemus.

4. Celsus forè huius rei causam explicauit. Dum enim cauet ne nimium assuescatur uti medicamentis, ita scribit: Purgationes ut interdum sunt necessariae, ita frequentes periculum afferunt. Assuescit enim non ali corpus, & ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obnoxia sit maximè infirmitas. cap. 3. lib. 1.

5. Notandum hoc symptoma nam alias ut symptoma curari debet, alias ut morbus. summam verò adhibeat iudicium Medicus, an in febre urina supprimatur per se, an per accidens; quoniam falsò recurrunt quædam ad calculum, aut ad alias causas falsas: & oportet diligenter incumbere in coctionem humoris, & exclusionem & naturæ vim excitare, & non frustra catheterem immittere metu maioris mali, id enim accidit cum totum corpus crudioribus humoribus refertum est. Conluit autem ex ipso acervata multitudo in vesicam, quæ amplius distenta & dolitans, ad actiones suas inefficax fit, & periculum suppressæ urine inducit.

CONSILIVM XLIX.

De capitis vulnere.

NVPER in ludo literario puelli colludebant, alius perâ, alius calmario, & ut quisque hac aut illa re erat instructus, ita tanquam idoneo instrumento utebatur. Fortè in peræ fundo gladius acutissimus latebat, cuius mucro pertuderat fundum. Is sensum ob acutiem fugiebat. Peram capiti appressit iocò, hinc vulnus incisa cute inflictû. Sinuosum erat, adacta cuspide acutissima funditùs & punctim os læsum. Neglectum id quicquid fuit ob vulneris exiguitatem. Malè tum, quoniam nil negligendum in sauciato vulneratòque capite: & quo magis sensum fugit, eò maiori curæ esse debet. Dilatatâ plagâ apparuit os læsum esse, sed an vtraque tabula perforata esset, an media diploe ictus

234 CONSILIORVM MEDICINALIVM
restitisset, controuertebatur. Si illud esset, necessariò modio-
lum adhiberi debere conficiebamus. Si hoc, id est, alteri tan-
tùm tabulæ adactus esset mucro, à terebra temperandum erat.
Hoc perplexum obscurùmque fuit admodum: Nam temerè ad
terebram accedere periculi plenum erat, ita rebus non bene
subductis, eam prætermittere, & vituperationis, & periculi me-
tum afferebat. Vnum tanquam vniuocum signum parebat, nem-
pe systole ac diastole, & nutatio seu inundatio quæ dâ quâ ictus
infiectus erat, vt propterea tactam esse pertusamque vtramque
tabulam coniceretur, ac sic modiolum vsu-venire. Sed hac in-
undatione deceptos sese esse, delusosque Chirurgi afferebant,
quòd hanc nutationem sæpe præseferant arteriæ exiguæ quæ
diploe perreptant. Itaque cum dubitaretur quòd pertineret ille
motus & agitatio, an ad cerebrum vi ictus detectum, an ad arte-
riolas in diploe intertextas, anceps magis ac dubium consilium
ac ratio existebat. Vt in vtramque partem paria æqualiaque ra-
tionum momenta starent. Si noxa vtrique tabulæ illata foret,
aiunt, sese id signis quibusdam detexisset. At nil planè ante 14
diem apparuit. Et illud quantulum fuit, procatartica euidam
causæ assignabatur. Si læsum os vtrumque, stillasset sanguis. A
stillicidio aliquid incommodi cerebro accidisset. Præterea vom-
itiones nullæ contigerant, stupor nullus, nilque ex iis quæ læ-
sâ vtrâque tabulâ euenire solent, & ad terebram ideò consilium
conuertunt ac dirigunt. Nos contra coniectas has petitiones
eludebamus. Vomitiones, & id genus alia quæ vtriusque tabulæ
læsionem, ac piæ meningis offensam significant, non in pun-
ctim factis vulneribus ita apparent, vt in aliis tromaton diffe-
rentiis, vt cum concussio facta est, aut magna plaga illata, aut la-
psus fuit, aut eum effractio est cranij. Accedit quod rimulæ an-
gustia in cæsim facto vulnere, præsertim tam acuto gladiolo,
impediat quominus in meningem stillet sanguis; aut si quid ta-
le contigerit, pigro gressu id fit, & adeò exigua quantitate, vt nil,
aut parum inde argumenti capi desumique possit.

Rebus ita agitatæ, ac dubiis ob obscuritatem, & multa ratio-
num inuolucra relictis, tandem fortunâ ac casu sæpè ad bene
medendum, & foeliciter scopum contingendum, nonnihil fa-
ciente, ad modiolum concursus est. Læsum os detractum. In-
credibile hoc fuit, & cuius gratiâ hunc commentariolum de illo
ictu conscripsimus de industria, nulla apparens erat diploe: os

craniij vnum erat, vna tantum tabula, quod terebranti multum attulit metus ac suspitionis, ne quicquam peccaret. Ita enim trepanum ἀβάριον adhibent, supra cuius mucronem circulus quidam parum latus extans circumcurrit. Prohibet enim ne dum terebra agitur, altius descendat, & subiectas partes violet. Ita enim ipsius terebrae circumactus, & appressio facilius fertur. Et cum iam totum os perforatum erat, opinione diploes ductus, rursus apprimebat terebram, cum cerebri substantia occurrit.

Atque propterea frustra ad arteriolas percurrentes diploen motus pulsatorius ille de quo mentio facta est, relatus fuit. Itaque nisi rationibus satis quidem firmis, fortuna, & cepti fiducia praecurrisset, magnum saucio puello periculum creatum fuisset. Rationes quidem quibus contra nitebantur ne temere modiolus adhiberetur, verae ac probabiles erant, sed earum falsitatem solus euentus detexit. Quis enim credidisset naturam in plurimis sapientem ita in illo puello sui oblitam adeo, vt os, quod diploc in omnibus ferè diuisum distinctumque miro artificio, ac profectu incredibili vnum constitueret?

Hæc dicta volumus, vt intelligant qui artem Medicam, Chirurgiam ei administram subaudio, exercent, multa sæpè fortuito experiunda esse contra quam ratio ipsa nobis dictare soleat. Etsi enim magna consilij iudicijque vis est, apprimè ad scilicet medendum conferens, & ad gloriam consequendam plurimum compendij afferens: tamen experientia quædam, fortunæque quædam cæca ac bruta aliquando pluris faciunda. Sæpe enim axiomaton nostrorum prætextus speciosus, ac mordicus facta obseruatio, in præcipitia quædam pericula ægros magno damno coniecit. Cuius rei fidem facit præsens illati vulneris historia. Si enim præualuissent rationes nostræ magno artificio confictæ cuidam ausui temerario, laudando tamen, syderationis periculum, ac deinde interitus creauissent.

1572.

CONSILIVM L.

De lactis asinini præstantia & dotibus.

CIBVS in egris loco & tempore non præscriptus variis incommodis corpus afficit. Quemadmodum enim dum va-lemus robur addit, virésque conferuat: ita dum de sanitatis præsidio atque statione deiecti sumus, idem cibus vires labefacit atque frangit. Ita enim memoriæ prodidit diuus Hippocrates. Quo fit vt natura quædam excogitauerit quæ in medicamentorum & alimentorum genere ambigerent. Hæc alimenta medicamentosa appellari solent. In horum genere est lac asinum, quod tabidis conferre dicitur. Sed hanc cautionem adhibere necessum est. Nam si magna subsit putredo, aut febris adfit, impunè dari non potest. Aut enim acorem, aut nidorem contracturum est; hinc detrimentum corpori afferetur. Labet tamen nonnulla hinc attexere, vt temerè lacte non interdicator, egrique iis commodis quæ inde apportari possunt, priuentur.

Aliud est loqui de lacte simpliciter, aliud de lacte asinino. Nam cum in Aphorif. cauet Hippocrates ne quid in vtendo lacte peccetur, hoc vult ne febrientibus lac offeratur, nec tabidis valdè multum febrientibus (quanquam Galenus in comm. dictionem [valdè] supposititiã esse scribit) nec capite dolentibus, de lacte in genere loquitur. Sed cum in generibus lactis magna sit latitudo, indistinctè non est accipienda Hippocratis sententia. Audiatur primùm Galenus libro de alimentis 3. de lacte in genere loquutus: Lac omne, ait, vtile est thoraci, capiti autem nisi quis illud habeat firmum, nocet: vt neque hypochondriis quæ leui de causa inflammantur. Nam plurimis in ventriculo in flatum vertitur. Si autem cum alio coquatur quod crassi succi est, deponit flatum, sed iecur obstruit. Lac autem optimum censeri debet & boni succi, & multi alimenti, quod contrariis & substantiis & facultatibus constat subducendi & sistendi, obstruendi ac tenuandi.

Nec illud omitti debet, omne lac facilè alterari, immo, quod notandum, in sanis etiã dum coquitur, probos humores generaturum, & caput ferit, & hypochondria attollit (ait Galenus.)

Quod si in sanis fit, multò magis in ægris alte ratio continget. Alteratio autem in vtrumque apparet, & in nidorem, & acorem. Tamen duo loci planè contrarij occurrunt apud Galenum 4. de simpl. medicam. fac. Priore ait, *Lac tamesi gustu dulce est, ex se tamen nunquam amarum efficitur; nam in eo euincitur à frigiditate caliditas, ac proinde repositum acescit.* Paulò post tamen amarorem lacti contingere assuevit. Ne quis putet nomen ^{re mæ} Galenum velle vsurpare tanquam cum ^{re cæ} confundatur, intelligit amarorem illum cum nidore coniungere, qui nidor à calido est. Verba Galeni hæc sunt: *Lac vbi cruuitatem in ventre patitur, in frigidiori acescit, in calidiori amarum nidorosumque efficitur.* Itaque amarorem lacti contingere posse asserit. Nisi fortè dicamus istam periodon ita explicari posse: Lac ex se nunquam amarum efficitur, ait Galenus, hoc debet intelligi per comparisonem cum melle; illa enim mens est Galeni. Nam mel per se ^{Vide eor} amarum efficitur, id est à suo calore per diuturnitatem tempo- ^{de ro ex} ris. Quia enim in eo summa est dulcitus, huic cum nil addi ^{lib. 2. A-} possit, necesse est vt calore in aliam qualitatem desciscat. Lac ^{cut. mult-} autem ex se non ita amarum efficitur, quia non ita dulce vt mel ^{et scriptor} est: immò ait Galenus eò loci, Si lac gustaretur vbi in ventre est, & per venas coctum, ipso melle dulcius inueniretur. Nam quod foris & ex se mel obtinet, id dum coquitur lac accipit. Immo, ait, cum admodum ingens calor est, tantam lac acquirit dulcedinem, quantam mel amittit. Quod si verum est, nec lac dulce est, alioqui calore mutaretur. Nec verum erit quod ait Galen. comm. in aphor. 64. lib. 5. Aphor. Lac omne facile alterari, aut in acorem verti cum paucò calori applicatur, aut in fumum nidoremque si plus calori addatur. Et hæc magni momèti sunt. Quia ex illo loco ex comm. in Aphorism. abduci possumus à præscriptione lactis, vbi intemperies aliqua est, vt apparet in iis quibus vulgò lac præscribimus. Ex alio verò loco facile adduci possumus ad lactis vsu, quia, cum, ait Galenus, calor etiam ingens est, tantam acquirit lac dulcedinem, quantam mel amittit. Itaque nec tam religiofos esse oportet in lacte præscribendo, nec in eodem interdicens difficiles. Nam est vbi reuera facile alteretur, vt si insignè incendium: est vbi non item, vt si febris magna non fuerit. Si tamen Hippocrati assentiendum, magna cautio est adhibenda. Nam & sitientibus negat exhibendum, & quibus biliosæ sunt deiectiones: quod vtrumque impedimento

esse non debere verisimile est: in textu latino legitur: *Malum autem & lac, & quibus in febribus acutis biliose sunt deiectiones.* Hæc lectio aliena est à mente Hippocratis. Legendus locus per distinctionem, vt legendum censet Galenus: in eo sensu: *Malum lac in acutis febribus, & quibus biliosæ sunt deiectiones, vt omni illi corpori interdici debere lactis vsu doceat, in quo calor præter modum insit.* Quòd si accuratiùs capiatur, non est dubium quin multis lac asinæ propinetur, quibus nec iure, nec loco, nec tempore concedatur. Quocirca cùm Hippocrates quibus interdici lacte debeat, explicauit (multos autem adducit quibus à lacte temperandum consulit) adiungit, *si nihil que dicta sunt affuerit,* quod Galenus ab aphoristica disciplina alienū esse comminiscitur, & veluti per pleonasmum additum. Acute tamen postea huiusmodi superflue repetitionis rationem reddit Hippocrates (ait Galenus) bis terve eadem repetere non veretur, si magnum aliquod periculum imminet, cùm quod dicitur, veretur ne negligentius audiatur. Ac si dicat Hippocrates, Magnæ sunt lactis opportunitates, nil est in rerum natura æquè præstans ac lac ipsum, ita nil æquè facillè corrumpitur, si quibus propinari nõ debet, exhibeatur. Inter enim euchyma habetur, id est, inter ea quæ optimum sanguinem generant: sed si in sanis, vt ait Galenus, tam facillè malam qualitatem acquirit, quid de ægris iudicandum?

Tamen vt non exactè omnia estimari debent, ne fortè simus nimis religiosi, vt Hippocrates in sua ptissana explicanda accuratus admodum est: ita in lacte. Quod vtrumque cùm inter excellentia primas teneat, ita non nisi appositè dari debent. Et subiiciuntur tanquam exempla rerum ceterarum. Si lac & cremor ptissanæ, quæ præstantissima sunt edulia iure & loco non exhibita, tantis afficiunt incommodis, quid debet expectari ab iis quæ & commoditate & præstantiâ sunt inferiora? Non est itaque quòd timidi simus in vsu lactis Hippocratis territi doctrina. Sæpe enim præceptionum ac theorematon artis nostræ nimis religiosa obseruatio magnis nos afficit incommodis, quod multa audere & tentare sit religio, quæ alioqui essent profutura. In quo sæpe circumforaneis, & humanæ vitæ periculatoribus victoriæ palma decidatur, nobis verò eripiatur.

Lac quoduis vsurpare non confert, sed ad id deueniendum quod commendat Galenus, quod nimirum contrariis substan-

tiis & facultatibus constat, subducendi scilicet ac sistendi, obstruendi ac tenuandi. Optimum autem lac asininum eas facultates habere dicendum. Et obseruauit, quod affirmare ausim, in fluoribus pessimis alui asininum lac præscribi, repressâ humorum malignitate, lactis bonitate, alius magno commodo substitit. Aliis quibus alius astricta, leue profluuium vsu lactis contigit, & profuit. Nec terreri initio debet si obsit, non proficit: nam perseuerandum experientia docet. Fit enim (vt quidam ex veteribus annotauit) vt assiduitate tandem lac suâ bonitate temperet, ac refrenet cacoëthiam & prauitatem humorum in corpore turgentium. Itaque Galenus 3. de alimentis ait, *Lac asinæ raro in ventriculo cogitur: quod si sal & mel addatur, non fieri potest vt ipsum in ventriculo coaguletur.* Si Galenus comm. in aphor. illum *Lac dare* multis serum lactis sale & melle conditum exhibuit, quibus distenta essent hypochondria (eos autem à lacte arceat Hippocrates) cur lac asininum proximè ad serum accedens, & prætereà facultate alendi præditum non præscribetur? Nam & sistendi parte caseosâ, & butyrosâ, serosâque laxandivim habet. Sic nec lactis vsus reiiciendus, nec iis temerè assentiendum, qui quibusque in affectibus, & quouis tempore lac exhibendum putant.

ANNOTATIONES.

1. Hoc ex loco scire oportet etiam in dysentericis fluxionibus prauis non esse alienum, contra Hippocratis præceptum, lac dare. Et si enim concresecat, tamen diuturnitate vincetur, & domabitur corruptio humorum. Et id ex præscripto Hippocratis fieri potest. Quamquam eos in quibus deiectiones sunt biliosæ, vetat lac dari. Et experientia compertum est quosdam quibus dysentericæ & mesentericæ erant deiectiones diu fatigantes non alienâ arte cessauisse, quam diuturno lactis vsu. Et Hippocrates lib. 2. de morbis mulierum, in fluore muliebri bilioso lac commendat; quia (ait) fluxus à lacte obtunditur. Quod idem de deiectionibus dici potest. Filio Erotolai 7. Epid. circa initium libri, lac per os dat in vehementi dysenteria.
2. Celsus cap. 22. lib. 3. in phthisi sicut in omnibus longis, difficillibusque febribus, lac dare commodum est.

CONSILIVM LI.

In quo explicatio continetur Aphorismi illius libri 6. Aphorism.
 Qui gibbi ex asthma te fiunt, ante pubertatem
 moriuntur.

PLERAQUE apud Hippocratem præclare & exquisitè scripta sunt, quæ tamen in paruis ducuntur, aut quòd deprauata in multis codicibus non intelligantur, aut potius quòd non sint eorum stomachi, qui peruiis vulgatisque nescio quibus theorematis contenti magnū se pretiū operæ fecisse credūt, si aliquid in pròptu habeāt quod promere aut potius effutire possint. Vt autè ingenuè fatear, cū in omnibus ferè Hippocrat. libris magna sit verborum obscuritas, ad eam tanquam auctarij vice accedit multorum deprauatio, quæ multorum studia & legendi, aucupandique desiderium restinguat. Quæ autem obscuritate solā implicitā sese nobis offerunt, vt in animos multorū sensim veluti influunt, & sui desideriū iniiciunt: ita quæ corrupta nausæ etiā appetentissimis hominibus pariunt. Nisi forte aliqui sint quos cū laboris non pigeat, multa aspera aufint peruadere, multas rerum difficultates deuorare. Horum imprimis laudandum studium, laudandi & conatus. Simile aliquid in plerisque cū aggressi simus, in quibus operam non detrectauimus, tum in vno aphorismo Hippocratis eandem operam maiorem, vehementiūque multò studium ponere institutum est. Ille tametsi primò quasi obtutu parum adiuuenti intellectus, aut voluptatis acutè euolutus afferre videatur. Tamen si cui rem penitiū paulò inspicere collubitum sit, nec legere pigeat, nec in hoc laborasse pœniteat. In euoluendis enim illis obscuris non minùs sæpe cuiusdam genij quàm ingenij vis apparere solet. Sed ne extra cancellos excurrat oratio, ad rem institutam accedendum est, cuius explicationem lectoribus voluptatis simul ac vtilitatis plurimū allaturam confidimus.

Aphorismus Hippocratis hic est: *Qui gibbi ex asthma te fiunt, aut ussi, ante pubertatem moriuntur.* Textus hic Leonicensi. Textus Græcus Basil. habet: *ὁκιστοὶ ὑβροὶ & ἀσθματικὸν ἢ βροχὸς γίνουσι πρὸ τῆς ἡλικίας, ἀπόλλυται.* Verba græca latinis non quadrant, cū aliud sit dicere, moriuntur

Id est, τῶν κυφῶτων, vt idē Hippocrates pluribus ostendit. Quæ itō
 queri potest, an nō cyphosis à casu lapsūque mortem intēn-
 tet, vt & quæ à tuberculis committitur. Hippocrates autem lib.
 de articulis 3^o duo distincta capita de cyphosi à phymatis, &
 causis externis nata conscripsit. Verborum autem series cō-
 semper pertinere videtur, vt aphorismus hic de ea tantūm cy-
 phosi intelligatur quam internæ causæ induxerunt. Idēque
 Hippocrates non absolute scripsit, Qui gibbi ante pubertatem
 fiunt, moriuntur: quanquam in libro de Articulis ita sine adie-
 ctione scripsit, *Quibus, dum adhuc puere sunt, priusquam corpus ado-
 leuerit spina in gibberum incuruatur, eā parte spina non nutritur & au-
 getur.* Sed Galenus aliō loco scripsit, illam sententiam, sicut &
 alias quæ illi annexæ sunt, de contorsione à causa interna in-
 telligi.

Atque vt res apertius explicentur; textus Basiliensis duobus
 in locis deprauatus est: vno, quia particula illa *αὐτῶν* non est
 referenda ad postremam partem contextus, ad verbum, nimi-
 rum *ἀπὸ πλάτης*, sed ad priorem, vt legatur, *διότι οὐκ ἐστὶν ἄλλο αὐτῶν*.
 Altero, quod omissa vox illa *καὶ* quæ ad verbū *ἀπὸ πλάτης* adiū-
 gi debet. Ita Euchsius in scholiis in illum locum annotauit, non
 suo ipsius iudicio, sed Galeni ductus autoritate in cōmentario
 in aphorismū prædictū. Huius rei fidem facit contextus Galeni,
ὅτι τὸν πῶν τῶν ἰσθμῶν καὶ ἀσθμῶν, ὅτι ἀδύνατον ἐστὶν διαβῆναι ἐπὶ τῶν καὶ.
 Nam cum hic aphorismus ad prognosin pertineat, nil Hippo-
 cratis ingenio dignum, nisi dicat gibbos ex asthma te ante pu-
 bertatem factos, aut citō, aut tardē mori, & vi asthmatis, & in-
 flexionis. Qui enim casu incuruantur, oblationem non integrē
 crescente spinā, iis mors celerior est, quā aliter affectis, sed
 ob inæritudinem de iis nil quicquam prædixit Hippocrates,
 eū fieri posse vt arte restituatur quoad eius fieri potest: nec e-
 nim legitime reponi potest luxata vertebra à casu, lapsūque, ait
 Hippocrates, quod vertebrae inter se aptæ sint. *ἢ ἄλλο ἄλλο* id est,
 cardinatim; vt ait Galenus in cōmentar. Itaque omiſſa male
 est in textu Hippocratis vox *καὶ*, quā circumscribitur tempus
 quodammodo quo gibbā factā spinā à tuberculis cum dys-
 pnoea iunctis; extremus fati dies non ita post sequitur. Necessa-
 riō enim adiungi debuit, alio qui indefinita absolutaque Hip-
 pocratis enunciatio nihil habet miri, nil habet digni.

Nisi quis fortē dicat Hippocratis laconismum non ferre vt

Sent. 6.
 lib. 3. de
 artic.

Com. in
 par. 19.
 lib. 3. de
 artic.

Part. 19
 lib. 3. de
 artic.

oratio aphoristica suis compleatur circumstantiis; vt sic dicere liceat. Et tamen Galenus in enarrando paulò copiosior adiecerit, id illi ex more est, vt imminuta deficientiâque perficiat, multâque sæpe clarioris doctrinæ causa subiungat.

Præterea ille textus Galeni, *καὶ δὲ τὸς πρὸς τῆς ἡλικίας καὶ ἀδύνατος*, declarat apertè vocem hanc, ante puberes annos, referri debere ad verbum *καὶ ἀδύνατος*, aut nomen *καὶ βία*, non autem ad verbum *ἀπό τῆς*: quod annotatione dignum est, & ad huius rei de qua primo loco quæsitum est, explicationem primùm necessarium. Dicendum itaque, *Qui gibbi ex asthma, aut tussi ante puberes annos fiunt.* Quam lectionem præterquam quod confirmat & ratio, & contextus Galen. in comm. depravatè latinus factus à Leonicensi, vt qui in primis sordibus latere velit, plurimùm roboris ac nervorū afferet alius Hippocrat. contextus libro de art. *ὅτι καὶ τῶν ἰσχυρῶν πρὸς τὴν ἡλικίαν, πρὸς τὸ πᾶσα τὰ καὶ ἀδύνατος ἀδύνατος.* Quibus, ait, *adhuc pueris, aut priusquam corpus adoleuerit, spina in gibbum contrahitur, iis corpus ad spinam augeri non solet, &c.*

Item in textu commentarii Galeni paulò antè adducti, alia periodus est apprimè faciens ad interpretationem particulariū, ex asthma, aut tussi; illud enim quæsitum prius, secundo & tertio locis, an legendum esset, *gibbi ex asthma*: nam si ita fiet lectio, Asthma causa gibberi efficiens videretur, quod rationi non consonat. At probabilius est à tuberculis primùm nasci dyspnoeam & tussim, illæso per se pulmone, deinde gibbam fieri spinam vi panorum seu phymaton. Et illud est quod Hippocrates vocat, *ἡ ἀδύνατος καὶ βία*. Textus illa est periodus, *καὶ πρὸς τῆς ἡλικίας καὶ ἀδύνατος ἐπὶ ἀδύνατος καὶ βία διαφείρεται οὗτος τὰ χεῖρας.* Iam vides formam loquendi immutari; nec enim dixit *καὶ ἀδύνατος* & *ἡ ἀδύνατος*, sed ἐπὶ ἀδύνατος. At dicere idem esse, *ἡ ἀδύνατος*, & ἐπὶ ἀδύνατος, græcam linguam ignorare est: *καὶ ἀδύνατος* enim ἐπὶ ἀδύνατος καὶ βία, est incuruari in asthma & tussi, id est, Cùm iam adest tussis, aut anhelosum quid ob phyma spinæ adnatum succedit gibbositas, non vi tussis (quamquam potest paulùm iuuare) sed vi phymaton tussim & difficultatem respirationis præmittentium. Quam sententiam secutum esse Galenū postea demonstrabimus.

Quamquam illud ἐπὶ ἀδύνατος, si referatur ad verbum *διαφείρεται* non autem ad *καὶ ἀδύνατος*, alium habebit planè diuersum sensum, sed Hippocrati non contrarium: ἐπὶ ἀδύνατος διαφείρεται, id est, gibbi ante pubertatem facti; intereunt in asthma & tussi, vel ab

asthmate & tussi. Melius autem, in asthmate & tussi, id est, facti gibbi à tuberculis tussificosi aut anhelosi moriuntur. Sic vtraque interpretatio fieri potest. At propterea quidam ex veterum codicum collatione ita textum Hippocratis restitui debere scribit, *ὄγκοι ἰσοίητοι πρὸς τὸν ἴσθμὸν τῆς στήθος, καὶ ἀσθματος ἢ κτηνος παχέως ἀπολλύουσι*. Quod clarius in sequentibus fiet.

Quoniam autem inter demonstrandum diximus verisimile esse à tuberculis gibbositatem fieri, præeunte tamen aliquâ difficultate spirandi, aut tussi: proptereaque non tam vi aut tussis, aut asthmatis, quàm gibbositatis mortem accelerari, horum quæ dicta sunt ac postulata, demonstratio est requirenda: nimirum quomodo à tuberculis gibbositas fiat: & an illa solo pulmone difficultas spirandi adsit. Et cur per distinctionem dictum sit, asthma, aut tussis. At multa alia quærentur, quorum explicationem plurimum conferre posse confidimus.

Com. in aphor. 16 lib. 6. & comm. in 1. art. 2. lib. 3. de Artic. Spina quatuor modis afficitur, aut vna pars tantum spinæ, aut plures continuæ afficiuntur; hinc *κίφωσις*. Si plures non continuæ afficiuntur, *λόφωσις*: si in latus, *σκολιόσις*: cum vertebrarum omnium tota compages concussa, *σπίσις* nuncupatur. Omnes autem differentie hæc aut à causis internis, aut externis concussu, ictu, lapsuque pendunt. In internis causis numeratur tuberculum varias apud Hippocratem & Galenum appellationes sortitum. Galeno vocatur *ὄγκος*, tumor. Hippocrat. *ὄυμα ἀπτερον καὶ σκληρον*. Eidem Galeno absolute *ὄυμα*. Et in enarratione in lib. *περὶ ἀφθέρων βιβ. 1. κεφάλαια, ἡρόδια, ἀπτερά, σκληρά*. Interpres autem Felicianus male *πὶ ὄυμα*, panum vertere videtur: cum apud Latinum Interpretem Celsum panus id sit quod Græcis *ὄυζελος* vocatur. Est autem tumor quidam latus, sed non altus, in quo quiddam pustulæ simile est: dolor & distensio vehemens, & maior quàm esse debeat pro magnitudine tumoris. Et ita phlegmone quædam est *ἐξ ὕδατος*. Fernelius vocat phlegmōnen in adenum locis emergentem, maxime in ceruice & inguinibus. fit autem post febres, aut alicuius partis dolores. Hippocrates generali nomine *ἀπτερόσις* vocat, *καὶ ἀπτεροειδέα*. Si itaque dolorificum sit tuberculum, & sanguineum, *ὄυζελος*. Panus, siue panis dici possit; si doloris expers, *ὄγκος* ἢ *ὄυμα*. Quanquam si panus tumor non altus, sed superficialius, & parum eminentes dicitur, non videtur posse difficultatem illam spirandi afferre, quæ à generatione tuberculorum in spina nasci solet. Tamen si diligentius res inspiciat

4. loc. aff. lib. 3. de art. 2. Com. in aphor. 16. lib. 6.

apho. 30. & 31. li. 6.

tur, quoniam à tuberculo statim cyphosin nasci non oportet, illud ^{εὐνοία τῆς κυφώσεως} occasio & parens, panus dici vertique potest: præsertim verò panus dici, quia citò generatur, & tardè in suppuratum abit; quæ conditiones pano quadrant, & ex consequenti ei tuberculo quod temporis progressu gibbum afferre solet. Nec enim citò à generato tubere inuertitur rhachis. Porro vt res paulò apertius pateat, ^{εὐνοία ἀπὸ τοῦ πυρῶδους} differt, quod ^{εὐνοία} citò suppuret & prognascatur paulo tardiùs, minusque doloris afferat; phygethion autem ægriùs suppuratur, faciliùs nascitur, & dolorificum est: propterea ad obliquandam inuertendamve compagem verticillorum accõ modatum magis est.

Itaque vt dictum est, vertebræ luxantur casu, lapsu, phymate neruosa corpora vertebris & spinali medullæ insita extendente. Et mirum, cum Galenus has differentias explicans, tanquam ^{πρὸς τὴν} adiecerit, horum duo sunt genera; aliud est partium quæ secundum naturam se habent, aliud tumorum quorundam præter naturam. Qui locus est subobscurus, ac parum intelligibilis, nisi huius ea sit explicatio: Omnino duobus modis spina vitiatur, aut cum ipsa secundum naturam est, & à causa externa infestitur. Sic nil apparet viti, in spina: aut cum non ita affecta est, sed diligentius inspicienti tuberculi generatio in spina apparebit: alioqui illius loci sensum non calleo.

Porro tuberculum aut superiores verticillos, aut medios, aut inferiores occupat. Si illos, anginosos facit, Galeno interprete. Scribit enim in constitutione pestilenti, quam Hippocrates descripsit eos ^{καὶ ἀσθῆναι} vocasse, quibus ad cervicis spondylos tuberculum aliquod adnatum fuerat, quod tuberculum cum ad suppuratum tenderet, tussiculosos reddebat, cum sua mole ac circumscriptione crudus maneret, spirandi difficultate eos exercebat. Non difficultas autem illa spirandi quicquam pulmonem laborare significabat. Cur autem, dicat quis, non gibbos efficit? mors longè anteuertit, & gibbositas non illa parte contingit nisi vna cum morte repentina. Quo enim tuberculū primis verticulis est propinquius, cõ funestius. Accedit quod positò pari vitio in superioribus vertebris & inferioribus, in superioribus (excipio præsentiam periculi) magis elucescit prohibitione incrementi, quàm infero loco locatis. valet enim illud theorema Galeni, *Quanto spina superius iuxta originem suam laditur, tanto*

4 de loc. affect.

affect. 2. Epid.

Com. in par. 12.6. de art. 10.

minius augetur, eò quòd à superiori parte & exortum & incrementum accipit. Ex textu autem de anginosis elicere oportet quòd ad Aphorismi nostri explicationem attinet: nimirum tuberculum superioribus ceruicis vertebris adnatum modò tufficulosos, modò anhelosos magis reddere, prout hoc aut illo modo affectum est phyma.

Si tuberculum medias costas occupat, aliquam ex tribus differentiis contorsionis spinæ producit. quæ omnes ad neruofum genus, non autem ad spinæ ossa propriè pertinent. Nam cum neruus vertebram muniens afficitur à morbo, postea trahitur vertebra, ac contorquetur. Sic Galenus reprehendit veteres qui diligentius verba Hippocratis obseruantes, putarent à tuberculis contorqueri costas, quòd adeò phymata indurescerent, vt ad nutum suum traherent ossa ac contorquerent. At nequit fieri vt tantum duritiæ phymata acquirant, vt costas grauent. Sic ossa per se non subuertuntur, tametsi proprietates verborum Hippocratis illud indicare videatur, cum *σπονδυλος ἐστὶν τὸ κρῖν ἐν ἄλλοις καὶ ἐν τῇ στήνῃ* dicat. Sed affectio hæc est corporum spondylos colligantium.

Patet itaque tubercula non obsidere pulmonem vt inde asthma fiat: sed phymata ipsa primò, per se, situ, circumscriptione, mole, lædunt genus neruofum spinæ, propterea gibbum fit: non autem ab asthma, aut tuffi fit; vt verba Hippocratis in aphorismo notasse videntur. Et idem contingit à tuberculo, quòd à casu, lapsuque: vt dicat quis aphorismum & de causis internis & externis intelligi posse. Nam quibus à casu læsa spina, quoniam nunquam eo modo se habet, quò prius: vt notat Hippocrates, videtur ob vitium non posse bene nutriri, ac augeri. sed longè alia ratio est. Nam quibus à casu vitiosa spina, ea sui vitii signum edit, & manu, artificioque, si non omnino, at ratione aliquà vitio occurrì potest: At non idem iudicium de vitiosa spina à tuberculo. nam cum intorta spina est, iam in summo vigore malum est, & latenter, sensimque obliquatur. Præterea cum à casu inuertitur, non est tuffis, & tanta difficultas ducendi emittendique spiritus (nisi quâ parte maxime dimouetur pulmo.) At cum tuberculum est præsertim eminent, vt *σπῆλαι* potius dicatur, quàm *σπῆλαι* (vt antè diximus) tuffis est, cum humidius est phyma, & difficultas spirandi cum durius; vt antè demon-

Com. in
part. 1.3.
de artic.

Apho. 19
lib. 3 de
artic.

stratum ex historia 2 Epidemior. cùm Hippocrates meminit eorum qui anginâ laborarent. Et cùm tussis est, & dyspnoea: deinde vitumoris cyphosis succedit, non est dubium quin vitæ nostræ filum statim præcidatur: quod non contingit in iis speciebus contorsionis spinæ, quas causa externa inuehit. Aut si in aliis contingit à casu, lapsuque, nec tam subito, nec ita manifestè vt cùm à tuberculis. Demonstrationem autem affert Galenus loquens de iis qui dicuntur *αὐτὴν τὸν κίβωτον*. Com. in
aph. 46.
lib. 6. Thorax non vult, ait, ob vitium cum aliis; id est cum corde & pulmone augeri, propterea angustia sequitur partium respirationi dicatarum.

Itaque mota adductaque in dubium fuit dubitatio, an tubercula illa primùm reddant gibbosos, & cùm ante pubertatem hoc contingit, moriuntur ab asthma & tussi, vel potius in Asthmate & tussi, quod superius docuimus ex Galeno. *ὅτι ἀδυναμί* interpretantes: an potius, tubercula in pueris difficultatè pariunt & tussim: mox cyphosis sequitur: inde mors. at propinquius rationi posterius est.

Porro illa tubercula, vt dictum est, occupant mediam costam, aut cervicis spondylos, aut lumborum. Item vel senioribus, id est adultis, quod Hippocrates vocat *ὀστέων*, vel pueris contingunt. Item alia cruda sunt & dura, alia non item: sed ex te aliquid tenue expirant. Præterea vel sunt *ἐπιπύματα*, suppurantia, vel non. Atque vt hæc vel illa sunt, ita variis modis afficiunt, aliis signis sese exhibent atque aliis diuersas criteis habent, diuersam prognosin constituunt, vt sigillatim omnia dici pertractarique necessum est.

Si dura ac magna, difficilem quamprimùm afferunt respirationem nullo in pulmone vitio existente; nam tubercula hæc Hippocrat. vocat *φυματία* & *τὸ μέγεθος*: non autem *κατὰ τὸ μέγεθος*. Partic. 99
lib. de argo quo modo propriè asthmatici fiunt: sed quod eos tuberculo in spina præditos, asthmaticos nuncupet, *τὸ ἀδυναμί* generaliter usurpat, Galeno. Si illa tubercula non ita dura, sed citò suppurabilia, tussiculosos reddunt per resudationem, vt ante de anginosi explicatum est: sic & tussis, & asthma, & cyphosis tuberculorum sunt soboles; & *τὸ ὅτι ἀδυναμί*. Si dyspneam afferunt, & dura manent, longius vitam protrahunt: si suppurant, moriuntur, ait Galenus in comment. Quod tamen dubio non caret. Nam maius periculum creare videtur difficul-

248 CONSILIORVM MEDICINALIVM
tas spirandi à duro tuberculo, cui succedit gibbosum, quam
cum promouetur suppuratum. nam suppurato tollitur sal-
tem difficultas respirationis, duritie autem tuberculi acce-
dente ad cyphosin, augetur: eaque propter quæ suppurant,
& tussim faciunt, & quæ intulerunt gibbum, minùs in peri-
culum præcipitare putanda sunt. Nam & tussis occasio tol-
litur, & cyphoseos fortè, & angustia thoracis. Nisi quis di-
cat pus illud & proximè tabem inferre, & pulmones planè la-
befactare; vnde non euadunt: nam diuturnitate putredo ac-
quiritur, quæ non potest non esse molesta pulmonibus. Quò
fit vt accuratè & acutè scripserit Hippocrates, *Quibus contin-
git gibbum a tultis iam corpore, his manifestè & liquidò gibbositas morbi
presentis crism, id est solutionem affert.* Ac si dicat; Si cyphosis à
tuberculo nascatur, & ij quibus contingit iam grandiores
sint, non pernicioza est cyphosis, sed præsentis morbi solu-
tionem affert, id est, indicat suppuratum factum, & ab eo su-
perstitem esse ægrum; quo fit vt non amplius periclitetur,
quamquam breuiorem vitam sit habiturus. Hunc locum
apertiore reddemus paulò post.

Si ergo tubercula dura protrahunt vitam; si supparet, ab-
breuiant: propterea particula *tu* fortè non adici debet;
siquidem mortis celeritas non de omnibus intelligi debet,
sed per comparisonem de iis quibus suppuratum contin-
git.

Galenus itaque in Comment. videtur ipsa tubercula etiam
per se, nondum contorta spinâ, pessima asserere: Nam, inquit,
si nondum gibbositate superueniente ob solos tumores diffi-
cilis respiratio est, quid eueniet cum tumores tempore erunt
auctiores: Et quid cum thorax angustior? Ac si dicat; Tubercu-
la per se ac primò dyspnoeam afferunt, licèt nulla contor-
sio; si dura ac magna, grauiorem: si humida, suppuratum &
tussim, & ideò malè de ægris merentur. Secundò gibbosita-
tem afferunt, quæ cum contingit, peius cum ægris agitur: &
id propriè est ex asthma & tussi gibbum fieri.

Maximè autem (vt de alia ratione cyphoseos dicam) id per-
niciosum cum pueris accidit hoc, & iis qui crescunt. Nam nõ
ita multò post fato defunguntur ratione gibbositatis, quæ
non tam per se, quam ratione tuberculorum à quibus nata
perniciem affert. Nam hæc & tussim, & expectoratum
&

& dyspnoean accersunt primo quoque tempore: quæ si tanta mala afferunt, & vim promouendæ cyphosæ habent, cum illam accersuerunt, quæ spes salutis? nam strangulatur animal prohibito thorace incrementis, auctis pulmonibus & corde. Sic Galenus, quæ tubercula cum difficili anhelitu fiunt, iis qui adhuc augentur sunt lethalia. Notandum illud iis qui adhuc augentur. apho. 46.
Com. in

Vnum restat, quandoquidem diximus aphorismum intelligi de gibberositate contingente pueris, aut ante puberes annos contingente, vt explicemus, si gibber etiam à tuberculis post pubertatem contingat, an non idem contingat quod prioribus: cum tuberculum natum necessariò aut tussis, aut difficultas respirandi in procinctu est; an non idem & pueris & grandioribus contingit? immò grandioribus magis quod pectoris ossa ob duritiem non tam facilè obsequantur? Sed cum gibberositas ob difficultatem spirandi breui interficiat ante pubertatem, cur nõ idem grandioribus periculum imminet? Non est necesse; siquidem cum iam legitimũ incrementum partes cepere, si accedat gibbum, proptereaque spina non augetur, nil interest; celerioris enim interitus occasionem inde collegimus, quòd in pueris cor & pulmo augetur, affecta autem spina cremento prohibeatur. Quod idem cum non vsuueniat adultis, non est mirum si in iis longius vita protrahatur. Quòd pertinent duò aphorismi Hippocratis cognitu digni, ac intellectu difficillimi:

Quibus iam corpore prouectioribus gibber contigerit, aperte gibber ipse morbi qui adest, crism affert: per tempus tamen aliquod eadem que & in alius magis vel minus significat: minus tamen malignè vniplurimum talia se habent. Galenus imminutus est admodum in Commentario: nec enim explicat quid sit quod Hippocrates dicat *κρίσις κρίσεως παρέρχεται κρισίον παύσει*: gibber morbi presentis crism facit. Morbi nomine quid intelligat, non dicit, κρίσεως nomine κρίσις intelligit quidem, sed qua ratione id fiat, non explicat. Part. 14.
lib. 3. de
art.

Tamen quid de ea re sentio, ipse explicabo. Morbi presentis nomine tuberculum subaudit, quòd quidem cum inuadit eos quibus ætas prouectior, & corpus robustius, ratione ætatis, nulla crementi est necessitas, ac proinde non ita opprimitur pulmo: quia corpus robustius, & ossa, tametsi incuruantur à tubere, tamen quia mors non præuenit, & pro omni accidente, nisi forte aliqua difficultas spirandi accesserit, cyphosis contingit, gibbo-

250 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 fitas morbi præsentis crifim, id est, folutionem facit, id est, indi-
 cat victu à natura tuberculum, & fortè remanere in aliqua
 mole & circumscriptione, vnde gibbositas conseruatur. Nam si
 solutio esset morbi, aut per suppuratum, aut aliâ ratione, cur
 nõ tollitur gibbositas? vt prius diximus varices tollere gibberũ
 excretâ per venas varicosas materiâ? At per suppuratum non
 potest solui sine interitu, vt abundè supra ostendimus. Itaque
 nomen *κρίσις* siue *κρίσις* alio in sensu accipi debet. Nisi fortè di-
 cat quis (& hoc subtilius est) cyphosis morbi, id est tuberculi, so-
 lutionem affert, hoc est, tuberculum nullum aliud accidens in-
 duxit præter cyphosin. sic vt cyphosis tuberculo criticè succes-
 sisse dicatur, & eius sit velut crifis. Quomodo dicemus si cui
 post febrem dolor in brachio succedat & febris, aut remittatur,
 aut cesset, dolor ille dicitur afferre crifin febris: sed hoc totum
κρίσις est. Remanet tuberculum, sed maior eius pars cessit in
 occasionem contorsionis spinæ, diffusa materia, aut aliter. Vn-
 de subiicit Hippocrates: Eadem quæ in aliis vel magis vel mi-
 nus: id est, difficultates sunt spirandi, & angustix aliqua magis
 vel minus, prout quis in vitæ ratione aut accuratus fue-
 rit, aut deliquerit; vnde plerique cum gibberum in summam
 senectutem tulerunt, præsertim quibus corpus quadratum ma-
 gis, quod minus dolitent à gibbero, & cum frigidiores sint, præ-
 fertim pingues, minus egent respiratione.

Itè aliæ sunt cum occupantur partes crifis aut hæ aut illæ spinæ.
 Diximus autem supra in spondylis ceruicis nato tuberculo *κρίσις*
κατακρίσις homines reddi, nomine *κρίσις* generalius sumpto, vt
 vult Galenus, in medio dorso cyphosin, quæ si ad partes inferas
 pertineat, aliis signis sese exhibet, quàm illa quæ in media spina
 sedet. Nam sic Hippocrates: Quæ vitia circa spinam sunt, id est
 tubercula, cum aliâ solui minimè possint, tum illa maxime quæ
 supra septi connexionem, Galenus in Commentatio vocat
κρίσις *κατακρίσις*. Nam cum suppurant, mortem afferunt, vt
 antè diximus, cum dubitaremus num melius esset phymata
 suppurari quàm dura manere. Ideo autem afferunt mortem, quòd
 nulla vena sit in thorace, quæ prauos humores à tuberculis ruptis excipere
 possit. Et cum venæ utrimque in thoracem dispergantur, si ex phymatis
 humor aliquis in eas transfertur, exinaniri non potest, & vt excipiatur
 ab illis difficile est. Accedit quod illa phymata gignunt humores crassi, si-

de loc.
 affect.

Part. 3.
 Et par.
 lib. 3. de
 art.

Textus
 Hippocr.
 lutinus
 male
 versus
 est.

Com. in
 par. 4. lib.
 3. de art.

gidi que sunt. Hæc Galenus.

Sed cum tubercula in partibus inferioribus nascuntur, ea sæpè successu varicum in cruribus solvuntur; nam per lumbares venas humor à facultate in cruales reiicitur: hinc phymaton solutio. Aliquando tenasmus & dysenteria huiusmodi phymata soluit, translatò ad intestina pure. Atque eorum symptomaton quæ gibberum costas inferiores occupantem consequuntur, alia gibberi ipsius solutionem afferunt, alia non afferunt, sed iuuant tantùm. ³ Ex eorum numero quæ solutionem afferunt, sunt varices & dysenteria, de qua paulò antè dictum. Ex horum autem censu quæ non soluere dicuntur, sunt quidam dolores renum & vesicæ: item abscessus circum ilia, qui suppurât quidem, & sunt sanatu difficiles & longi: hi enim morbi per sympathiam tantùm sunt; quia quæ sunt vicina, & quæ propinqua, ea primùm & maximè affici solent, ait Galenus in Comm. ex sententia Hippocratis. Et quia per sympathiam tantùm sunt, ideo morbum non solvunt. vbi notanda propositio Galeni in eodem Comment. *Ἐπι τῶν οὐρανῶν ἰσχυρῶν ἰσχυρὰ, τὰ τῶν ὑπὲρ λυκῶν ὄντων*

In filio
Præsidis
Bailly
hoc ob-
seruatù.

Com. in
part. 10.
lib. 3. de
artic.

ἔπι τῶν παθῶν. Quicumque per consensum communicationemque fiunt morbi, eorum nullus eos morbos soluit qui præcesserunt. Prætereà quibus gibber superior, iis gracilescunt brachia, quibus inferior coxæ graciliores fiunt, pubes, barbæque tardior ac imperfectior. Item & infœcundiores iis quibus gibber superior, nam his sua sunt signa propria, suspiria, angustia thoracis, difficilior respiratio. Quæ duo principio quidem esse possunt antequam gibbositas sit. Nam tuberculum prius afferre potest angustiam, tussim, anhelosum quid, quàm gibberum efficiat. Ideò scribebat Hippocrates loquens de supero gibbero: *Panis*

Lib. de
humorib.

part. 6.
lib. 3. de
artic.

& phymatis crudis obnoxij ut plurimum circa pulmonem gibbi parte superiore sunt; nam gibber occasio & contentio plerisque ex talibus contorsionibus fit, quarum vicini tumores participes sunt. Pars prior contextus bifariam intelligi potest: Gibbi parte superâ obnoxij sunt phymatis crudis, id est, quibus gibbositas est, ij obnoxij sunt phymatis, id est, ob gibbositatem tandem tubercula in pulmone nequeunte bene nutriti ob affectionem spinæ, crescunt. Hanc suspicionem auget, quòd dicat, obnoxij phymatis circa pulmonem: & sic gibbositas per eum contextum causa esset phymaton, & difficultatis spirandi. Sed non ea est mens Hippocratis. nam dictio [obnoxij] quæ vim magnam habet,

part. 9.
lib. 3. de
artic.

supponitur ab Interprete: & nisi supponeretur, prior ista interpretatio cohæreret. Verba Hippocratis sunt obscura, nam loquens de iis quibus super septum affecta spina, & qui propterea *ἰσχυροὶ*, id est, quibus guttur protuberat, facti sunt, ita scripsit, *ἰσχυροὶ παύσι ἐπὶ τὸ πλάγ, καὶ τὴν πνεύμονα εἶσι*: id est, ita gibbis super septum affectâ spinâ factis, maximam partem tubercula sunt circum pulmonem: id est, in spina. nam *ἰσχυροὶ* non idem est ac si dicat, *ἐπὶ τῆ πνεύμονι*, vt licet colligere. Hunc autem syllogismum ita Galenus conscribit: Quibus gibber cōtigit vt plurimum à phymatis est, vt excludantur causæ procatarcticae, casus, lapsus. Quod autem diximus gibberum illum declarare generationem suâ tuberculis, nō autem inducere tuberculum in pulmonem, vt aliquis malè colligat, satis sequens periodus demonstrat. nam gibberi occasio à talibus contorsionibus existit, id est, contorsiones spinæ ob affectos tonos à phymatis gibberum induxere.

Atque vt tandem dicendi commentandique finis fiat quod instituti nostri est tandem extremum persequamur. Quæcumque autem dicturi sumus, ea ex superioribus desumentur sparsa disseminatâque, vt per *ἀνακρίσασθαι* quandam res planè intelligatur. Tolerari ergo potest lectio illa; Qui gibbi ex asthma, aut tussi fiunt ante pubertatem, illi moriuntur. Docuimus enim particulam illam *ἰσχυροὶ* non necesse esse adiici: quoniam non citò moriuntur, nisi quibus à tuberculo suppuratum contigit. Et quod Galenus in Commentario ascripserit particulam, citò, dum verba Hippocratis recenset, illud potest dici clarioris doctrinæ causâ adiectum esse. In plerisque enim est obtusus & mutilus Hippocrates: sed eius scripta aut collatis locis sunt venanda, aut exacto grâque iudicio æstimanda. Item si dicatur absolutè, illi moriuntur, nec adiciatur, quando, an tardè, an citò, nihil Hippocrate dignum videtur. Itaque Leonicenus, cuius interpretationem censuimus, si hîc adesset, fortè sese probabili ratione defenderet, cur dixerit, *Ante pubertatem moriuntur*: & significantius adiectum esse, *ante pubertatem moriuntur*, quàm si dixisset, *Qui gibbi ante pubertatem fiunt*. Nam cum contorsionis spinæ incommoda & pericula facilius in primas aetatis partes quàm in secundas tertiâsve incidant, immò periculosè iis qui crescunt spina vitietur, prognosin instituire veluti de morte ante annos pubertatis. Si enim moriuntur ante pubertatē, satis hoc indicat, necessariò & tussim, & asthma, & gibberum in

pueritiæ annos incidere debuiffe. Cùm ergo dicitur, *ante pubertatem moriuntur*, prædicitur mors necessariò, & fupponitur necessariò vitiatam fuiffe in pueritia fpinam Si enim excedantur pubertatis anni & ab afmate, cyphon fuccedat, id periculi non imminet: Tamen innumeris locis Galeni & rationibus docuimus illud *πρὸ τῆς ἡλικίας* priori aphorifmi parti attexi debere.

De altera autem parte quâ quærebatur fi ferretur lectio aphorifmi, *Qui gibbi ex afthmate*, an gibbofitatis caufa effiet afthma? hoc bifariam, trifariamque potefit explicari: cùm dicimus gibbos ex afthmate, aut tuffi mori, fumitur effectus pro caufa, nam tuberculum inducit tuffim fi humidius, afthma fi durius, & poftèa cyphofin: fic ex afthmate aut tuffi, periphrafticos eft, ex tuberculo. Sed quoniam occasio prioris affectionis & manifeftioris, nempe afthmatis & tuffis, eft tuberculum, ideo affectionum loco caufæ mentio iniefta eft. Ac fi dicat Hippocrates: *Qui gibbi ex afthmate*, id eft à tuberculo caufa afthmatis. Alio modo illud & fignificat *ὄν*, & *ὄν ἀμα* fignificat: illis enim modis explicat Galenus. *Gibbi & ἀδματος*, id eft, poft afthma. nam tuber afthma efficit, quòd faciliùs & promptiùs pulmo perfenit tuber quàm fпина. Primo enim quoque tempore difficultas fpirandi affertur, deinde fuffectu illius *κίφως*. Et illud & *πρὸ τῆς ὄν* fumpiffe Galenum in Comment. docet, dicens, *τὸν ἀσθμῆς ἡλικίας κίφως ὄν ἀδματι*, &c. Et alio loco ait, *φύμα τὰ γινώσκει ἀμα τῆ βυχί, & μὲ δυνάμει*: ac fi dicat, primum tuberis effectum effie tuffim & afthma, fecundum cyphofin. Particulam autem & fignificare, poft, apud Hippocratem quidam ingeniofè admodum colligunt in illo aphorifmo, *ασθμῆς & ἐλλεβό, ἢ δυνάμει*, nam meliùs Hippocrates dicit &, quàm *ὄν ἐλλεβό*, nam qui dicit *ὄν*, declarat conuulfionem effie dum agit elleborus adhuc, ac hæc conuulfio non eft calamitofa: plerique enim etiam ab aliis cathartice conuulfionem medio actionis medicamenti tempore. Sed qui dicit conuulfionem & *ἐλλεβό κίφως*, illud, ex, declarat abfentem iam elleborum, & muneris functionem. Itaque idem eft ac fi dicat, *Post elleborum*. Sed hoc subtiliùs. Atque ita fit vt protuberantia fpinæ à tuberculo poft difficultatem fpirandi, aut tuffim fuccedens, malo veluti malo cumulado tantam thoracis anguftiam efficiat, vt breui mors obrepat. conuulfio

ANNOTATIONES.

1. Nam tamenſi ob aſthma aut diuturnam tuſſim aliquâ ratione inſecti poſſit ſpina, vt inflexio illa longo tempore fit, ita nonniſi poſt longiſſimum temporis flexum periculum mortis poteſt afferre.
2. Quod partic. 8. lib. 3. de articulis docet Hippocrates loquens de ſuperiore ſpina parte inflexa, occaſio (ait) gibboſitatis à cauſa contorſionis, id eſt, ait Galenus; à tuberculis.
3. Huc pertinet locus præclarus de pleuritide ex dorſo, in qua fit excretio vrina ſanioſa & cruenta. Quod facile pertinere poteſt ad hunc locum.

CONSILIVM LII.

De renum calculo.

PRI-MARIVM quendam virum vidimus nephritico dolore miro modo cruciatum. Dolor erat acutus naturâ pote calculum è renis capacitate deturbare conanti. Ren tantum ſiniſter obturatus erat, vt apertè ſectò corpore innotuit. Quod plerisque nil tale expertis admirationem mouit: nam ſuppreſſa omnino vrina. Vnde colligebant Medici aut vtrumque renem à calculo obſtructum præpeditumque, aut in veſica ipſa vitium latere, aut vtramque partem laborare. Sed eos euentus ſefellit. Huius rei cauſam ita in numero habere vt communi ratione fanciri, roborarique poſſit, non licet. Non aliunde repetunt quàm ex eo quod præ dolore in renem ſiniſtrum materia flueret, rapereturque potiùs, deinde motu contrario delata vomitione excernebatur: hinc vomendi aſſiduitas, hinc vrinæ ſuppreſſio. Aut ſi quid è rene dextro non obſeſſo ferebatur, paucum erat, & naturæ recreandæ non ſatis erat. Vel potiùs tam malè affecto rene ſiniſtro, communicationis & ſympathiæ vi dexter alioquiliber & incolumis laborare incepit: deinde ſa-cuitas eius diuturnitate doloris fatiſcere. Quod mirum tamen, cum natura corpus omni ex parte geminũ fecerit, vt vnus partis actione læsâ, aut ceſſante, altera etiamnum ſuum præſtet officium: in eo Medicorum verſata induſtria, vt ſymptomatis oc-

curretur, vomitioni, vigiliis, dolori nephriticoid & genus alijs.

℞ Terebinth. Veneta lota in aqua pariet. ℥ s. rhabarb. electi ℥ j. lapid. Ind. ℥ s. cum diatrag. frig. fiant boli. capiat cum syrupo de raphan.

In ista vrinae difficultate hæc quoque præscripta sunt:

℞ succi raph. ℥ j. succi lymon. ℥ j. syrup. de alth. ℥ vj. cineris cancor. fluuiat. & carab. an. ℥ s. cum aqu. parietar. fiat potus.

℞ ℥ iij. decoctionis aperitiua: adde syrup. de raphan. ℥ j. lapid. Ind. ℥ j. canthar. pulueris. gr. iij. mithridat. ℥ s. fiat potus.

℞ Theriaces ℥ s. aqu. destill. terebinth. ℥ y. syrup. de alth. ℥ j. fiat potus.

℞ aqu. scabiosa, bipin. agrimon. card. saxifrag. an. ℥ j. s. destillat. restaur. ℥ iij. succi li. ℥ j. s. accabr. quod suffic. passetur per manic. Hippocratis.

℞ rad. lilior. q. j. malu. bismal. violar. parietar. nasturt. berul. adian. an. m. j. ciccr. rubr. ℥ s. seminis milij solis, anisi, fœnic. an. ℥ y. florum chamem. melilot. an. p. j. coquantur in omazorum decoct. In colat. ad quartar. tria, dissol. terebinth. diacarth. & benedict. an. ℥ iij. sacchar. rub. & mell. an. ℥ j. ol. de scorpio. & lilior. an. ℥ j. s. fiat clyster.

℞ summitat. althea, vrtica, an. p. j. folior. beton. bipin. saxifrag. p. s. passul. mund. folior. senæ an. ℥ iij. fiat decoct. dissol. in colat. diaphæn. ℥ iij. bened. ℥ j. diacarth. ℥ y. fiat potus.

℞ milij. solis puluer. burg. spine lapid. indaic. macis an. ℥ j. puluer. electuar. ducis ℥ j. s. Capiat cum aqua terebinth. destill.

℞ succi amygdalar. dulcium sine igne ℥ j. s. vini albi potenti ss. ℥ y. cum aqu. destillat. terebinth. fiat potus.

℞ nucleor. mespil. ℥ y. s. semin. bard. petrosel. fœnic. an. ℥ s. 4. sem. frigid. maior. an. ℥ j. puluer. electuary diatrag. frig. an. ℥ j. s. cinnam. ℥ j. fiant tabella cum sacch. in aqu. pariet. soluto.

℞ decoct. omazorum quod suff. in quo coque mal. bismal. viol. an. m. j. ciccr. rubr. ℥ s. s. m. lini, dauci, alth. n. ilij solis an. ℥ iij. florum chamem. an. p. j. In colat. dissol. cass. & bened. laxat. an. ℥ s. ol. de scorp. lilior. & viol. an. ℥ j. santal. rubr. mellis viol. an. ℥ vj. philo. roman. ℥ y. fiat clyster. Fetus solemnes, & unguemum ex mucaginibus administrabantur.

℞ s. radic. aperit. an. ℥ s. althea, totius gramin. an. ℥ j. radic. bard. lapat. acuti. an. ℥ iij. cicchor. totius, herniar. scariol. beton. capill. ceter. bipinell. saxifrag. omnis buglos. an. m. s. 4. semin. frigid. maiorum. carui. milij solis, citrij. an. ℥ iij. glycyrrh. ras. ℥ s. florum cordial. & genisi. an. p. j. fiat decoct. a. lib. j. In colatura diss. syrup. oxymel. syrup. de

capill. ven. an. ʒ. j. s. aromatizetur electuario ducis.

ʒ. aloes ʒ. ij. s. medulla semin. bipinell. bardana, apj, contuse & crete per setaceum, an. ʒ. j. nucleorum mespilorum loto. vino albo & pulueris. ʒ. j. s. cum syrup. de alth. fiat massa vtenda ante pastus.

ʒ. nucleor. mespil. puluerisator. ʒ. s. rad. gramin. lote in vino albo, & in furno siccatur. ʒ. iij. liquiritia, semin. bardanae, ocymi, petrosel. maced. an. ʒ. j: cum triplo sacchar. puluer.

ʒ. semin. milij solis, alth. lini. fænugr. an. ʒ. s. fiat decoct. In colat. dissol. Cathol. ʒ. vj. benedict. laxat. ʒ. iij. terebinth. ʒ. s. sacchari rub. mellis viol. an. ʒ. j. ol. de scorpion. & liliorum an. ʒ. ij. philon. Rom. ʒ. j. s. fiat clyster.

ʒ. aqu. betonicae, argentine, corticum fabarum, an. ʒ. j. s. passentur cum saccharo & pauco cinam. adde sanguinis hirci preparati ʒ. j. pulueris lithon. ʒ. j. fiat potus, capiat in semicupio.

ʒ. rad. raphan. petrosel. fænic. aspar. an. ʒ. ij. semin. milij solis, saxifragi, lappæ maior. an. ʒ. s. beton. parietar. bismal. totius an. m. j. fiat decoct. in hydromelite bene cocto ad lib. duas.

ʒ. predictæ decoctionis quartar. tria, in quibus dissol. terebinth. venet. benedictæ laxat. an. ʒ. s. adipis anser. ʒ. j. puluer. lapid. iudaici ʒ. j. pulu. lithont. ʒ. ij. ol. de scorpion. & liliorum an. ʒ. i. s. fiat clyster. Vel

ʒ. olei de sem. lini lib. j. terebinth. veneta ʒ. j. s. diaphænici vino albo soluti ʒ. iij. fiat clyster.

ʒ. aqu. destill. saxifrag. beton. an. ʒ. j. s. aquæ terebinth. destill. ʒ. j. cum sacchar. & pauco cinam. fiat inlep. Capiat reddito clystere: & cum illo iulepo misceatur sanguis hircini preparati ʒ. s.

ʒ. rad. bryoniae, lilior. an. ʒ. j. s. malu. bismal. tot. parietar. creffionis, berula, an. m. j. semin. fænugr. alth. lini an. ʒ. j. ficus pingues num. vj. florum cham. em. p. ij. fiat decoct. & materialia predictæ decoctionis misceantur cum far. cicerum rub. ʒ. iij. far. fenugr. ʒ. ij. adip. anser. ʒ. j. s. cum oleo de scorp. & liliorum: fiat cataplasma pro rene utroque.

Paratur balneum cum seminibus lini, fænugr. alth. milij solis, florib. cham. em. melilot.

ʒ. 4 semin. frigid. maior. an. ʒ. s. semin. aspar. lithosperm. an. ʒ. ij. pul. lapid. cancro. & iudaici, an. ʒ. s. pul. burg. spina, & sem. bardana, an. ʒ. s. anthos ʒ. j. cum saccharo quod sufficit. Fiat puluis vtendus cum iulepo sequente.

ʒ. syrup. de alth. & de limonibus an. ʒ. j. aqu. decoct. fabarum ʒ. iij. fia iulp.

ʒ. aqu. byssop. parietar. beton. saxifrag. an. ʒ. ij. aqu. terebinth. destill. & raphan. an. ʒ. j. in quibus dissolue ol. de scorpionibus ʒ. ij. ol. lilior. ʒ. j.

℞. j. puluer. elect. ducis, & lithoni. an. ʒ ij. oxymel. simpl. & syrap. de raphan. an. ℞ ij. adipis anserini ℞ ij. fiat clyster pro duplici iniectione, additā ʒ j. s. quinta essentia terebinth.

℞ rad. cichorij, asparagi, apij, petros. fœniculi, raphan. areste bouis, an. ℞ j. rad. althee, lapp. maior, spine burg. can. rhlb. an. ʒ vj. betonica, parietarie, saxifrag. adiant. ceterach, endinia, pimpinell. cum toto hermiar. cichorij, an. m. j. fructuum alkek. en. num. xij. ciceram rub. xj. baccarum iuniperi & lauri contusarum an. ʒ j. s. milij solis. 4. semin. frigid. maior. semin. althee & milij solis, sem. malu. ruiotar. mart. an. ʒ ij. florum genist. p. j. fiat decoct. ad lib. j. In colicis. dissolu. syrupi de raphan. & de lymonibus an. ℞ j. s. Fiat iulep aromatizat. Electuar. Diatrees & Elect. Ducis.

℞ expr. ss. ʒ ij. rhubarb. infusi in decoct. gram. petrosel. brusci, acetos. agrimonia, bipin. saxifrag. rutic. mortua, sem. alkek. en. iuniperi: dissolu. lapid. iudaic. ʒ j. syrap. de raphan. & ros. pallid. an. ℞ s. omni.

℞ aqu. betonice, argent. saxifrag. an. ℞ j. s. aqu. raphan. ℞ s. passentur cum cin. sm. & pauco saccharo, addendo puluer. ducis ʒ j. lapid. iudaici & milij solis, lapillor. cancror. an. ʒ j. Fiat potus, detur in semicupio.

℞ mucagin. sem. lini, althea, fœnugr. extractarum in aqua pariet. ℞ j. s. adip. gallina & anseris an. ʒ vi. cum oleo de scorpionib. terebinth. venet. & butyr. recen. an. ℞ s. Fiat litus pro partibus dolentib.

℞ oleor. mastich. & cytoniorum, an. ℞ s. puluer. absynth. rosarum, corall. rubr. galang. an. ʒ s. cyp. ʒ j. pulu. myrtillorum, gall. nuc. cupress. an. ʒ j. cum ceroto stomach. Fiat litus ad stomachum.

multa alia instituta sunt, quæ necesse non est scribere, & quòd ea satis per se cuique occurrant, & quòd aliis ex locis facillè repetantur.

CONSILIVM LIII.

De Diarrhœa, & Dysenteria.

INTER eas affectiones quæ miseris mortales exercent, sunt fluores alui, præpropere deiectiones, leientericæ, dysentericæ, eteliacæ. Occurrerunt nobis plerique, quibus graue fuit ac permolestum sæpius desiderare, ac præsertim de nocte, vel cum in negotiis occuparentur, quæ necessariò omittenda essent, vt excernendi necessitati seruiretur. Coeliacæ, vel aluinæ excretiones (*ισχίον* enim hoc loco, aluus, latinè à nobis cum Cicerone vertitur, vulgò Ventriculus dicitur) non possunt diutiùs perseverare incolumi stantéque ægro. At dysentericæ excretiones (nomine *δυσεντερίας* improprie sumpto) diu fatigant, vel quòd minimo negotio sanguis excernatur, vel quòd tam diurni profluuij dysenterici occasio à capite repetatur, nullo etiamnum vitio in viscere aliquo contento, nisi quòd longitudine fluoris tandem partes *εὐσπαστικὰ* contentæ labem contraxerint. Ac fluorem hoc loco intelligimus *δυσήνη* vulgò dictam, cum & in excretionis modo, & in qualitate, & in frequentia peccatur. Nam hoc loco intelligi volumus de excretionis modo, & qualitate, quia per annos ferè septem, octoye nunquam excernitur quicquam ab aluo, nisi cum dolore circum umbilicum, aut paulò supra, infràve: & quæ secedunt corrupta sunt sanguinolentaque, diuersi coloris, & tamen morbus remedijs non cedit.

Hoc affectu miserè quidam annos iam afflictus est decem, nec opem vllam, quamvis consultis primarijs Medicis quæsuerit, inuenit. Decem ante annis dysenteriam, vt tunc Medicis visum est, passus est: operâ adhibita est: an malè curatus morbus nihil ad nos, ab eo tamen tempore, nisi breuibus aliquot intervallis, dolores, & excretiones, vt sic dicam, *εργαστικὰ* & *πυρετικὰ* non conquieverunt. Viso homine, nemo tam parum in arte versatus, qui non colligat temperamento bilioso esse, conferentibus eò frequentibus animi curis quibus impensè complicatur. Emaciatus est, hepar illi ad calidiorem temperiem inclinans, to-

tus venter ambustus (vt vocant) denique *Σεμεύαιλος* est, vt verbo Hippocratico vtamur. Sed sit ita, & fateamur eiusmodi temperiem & vitæ institutum Græcis *ἐπιπύρισμα* appellatum, ad alendum morbum conferre, propterea tamen non constat de sede, ac specie morbi: quis sit, vnde, qui tandiu manente ægro, perseveret, an vitium lienis, an hepatis, an cerebri, an mesenterij: & si mesenterij, an vlcus sit, an intemperies: Si vlcus, aut quid simile, quomodo tandiu superfuerit, cur non illa pars siderata, vitiatâque temporis progressu. Denique mirum est qui fiat vt illa liquida satis excretio, *αιματηρά*, graucolens, tam multiplex; (nam simul & cruenta, & stercoracea, & viridia, & flaua excernuntur, quæ nunquam in bene affectis excernuntur) tandiu possit perseverare. Notum enim illud est Galeni, *Κύμα excernuntur varia, si praua fuerint, deterius agris esse, quàm si vniufmodi.* Et si varia sint, ac praua, vel *ἀυτομάτως ἢ συμπύρισματικῶς* excernuntur, vel vi medicamenti purgantis. Cum *ἀυτομάτως* excernuntur, & excernendi finis non fit, nec id affatim fit, sed lentè ac pigro gressu, significatur varietas dispositionum malarum in diuersis partibus. Ac quò plures partes afficiuntur, eò res ægrorum deteriores sunt: vt autem lentorem, tarditatèmq; gressus explicet Hippocrates, vsus est participio *τὰ ἴδιον*, quòd non semel factam excretionem, & *ἀεθῶς* declarat, sed sensim ac sensim fieri. Sed cum artificio Medici ad imitationem naturæ comparato excretio fit talis materiæ prauæ ac multiplicis, tametsi hoc per se malum, ex euentu tamen bonum est: nam non perennem generationem, sed congeriem tantùm accumulationemque, *πυλαθρησιδόν* Græci vocant, designat: quod in omnibus morbis diligenter notandum.

Ac cum tandiu praua ista materia excernatur, siue noua generetur, vt necesse est, siue è sedibus partium intimis illa, aut pars illius secedat, mirum quomodo id fiat. Ideòque claris Medicis hoc negotium datum est, vt nec operâ, nec consilio iuuant, immò ne sedem mali quidem intelligerent: quanquam communè nomenclatione dysentericum quid appellant. Hepaticum non est pro fluuiù, siue rubrum intelligatur, siue non, quod tanti momenti pars decem annos non possit ita laborare, non quòd, vt antè dictum est, non afficiatur tandem hepar. Cephalicum esse aliquis suspicetur, non ita tamen vt tota natura profluuij in descensu pituitæ à cerebro consistat; nec enim dolores

illi ad vmbilicum consistenter, nec propterea cruentum excerneretur, nec tam varia ac putria; sed eâ ratione cephalicum esse potest, quatenus cum iam partes inferiores affecta essent, ad diuturnitatem fouendam accessit capitis opera mucosum humorem, aut phlegma falsum excernentis in aluum. Huc facit quod de nocte potius ad excernendum æger incitetur. Ac veteres practici distinxerunt profluuium stomachicum ab hepatico & cerebri, quod illud interdum fatiget, hoc, id est à cerebro hepateque natum profluuium de nocte potius sæuire consuescat. Quod autem diuturnitatem fluorum alui cuius illacumque modi sint, adiuuet cerebrum, primus literis mandauit Hippocrates: *Dysenteria, Leuenteria, Diarrhœa morbi sunt consimiles: hi sunt sanandi, vt defluxum à capite impediatis, & à ventre superiore. Morbi enim natura hinc est.*

Hipp. lib. 7. de mor. 9. c. 1.

Atque vnum obiter annotare non alienum, an necesse sit spumantes esse deiectiones, si à capite occasio excretionis pendeat. Aphorismus est Hippocratis: *Quibus in alui profluuiis excrementa spumant, iis à capite pituita est.* Falsus enim videtur in plerisque aphorismus: nã in doloribus colicis excernuntur spumantia, & bubulo excremento similia, natantiãque præ contecto spiritu, in aqua, non propterea tamen colligere licet caput hæc suppeditare. Sed dicit aliquis, Hippocratem loqui de alui profluuiis, in quibus cum spumat aliquid, excretæ à capite pituitæ argumentum est. In Comment. Galenus non videtur hunc aphorismum omninò probare. Sic visum est recentioribus rectè quidem in dysenteris materia commota calore æstuante agitata spumantia deici. Sic aliis signis colligendum caput male habere si graue caput, saluatio, ac præsertim mane & vesperi: maximè si eã molestiam sentiant in ventriculo. Quanquam caput per se constituitur pituitæ, sedes, quæ in ventriculum illabens profluua longiora reddit. In spumantibus itaque deiectionibus falli non oportet.

Gal. com. in aphor. 4. lib. 3. c. 30. l. 7.

Hipp. 4. de mor. 9. c. 1.

Esti autem caput magnum habet momentum ad producenda profluua, non est tamen temerè incusandum, nec medicamentis agitandum. Galenus primus meo iudicio, quod à nullis hætenus annotatum est, fluorum alui causam vnã agnoscit quandam *spumantem diarrœam* intestinorum, vt vocat, quam in quodam animaduertit qui exercebat cum sensu mordacitatis in superioribus intestinis (quod colligebat ex eo quod post mor-

Cap. 4. l. 1. de loc. aff.

dicationem paulò lōgiore tempore defideret) idque ob læsum
 à prauo medicamento intestinum. Ac coniecit læsum esse ab eo
 medicamento intestinum, ac iam in *πευματικῆς διαβίωσι* peruenisse,
 propterea que facile iecoris excrementa recipere, eaque cor-
 rumpere. Hic locus plurimùm conferet ad id intelligendum de
 quo laboramus, quò fiat vt tandiu profuuium perseueret, est il-
 la *διαβίωσις πευματικῆς*, in causa, id est, intestina vitata sunt, imbecil-
 liorave reddita, vt humorum aliunde influentium impetum fa-
 cile recipiāt, & humores à iecore manantes corrumpāt. quod
 notandum. Nam aliquis quærat, si à iecore excrementa manāt,
 corrumpantur necne, nil interest: quod intrepidè negandum
 est. Nam quæ à iecore fluunt, resfluuntque, ea cum excrementa
 tantùm sint, sed nil mali præterea habeant, intestinum vicinum
 vitatum, & iam in *πευματικῆς διαβίωσι* deueniens corrumpit, & pro-
 pterea citatior aluus redditur. Nam quæ in intestinis continen-
 tur, nisi acrimoniam quandam aliquo modo nata fuerint, ca-
 diutius in iis restitāt, & alio stimulum calearque ad soluendum
 non addunt. Non exigua itaque dubitatio fuit de illo egro, quæ-
 nam in illo potissimùm pars incusanda esset. Omnes ad hepar
 recurrerant. At illud aut intemperie, aut solutione continui,
 aut totâ substantiâ affectum est. Non abs re autem *τῆς ἐπιπέφυκῆς* dico,
 non autem *πυλῆς καὶ δόσι*; quoniam pars illa sicut & reliquæ partes
 efficiuntur nullo interim iudicio manifesto affectionis. Nam
 plerique ex his quibus præcipua cura est de coniectandis tan-
 gendisque hypochondriis, cum nec inæ qualitatem, nec tumo-
 rem, nec renitens quid tactu deprehendunt, propterea iubent
 securos esse ægros. Vnde sæpe in vulgi mentem venit, propi-
 nato veneno ita languere hominem, cum recitat Medicus nil
 deprehendisse vitij in hypochondriis. Tametsi enim Hippocr.
 in Coacis aduersariis in omni morbo hypochondrii æ qualita-
 tem in qualitate & substantiâ, in eoque doloris vacuitatem
 laudat: non propterea latere nos debet subesse substantiæ to-
 tius vitium in viscere contento in hypochondriis. Hoc autem
 Galenus literis tradidit apertè, quod ad medendum & inuesti-
 gandum confert plurimùm, ne temerè inueterato contrectan-
 di hypochondria mori assentiamur. Declarat enim quomodo
 superficies corporis sæpe colore æruginoso infecta, deturpatâ.
 que sit, cum nullâ existat obstructio, aut inflammatio, aut scir-
 rhus in hepate. Sed, ait, secundùm substantiam temperiei ipsius

partis mutatur. Vt sit temperamenti quædam alienatio, sed sit ita sanè (iam enim accedo ad eos, qui quòd fortè iuuenum virginum nitore, & vt ita dicam, polito marmore alliciantur, iam sibi persuasère officio suo non se defuturos, si vt morbì sedem inuestigent, manum ad hypochondrium adiiciant, vt hic plus voluptatis ad illos redeat, quàm ad ægros vtilitatis.) Sit ita, inquam, aliqua obstructione aut tumore laboret hepar, an propterea tactus fidem faciet? ² Quod si neges, habebis Galenum tibi contradicentem, qui non ita stolidè voluptuosèque ægra-

Gal. cap.
7. lib. 5.
de loc. aff.

rum mulierum inuerecundo tactu delectabatur. Istius verba hæc sunt: *Constat*, inquit, *hepar intra musculos positum esse; quod cum tribus contegatur musculis, fieri non potest vt tactus aliquam illius notitiam præstet, nisi vel magna in eo oriatur inflammatio, vel incumbentes ei musculi valdè extenuatisint.* At affectus hepatis cognitionem alià arte venandam esse tradit.

Vt ad institutum reuertamur, illius ægri hepar quod tanquam mali auctorem omnes accusabant, illudque præfidiis innumeris fatigabant, aut solutione continui, aut intemperie laborabat, aut vernacula eius temperies totaque substantia erat immutata. Nec inflammationem hepatis passus erat, nec tumor vllus, tamen si incumbentes musculi ex carnes penè essent, percipiebatur. Si caliditas est magna, adureret potiùs, siccarètque, & au-

Gal. cap.
3. lib. 3. de
symptom
caus. 8.
lib. de ar-
te par.

egritudis diarrhœa efficeret, vt in hydropicis quibus hepar præcalidum est, annotauit Hippocrates. Caliditas ad retentionem & attractionem facit: humiditas & frigiditas eadem retentionem dissoluit. Et si siccitas in iecore eandem retentionem roborabit, vt patet ex Galeno, qui qualitatum corpus constituentium, alias ad hanc aut ad illam potiùs actionem valere. ³ At dicet aliquis, immoderatus est calor, immoderata siccitas, Tametsi enim siccitas & calor ad retentionem & attractionem conferat, illud est intelligendum de vtroque moderato. Verum quidem

Com. in
aph. 10
lib. 2. A-
phor.

illud: nec enim nos latet scriptum esse à Galeno, vt moderata siccitas actionem retentricis iuuat, ita immoderata dissoluit. Quod senum exemplo patet, quibus cum adsit summa siccitas, iis aliud est liquida *αἰμαδότης* vitio impediente, nimirum siccitate immodicâ, & *αἰμαδότης*, & retentionem legitimam. At si fuisset in illo tanta intemperies calida siccaque hepatis, non fuisset credibile tamdiu eum viuere potuisse. Quanquam non negamus calorem qui in eo est magnus, & acer, plurimùm illum

fluorem iuuisse, dispositis malè iam intestinis, humores corrumpendo, & iis saltem acrimoniam attribuendo. Sic enim lib. 6 Epidemiorum scripsit Hippocrates, *Qui ventre calido sunt, carnes habent frigidæ.* Et miror, si tanta fuit intemperies calida hepatis initio, cur non ætas quæ secuta est illam correxit? Ita enim vernaculæ intemperies & veteres infirmitates temporis progressu immutantur, vt quibus in iuuentute fluxerit aluus, iis senibus resiccet. Et id est quod scripsit Hippocrates in Epid.

Morbi conuulsi in senectate relinquunt; quod Galenus de intemperie calida intelligit in Commentario, vt ætas ingrauescens illi intemperiei veluti auxilio sit. Quomodo autem hæc multos torquere possit. Ergo probabilius est accusare intestina in quibus inest

*Apho. 20
lib. 2. Aphor.*

in partibus diuersis illa quam diximus, iuuant hepate, ni mirum serofos humores acresque generante. Qui, si intestinum integrum esset, non ita citaret aluum. Sed hepar generando, mittendoque, intestinum & corrumpendo ob malam dispositionem, mutuas tradunt operas ad illum fluorem perpetuandum.

*Part. 6.
sect. lib. 6
Epidem.*

Et futurum tandem vt colliquecat hepar, & veluti consummatur. Si vitium in illo absolutè fuisset, vix tandiu homo superfuisset. Quanquam audiuius de Consule Parisiensi qui hepatico profluuiio bilioso sex annos vexatus est, & nullis remediis alleuatus est. Eo mortuo inuentus tantum hepatis locus & membrana, illius parenchymate consumpto & colliquefacto. Quod autem huic nostro ægro intestinum malè affectum sit, colligere possumus ex antecedentibus; nam aliquando dysenteriam verà laborauit, & cum Medicorum iudicio ea malè curata esset, ab eo tempore superfuit, restititque illud quodammodo dysentericum profluuium. Quanquam ad mesaræon potest sæpe longi fluoris occasio referri. Nos enim sex mensium spatio fluorem patientes vidimus, qui non hepatica cephalicæque exercebant, sed mesenterica, vt sic loquebamur. Et sæpe longorum latentiumque morborum sedes est mesaræon, frustra que aut ad licnem, aut ad hepar mali primalabes & occasio refertur.

Et ne cui mirum videatur si ad mesenterium recurrendum sit, quod non sit credibile ab vno hepate tam multam colluuiem provenire, habemus nobis suffragantem Galenum. Ille agnoscit quasdam mesenterii affectiones, à quibus qui ægrotarent, Mesenterici appellarentur. Quidam veterum cum perfectè confectum in ventriculo cremorem animaduertent, & talem serè deiici,

*Cap. ult.
lib. 13. de
loc. aff.*

nec à meseraicis factum deuectumque, vt fieri solet, falsò mlli causam mesenterio attribuentes, sic laborantes meseraicos appellabant, sed malè: & ideò hos Galenus redarguit. Nam cùm facultas attractrix hepatis languet, nil per venas meseraicas atrahitur ab hepate: propterea que non accusari debet mesenterium, sed hepar ipsum. Idem enim contingit quod iis quibus læsa spinalis medulla, & aut brachia, aut manus in iis suum officium non præstant. Non accusandæ manus, sed ad spinam recurrendum. Item cùm quis syncope prehensus non mouet manum, an ei manus in vitio est? Hæ rationes Galeni sunt. Contra tamen afferri hoc potest: Cùm chylus mitificatus excernitur, nec ad hepar deuehitur, an ideò facultatis attractricis hepatis id vitio sit? Nunquid sæpe fluorem alui videmus obstructo meseraeo facultatibus hepatis etiamnum integris? Non sequitur ergo ideò conuinci posse hepar laborare, cùm chylosa deiciuntur. Verum quidem illud, cùm facultas attrahendi hepatis ægra est, attractionem per meseraicas tanquam per manus officiales non fieri, non obstructæ viæ ratione, sed partis principis meseraei ministerio vtentis vitio. Et veteres qui meseraicos appellabant illos, non abs re fecerunt. Sic & Galenus, & illi veteres culpâ non vacant; siquidem & chylosa deici possunt solo vitio meseraei non deducentis: aliquando ipsius hepatis vitio, cùm meseraeon incolumis sit. Prætereà aduersus Galenum hoc stare potest. Meseraeon pars est naturalis: omni parti naturali sue actionis vis est, & per protopathiam laborat, non per consensum vt partes animales, quæ aliquando cùm per se incolumes sint, suæ affectionis causam in se non continent: Hinc fieri potest vt etiam laborante hepate meseraeon suum officium faciat: & contra incolume potest esse hepar, læso meseraeo. Et nil assert Galenus cùm ait ridiculum esse affectâ spinâ, manum, quia non moueatur, accusare: Idemque cõtingere in hepate & meseraeo, siquidem si meseraeon non trahat, affectionis huius causam non acceptâ ferèdo meseraeo, sed ipsi hepati; quod à ratione alienû se videtur, cùm meseraeo insit vis suæ actionis, & *est propria*. Nec est quod quis parum interesse dicat, sitne affectum meseraeon, an hepar, cùm chylosa deiciuntur; nam magna est partium affinitas: & vnus affectio facilè in aliud redundat. Nos autem contra sentimus; siquidem si in mesenterio aut tumor & obstructio sit, cuius occasione chylus ad portas non deuehatur, aliâ ratio-

*Galeni
lapsus.*

*de loc. aff.
Cap. vlt.*

ne curandum erit quàm si hepatis sola attractricis infirmitas in causa sit. Et nos vidimus chylosas deiectiones non affecto hepate aliquo insigni vitio, sed sublatis multis quæ mesaræon occupabant obstructionibus; tandem cessauit chylosa deiectio. Sic non sunt Galeni dicta pensiculatim & ad momi lucernam æstimanda: sed cum Galeno illo loco mens sit de hepaticis dicere, non est dubium quin hepatis facultate tractrice infirmâ mesaræon labore, actiôque eius aut minuat, aut deperdatur. Nam mesaræon tanquam auxiliaris manus hepatis subseruit. Sed contrâ non sequitur, chylosa deiectio est, necessariò itaque vitium hepatis conuincitur. Sic in vno sensu vera opinio Galeni, in altero sensu veterum opinio excipienda. Dicendum verò mesaræon, quod est veluti venarum textura, ita affectum esse ad hepar quatenus pars est officialis, vt vitium quod est in hepate facilè comunicetur ipsi mesaræo. Et Galenus eodem loco ait, si phlegmone, aut aliquid simile mesaræon obsideat, hæc affectio propriè eius esse dicitur. Si verò hepar ob imbecillitatem non possit per venas suas alimentum trahere, non mesenterio, sed hepatis prouidendum erit. Porro si velis discernere an inflammatio & erysipelas mesaræon occupet, sciendum tunc non solum excerni talia qualia in hepatis imbecillitate cum ad se cibum non trahit, excernuntur, sed præterea saniosum quid. Sic cum hepar non inflammatum est, & si cum chylosis excrementis saniosum quid excernitur, ad mesenterium hoc referendum.

Ceterum incredibile dictum est qualia excernantur dum mesenterium per intestina congestam in se colluuiem deponit: nec alienum ab instituto si differentias aliquot fluorum hepaticorum apposuerimus, dysentericæ species proposuerimus; quæ accidentia incipiente fluore dysenterico & hepatico contingant; quæ sedium distinctio, quæ notæ: deinde remediorum per breuis sylua præscribetur. Si enim omnes fluorum differentias persequi institutum esset, ne hic liber quidem sufficeret.

Quæ cumque excretio per aluum sanguinis sit (si hæmorrhoidalem exceperis) Dysenterica vulgò appellatur: idque præsertim cum dolor, ventrisque torsio aliqua percipitur: Quæ tamen cum vlcere est, propriè Dysenteria appellatur: hyparxisque eius in vlcere posita est. Ita enim eam propriè Dysenteriam nominari, & à veteribus & à suis Galenus autor est. Aliæ autem

2. de loc. aff. sunt excretiones cruentæ, vt cùm limus sanguinis excernitur, aut velut sanguinis fæx, aut cùm syncerus planè, eaque excretio affectum hepar declarat eidem Galeno. Nam vt tenue & faniosum, & recens mactatarum carniùm loturæ simile euacuat, id hepaticum est, id est declarat imbecillitatem iocineris sanguinem probum generare nequeuntis. Hanc excretionem

Galilib. 5. Hip. 1. 1. Proch. Hippocrates vocat *περίπλευρον ζέφυρον*, prærubram alui proluuiem interpretor. Est enim vel rubentior, vel dilutior pro ratione permixtæ tenuis substantiæ. Cùm autem fæci similis excretio sanguinis fit quodammodo exassantis iecoris argumentum est, & vocatur hoc *τὸ διαχρῆμα ζαφύρον*. Et notandū est illud quod

Cap. ult. lib. 5. loc. aff. scribit Galenus, & quod nos experientiâ sæpe deprehendimus, aliquando liquidam tenuemque sanguinis esse excretionem, quam melancholica postea, fæculenta, nigra, & atra consequatur. An atra, nigræque, & adusta quodammodo intemperie frigida affecto hepate excernitur? Nequaquam. Sed cùm alioqui præcessit frigida intemperies, temporis progressu putrescit in imbecillo hepate humor, à putredine febris lenta oritur; hinc adustio recoctioque humoris: quod annotandum. Nam sæpe hæc febris negligitur; hinc deiecta appetentia, prouentus prauorum humorum. Et cùm vident illi Medici deiectam appetentiam, non mouentur: quod malè fit. Illud enim notum esse debet, si perseueraret intemperies illa frigida quæ initio fuit, non ita deici appetentiam, immò cibi augeri desiderium. Quia autem ita deperditur appetentia calidioris intemperiei quæ successerit, debet esse argumentum. Nam calidas intemperies nūquam comitatur ciborum appetitus, sed ingens cibi fastidium, febris, vitiosorum humorum vomitus. Itaque non falsa debet esse opinio prioris intemperiei frigidæ: sed signis est venanda aucupandaque cognitio succedentis aliæ intemperiei.

Gal. ult. cap. lib. 5. de loc. aff. Quoniam autem de inappetentia quæ imbecillitatis hepatis comes est nonnulla dicta sunt, & de fluoribus dysentericis & hepaticis sermo est, non abs re erit pauca annexere ex Galeni mente, eaque ad Hippocratis sententiam accommodata. Hippocratis est illud, *In longis dysentericis inedia ex fastidio, malum, & cum febre, perus*. Nomen *τὸ ἀποστία* non aptè satis Leonicensis vertit, inediam ex fastidio, cùm vel inappetentia, vel auersio ciborum, verti debeat. Propriè autem nomen *ἀποστία* auersionem ciborum significat, vt in comment. in 1. Epidem. explicat

Aphor. 3. lib. 5. Aphor. 3. lib. 5. Aphor. 3. lib. 5.

Galenus. Sed hinc *αὐτῆ* *αἰσθησις* vsurpatur. *ἄριστος* autem *ἢ ἀπόριστος* distinguuntur propriè loquendo: impropriè autem sumitur hoc loco. Sic enim in Commentario Galenus vult *ἀπόριστον* sumi pro *ἀρίστου*. Denominibus hætenus.

Dysenteria aut supprimuntur intempestiue, aut diuturniores sunt. Tamen si enim dysenteria pessimus sit morbus, quia tamen sæpe fluor est quidam, ratione autem fluoris multa è corpore euacuantur, multaque qualitate prauâ, nullum tamen negotium naturæ (quia quietem habent, imoque delitent corpore) faceffentia continuata serie ad motum incitantur, fit vt si illa repentè, commota iam tamen, supprimantur, corpori periculum creent. Ita enim scripsit summus præceptor, *Dysenteria qua cessauit, abscessum vel tuberculum aliquod faciet, nisi vel in febres, vel in sudores deserit.* Et in Coacis; *Dysenteria intempestiue suppressa, abscessum in costis, aut visceribus, aut articulis facit.* Vt autem *Δυσεντερία* suppressa comites habet morbos, ita filongior, ei non defunt qui ius hæreditatis sibi decernant. Quocirca Aphorismo illo lib. 6 Aphorism. inappetentiam tanquam malum longæ dysenteria *ἐπιγυροῦσιν* scribebat. & in alio loco ita scripsit, *Qui lienosi à difficultate intestinorum capiuntur, iis superueniente longâ dysenteria, hydrops, aut leienteria superuenit, & moriuntur.* Vbi notanda verborum Hippocratis proprietates. Quid enim sibi hoc vult, *Qui lienosi à dysenteria capiuntur, iis superueniente longâ dysenteria*? nam non potest superuenire si iam adsit: debuitque dicere potiùs: *Quibus lienosis superuenit dysenteria, eaque productior fit.* Ita excusari potest Hippocrates, vt verbum *ἐπιγυροῦσιν* non est hinc propriè vsurpatum. Vel, quoniam laudatur dysenteria quæ superuenit lienoso si breuis sit, vt in Coacis animaduertit Hippocrates, cum producitur, debitumque tempus præterit, non iam amplius dysenteria splenica vocanda est, sed per propriam intestinorum affectionem fit, humoribus cuniculos agentibus, & vtrò progredientibus. Propterea que noua quodammodo dysenteria dici potest: sed hæc nihil ad rem. Itaque inappetentia, leienteriaque longæ dysenteria succedunt. An vtrūque affecto ventriculo, & malo quodammodo ventriculi œconomia (cuius est appetere, & coquere cibos, ideoque leienteria propria est ventriculi passio) labefacta cõtingit? Non videtur, si Galen. credimus. Et ideò sui oblitus Galenus, mihi in eo errasse videtur, quod mox explicabo.

Nam cum de inappetentia dysenteriae longae succedente mentionem iniecit, scribit; *ulceratus (in dysenteria) putrilaginosus ventriculus compatiens in coctionis munere offenditur: qua offerensione magis ac magis ad superiora perveniente cum os ventriculi vna afficitur, tum amoto sunt.* Itaque vult ad os superius ventriculi malum pervenire. Et quomodo? dicit aliquis. An ulceratio hyparix in dysenteria constituens ad os superius alui pervenit? Nequaquam. Quomodo id fit? Cum autem de leienteria meminit, non ad ventriculi vitium recurrit, sed ad intestina sola. Verba huius haec sunt: *Lasus intestinis a transitu vitiosorum humorum vis eorum laborat, & temperies nativi caloris aboletur; hinc hydrops, & leienteria. Leienteria quidem ex sola intestinorum laesione: hydrops ob hepatis sympathiam, &c.* An sola *νεκρωσις*, id est, oblatio sola intestinorum in longa dysenteria leienteriam facit? Si in tali morbo inappetentia contingit cum malum ad os ventris attingit (vt ante dictum est) cur non leienteria potius a vitio ventriculi, quam solo intestinorum vitio? An solum intestinorum vitium leienteriam parit? Galenus taxat veteres quod leienteriae tale nomen indiderint ἀπὸ τῆς αἰτίας τῆς νεκρωσεως, cum tamen vitium non intestinorum sit, sed ventriculi, vt pote cuius vitio coctio laedatur, eademque incolumis sit integro ventriculo. Itaque illa erronea propositio est, qua statuit solam intestinorum laesione leienteriam contingere posse. Nam & in primo aphorismo lib. 6. & aliis locis, ad ventriculū male affectum leienteria refertur. Quid ergo sibi vult Galenus tam sui dissimilis? Bisariam responderi potest, & excusari Galenus: Quoniam institutum est Galeni de dysenteria longa disputare, cui & hydrops & leienteria superuenit, quoniam dysenteria ad sola intestina refertur, a sola quoque laesione intestinorum leienteria nascitur, vt vnum & idem subiectum sit & dysenteriae & leienteriae. Dysenteriae quidem per conscriptionem ulcerationis quandam in intestinis: leienteriae, vitio communicato toti intestinorum conuolutioni, & diurnitate dysenteriae affecta temperie intestinorum. Vel dicemus aliud esse a sola laesione intestinorum nasci leienteriam, aliud a laesione solorum intestinorum. Nam si sola intestina diceret, excluderet ventriculū. At non est excludendus. Tertiò dicemus *νεκρωσις* nomen leienteriae usurpatum: & qua hinc leienteria fit, non est vera, cuiusmodi ea est quae per

Apho. 3.
lib. 6.

Com. in
Aph. 43.
lib. 6.

Expus
Galeni.

Com. in
apho. 12.
lib. 4.

Excusa-
tio Gale-
ni.

affectionem ventriculi contingit. Vel dicemus (& hæc vltima
 ratio probabilior videtur (illud *μόνος & μόλις χάρισον* dictum esse
 per comparationem morborum duorum, nempe hydropis, &
 leienteriæ. Nam cum hydrops longæ dysentericiæ succedit, ta-
 met si intestina malè à priore morbo afficerentur, non tamen ob-
 vitium solum intestinorum inuehitur hydrops, sed per sym-
 pathiam hepatis, lienis, & totius generis nervosi, vt disertè scri-
 bit Galenus. Ac si diceret, cum contingit hydrops in longa dy-
 sentericiâ, non est illius generatio ad intestina referenda: nullus
 enim hydrops nasci potest nisi aut hepate, aut liene affecto, aut
 genere venoso, vt apertius in Prognost. declarauit. Sed cum
 leienteria superuenit, à sola intestinorum læsione est, id est,
 non oportet aut hepar, aut lienem, aut genus venosum
 compati, vt in generando hydere, sed per proprium, peculiare,
 & vernaculum intestinorum suis rugis & febris alimentum, do-
 nec elaboretur aliquo modo, retinentium, vitium leienteria
 contingit: non quin ventriculi vitium adfit. In confessio enim
 omnibus esse debet leienteriam non posse nasci nisi affecto vē-
 triculo: Et cum meminit *χάρισον* intestinorum, non excludit
πλὴν & κατὰ τὴν χάρισον: sed omnia per comparationem duorum mor-
 borum intelligenda sunt. At inappetentia ad solum superius
 orificium ventriculi spectat. Quod Galenus explicat, dum sym-
 ptomata facultatis vitalis emorientis ab Hippocrate recensita
 demonstratione illustret. Hermocrates (ait) perpetuò à cibo
 abhorrebat, loqui non valebat, lingua inaruit, non sitiebat, &c.
 Hæc omnia sunt *ἀνορέτως ζῶντις καὶ κενὸν*: deinde subdit Gale-
 nus in Commentar. *Inappetentia*, Græcè ἀνορέτεια, melius ciborum
 auersio verteretur, id est vt ait, *ἀνορέτεια*, aut à ventriculi ore proficiscit-
 ur affecto aliqua humorum qualitate, aut ab ipsius facultatis extinctio-
 ne. Atque obiter annotandum est an ἀνορέτεια, aut ἀνορέτεια ad vi-
 talem facultatem referatur, an non potius ad naturalem. Pro-
 pterea pro verbo *ἀνορέτως ζῶντις*, legendum potius *φασκίς*. Con-
 iectura verisimilis esse videtur. Tamen, vt dicam quod sentio,
 nomen *ζῶντις* melius & generalius mihi videtur à Galeno vsur-
 patum, vt & *πλὴν δύναμεν ἐσθῆν*, & *τὴν ζῶντιν* complexu suo compre-
 hendat.

Com. i. in
 Apho. 48
 lib. 6.

Com. i. in
 Part. 1.
 lib. 2.
 Prognost.

Subtilis-
 sine Gal-
 leno
 excusa-
 tar.

P. vi. 10
 Sect. 1. lib
 3. Epid.

Redeamus ad institutum. Ex his symptomatis quæ dysente-
 ricæ longæ succedunt, sunt, inappetentia, leienteria, hydrops.
 Dictum est quomodo hæc fierent. Nunc autem vt aphorismus

tertius libri sexti intelligatur, ne temerè iudicent Medici de in-
appetentia quæ in dysenteriam incidit, eamque aut bono, aut
malo esse pronunciant; ita cum Diorsimo res distinguetur. In-
appetentia quæ in dysenteriam incidit, aut initio, aut affecto
iam morbo. Si initio, non ita in malis poni debet. Nam fieri
potest inappetentia primis morbi diebus ob ichoras confluen-
tes ab hepate (malè nomen *ιχθεις humores* vertit Leonicensus.)

Ex quibus qui ad intestina deriuantur, exulcerationem afferunt.
Qui in ore ventriculi fluitant, *αποριαν* afferre solent. At cum in-
appetentia affecto iam morbo contingit, *νεκρωσι*, mortificationem
interpretor, ventriculo aduenisse lege sympathias declarat. Hęc
Galenus. Itaque vt iudicium de inappetentia in dysenteriam
incidente feratur, hæc distinctiones tenendæ sunt.

Com. in
aphor.
3. lib. 6.

Missam fecimus variam acceptionem nominis Dysenteria, ne
quoties sanguis per inferiora educitur, dysenteriam adesse su-
spicemur. Nam & mutilis ob copiam sanguinis fit excretio per
aluuum, quæ dysenterica improprie vocatur: vocant autem
αιματηρον. Item quibus sanguis habet admistam bilem, aliquando
aperit, roditque oscilla vasorum, vnde fluit sanguis. Hęc autem
improprie quoque Dysenteria vocatur, nullumque nomen re-
perit, nisi sub *δυσωστος αιματηρος* comprehendas. Quanquam hoc
nomen ad eam euacuationem, quæ ob quantitatem contingit,

3. de sym
pto caus

accommodetur. Galenus autem indicare videtur & hanc & il-
lam *αιματηρον* appellari posse, hoc discriminis statuto, quod vna
dicatur *αιματηρον* ob sanguinis copiam, altera ob qualitatem. Quod
autem ea quæ ob qualitatem fit, *αιματηρον* quoque dici possit, col-
ligi potest ex Commentario in 5. Aphorismorum. Nam dum

Com. in
aphor. 6.
lib. 5.

Hippocrates narrat ea symptomata quæ contingunt iis quibus
circum vlcera tumores sunt, & de repente euanescent, memi-
nit Dysenteria non proprie dictæ, sed quæ *αιματηρον* vocatur.
Nam vlcera aut partes posticas corporis, aut anticæ occupant,
tumoresque iis assident, aut euanescent. Si in posticis, conuul-
siones fiunt tumore disparente, aut tetani. si in anticis, insania,
dolor lateris acutus, suppuratum, difficultas intestinorum. Ho-
rum hæc demonstratio, quia posteriora neruosa, anteriora vero

Aph. 6.
lib. 5.

venosa ac arteriosa: ideoque alio loco dictum erat, *Mulieribus
rigores ex lumbis magis & ad dorsum, &c.* Quod contingit & quia
pars illa neruosa, & frigida, & facile compassionis modo ad
principium neruorum affectio fertur, & quia substantiæ mol-

lioris est, facillè alterationem suscipit: At partes anteriores calidiorem habent temperaturam, ait Galenus. Si itaque tumores, præsertim si *λεῦδοι* sint, evanescant in partibus anterioribus dolores lateris & dysenteria fiunt *αἱματῆς*, id fit per *μείωσιν*, cuius maximè ratio habenda in morbis, an eam dysenteriam probabile est fieri à sanguinis tantùm copia, an verò à sanguine multo, sed ià malâ qualitate prædito? Si enim nondum contraxisset malam qualitatem, non tristia illa symptomata afferret. Ergo credibile est illam dysenteriam à qualitate & quantitate sanguinis contigisse. Sic ex eo loco patet dysenteriam à qualitate sanguinis factam nullo in intestinis concepto ulcere, *αἱματηρῆν* dici posse, non eam solam quæ à quantitate sanguinis fit. Vt utur enim Galenus nomine *ἡ δὲ δυνάμις αἱματῆος*.

Præterea hepatici sæpe excernunt sanguinem nullo intestinorum ulcerato, tamen non dysenteria propria, sed hepatica dicitur dysenteria: & illa est de qua antè dictum est, quam Hippocrates vocat *πείπλωσιν λεῦδοσιν*, vt Galenus Comment. in part. 2 1. Prorrh. part. 2. Prorrheticorum demonstravit.

Quid ergo restat de dysenteria dicendum, paucis aperiri debet quo excretionis modo significetur obsideri intestinum superius aut inferius: quod & deiectiones, & doloris situs & species declarabunt. Præterea quid de dysenteria scripserit Hippocrates, præsertim in libris Prorrhetic. Varietas intestinorum efficit vt & tenesmus, & dysenteria non facillè sedem affectam priuatim significant, ait Galenus. Item affinitas affectuum efficit quominus minùs facillè hepaticus fluxus à dysenterico distinguatur. Sunt quidem notæ nonnullæ, quibus distinguere possis. Etenim in dysenteria paulatim & cum torminibus excretio fit, & subinde desurgendi necessitas adest: quod in hepatico fluxu non contingit. Et mirum quod scribit Galenus eodem cap. Dysenteriam hepaticam à dysenteria propriè dicta, quæ in ulcere consistit, in eo distinguere, quòd dysenteria propriè dicta non repenti & affatim fiat, sed sensim, cum vlcus sua habeat tempora, & quædam rudimenta habeat: quod in dysenteria hepatica non vult contingere; quasi verò hepatica dysenteria non habeat quoque sua tempora, & non imbecillitas illa à qua nascitur ille affectus, inducatur ex longo tempore. Quod si verum est, nulla planè est Galeni distinctio de vtroque affectu constituta. Nec hunc locum planè intelligo, nisi de excretionis modo

Cap. 2.
lib. 6. de
loc. aff.

quam de generatione potius intelligatur. Aut hæc accipiuntur non ita strictè. Huius rei iis iudicium relinquo, quibus acuties ingenij maior inest. Ergo excretionis modus, & dolorum perceptio in variis partibus, & varia contèta, varièque mixta morborum sedem satis indicant: ac primùm in doloribus & situs, & species consideranda: situs quidem, si in partibus superioribus, aut inferioribus consistat dolor. Nam prout partes superas, aut inferas tenet, ita aut tenuia, aut crassa intestina dicitur occupare. Sed qui in Anatome versati sunt, aiunt hanc situs considerationem pili esse faciendam. Intestinum enim colon in crassorum intestinorum censu habetur, & tamen si quis in eo dolor sit, non dicetur deprehèdi ex situ inferiore. In hominibus enim vicinum est colon ventriculo: vnde in colicis doloribus stomachi subuersiones, & vomitionis assiduitas. Quid ergo sibi vult ille situs superior, aut inferior? Prætereà quod ad speciem doloris attinet, quæri potest, an dolor in superioribus, tenuibusque intestinis sit aut maior, aut minor, quàm qui in crassioribus confedit? Primùm ex Anatome disci debet tenuium intestinorum tunicas rarâ ac tenui substantiâ constare, & intestina illa, quæ membranosa sunt, exquisitioris esse sensus quàm sint crassa; quippe quæ carnosâ sint magis. Si exquisitior in illis quàm in his sit sensus, dolor qui in tristi sensatione consistit, maior erit, ac manifestior in tenuibus quàm crassis intestinis. Ac proptereà Galenus vehementissimos dolores in tenuibus intestinis persentiri dixit. Cõtra tamen & rationè Anatomæ, & cõmunem sensum, & sententiam Galeni locus alius stabit ab eodem Galeno scriptus, cuius hæc verba: *Ex doloribus ij qui vehementissimi sunt, haud abs re in crassis erunt intestinis.* Qui verò mitiores sunt, horum duorum alterum esse necesse est, aut quod à mansuetiore minorèque causa sunt, aut quod non in crassis, sed in tenuibus sunt intestinis. Hoc ex loco sole clarius apparet dolores grauiores deteriorèsque esse in crassis quàm tenuibus intestinis, positis omnibus paribus: alioqui distinctionis omne fundamentum mutaret. Sed locus ille planè falsus & erroneus est, nisi intelligatur. Institutum Galeni est de colicis doloribus à materia crassa frigida, lentâque disputare: cum enim cumulanda, crassa, crudeque materiæ locus sit opportunus, Colon intestinum, idè & ratione loci, qui amplius est, distenditur vadè, & materiæ quæ in eo congeri solet, cum vehementissimi sint dolo-

Cap. 2.
lib. 6. de
loc. aff.

Cap. 5.
lib. 2 de

dolores, conuicimus in colo esse; si mansuetiores, aut in tenuibus sunt, utpote in quibus non soleat illa pituita cumulari; aut in colo sunt, sed à minore causa. Sed dicit aliquis, si in tenui & crasso intestino eadem crassa materia ponatur, à qua dolor, an non crudelior dolor in tenui, quàm in crasso? Verum quidem esse videtur. Sed in tenuibus intestinis non illa congeritur materia: propterea accommodatè admodum facit sententia Galeni in lib. de locis affect. *Omnes, ait, & Medici, & populares vehementissimos dolores ad colon referunt, & colicos vocant. Quod mihi verisimile videtur, ait Galenus. Nam non ut in vteribus lapides impa-* cap. 2 lib 6.
cto lapide dolores excitantur, ita in tenuibus intestinis frigidi spiritus & humores retenti grauissimos dolores excitant. Nam cum tenuium intestinorum tunica sit rara, diu huiusmodi causas, id est, crassos humores continere non possunt. Probabilius ergo cum crassum humorem in crasso intestino genitum, egredi nequeunt dolores hos mouere. Vehementes quidem ob intemperantiam, & corporum crassorum tensionem: longos, quia difficulter vacuatur. ¹² Hoc ex loco patet superiorem sententiam de grauitate doloris in crassis intestinis intelligi de materia frigida quæ & generationem peculiariter hinc habet, & mansionem. At tenuia intestina, quia à bile tanquam clystere naturali eluuntur, non generant; & si habeant, non diu retinent; ut placet Galeno. Non enim negare oportet quin si acres mordacesque humores in tenuibus intestinis retinerentur, aut crudeliores dolores, aut pares saltem excitarentur ac si eadem materia in crassis retineretur: sed peculiariter & crassæ materiæ crassa intestina sunt promptuarium. Ideo, ut annotat Galenus, in tenuibus intestinis acerbissimi dolores sunt (ut in ileo) aut cum inflammatio est quæ obstruit intestinum ut nil transeat, aut resecatum omnino stercus. Quanquam contra id quod dicimus, in tenuibus intestinis non posse eam phlegmonem generari, quæ intestini capacitatem illatenus impediatur, afferri potest locus in quo Galenus docens asperæ arteriæ phlegmonem posse quidè difficultatem spirandi afferre, sed strangulationem non posse inducere, scribit: *Impossibile est corporis multum tenuis inflammationem spatium effatu dignum replere.* Tenuia intestina, per eundem Galenum 6. de loc. affectis, tunicam habent raram admodum: Ergo quamuis in ea concipiatur phlegmone, non potest viam obstruere. Locus est notandus.

His ita positis, ad reliqua pergendum est, ac de mitionis mo-

x. cap. lib.
de loc.
affect.
4. cap. 1.
6.

de dicendum. Galenus excretionis modum considerauit: item
quæ excernuntur: præterea qualiter misceantur quæ excernun-
tur. Hæc autem vocat Galenus eo loco, vlceris notas admistas,
aut non admistas, parum aut multum admistas. Si quæ excernuntur
membranosa magis sint, à tenuioribus intestinis excre-
tio fit; si autem purulenta magis & carnosa ab intestinis crassio-
ribus. Et quod ad tempus excretionis pertinet, si postquam do-
lor in partibus perceptus est, breui post tempore desideat æger,
à partibus propinquis secretio fit: contra verò euenit si à lon-
ginquis partibus humores exiuerint. Præterea notæ vlceris, vel
sanguis, aut tota totis excrementis sunt mixta, aut per se, & ve-
luti sola in sese coacta comprehensaque excernuntur: si partiū
omnium quasi minutim concisarum ac confractarum mixtio
fiat, à superioribus intestinis vacuatio fit: sin aut sanguis, aut
pus secretum videatur, & per se solum existens, in seseque co-
actum, à propinquis partibus materia deraditur, huiusmodi ex-
cretionem dicimus fieri aut *ἀσπείου*, aut non. Quod vt intelliga-
mus, asserti potest sententia ex Aphorismis Hippocratis: *Quo-
rum in urinis supereminet pingue aliquid, idque ἀσπείου*, id est confer-
tum, totumque in sese, iis renes laborant: *ὀμύουσι* dicitur *ἀσπείου*,
aut pus *πύον ἀσπείου*, cum non est diuulsum, diuisumque, sed compres-
sum, coactum, collectumque in sese. Galenus in Commentar.
docet, cum à partibus corporis decedit aliquid crassum, vñ
cum liquore, aut etiam sine eo, ob viæ prolixitatem non potest
suam coherentiam ac continuitatem retinere, sed refringitur,
diuiditur, diuelliturque. Cum autem à propinquis partibus di-
manat, coadunatur, coitque, læ in sese compingitur: hoc au-
tem dicitur *ἀσπείου* & *ἀσπείου* excerni, quanquam in nostris defini-
tionibus Medicis *ἀσπείου* longè alias differentias & significatio-
nes exposuimus.

Pleraque in nostris monumentis de differentiis alui fluorum,
siue sint vniuersales, siue particulares, siue cruenti, siue cœliaci,
siue hepatici: quæ omnia hic meminisse non vacat. Tantum
huc afferemus sylvam aliquam remediorum non sine iudicio
vsurpandorum, sed cuique pro diuerso tempore morbi, & va-
ria corporis constitutione accommodandorum. Illa quoniam
nos in vsu contulimus, & ab aliis vsurpata vidimus, reliquis
omnibus diorsimis qui in dysentericis fluoribus curandis sunt
considerandi, nudam remediorum tabulam proponemus. Et

Cap. 4.
lib. 1. de
loc. aff.

Aph. 35.
lib. 7.

fortè primo loco ponemus quæ astringant, non quòd ita statim faciundum putemus in eorum erroribus nosipfos implicantes, quibus irretitos veteres Galenus scribit. Illi enim omnem dysenteriam per sola astringentia, idque initio morbi curabant. Quòd pessimum est, cum dysenteria intempestiue suppressa sit calamitosa Hippocrati.

In Conc.

In fluxu hepatico:

℞ ol. de absynthio ℥ j. s. olei rosati ℥ j. santalor. omn. pulueris. ʒ s. assæ odorata ʒ j. cum cera. fiat linim. pro hepate.

℞. carnis cyton. mastich. cerot. confortat. an. ʒ vj. ladani in vino soluti ʒ ij. cypp. aloes lotæ an. ʒ. j. Malaxentur cum ol. de absynth. & rosat. fiat massa emplastri pro stomacho.

Item ℞. pulp. passul. damasc. ʒ j. s. carn. myrobal. emblicar. per se-taccum transmissam, hepatic. vulp. prepar. an. ʒ iij. rasur. ebor. ʒ j. sacch. ros. ʒ j. cum syrup. de cichor. compos. sine rheo. fiat opiata: vsus sit ʒ s.

Ad dysentericos fluores valent clysteres, in quibus sepeum hircinum prius solutum oleo rosato dissoluatur.

℞. syrupi rosar. siccar. ʒ j. syrup. de papan. ʒ s. cum decoct. papan. fiat potus.

Item ℞. rhab. puluer. ʒ ij. dissol. in aq. rosar. fiat potus.

℞. lact. vstul. cum calculis fluuiatibus lib. s. muccag. sem. citrij, hordei & psily extract. in aqua centinodia ʒ ij. coaguli de quo casei fiunt, boli armen. amygd. an. ʒ j. s. vitell. oui vnum. fiat clyster.

Fruus ex plantag. alihea, seminib. & calidis & frigidis valent.

Item hoc quod sequitur:

℞. coriandri ʒ s. anij ʒ ij. rosarum rubr. cort. citrij, carnis cytonior. exsiccat. an. ʒ j. sacchar. ros. quan. suff.

℞. ros. vnicor. gr. s. cum destillato restaur. fiat potus.

℞. syrup. ros. siccar. ʒ j. diacod. cum addit. ʒ s. cum decoct. lactucæ. fiat potus.

Paretur hordeatū incoctis duobus capitibus papaueris, & positis in nodulo

℞. confer. rosar. symphyt. cornelio. nemuph. an. ʒ s. puluer. triasant.

diatrag. frigidi, diarrhod. Abbat. an. ʒ j. trochisc. de karab. & spod. an.

ʒ s. passul. cum toto ʒ ij. seminis papan. albi ʒ j. s. aqua decoct. duorum

pullorum in aqua pluuiali ferrata alteratorum cum lactuc. porul. buglos.

borag. foliis plantag. lib. viij. Pone in alambico cum mica duorum panu

infusor. in lacte. fiat destillatio in baln. Marie.

℞. præd. destillat. lib. s. sacchari ros. ʒ ij. vini granat. ʒ s. cinamo.

ʒ s. p. asser. per manic. Hippocr. utatur omni hora.

℞. conseru. rosar. ℥ss. myrobalan. citrin. condit. ℥ij. rasur. ebór. cor. cerui, coral. rubr. an. ℥ss. facchar. ros. quod suff. fiat conditum.

Item parata sunt hordeata cum lacte vaccino.

℞. myna cytonior. ℥ij. capiat cochlearia duo ante pastus.

℞. sumach. ℥j. granor. berberis ℥j. facti sunt noduli imposti per sedem.

℞. ol. commun. lib. i. cera alba quod suff. pistetur in mortario affundendo aquam frigid. fiat unguent.

℞. decoct. fact. ex ros. rubr. plantag. verbas. sem. portulac. acetos. rosar. florib. chamem. dissolut. ex mucag. sem. cytonior. extract. in aqu. solatriq. s. album. ouor 3. ℥ij illius predicti ceroti refriger fiat for.

℞. olei nucis mosc. ℥ss. pro stomacho.

℞. rad. alth. lib. s. coquatur in lacte ad lib. ij.

℞. predict. decoct. lib. j. mucag. semin. cyton. extract. in aqua plantag. axungia anser. an. ℥ss. mellis ros. 3vj. sacchari comm. ℥ij. croci ℥ss. fiat clyster.

℞. olei ros. cyton. & mastich. an. 3vj. coral. rubr. & gallie mosc. an. 3j. cum cera. fiat linimentum.

℞. terra sigil. 3j. boli armen. ℥j. syrapi rosar. siccar. ℥j. aqu. rosar. ℥ij. fiat potus.

℞. puluer. pudendi ceruini 3j. sacchari ros. ℥j. fiat puluis.

℞. far. fabar. ℥ij. rosar. rubr. mastich. an. 3ij. carnis cyton. ceroti stomach. an. ℥j. s. cum oleo cyton. fiat emplastr. pro stomacho, & toto vêtre.

℞. conseru. rosar. 3j. philo. roma. ℥ss. terra sigil. ℥j. corall. rub. ℥ss. cum saccharo. fiat bolus, capiat hora somni.

℞. corticum myrob. citrin. ℥ss. passul. 3ij. glycyrrh. 3j. s. plantag. m. s. In colat. dissolue syrupum de cicher. compos. cum rheo ℥ss. s. rheub. puluer. 3ss. philony rom. ℥j. fiat potus.

℞. aqu. decoct. sumach. & vnius myrobal. plantag. rosar. berberis, 3ij. in quibus dissolu. boli armen. loti in aqua rosar. 3ss. syrapi rosar. siccar. & cytonior. an. ℥ss. trochisc. de spodio ℥j. fiat potus, capiat sero.

℞. philony rom. 3ss. syrapi cyton. 3vj. trochisc. de Karab. 3j. cum decoct. sumach. rosar. plantag. fiat potus.

℞. corticum myrobal. cyton. cebul. an. ℥ss. fiat decoct. in aqua centinodie. In colat. dissolue syrup. rosar. siccarum ℥j. aqu. arnoglos. ℥j. fiat potus.

℞. myrobolan. citrinarum contus. cum amygdalis 3ij. fiat decoct. in aqua plantag. In colatura dissolue earum. myrob. pulueris. ℥j. mibridatij 3ss. syrapi de cyton. & menth. an. ℥ss. cornu cerui vsti 3j. fiat potus.

aromatizatus cinam.

℞. cypp. calami aromat. schenuath. caryoph. an. ℥ss. rosar. rubr. menib. absynib. folior. myrtil. an. m. j. sem. anisi, fœnic. cumi, an. ℥ iij. balaust. ℥ j. includantur sacculo: fiat decoct. in aqu. fabror. & vino stypt. pro fetu ventris.

℞. ros. rubr. absynibij, an. m. j. cypp. ℥ iij. sumac. balaust. nucum cupress. myrtill. an. ℥ j. gallar. ℥ s. fiat saccul. qui bulliat in aqua & vino rubro: adde aceti rosati ℥ ij.

℞. succi plantag. depurati, centinodia, an. ℥ ij. boli armeni loti in aq. ros. ℥ s. trochisc. de Karab. ℥ ij. syrapi myrtib. & cyton. an. ℥ s. fiat potus.

℞. ole. mastich. de absynib. de menth. ceroti stomach. an. ℥ iij. olei nucis mosc. ℥ j. caryophyl. & pip. an. gr. xv. fiat unguent. pro stomacho.

℞. ceroti santal. vnc. ij. mastich. carnis cyton. an. ℥ s. rosar. rubr. unguenti comitiss. an. ℥ ij. Fiat emplastr. cum puluere lapid. calam. & bolo.

℞. carnem vnius perdici, dimidiam partem capi, vitulinae carnis frustum vnum, folior. plantag. scabiosa, card. an. m. j. semin. berberis, cyton. 4 semin. frigid. maior. an. ℥ s. conserua rosar. rubr. de ribes. conscribuglos. & res. an. ℥ s. mica panis ℥ iij. Includantur omnia vase figulino, coletur. in colat ad lib. duas dissolu. succi granat. succi ribes. an. ℥ ij. s. frequenter vtatur.

℞. olei mastich. cyton. & res. an. ℥ s. pulu. rosar. rubr. corall. rubr. an. ℥ s. galange ℥ j. cum cera noua in aqua plantaginis lota. Fiat linimentum pro ventriculo ad regionem umbilici.

℞. far. fab. ℥ ij. ros. rub. mastich. an. ℥ iij. carnis cyton. confortat. gal. an. ℥ i. s. cum oleo cytoniar. fiat emplastrum pro venire anteriore. Applicetur aliud parti postica.

℞. emplastri de gallia cum significationibus caliditatis ℥ iij. terrae lemnie, coral. puluer. an. ℥ j. boli armeni, carnis cyton. an. ℥ j. s. cum ol. mastich. Fiat unguentum pro ventre toto.

℞. plantag. sumach. balaust. ros. an. m. vnum. fiat decoct. pro doct. In colat. dissol. trochisc. de spodio & kar. boli arm. an. ℥ s. syrapi ros. sicc. ℥ j. phileny romani ℥ j. fiat potio.

℞. coral. rub. puluer. trochisc. de spodio & Karab. cum ℥ ij. gummi tragacan. vsti, boli armen. loti aqu. ros. ℥ s. syrapi cichor. & cytoniar. an. ℥ s. opij gr. ij. cum decoct. plantag. fiat potus.

Item ℞. pilul. de cynoglos. scr. s. Capiat ex syrapi. de liciis.

℞. succi plantag. depurati ℥ ij. trochisc. de Karab. ℥ ij. boli arm. loti in aqua rosar. ℥ s. trochisc. de spodio ℥ j. syrapi. myrtil. ℥ j. fiat potus.

Valet hic clyster in summis doloribus.

℞. capiatria papau. tapſi m. j. roſarum, m. j. radicis altheæ ℥. j. coquantur in aqua. diſſol. lactis lib. ſ. puluerem duorum ouorum induratum, pro tribus iniectionib. in ventrem.

℞. roſar. rubrar. ſumach. balauſt. & nucum cupreſſ. galla. corticum granat. an. m. j. ſem. berberis ℥ iij. alumin. ℥ iij. fiat ſacculus qui bulliat in aqua fabror. adde aceti ℥ ij. Ceratum ſantalinum malaxatum in oxycrato aut oxyrhod. applicitum hepatis confert.

Pleni ſunt libri remediis quæ ad dyſenteriam apprimè conferunt, ſiue detergendum, ſiue leniendum, ſiue incruſtandum, ſiue abluendum, ſiue incarnandum: denique pro variis ſcopis quos intueri poſſumus.

Solum hoc annotandum de dyſenteria, quod aliò animum cōuertentes, ad cætera adiicere non meminimus, conſcriptam eſſe caput de ea ab Hippocrate lib. 2. Prorrheticon. in quem librum Galenus Commentarium non conſcripſit. Quod eo à Galeno factum videtur, vel quia illum librum Hippocratis eſſe non putaret: quanquam hæc ratio ieiuna videatur, cùm ne aliū librum priorem ipſius eſſe exiſtinet, quem tamen ſcholiis illuſtravit: aut quia clarior videretur, vt & reuerà eſt, quam vt in conſcribendis in eum commentariis opera inſumatur: aut conſcripſit & concinnauit, ſed ij iniuriâ temporis exciderunt, aut blatis & tineis eſca ſunt apud eos qui nimium publicæ vtilitati inuidentes, malunt neſcio cui commentario oſcitanter indormire, quàm eius partem ſuis communicare. Satis eſt locum Prorrhetici indiçaſſe, vt ex eius penu quod lubet, & ſemel ſubindicatum eſt, cùm volemus, depromatur.

ANNOTATIONES.

1. Galenus hunc nodum ſoluit cap. 17. lib. 2. de different. febr. Cùm pars imbecilla eſt, & aliunde in hanc humor inſluit, hic humor ſi pars bene affecta eſſet, alimentum foret, ſed quia laborat eſt illi potius onus quàm nutrimentum, ait Galenus; unde non mirum ſi corrumpatur.

2. Tamen cap. 1. lib. 6. de loc. affect. vult facile aut ſaltem facilius per comparationem deprehendi tumores & inflammationes lienis, quàm hepatis. Et quod ad ſimarum hepatis inflammationem ſpectat, non a deò difficulter cognoſcuntur, quia ſimarum inflammationes cum gibois partibus communicant.

3. Galenus loquens de intemperie hepatis, cap. 7. lib. 5. de loc. affect.

ait: Calida hepatis intemperies cibos in eo contentos, & eos qui per venas mesenterij deseruntur adurit: frigida contentum iam in iecore humorem crassum contumaciorem reddit: id quod affertur semicocctum reddit arida sicciores, crassioresque, humida tenuiores.

4. Notanda vox, [non solum propter ea quae dicta sunt] supp. Nam hinc patet ob affectionem peculiarem ipsius mesenterij attractionem non fieri.

5. Galenus comment. in part. 2. lib. 2. Prognost. docet finorem alai sequi ex inflammatione mesenterij, & hydropem, tribus de causis. Locus est notandus. Omnium autem amplissime de distinctione hepaticorum & mesarascarum excretionum, cap. 7. lib. 5. de loc. affect. Galenus.

6. Tamen in doctrina Galeni, intestina unam tantum habent facultatem: quomodo ergo leienteria horum vitio contingit?

7. Inappetentia ad facultatem vitalem à Galeno refertur.

8. Comment. in part. 38. sect. 2. lib. 6. Epid. notat ichorem dici bisariam: & pro aquea substantia quae circumfluit crassiorem partem cuiuslibet humoris, & veluti *cat' Hoip*, cum malignam qualitatem humor ille adeptus est, à quo ichore mali morbi.

9. Sub finem libri de veteri medicina, certissimo argumento colligere possit & minores esse dolores in intestinis quam sint in hepate, & regione eius & frequentiores esse in hepate Nam quia hepar tenerum est, (à medicis Graecis) & sanguineum visus, ideo magis sentit. Intestina nervosa sunt, membranosa, fortiaque, ideo magis resistunt.

10. Ab ea parte qua dolor sentitur, nullum iudicium sumi potest quae intelligas colō intestini potius quam tenue affici ac laborare. Ait Galenus. ca. 5. lib. 2. de loc. affect. quod falsum videtur. Nisi quis dicat generaliter ex vehementia doloris dicere nos posse tenue quam crassum intestinum laborare: si enim vehementissimi dolores, credibilis esse in crassis intestinis: sed peculiariter à parte affecta non possumus indicationem sumere ut iudicemus colō potius laborare quam aliquod ex tenuibus intestinis.

11. Quò pacto dolores in intestinis excitentur ob revolutiones eorum dē; Hippocrates libro de veteri Medic. sub finem explicavit.

12. Ex cap. 5. lib. 2. de loc. affect. tenuitas corporis intestinorum efficit ut non diu humor crassus retineatur: quod contingit in crasso. Ideo Galenus loquens de dolore colico quem patiebatur, ait, Neque tanquam per tenue corpus brevis temporis spatio dolor transibat, sed quasi à profundo per crassius corpus ferebatur, quam fit tunica tenuium intestinorum. Tam. n. ibidem ait; Nullum à parte à qua dolor excitatur, aut quā sentitur iudicium sumi, ut magis tenue quam

280 CONSILIORVM MEDICINALIVM
crassum intestinum affici intelligamus. *Quod falsum est, & iis que
hic dicuntur contrarium. Nec video quomodo coherere possit, nisi forte ab
revolutionem coli intestini dicat fieri non posse ut si spectetur situs doloris,
iudicemus aut colon intestinum laborare, aut tenue aliquod. Et nisi ita
locus audiatur, non eum possum explicare. Situs enim fallax omnino est.
nam ileum intestinum infra umbilicum ferè totum est: ergo ex situ nil
colliges.*

CONSILIVM LIV.

De Angina.

CONSTITVTIO aquilonia impensè frigida & sicca sæuie-
rat, cum in hominum genus magna morborum vis inuasit,
ac præsertim febres, cum magna perfrigeratione, calescendi,
frigescendique erat vicissitudo, & crudor quidam, vt Aristote-
les I. Problematon 9^o, & 10^o problemate annotauit. Ille autem
crudor, Græcis *σφαιρατος*, maximè ob frigidam, siccam, aquilo-
niamque constitutionem solet contingere. Pleuritides grassa-
tæ sunt, peripneumonia, pulmonumque variæ affectiones, at-
que inter cætera tussiles & raucedines, præsertim cum defæuien-
te hyeme quæ in summo squalore & rigore frigoris congelata,
conglaciata quæ fuerat, fundi liquarique cœperunt. Inter cæte-
ra ophthalmiæ multis *σφοδρες*, multis *εμπαι*, vt quæ in siccitatibus
αγγυμοις Græci vocant, contingere solent: item deglutiendi
quædã difficultas cum febre, linguæ scabritie, totius oris squa-
lore quodam, iunctâ virium infirmitate. Atque de hoc tertio
agere institutum est; nam & cum nil appareret in faucibus, & ta-
men deglutire aptè non possent ægri, nec solemnis remedio-
rum vsus quicquam conduceret, id ipsum nobis medicinam
facientibus plurimum negotij dedit. Tres nobis videre contigit
in quibus nil apparebat rubrum in faucibus, nil extrâ: non eri-
gendi capitis vlla necessitas, & tamen per quindecim dies sine
vlla tussi, sine excreatione manserunt, cum linguæ & totius oris
ad mediam ferè asperam arteriam squalore, siccitate, non calo-
re vlllo effatu digno, sine tumore vlllo, & tamen nil alleuaban-
tur. Hippocrates quidem part. 20. lib. 3 Prognosticon, meminit
cuiusdam synanches quæ ægrum in periculum non conuicit:

non

non laborat guttur, sed in fauces, aut in ceruicem, aut in vtrāque fluxio fit: maximaque ex parte ceruix & pectus ruborem contrahunt. At talis fluxio *sacer ignis* ab Hippocrate vocatur, quod erysipelatodes sit. Nec dolent vehementer, nec difficulter spirant, cum guttur non perpetiatur. At in nostris ægris nullus rubor in ceruice, aut pectore, sed tantum nescio quid superficiei tenus in faucibus & circum vuluam apparebat: dumque salua deglutiebatur, difficultas quædam erat. Item partic. 17.

lib. 3. Prognost. meminit faucium exulceratarum in febribus, quod nos aliquando obseruauimus, cum & à capite rodens humor defertur exulcerans, & postea vi febris rursus summittitur humor, qui ob calorem febrilem acrimoniam acquirens malum continuat atque protrahat. Sed nil in ægris nostris tale apparuit.

Quid ergo fuit quod illis tantam molestiam pareret? Illa difficultas, quæ aliquid *συνασχυρόν* in se habebat, & fortè ad synanchen referri potest (generali enim nomine quicquid nonnullam difficultatem spirandi affert, aut circa guttur, aut fauces, illud synanche nominatur Galeno comm. in lib. de diæta acutor. Sed vnde illa difficultas, cum nec magnus dolor, nec phlogosis apparens, immò nec tumor, aut phlgmonodes aut pituitosus, nil erysipelatodes apparebat; & tamen maxima est siccitas, nil resudate, nil excreto, squalor est, & languent admodum ægri. An hic morbus angina sicca, aut biliosa, aut morbus siccus vocabitur?

Reperio apud Hippocratem nomen τὸ ξηρὸν multis rebus attribui, & magnam vim habere, immò maiorem fortè quàm quis existimet. Si liceret orationis vela pandere, multa ea de re disputari à nobis possent. In aphorismis multis in locis inuenio

ἰσχυρὰ ξηρὰ, & ὀδοναλμιας ἐπιώδεις, quæ eadem & ξηρὰ dicuntur, & ἀσχυρὰ. Item apud Hippocratem 4° de diæta acutor. χολέρας ξηρὰν χυρῶσαν; & apud eundem Hippocratem, anginam reperio

χολέρας, πυρόχολον (ita enim eas voces admittit Galenus clarioris doctrinæ gratiâ, vt distinguatur ab ea angina, quam ολερμάνιν appellari volunt. Et illa angina à nitroso humore fit, qui non fauces obsidet tantum, sed musculos à tergo, vt paulò post explicabimus, orthopnoeamque parit, & τὴν ξηρῶσται πολλῶν, ita tamen vt nil appareat. Notanda hæc vox ξηρῶσται πολλῶν; nam & in 4° Aphorismorum, periculosissimam quandam anginam video, διὰ τὴν ξηρῶσται πολλῶν, vnde strangulatio, accedente quoque febre quæ eam siccitatem adaugeat. Præterea in 1. de Diæta

282 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 acutor. τὸ ἴδιον μὰ ξηρὸν ἐν ὕδατι reperio. Quonam verò in sensu omnes hæ sententiæ, in quibus τὸ ξηρὸν reperitur, accipientur? Item & hæc in qua Hippocrat. periculi iam aduenientis signum dat, in iam perniciosi morbis, ait, parui tremores, & vomitus arginosus, qui in potibus substrepunt, & ἀποβορβορῶσι ἐν ξηροῖσι, ἢ χαλκῶσι κατὰ βωκίλῃσι; id est, in ficcis submurmurant, & deglutiunt difficulter. Duretus illud ἀποβορβορῶσι ἐν ξηροῖσι refert ad murmur hypochondriorum, vt murmur illud sit ob inflammationem diaphragmatis in sympathiâ cerebri tracti: ego verò nō ad murmur ob inflāmationē diaphragmatis refero; quanquā scio borborygnum inde nasci posse, sed cū & strepitus in bibendo, & difficilis deglutitione meminerit: ego illud murmur ἐν ξηροῖσι, in sicco, refero ad id quòd apparet sæpe in delirantibus, in quibus laryngis musculi siccati sunt, vt non ampliùs motū facillē præstēt nec obediunt. Nam cū bibunt illi, & delirant, pars aquæ quæ descendit quodammodo in præceps cum sonitu, in vacuo & inani descēdere videtur: obauditurque murmur & borborygmus circum præcordia, siccatis musculis, & liquore rectā descendente, nil administrantibus illis musculis. Sic illa vox, ἐρησις, ad difficilē illam deglutitionem potest referri, cū tantā siccitas fit, vt musculi inertes sint, & propterea auditur sonus & murmur, ac si in cauum aliquid aquæ coniiceretur.

Nunc singillatim explicemus vocis ξηρὸν significationes, vt tandem de angina, aut potius de dispositione anginosa oratio nostra terminetur. Ia enim Medicis debet constare, quibus incumbit ex officio morbi ideam causamque animaduertere, qua ex causa difficultas deglutitionis pendeat. Nec enim auditio anginæ aut difficultatis deglutiendi nomine statim ad secandas venas anulares, ac gibberii accedendum: cū aliàs à materia hac aut illa, aliàs à nescio qua intemperie illa difficultas deglutiendi oriatur. Vnde auctor lib. 4. de diætâ acut. duas anginæ species facit à materia diuersitate desumptas: vt cognitis ideis morborum in remediorum delectu aliquantò exactiores simus, ne malè, tenueréque vnum pro altero vsu veniat.

Ὁξυδαλίαι ξηραὶ καὶ ὀφθαλμικαὶ φθισίδες, cū ab Hippocrate dicuntur, aut cū ὕδατι ita eas dici accipiendum est, vt in ficcis lippitudinibus nil humoris manet; in humidis, non crassus humor, sed tenuis, quamquā quibusdam placet, eas ἐρησις dici posse, in quibus aliquid acre, mordax, pungens, & lancinans, non quantita-

In Con-
 cū.

Idea mor-
 borum
 noscenda

Ophtalmi-
 cæ siccæ
 quæd.

te, sed qualitate peccans, excernitur. Et hoc fortassis probabilitate non caret. Humidas ophthalmias Hippocrates describit in Epidem. *In constitutione calida humida, austrinaque, multis fiebant* (ait) *ophthalmia humida, longa, diuturna, laboriosa: palpebrarum foris & intus ἐπιούσας, id est progerminationes, quas ficos, Grecis σίκα vocabant.* Humiditatis copia & ophthalmiam attulit, & tubercula in palpebris: sed quâ id ratione factum est, cum à duplici humore hoc duplex vitium natum videatur? Etenim humiditas ophthalmiæ ab humore est tenui, Galenus dicit, ἀπὸ τοῦ περματός ὕδατος δὲ: at σίκα, siue ἐπιούσας, siue ἰχθυώδης ἐπιούσας (omnibus enim his nominibus vnum & idem significatur) à crassiore, lentioreque humore esse videtur. hoc ipsum & Galenus fatetur: ait enim in Commentario, humoris redundantis superfluitatem duplicem speciem in tenuitatis & crassitiei differentia habere, tametsi idē esse humor videatur, & in eodem loco consistat. Quod hac ratione in corpore succrescere confirmat, Cum, ait, corpus exercitationibus solitis concitetur, moueatur, dissetur, ac lustretur, copiam & crassorum & tenuium humorum simul coaceruat: crassorum ob desidiam & socordiam: tenuium & aquosorum ob vacationis prohibitionem. Ac si in quolibet humore sit quippiam quod limi & fæcis rationem habeat, quippiam verò quod seri, liquidiorisve partis. Quis autem discernas varios effectus vtriusque humoris: tenuiorem partem excerni testabantur deiectiones liquidæ, vrinæ, quæ: crassiorem partem, vel grauitas capitis, vel coma, vel quia moram trahit cunctaturque in corpore. Et clarioris doctrinæ causâ affectus quosdam nasci dicemus ab humore crassiore per cōgestionis modum: alios à tenuioris humoris copia per suppressionem, id est, qui suppressus est in constitutione aquilonia: deinde viâ apertâ in partes influxit. Id quod tenue & aquosum, ophthalmias humidas fecit: id quod crassum ac defes, ἐπιούσας quasdam in palpebris foris & intus. Quod enim crassum est, quia pigro gressu insistit, partibus inhærens alium morbum producit quàm id quod tenue est, & ὕδατος δὲ. ἐπιούσας progerminatio dicitur, σίκα ficus; ἐπιούσας seu ἐπιούσας, quod nomen apud Medicos potest sumi pro eruptione. Apud Aristophanem, bullam, papulam & phlytænam significat: & quod dicitur ἐπιούσας, illud ἐπιούσας significat in palpebrarum extremo protuberantiam, eruptionemque apparere. hoc enim verbum ἐπιούσας significat: Galenus in Commentario interpretatur nomen ἐπιούσας, τῆς ἐπιούσας ὀφθαλμίας

284 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 Interpres, Tuberculum collium modo, vertit: & malè; hoc enim grammaticoteron. Etsi enim ἰχθυῖν, præruptum ripæ locum significet & eminentiorem paulò, & ὄ ἰχθῆος colliculum prominentem; tamen debuit scire ὄχθῆος apud Medicos pro verrucis, siue verrucosis extuberantiis sumi. ita enim Marcellin. lib. 2 Dioscoridis. Ergo τὴν ἰχθῆος ὄχθῆος ἐπινοήσαντι verti oportet, eruptionem, extuberationemque verrucosam; quanquam Interpretis lectio plausible est, quia Grammaticum agit.

Vt ad institutum redeamus, humida ophthalmia dicitur in qua aliquid aqueum & tenue manat: ἕνεκα autem est cum aquilonia tempestas calidam humidamque excepit; hæc enim frigida constitutio vt manus spongiam, sic cerebrum comprimit; hinc humor in has illasve partes exprimitur, vt in oculos: quia autem extremo frigore cutis densatur, hinc ophthalmia sicca nascitur: idque maximè in ficcis ac biliosis. Quod notandum est ex Hippocrate. Neque enim in omnibus sicca ophthalmia præsentē constitutione aquilonia fit. Et alio loco in lib. de aère, locis

Corr. in
 Apt. 12.
 lib. 3.

& aquis probabilem affert rationem cur in siccitatibus, & squaloribus ophthalmiæ siccæ nascantur. Bilis, inquit, (loquitur autem de hominibus biliosis) pars humidissima, atque aquosissima exiccatur atque absimitur, crassissima vero ex acerrima linquitur, supp. &

Lib. de
 ficis, 2.
 76.

siccas ophthalmias & febres acutas faciens. Itaque ex eo Hippocratis & Galeni loco colligi potest, verisimilem eorum opinionem qui siccam ophthalmiam interpretantur, in qua aliquid nitrosum, paucum, siccum, acréque apparet mordicans oculos, non autem in qua supprimitur omninò humor, vt priùs dictum est de aquilonia constitutione humores supprimente. Hinc effici potest ἕνεκα ὄφθαλμίας bifariam intelligi posse, & eam in qua multus quidem humor ob calidam humidamque constitutionem, est, sed supprimitur ob ambiens frigidum, eaque ophthalmia cruda dici potest, eo modo quo in libris de Diæta, morbus siccus dicitur, id est crudus, in quo excrementum nondum apparet: & eam in qua non tam quantitate quàm qualitate humor in vitio est; vt cum acer, mordax, in bilioso humore succrescit, tempore squalido, arente, aquilonio, si vis; & species quædam erit ophthalmiæ, eaque τὴν ἰχθῆος ὄφθαλμίαν opponetur. Et hæc posterior de genere earum ophthalmiarum est, quæ à Galeno &

2 lib. 15
 lib. 36

Hippocrate vocantur ὄφθαλμίας ὄφθαλμίας, de quibus antequam dicamus, afferemus opinionem Aëtij & Celsi πρὸς ἕνεκα ὄφθαλμίας, nec

mine composito. Aridam lippitudinem definiunt, in qua subaridi oculi nec tument, nec fluunt, sed cum leui prurigine ingravefcunt: & palpebræ citra duritiem prægravi pituitâ inhærescunt. Huic similem faciunt *ἄροσθαλίαι*, aspritudinem oculorum ac scabram lippitudinem interpretantur, rubor est oculi, pruritus à nitroso salis que humore. Ac credo in his apparent quibus corpus biliosum est, aut putri salis que pituitâ plenum. Ergo ophthalmiæ tabificæ quædam sunt, *ἐπιόσεις* vocant vt sine distinctione sit legendum in aphorismo 16. lib. 3. Aphorismo *ἄροσθαλίαι*, non autem cum distinctione, lippitudines in squaloribus, & item tabes, vt contendit Galenus in Commēt. siquidem negat in siccitatibus, quatenus tales sunt tabem contingere: at nec articulorum dolores, nec dysenteriæ ipsæ, nec stranguriæ in squaloribus contingunt. Quis dicat sine humore aut arthritim, aut dysenteriam, aut stranguriam nasci? Ideoque perplexus est admodum Galenus in exquirendis huius aphorismi demonstrationibus. At mihi parum consultus videtur Galenus, quasi verò non nouerit in squaloribus ferinas destillationes & dysenterias ab acris, squalidisque (vt sic dicam) humore, qui sensim atque sensim sese exerit. Nec enim adeò rudis Hippocrates, vt *ἀρχαίον* intellexerit sine aliquo humore, & in medio omnis recessus: quasi verò squalor temporisque arida & squalens tempestas non vim aliquam humoribus imprimat, & non in tali constitutione squalida ichorum dominatus non sit satis malignorum. Itaque accuratior fuit hic Galenus, & frustra. Porro *ἐπιόσεις ἄροσθαλίαι* videtur & Galenus referre. Quamquã ophthalmiarum tabificarum hoc sit proprium, vt ad tabem, consumptionemque oculum pertrahant, & tamen in squaloribus grassantur: an vi squaloris, an ratione humoris sicci, nitrosi, mali. Si humor est, quare non & tabes ab humore. Si vi squaloris, si oculus tabescit ac consumitur, cur non & reliquum corpus; vt nomen *ἐπιόσεις* non pro tabe, quæ proprie vlcus, aut aliud pulmonis vitium sequitur, sumatur, sed pro qualibet consumptione, vt posse sumi Galenus suspicatur in Aphorismo.

Item *ἐπιόσεις* reperitur apud Hippocratem part. 22. comment. 1. in lib. de Diata. acut. cum diatæ instituenda ratione hocet. Nam quamdiu morbus siccus manet, tandiu à pleniore cibo abstinendum, nec naturæ negotium faceffamus: nec tantam ad morbos thoracis nomen *ἐπιόσεις* referri vult, sed ad om-

Apho. 16.
lib. 3.Com. in
apho. 10.
lib. 3.Part. 22.
com. 1. inlib. de
Diata.
acut.

*Sicca ta-
bes ab
Hippocr
describi-
tur lib de
ossio na-
tura,*

nes partes laborantes, in quarum affectibus nihil excernitur eorum quæ redundant. In sicca ophthalmia, ait, cum nil resudat: in cerebri affectibus, cum nec per nares, nec per palatū rei cuiusque excretio fit: in affectibus partium in ventre inferiore contentarum, cum alius resiccata admodum est. Et idem in cæteris. Cum autem excernitur aliquid, vocat morbum *υγραινοσ* humefieri.

*Apb. 12.
lib. 1. c. 8
lib. de cri-
fib. pass.*

≡ Sed quæstio hinc magna oriri possit, an sit idem morbus siccus: & crudus: an idem, morbum humescere & coctum esse, vt omnia per synecdochen capiantur. ³ Videtur idem esse morbū crudum & siccū, item coctum maturumve, & humidū dicere. Nam, exempli gratiā, in pleuritide oris mador, sp uti expecto. ratique facilitas tanquam *πρωτοσυσυ* iam initium morbi præteruisse, & breuī finitum iri demonstrat in Aphorismis. Si ergo siccus, id est crudus est cum nil excernitur a parte, sed materia coercita conclusaque in parte est: ergo in cuius ophthalmiæ initio fluor & lacrymæ multæ sunt, vt in humida ophthalmia, ex 3 Epidem. Hippocrat. antè monstrauimus, ea diceretur humida, proindeque cocta: consequens autem falsum est. Item cum cerebrum plethoricis auctum est symptomatis, & per oculos, nares & palatum multæ pituitæ liquidæ crudæque excretio fit, ista excretio significaret morbum humidum, id est coctum: hoc autē falsum est. ⁴ Itaque tametsi cum madet os in thoracis affectibus, breuitatis morbi indicium est, non tamen idem est siccum ac crudum: nec coctum, & humidum. Liquidior enim ptissana ad humectandum propinatur, non autem ad coquendum dari dicitur. Quocirca vt in omnibus admirabilis est Hippocrates, ita huius quæstionis nodum quodammodo dissoluit; scribit enim, *Si autem os madescat, & qualia oportet a pulmone excernantur, subtractionis quantitatem augetis.* Nam quæ citius madent, Græcè *πρωτοσυσυ*, celerioris criseos notam præferunt: si coctum & humidum, idem significarent, & *επιεργει δὲ σπυριον*, crudum seu *ἀπυριον* dixisset simpliciter; si os madescat; nec adiecisset, & qualia oportet educantur. Nam hæc particula, *υγραινοσ*, non iam amplius contrarium siccitatis declarat, sed iam ad coctionem nos inuuant: id est, coctionis tacitam mentionem iniiciunt. Et illud est quod acutè Galenus in comm. in partic. illam, annotauerit, verba illa; *si qualia oportet excernantur*, coctionis argumenta, signaque *πρωτοσυσυ* Græcis, exhibent. ⁶ Et si humidum esse ac coctū

esse idem significarent, catharrosæ dispositiones qualescumque forent, de coctorum morborum numero essent. Nec dubium quin in quibus morbis excretio esse debet materia, si illa materia supprimitur, & siccus morbus dicitur & crudus: & cum excerni incipit cocta, tum morbus *χολέρα* dicitur: & in quibus ante tempus excretio fit, nimirum materiae crudæ, tametsi tunc *χολέρα* dici non possit, quia effluxio fit, tamen crudus vocabitur. Sed hæc subtiliora.

Præterea *χολέρα* & *χολέρα* apud Hippocratem reperio in 4. de Diætâ acutor. Humida cholera dicitur in qua magnâ cōtentione & virium iacturâ sursum deorsum excretio fit putrium, incoctorumque. Galenus in comment. vult oriri ab acribus humoribus generatis à corruptione assumptorum: Arida fit à spiritu flatulento acri. Videtur ex sententiâ Galeni his nasci sicca cholera qui cibos coctu difficiles sumpserunt, transire nequeunt, quibus adiecti sunt cibi acriores ac calidiores: & tunc flatulenta copia impedit quominus quicquam excernatur. Vnde quomodo magna, an non illa cholera in qua calida assumpta sunt cum difficillibus coctu, potius humida dicenda sit quàm sicca? Hippocrates ait quidem lazerpitij radicem choleram siccam efficere, sed postea iungit, si cum multo casco & carne bubula sumatur. Sic in Epidem. quidam vorax esu carnium porcinarum, haustu vini generosissimi & placentarum, in Choleram incidit, supp. siccam, vt ex priorè Hippocratis demonstratione colligi est: Quid ergo erit humida? Quantum ex collatione locorum colligo, in humida cholera plus est materiae corruptæ, facultatem expellentem irritantis ad excretionis omne genus, vt in hoc dicitur humida, quia excretio fiat, quâ nominis significatione sumi *χολέρα* diximus antè. In sicca plus est crudæ crassa, impactæ, & status eâ materia subigente, agitaturque, vnde membranarum diuulsio disruptioque aliquando, & grauissimi dolores. In eoque sicca dicitur, quod nil ferè excernatur, sed conuolutio fit quedam intestinorum, & inflatio ventris. Quâ in significatione *χολέρα* sumi dictum est paulò antè. Atque astringentem esse flatuumque magnam iliadem collige ex Hippocrate eodem loci: *Ab arida cholera venter inflatur, strepitus sum, dolor laterum & lumborum, nihilque aliud deicit, sed astringitur.* Ergo *χολέρα* ipsius in cholera sicca vis in eo est, quod cohibitio retē-

Com. in
part 103
lib. 4. de
diætâ acuti

9. Epid
p. 566

tióque est materiei. Quanquam Galenus Comment. in partic. illam non vult probare istam suppressionem flatuum ad constituendam hyparxin, naturamque ἡ χολέας ἐνεῖς, quod tamen à ratione alienum est. Verba eius sunt: *Cum flatus interdum exire possint, interdum retineri, aridam choleram ob retentos flatus generari asserere nequeo; nam probabilius est eos vocare (suppl. cholera sicca laborantes) in quibus potius flatus erumpunt, quam retinentur.* At contra: etenim nonnullos summis cum cruciatibus cholera sicca laborantes mori videmus, in quibus nil ferè excernitur, nec materię, nec flatus. Membranarum enim offensę, & diuisiones ex eo maximè sequuntur, quòd spirituum magna sit vis materiam veluti subigens, diripiensque, & dum penitus subitur, solutione vnionis partium præsertim neruosarum implacabiles dolores excitantur. Atque idem in ventriculo contingit & partibus vicinis, præsertim membranosis, quod in surarum affectu, qui Græcis peculiari nomine σπασμὸς dicitur: Gallicè *gouttes crampes*; inclusus est enim spiritus diuellens, & exitum sibi quærens. De Cholera sicca dictum sit hæcenus.

Com. ad
part. 27.
li 3 Pror
rhetid
meminis
αἰς συ-
ολλῆς
σπασμῶ-
δης.

Accedamus nos ad id cuius gratiã instituta est disputatio. Institutum erat dicere de Angina, & anginoso quodam affectu (ita enim loquar) id est, de difficili deglutione. Quæ difficultas in faucibus & gutture synanches aut σπασμὸς τοῦ πρυμναίου ἢ παρῆνι constituit. Animaduertimus enim in quibusdam, vt initio dictum est, ariditatem summam linguę (talem autem linguam Hippocrates 7 Epidemiorum vocat ἡ ὑπὸ πνεύματι ἐπιμαρτυροῦσα, quòd iis qui inflammatione pulmonis laborant familiaris esse soleat) dolorem occultum & latentem colli musculorumque omnium qui ad humeros vsque protenduntur, faucium est squalor, siccitas, nil tamen apparet quod arguat id de quo tanquam de difficili deglutionis causa quæri possit. Quærendū itaque quis sit affectus, quo nomine donandus, cuius speciei, quæ idea, qui mos & ingenium. Potest generaliter affectus σπασμῶδης dici, vt Galenus Comment. in partic. 30. lib. 4. de diætâ acut. sumi posse ostendit. Duplex autem omnis est σπασμῶδης, vt autor lib. 4. de Diætâ acutorum vult, aut est à materia crassa, viscosaque quæ in maioribus vasis continetur, aut à tenui, acri, biliosa, quæ suã tenuitate maiores amplioresque venas peruadit, sed in tenuiores sese insinuat. in synanche à crassa materia tumor est breuì strangulans: alter σπασμῶδης, qui à tenui fit, non ita sese tumore effert,

sed intemperie potius quadam, & erysipelatodes dicitur: Galenus dicit vocari posse *πυρόχρον*, aut *χρόμα*. Hanc autem ita describit; *Cum à capite tenuis fluxio est, & nitrosa, quasi ab anni tempore talis sit, mordet, ulcerat, orthopnœam parit, & siccitatem multam: Quae intuentibus nobis apparent* *ισχυρὰ & αἰνέ*, *minimè tumentia apparent.* Ita enim non pro gracili *ισχυρὸν* fumitur, sed pro humili, non tumente.

⁸ Quo loco mihi videtur anginam nostram, de qua laboramus, describere; nam & siccitas multa erat, quam Hippocrates *πολλὴν ἐξερσίω* vocat verbo antiquissimo: & difficilis deglutitio, nihil autem in faucibus aut gutture apparebat: nec alius color ferè à proprio erat, nisi quòd siccitas esset. Magnum enim est obseruare an dissimilis sui sit color. Propterea veteres vocem *ισχυρὰ* interpretabantur per *ἀχρῆα*, id est, decolorata, non habentia colorem qui adesse deberet si inflammatio esset. Sed tamen hanc interpretationem ridet Galenus in Commentario. Galenus autem rationem reddit cur non tumeant partes laryngis & faucium: non quin biliosus humor multus collectus, non possit tamen efficere, ac praesertim humor qui à capite descendit: omnis enim pituitosæ naturæ propinquus est, vt propterea pituitæ naturalis fontem cerebrum asseueraret autor lib. 4. de morbis, & lib. de glandulis: sed, vt ait Galenus, sit vt fluxionis partem recipiât faucibus vicini masculi: item qui à tergo siti sunt, vbi & stomachus qui sæpe simul afficitur. Sic rationem reddit & cur siccitas, cur tumor non adfit, diffusa, liquatâque materia: item cur à tergo & circum collum dolores adsint: atque talem affectum, & symptomata qualia hic describuntur, mihi visus sum videre in istis ægris quorum superius paulò memini, nisi quod talis synanche per eundem Hippocratem vel æstate, vel autumno fiat. At hæ affectiones synanchicæ, quarum meminimus, in hyemem inciderunt, eamque acerbissimam. At quid obstat quin dicamus id quod antè obseruatum est, per hyemem coaceruari crassos humores, & eorundem ichores siue serositates, quæ cum diu suppressæ fuerint, acrimoniam & *πυρρότητα* acquirant, desequientēque hyeme tenue illud subitacite, & morbos sui generis committit. Atque eo modo fiet angina *ἐξερσῆς*; ita enim loquar doctrinæ causâ, quo & ophthalmia *ἐξερσῆς*: non quin sit humor aliquis, sed potius qualitate quàm quantitate peccat: & facit squalorem, nescio quam intemperiem aridam: quod explicauit Hippocrates, cum ait, istum humorem nitrosam efficere vt

Part.
lib. 4. de
Diata.

ἔνεστιν πολλὴ ὀδύνηται; hinc fit vt subdiderit, & tendines cer-
 uicis posteriores intenduntur, apparentque intenti ac si tetanus esset: hinc
 vocis amissio: quod indicat scribens, ἢ ἡ φωνὴ ἀπέπρωγα τῶτέτι
 Σπύλλου, ait Galenus, per laryngis passionem. Vocis autem ge-
 neratio in ea maximè parte fit, quæ Larynx vocatur, Galeno
 teste. Huc maximè pertinet locus de Angina lethaliſſima, quam
 describit Hippocrates in Aphorism. Si à febre habito collum per-
 uertitur, & vix potest deuorare, sine vlllo tumore, lethale. Paulò antè
 alium scripserat aphorismum de angina quoque. Si à febre ha-
 bito, tumore non existente in faucibus, strangulatio repentè su-
 peruenerit, lethale. Aliud esse scribit Galenus, vix potest de-
 uorare, & cum strangulatur. Cum autem dixit, tumore non exi-
 stente in faucibus, tacitè indicat affectum esse solum guttur, quod
 λάρυξ dicitur: cum repentina strangulatio necessariò laryngis
 affectionem significat, vnde libet hoc contingat, siue ab inflam-
 matione, siue aliter, vt paulò post dicemus, cum inquiretur an
 sola intemperies sicca hoc efficiat. Miram quomodo in apho-
 rismo illo prædicto, in quo scriptum, οἰδὴματος μὴ ἑόντος ἐν τῷ
 φάρυγγι, cum nomen φάρυγγος per fauces interpretentur. Nam
 illud animaduertentur autores Græci, nomen ο φάρυγγος in ma-
 sculeo genere, guttur significare, & cum nomine λάρυγγος con-
 fundi: in fœminino, φάρυγγος fauces: & Hippocrates in masculino
 genere accepit. Sciendum non necessariò semper laryngem si-
 gnificare cum masculini generis est: promiscuè enim ο φάρυγγος &
 fauces & guttur designat: sed ἡ φάρυγγος fauces semper denotat.
 Propterea que Galenus in commentario vtriusque aphorismi à
 nobis citati, cum verba Hippocratis adducit, non amplius vsur-
 pat articulum masculinum ο, τῷ, τῷ; sed ἡ, τῆς, τῆ: quod diligen-
 ter notandum est, vt omnis amphibologia declinetur: Quod
 Galeni ingenium vix deprehendent linguæ græcæ ignari. Pro-
 pterea parum legendo proficiet, qui versionibus tantum latinis
 impolitis & rudibus, nec vlla ex parte attingentibus Asiaticam
 sermonis venustatem, operam accommodabit.

Ergo cum non apparet tumor in faucibus, & repentè suffo-
 catio incidit, præsertim dominante febre, mortis metus est ma-
 ximus. Quærit Galenus duo: cur dum in illo aphorismo angine
 funestissimæ meminit, non mentionem facit de dolore, vt fecit
 in prorrhethico, dicens, fauces dolentis: item an angina absque do-
 lore esse possit. De priorè ita statuit: Tametsi non meminit do-

Com. in
 apho. 32.
 lib. 4 de
 die. acut.
 Aph. 35.
 lib. 4.
 Aph. 37.
 lib. 4.

De in
 angina
 dolor.

loris, potest tamen intelligi. De posteriore ita, Si angina sit cum inflammatione, non potest non adesse dolor. Potest autem strangulatio fieri sine dolore tribus modis, vel oborto tumore frigido quod *ὀδύνη* dicitur: ¹⁰ Vel resolutione musculorum laryngem aperientium, vnde angustior redditur meatus: vel ab vtroque simul: tertio summa siccitas & squalor musculorum internorum laryngis hoc efficere potest: ita enim supra modum extenti, meatus angustiam afferent. Sed quæstio orietur difficillima: Si indolens angina & strangulatio repenti contingere potest, vt hîc docet Galenus, an à siccitate immodica id fieri potest? Videtur non posse fieri, nam intemperiem siccam anginae autorem, si ita fors ferat, necesse est longo admodum tempore acquiri, vt ex locis infinitis Galeni colligi potest: quomodo ergo ab ista immodica siccitate repentina strangulatio contingere potest? Ista videntur asystata. Nisi quis dicat siccitatem quidem tempore acquiri, sed illam non sufficere ad necandum nisi febris concurreret maxima: quæ febris (nullâ adhuc præsentem aliâ siccitate) breui tempore omnium instrumentorum tensionem atque ariditatem afferre potest, præsertim si sit è genere febrium *καυσόδων*. Ac propterea cum in alio aphorismo scribit: *Si cui à febre occupato collum inuertitur, & vix potest deorare, sine vlllo tumore, lethale*. Galenus in Commentario miratur Hippocratem non meminisse loci, cum ait, *tumore non existente*, vt fecit alio in aphorismo: sed subaudiri intelligit, vel, in faucibus, vel, in collo ipso. Ait autem istam strangulationem, aut potius deglutiendi difficultatem ab inflammatione musculorum gulæ præiacentium, aut gulæ ipsius oriri posse: & ab ista inflammatione contorqueri potest vertebra. Vel enim à tuberculis inuertitur, vel ab inflammatione ob tensionem partium inflammatarum, & ad sese retrahentium. Est enim affectus ceruicis in quo vertebræ ad anteriora luxantur, vel solum musculis qui cum ipsis communicant affectis tumore, vel nato tuberculo, vt placet Galeno: vel extentis ob inflammationem partium neruis ac ligamentis, vt notat Galenus Commentar. in Aphorism. 35. lib. 4 Aphorism. Atque vt explicet rationem illius anginæ de qua sermo est, affert locum ex Hippocrate, quo in loco vult eandem anginam describi quæ & hoc in loco. Textus autem est: *Anginam patientium tales erant affectus: Colli vertebra intrò vergebant, extrâque apparebat collum habere caui-*

Cap. 9.
lib. 4. de
loc. aff.

Lib. 2. E.
pidem.
Vide cap.
3. lib. 4.
de loc. aff.

tatem, & hoc tactum dolbat. Notandum autem illo loco mentionem fieri de angina in pestilenti constitutione. Quærit rursus cur Hippocrates dum loquitur de angina à contorsione colli in febre ingente, non meminit doloris vt & in Epidemiis: si enim inflammatio est, necesse adeste dolorem: an non inflammatio est præsentè tantâ febre, & factâ contorsione colli? vnde ista contorsio? Concludit istam anginam ab excedente fieri siccitate, à qua tensio, hinc tractus, à tractu euersio vertebrarum. Cùm enim adest ista siccitas, à qua tensio, tractus, euersio, angustia meatus, difficilis deglutitio, malum hoc: peius verò si febris adsit. Nam & febris auget vsum respirationis, cui non potest satisfieri ob meatuum angustiam; item auget siccitatem; sic malum malo cumulatur.

Quæstio: Si est excedens siccitas quæ anginam quodammodo pestilentem facit: vnde illa siccitas? an repentiè incidit, an non? an humor est? Dicam quod sentio, & accommodabo ad ægrum nostrum, cuius ergò instituta est hæc disputatio.

¹ In summis squaloribus, præsertim dum æstus adsunt, vel etiam in sicca & aquilonia constitutione in qua supprimuntur humores, sed tenuè tantùm serum exprimitur vi ambientis, vt exemplo spongiolæ fieri contingere scribit Galenus in Comm in 3. Aphorismorum, sæpe circum fauces, collum, oculos, siccitates oriuntur, quarum ratio nulla reddi potest. Et difficultas deglutiendi est, nullo apparente tumore vel in vuula, vel in pharynge, vel in larynge. Et squalet arètque ægrotis guttur, lingua scabra, exigua febris & latens, quasi ab ambiente calido euocato foras calore, aut ab ambiente frigido nimium (nam in squaloribus hæc fieri diximus, dictum autem velim cùm vel excessus est caloris, vel frigoris) retruso in centrum calore; vnde quemamodum in oculis *Ἐπιφθάλμια* nascitur, ita *Ἐνεχθίρα*, si verbum confingere liceret, aut *Ἐνὸς σφύγγου* oriatur. ² Quod admodum notare oportet, & Medici decipiuntur admodum. Vidimus ita affectos per 20 aut 30 dies laborare cum squalore magno, infirmitate summâ, ariditate, nulla siti, difficultate deglutiendi, oculorum quadam cauitate, fuliginoso spiritu arente atque æstuante, ac si in hæcticam laberentur. Et ex nostratibus Medicis nulli hoc obseruauerunt, præter vnum dominum Magnum, omnium, quos ætas nostra fert, acutissimum

& solertissimum, qui vocat istum morbum Anginam *συντη-
κτικὴ* colliquatiuam anginam, & catarrhosam colliquatio-
nem. nam partes omnes ad guttur, collum, & fauces attinen-
tes liquefieri quodammodo videntur: Et in exiguis venis
ichor tenuis contineri videtur, qui superficialium dolorem
excitat.

Omniū morborum quos mihi videre contigit, hic mihi
difficillimus & ad cognoscendum, & ad curandum visus est.
Atque obiter qua ratione ei sit occurrendum, si quando inci-
dat, aperiam.

Cū ergo ea difficultas deglutiendi (sive quis *Anginam* vo-
cet, seu *rheumatismum siccum*, seu *morbū siccum*, seu *anginam siccā*,
seu *pestilentem fluxionem*, sive *ὠχρὸν* quemdam malignum, sive
colliquationē, sive *catarrhosā colliquationē* hoc loco non interest, ta-
met si longè hæc vocabula inter sese differant, aliasq; morbo ū
ideas indicent) cū, inquā, ea difficultas deglutiendi cū sicci-
tate, squalorēque sit coniūcta, nullo etiam nūm nec foris, nec
intus tumore apparente, dolore quodā occulto partium om-
nium ad guttur & collum pertinentium, non est dubium
quin illa intemperies sicca corrigenda sit: Eamque ob cau-
sam plurimūm conferet id quod sequitur.

℞ passular. mundatarum & sicuum an. ℥j. glycyrrh. non rasa ℥ij.
prunatum. 20. rad. altheæ ℥s. fiat decoct. in aquis partibus aquar. rosar.
& plantag. In colat. dissolue oxycratū ℥ij. mellis violar. ℥ij. fiat garga-
rismus. Vim habebit humectandi, & detergendi, & squalorem tollendi.
Deinde circūm partes thoracicas fiet litus sequens.

℞ butyri recentiss. lib. j. cum qua misce olei amygdal. dulcium sine ig-
ne extracti ℥ij. ol. de kenri & violati non veteris an. ℥j. s. misce: fiat
litus. Circūm collum, guttur, nacam, de foris magna copia assundetur, &
illineatur id quod sequitur.

℞ chamæmeli, melil. scabiosa, an. m. j. fiat decoct. ad sufficientem
quantitatem, in qua extrahet mucaginis sem. psyllij & a'ib. an. ℥ij. cum
butyro recenti ℥ij. & ol. violati loti in præd. decocto. fiat litus ad omnes
partes dictas.

Item præclare fiet si bolum castiæ assumat sine rhabarb. cum syrupo
viol.

Item si ore verset bolum castiæ, deinde reiiciat, quia vim magnam ha-
bet humectandi & squalorem tollendi.

1. *Istas affectiones Hippocrates 4. acutor. explicat eleganter, cum fluxio calida ac nitrosa sit è accipite, mordet, ac ulcerat, & spiritus implet, & erecta cervicis spiratio accedit, & siccitas multa: & quæ videntur gracilia apparent, tendines posteriores in collo apparent distenti, vox abrupta, &c.*

2. *Lib. de loco, aëre & aquis, humidus ophthalmias agnoscit in iis qui à ventis calidis perflantur, præsertim si inter brumalem solis ortum & occasum venti perflent: duras & vehementes in iis qui inhabitant regionem ventis frigidis obiectam, & duras opponit humidus certa de causa. Et alio loco videtur explicare cur fiant ophthalmia sicca & febres acutæ, & diurnæ, cum ætas sicca fuit, & autumnus siccus est & borealis. quia (inquit) quod in bile est humidissimum & liquidissimum absumitur, densissimum & acerrimum relinquitur. Quod notandum. Vide Comment. in Aphorism. 14. lib. 3.*

3. *Apud Hippocratem lib. de locis. In homine, locus est in qua de pleuritis sicca loquitur: sed nomen siccum longè aliter quàm hic sumitur. Etenim pleuritis siccam vocat, in qua successu temporis pulmo resiccatus adheret costis: unde dolores lateris.*

4. *Vnde lib. de veteri medicina, erysipelas, peripneumonia, defluxiones salsae, acres, humide, incocta dicuntur: quæ cum crassiores redduntur, coqui dicuntur.*

5. *Libro 1. Aphorismorum, aphor. 12. & aphor. 50. lib. 2. ὀφθαλμοὺς ἄνω docet sputa in morbis thoracis initio apparere debere, in peripneumonia, biliosa remissa tantillo sanguinis, an hoc vult initio morbum debere esse coctum. Magna hæc controuersia, quam hoc in loco dirimimus: & in margine Commentarij in aphorism. 12 lib. 1. Aphor.*

6. *Quibus antequàm facti essent pleuritici, pulmo erat male affectus, aut catarrhus aliquis statim initio pleuritidos multum mucorem excernunt, & tamen eorum pleuritis non dicitur esse humida, sed sicca, nisi de materia coniuncta excernatur. quod notandum.*

7. *Nota choleram siccam usu balnei iunari, ut patet ex lib. 7. Epid. de Pausania filia, qua ex fungi crudi esu incidit in choleram siccam, hydromeli valde ei contulit.*

8. *Vide Galenum comment. in aphor. 34 lib. 4. & in sententiam 56. lib. 2. Prothretic. ubi vocem τῆ ἰχθῆς interpretatur per id quod in Prognosticis ab Hippocrate dictam est: τὸ μὲν ἐκ δὴλον ἐστὶ τῆ φάρυγγος ποταῖν, quod nil manifestum in faucibus facit.*

9. Apud Hippocratem sect. 7. lib. 6 Epidemior. cum de quadam constitutione loquitur, ait; Pharynges inflammabantur: deinde paulò post Anginæ fiebant. Sic aliud est Pharyngas, aliud Anginas.

10. Et partic. 28. sect. 1. lib. 1. Epid. notat Hippocrates à ferina destillatione pharyngem esse vitiatum & tabefactum, à qua tabefactione sequitur retractio quædam gutturis. Vide librum Definitionum nostratum in voce χετειλῶσαι.

11. Ἀρχμὸς non tantùm debet intelligi de calidissima tempestate. Nam cum nulli flatus planè excitantur, siue torreat omnia æstas, siue rigeat planè hyems, tunc ἀρχμὸς Græcis dicitur. Et cum hyems anni 1572. rigentissima fuerit, non mirum si morbi alij fuerint quàm qui in hyemem moderatâ incidunt: Nulla, aut pauca fuerunt apoplexiæ, carètia somni fuit: dolores superficiary & anginosi cum pauca febre, & hoc à squalore fuit: Quem squalorem hyemalem Virgilius videtur describere, cum in Georgicis ait, -penetrabile frigus adurit. Adustio illa Virgiliana magnam habet ἐνέργειαν.

12. Apud Hippocratem sect. 7. lib. 6 Epid. manifestè apparet hoc nomen Angina ἕνεα, quia nihil aut parum cocti educebatur. Itè ἕνεα ἀπὸ πύρινα ἕνεα: quod mirum est.

CONSILIVM LV.

De Cholera morbo.

QVONIAM dum disputarem de morbo sicco, de angina sicca, necessariò incidimus in disputationem de Cholera humida & sicca: non alienum ab instituto erit, si nonnulla quæ animo concepta habemus de Cholera morbo, eloquamur ac exprimamus. Hæc enim intellecta descriptaque plus voluptatis afferent, quàm animo retenta. Aphorismus est Hippocr. in Coacis animaduersionibus, πύρινα μὴ χολέρας ἐπιγνομένους ἢ λύεται: Leipyria, febres non solvuntur nisi superueniente Cholera morbo. Quæ Hippocratis sententia quoniam obscura est, & à communi sensu iudicioque remota, ob latentem quem in se fructum continet, plenius à nobis est enucleanda.

Ac primum vt plenius res intelligatur, de febrium leipyriarum essentia agendum, vt tandem constet an Cholera morbus leipyriæ febris solutionem afferre possit. Nulla est consensus inter Græcos & Arabes de leipyria febre, immò ne inter Græcos ipsos. Κωσθ & febris leipyriæ magna est affinitas, nisdémque penè symptomatis morbus vterque sese profert ac prodit. Sitis est ingens, iectigatio, mentis percussio, vigiliarum assiduitas, partium extimarum refrigeratio, sed præsertim in leipyria, æstus in internis. Galenus Comment. in Aphorismos ait: *Partium extimarum refrigeratio æstuantibus internis solis accidit febribus quæ Causej dicuntur, perniciosas, vel potius malignas, vt leipyriis.* Quo loco leipyriæ febres ad καύσθς referre videtur: & notandum hoc est. Causa autem recessus ad interiora caloris, vel est ingens inflammatio, vel erysipelas. Sic leipyriæ febris hyparxis in eo consistit. Id autem statuunt discriminis inter continuas ardentes & leipyrias, quod καύσθθ sequantur inflammationem internam partis alicuius, leipyriæ congestionem humoris biliosi in aluo, qui aliquid ἐρροσιτελατώδες in ipso ventriculo efficit. Quod fortassis quosdam Græcos adduxit vt existiment Erysipelas solum ventriculi leipyriæ febris autorem esse. Nec enim phlegmone est. Videndumque est an bilis in ventriculo æstuans erysipelatodes aliquid afferat: & an sit tumor. Nam credibile videtur bilem quandam prærubram & viscidam membranis inhærere posse, partim in occultis viis subsistere, quæ dum inflammatur, nec facile à parte defecatur detergereturque, concipitur æstus ingens qui recessum afferat caloris foris intrò. Quod si verum, an τὰ λειπυρική μὴ λύονται μὴ χολέρας ἐπιγινώσκουσιν? An leipyricæ affectiones, vel febres leipyricæ non soluuntur nisi successu cholerae morbi? Locus ille Hippocratis si verus est, & focum, & causam, & curationem leipyriarum explicat. Quidam verbum λύειν in malam partem accipi volunt, vt morbi solutionem ad interitum significet. Quo in sensu sumptum est in Aphorismis, τρέμος ἐπιγινώσκουσι τὸ διαρροσίλιον λύει. Tremor in febribus post ingens delirium succedens, illud delirium soluit, id est, delirij quidem finem affert, sed simul & semel hominem de medio tollit. Et est politicus loquendi modus cum ægrum quempiam non amplius laborare dicimus, & ab omnibus malis liberatum, per mortem, supple. Postquam enim mors

Com. in
apho. 48.
lib. 4.

λύειν
quid si
gnificet.

mors percussit. Itaque dicunt, Leipyriæ febres non solvuntur, nisi Cholera superueniente, id est, cholera soluit febrem leipyriam; ac si dicat, finem quidem leipyriæ affert, sed vnà ad interitum ducit. Quod mihi non placet. Cùm fieri possit vt Cholera morbus leipyriæ succedens, eam tollat; quod mirum esse possit. Leipyria morbus funestus est, Cholera quoque funestus morbus & acutissimus brevissimo tempore hominem è medio tollens. Quì fieri potest vt morbus per se funestus alterum morbum funestum soluat: potius enim malum malo cumulari videretur. Atque ita interpretandum est Hippocratis consilium.

CHOLERA morbus est cùm sursum deorsum magno impetu bilis fertur, vt magna breui tempore spirituum fiat euacuatio, & dolores acerbissimi sint; hinc mors. Leipyria febris, vt antè docuimus, sequitur διάθεσιν ἐρισπιλατάδην ab humoris biliosi congestione. Ille autem humor non eius generis cuius & bilis flaua tenuis, quæ suâ tenuitate orgasmum facit: sed est quædam bilis prærubra, squalida, sicca, viscosa, adhærens parietibus stomachi, quæque propterea non nisi magnâ vi deturbari potest. Cholera morbus cõferre potest ex euentu, dum videlicet in cholera morbo (cuius ἑπαρξίς in excretionem consistit ἀθρόως facta) euacuatur biliosa materia. Bilis enim conclusa exitum habet per choleram morbum, natura quâ data portâ sese expediente humore tantæ febris tamque funestæ causâ. Itaque dixit, τὰ λειπυριεῖ μὴ νοημένης χολέρας ἔλυεται. Duæ istæ negatiuæ particulae, μὴ, & adiectæ sunt ab Hippocrate per quandam αἰξίσησιν ἢ ἐνέργειαν: ac si dicat, Leipyriæ febres non possunt solui, nisi cholera morbo superueniente: id est, necessaria est cholera morbus vt cesset leipyria. Per choleram vel propriè intelligendo morbum istum & ideâ & specie, signis, symptomatisque talè, vel euacuationem cholerae morbo similem: id est, quæ sursum deorsumque fiat; non quòd propriè cholera morbus sit. nam iste morbus peculiare quid habet, cuius ratione per se funestus omnis fere sit: nedum hoc boni afferre natus sit, vt manum veluti auxiliarem nobis præstet tam capitalis hostis ad alium morbum depellendum ac deturbandum. Eaque propter nomen τῆς χολέρας καταχρηστικῶς tantum sumetur. Quo modo & in Coacis vocat πύετος μετ' ἰλειαν: febres cum ileis, non propriè sumpto nomine ilei, sed pro simili symptomate quale in illiacis passionibus contingit, nempe pro vomitione assidua.

Quod notandum. Sic & *χολερά* non propriè sumetur, sed tantum pro ea excretionem quæ in cholera propriè dicta apparet, cum sursum deorsumque impetu excernitur humor. Item cum dicimus, *τὸ λεπυρικόν*, fortè hoc nomen illic non significat febres lipyrias, quas à cholera solui non sit verisimile, sed *τὸ λεπυρικόν* significat affectionem quandam *λεπυρικὴν*, nempe cum post esum calidorum ciborum, acriumque dolores ad ventriculum oriuntur, collectam ibi materiam; vnde sitis, iactationes, *ἰσχυροὶ ἀσθμαί*, syncope, recessus caloris intro, sine febre tamen, taliaque hic apparent qualia apparerent si eos febris lipyria occuparet. Quis enim dubitat in eo casu excretionem instar Cholerae morbi factam, eam leipyricam passionem non soluere? Et hæc probabiliora videntur, quam si *τὸ λεπυρικόν*, & *ἡ χολερά* in propriis significationibus accipiantur.

Tamen aliam probabilem coniecturam afferemus, vt omnes intelligant morbum vnum funestum perse, pessimumque posse alteri morbo auxilium præstare, præsertim si qua sit apparens excretio materiae morbum priorem efficientis. Adduximus aliquando hoc in libro aphorismum, cuius veritas communi hominum iudicio & rationi nunquam placere aut apparere videatur. Textus autem hic est: A furore, *μανία*, Græcè dysenteria, vel hydrops, vel mentis alienatio, græcè *ἔκστασις* bonum. *ἔκστασις* *μανίαν* soluit, & tamen *ἔκστασις* per Galenum est incrementum mania, vel potius *μανία* adaucta. Quomodo ergo alienatio mentis maniam tollet? Id fit quia humor qui maniam efficiebat cum loco aliquo conclusus esset, & in parte cerebri, dum de manico fanaticum facit, dispergitur diffunditurque naturam exitum sibi querente materiae priorem morbum; id est *μανίαν* efficientis: & dum hoc conatur natura conatu motuque critico (quem *ἔκστασις* propriè vocabimus, *καὶ θέρμην*) *ἐκστασις* reddit. Plura & commemoratu dignissima illo loco à nobis conscripta leges. Sic idem in cholera morbo, & lipyria febre contingit.

Atque non ita pridem leipyria febre quis laborabat: leipyria esse, non autem *καύσιν* declarabat lingua; nec enim vt in Causo scabra erat, sed nigra à bile adusta in ventriculo erysipelatis modo æstuante, & resudante ab ipsa aluo accensa. Deplorata omnis erat salus. Ecce subito ac si cholera morbo detineretur, cum prius ficcus morbus esset, id est, nil dum excerneretur eorum quæ in vitio essent, sursum deorsum magna bilis copia

fertur, & febre lipyriâ absoluitur. Cùm enim in lipyriis febribus commendatur Cholera morbus, non de sicca cholera, sed de humida locus est intelligendus. Nam sicca cholera perniciofa est admodum, & potiùs leipyriam febrem accerferet, quàm eandem solueret.

Sed hæc omnia dicta sint de Cholera morbo & febribus leipyriis, quorum intelligentia compendio ad curationem vtriusque morbi, sed præsertim febris leipyriæ est profutura: in hisque vt in omnibus admirabilis est Hippocrates.

CONSILIVM LVI.

De fluore muliebri.

POYS *γυναικίως τῆς χε. γά. ποως* nomine potiùs quàm *κατάσσως* donandus multas mulieres affligit, ex earumque numero albas, & quibus læuis admodum, æqualis & iucunda visu superficies inest. Huius rei rationem reddunt, quòd iis cutis sit astricta, propterea que excrementis non pateat: tum quòd delicatioris molliorisque sint habitudinis, eoque in morbos procliuioris. Tertio accedit quòd sint effœminatiores a quosæque magis, quas libris de Diæta Hippocrates *ἰδ. α. ταιύσας* vocat, unde excrementorum molestant vim non faciliè depellunt: fluxionibus sunt obnoxia, & partes principes cum quodam modo aqueas, laxas, viginofasque habeant, putredini minimè obfistunt, immò faciliè corrumpuntur, & longis morbis aut implicantur, aut aliorum vim impetumque non sustinent. Dicam quod nobis videre contigit fortè, cuius non negligenda obseruatio vt non minimùm adiumenti allatura & ad medendum, & ad præsentendum. Quædam cùm quatuor annos fluorem illum pertulisset cum frequentibus leipothymiis præhenderetur adeo fœtidam proluuiem per pudoris sinum excernebat, vt nullus quantumuis graueolentium rerum odorationi assuetus, esset ferendo. Alteri diutiùs fœtens putrisque illa illuies effluxerat, cùm annos sexaginta nata foret, vsurpato leui quodam remedio inopinatò suppressa est. Nec diu impunè eam suppressionem tulit. Etenim diabetes illius loco multò funestior successit, manifestus, suis sese signis exprimens, tres aut

300 CONSILIORVM MEDICINALIVM
quatuor menses exercuit, & ad mortem comitatus est. Totâ
ferè die vrina planè aquea fluebat, nec natura eam sistere pote-
rat. Cùm sat bene habita esset, emacruit continuo, & siti inex-
plebili cruciabatur: lingua arescebat, & eam pellucidam præ
ficcitate vidi. Fœtidum expirabat & cadauerosum. Quæsiu-
num in renum regione sensum caloris aliquem ob putrem ma-
teriam suppressam percepisset: cùm constitisset à squalida sic-
cæque intemperie diabetem originem capere solere. Retulit
caloris loco ita partem illam perfrigentem percipere se ac si
glacies inibi cogeretur. Quod nobis persuasit fluorem illum
muliebrem à salsa partim acidâque materia manauisse. Nam
quæ in eius marito superiore hyemè materia acida tenasimum
ferè immedicabilem pepererat, eadem partim fluorem illum
& proinde hydropem ad matulam adduxerat. Hæc fuit mor-
borum successio. Hinc patet eos de ægris malè mereri Medi-
cos qui indicatione à morbo sumptâ aliquatenus, de suppri-
mendis effluuiis cogitant: non rati periculosam esse suppressio-
nem eius floris qui multos annos ægrum occupauit. Itaque
fontem catarrhi sensim exhauriri oportuit, dietam institui ex-
iccantem, decocto sarsaparillæ vti, purgantibus medicamen-
tis repurgari ægram: venam secari, malignam qualitatem op-
pugnari, atque ita rerum meliorum expectatione ægra fuisse
alleuata ac recreata.

CONSILIVM LVII.

NONIS Aprilis anno 1573. mulier quadrata, boni habitus,
& integrè sana, ad sudatoria vulgaria, Galli *Estuaes* vocât,
proficiscitur. Tertio post die dolere ei incipit imus venter. Do-
lorem primùm vagum, Præcici deambulatiuum vocant, perci-
pit: deinde ad partes paulo superiores reuoluitur, stomachum
que quodam velut pondere premi queritur. Cùm grauissimè
doleret, Medicum consuluit, qui statim carminatiuo clystere;
vt ferè fit Parisiis cùm primùm quis de dolore torminoso con-
queritur, sed id malè fit, vt paulo post dicemus. Aluus licèt ir-
ritata nihil reddidit: totam noctem insomnem duxit: conster-
nabatur. Manè subiectus alius clyster vchementissimus, nil red-
didit. Et hic tertius dies erat, quamuis nec primo, nec secundo

decubuerat. Prehenderunt eam frequentes syncopæ, sudores ad clauiculas: Mentē constabat: datum cardiacum, reuomuit: frequentes vomitiones erant, frigus extremarum partium. Character faciei planè deletus, quod mirum, tam breuì contigit. Tertiâ pomeridianâ interiit. Ego illam tertio tantum die vidi ad meridiem. Talia mihi videre contigit: Frigus erat partium extremarum, frequens virium lapsus, *ἀσπύξια* perfecta; deinde vermiculans pullus; hypochondria satis æqualia, sed illa, & regio ventriculi contrectata etiam blandè dolebant, & syncopen inducebant. Necessariò erat illi propendendum in dextrum latus, inclinatio etiam capite: si aut supinam figuram retinere cogeretur, aut in sinistram latus deuergere animo deficiebatur, & penè suffocabatur. Vomitiones perpetuæ: nil aliud reddebat. Et quod notandum, ingenti siti & inexplibili afflictabatur. Narrabat se in ventriculi regione velut ardentem carbonem sentire. Iactabatur: irrequieta erat. Itaque non mirum si mors tam repenti aduentarit. Diligenter rogauimus longo ante tempore dolores vtillos percepisset? Menses vnum præcessisse dictum est ex quo de stomachi dolore quereretur. Obstetricum iudicio vtero ferebat. Quadraginta diebus, antè solum menses apparuerant. Nunc querendum quod genus morbi, quâ & arte ei succurrendum fuerat. Potuit esse cholera sicca: Apud Hippocratem 4 acutorum, cholerae siccae historia proponitur; *Ab arida cholera, ait, venter inflatur, strepitus sunt, dolor sectoris & laterum, alius nil deicit.* Adde, & vomituriendi esse desiderium, dolores summos ad stomachum, coercitis flatibus in partibus abdominis, sudores frigidòs, vnde præ dolore virium prostratio, recursus caloris intrò, & multa alia. Illius morbi qui acutorum numero recensetur, tota historia describitur paulò antè. Vel potuit esse suppressio omninò excrementorum malignorum, quæ in partem superiorem, nempe regionem ventriculi, delata sunt vndelibet vt in partem iam iam dolitantem (sicut antè meminimus). Ita enim obseruauimus in constitutione illa temporis maligna (vnde infiniti penè ruri peribant) aliis ab hypogastrio delatam percipi materiam ad costas, vnde pleuritides: aliis ad ventriculum, vnde suffocationis motus: aliis herpetas natos vidimus: aliis ignes sacros vel infernè sursum, vel supernè deorsum lata materia; vnde effera reddita magis materia, traducta est in ventriculum, & primam

regionem strictè sumptam, & illic apostematis speciem excitauit. Tale morbi genus obseruasse videtur Hippocrates in Proretheticis; *Quæis lumborum tenus & diuturni dolores ad hypochondriū reuoluuntur, reducunturque, & ciborum auersio, dolor hic valens intentus ad caput perueniens, citò interimit cum conuulsione.* id est: Fieri potest vt excrementosa materia per se initio ^{conuulsio} ideo minutulos dolores excitans, tandiu in mesenterio resistat quoad aliquid maligni acquirat, vnde effrænis reddita, tandem suis ruptis repagulis orgasmo quodam in partes fertur, si in caput cum conuulsione interimit. Adde, Et si in ventriculum suffocationem adfert, si in aliam partem aliud atque aliud. Nam quod in vno obseruatum est, id in multis potest intelligi. Est & paulò antè eodem in libro similis aphorismus, *Ventris circumtensio liquida ad necessitatem deiiciens, citò intumescens conuulsuum quid habet.* Illud in Equifone in vico de la Mortellerie obseruauimus, qui cùm serò bene cœnasset, quartâ matutinâprehenditur febre acutissimâ, circa duodecimam meridianam totus imus venter inflatur, delirat, tertiâ pomeridianâ pulsus paruus fit & frequens: nigra deiiciuntur. serò pectus dolet. Duodecimâ pulsus formicâs, interiit tunc. Corpus totum intumescit, & nescio quibus suspectis maculis exaratur. Illud idem Hippocrates, sed non tam apertè vt nos explicat. Sic ei mulieri contingere potuit à reducta materia à parte inferiori in superiorem. Vt sæpe idem à materia delata supernè deorsum potest euenire. Quod obseruauimus in filio vitrearij. Primâ die dolor exiguus ad latus dextrum: vomitiones assiduæ, secundo dolores inferiùs ad ventriculum & xiphoidem cartilaginem percipiebantur: tertio habebat ^{op. do. d. d. l. u.} quarto summus ad ventriculum dolor, inflatio: extimorum frigus, leipothymia, sudor, mors. Et hoc contingere posse notauit Galenus in comment. in Epidem. vbi notat initio morborum funestissima symptomata euenire quòd in visceribus malignus humor resideat atque restagnet, adeò vt venenatorum animalium venenū adæquet, vnde inopinata mors aduenit. Quod & huic mulieri contigisse videtur. Sed tanti incendij perceptio quantum ægra narrabat in suspicionem nos adducit eam febrem leipyriam esse, ab apostemate quodam in primis venis, vnde nec in latus decumbere non poterat, & sine tumoris sensu (alioqui ingentem esse oportuisset) vix minimum appulsum digitorū ferre poterat: & eius.

Histor. 4.
sect. 3. lib.
3. Epid.

modi apostema speciem aliquam iliaci morbi afferre potuit. Sæpe enim de repente in primis intestinis & phlogosis, & tumor non ita altus oboriri potest, qui breui ad interitum ægros præcipitet. Præcesserat velut dolor quidam colicus acerbus, quem frustra ignaræ mulierculæ ad vterum referunt. ³

Et Arnaldus Villanouanus annotat colicam quandam mortalem, vt cum remediis (inquit) non alleuatur dolor, sed figitur in parte, & vomitus post vomitum insequitur: & sudor frigidus oboritur, partiumque extimarum perfrigeratio. Et quod tam propinqua ventriculo pars laboraret, illud forte erat ob colon intestinum cui ventriculi fundum incumbit, & in eo verisimile quoddam apostema natum fuisse. Annotat quoque colicam in iliacam aliquando degenerare, & hanc in illam. Ex omnibus his colligo omnium verisimillimum videri vel simplicem colicam fuisse, vel à colica natam iliacam; quæ iliaca citius interimit quàm colica ipsa, quòd in tenuibus fiat quæ ventriculo sunt propinquiora. ⁴

Nisi fortè quis dicat febrem omninò pestilentem fuisse. nã quod liuens corpus post obitum apparuerit, id ad excretionem caloris febrilis, & naturalis extinctionem referri voluit.

Ceterum polliciti sumus demonstraturos nos non è re morbo occupatorum esse in colicis doloribus statim vehementes acresque clysteres subiicere: & tandem hic error pessimus inoleuit, vt operæpretium nos facturos existimemus si carminarium enema subdamus. Quòd legerint in doloribus colicis siue fugacibus, siue fixis talium clysterum vsu adiumentum afferri. Sed id intelligendum modò tempore & loco exhibeantur. Nam (vt annotat Arnaldus loco supra scripto) multi errant Medici ineuntibus doloribus colicis statim subdentes enemata acria validaque: hæc enim fæces iam induratas magis exiccant & exuccas reddunt, & tantam afferunt perturbationem, vt natura sæpe sese colligens omnia retineat, quæ tanto molimine auellere cogitamus. Quod ego sæpè obseruauit: & clyster blandus mitisque in doloribus eiusmodi plus aliquando profuit, quàm ira validus & acer.

Ecquid præsidij afferri poterat ad declinandum tam funesti morbi, tamque præcipitis exitum? Non est dubium quin blandis enematis aluo irritata latæque pars materiæ quæ diu

Cap. 32.
li. 2. Bre
uiat.

304 CONSILIORVM MEDICINALIVM
restiterat aliò diuertisset: sequenti verò die satis valido ec-
coprotico exhibito, quod in mediis viis hærebat, foras de-
primi, exigique potuisset. Tertio & fatus ad partes adhiberi
potuisset, & cardiacis locus fuisset.

Talis fatus præscriptus, sed iam res erant deploratæ.

℞. *florum chamæmeli, meliloti, an. p. j. absynth. m. j. s. sem. anisi & fœniculi an. ℥ s. santali citrini ℥ ij. cyperi ℥ s. rosarum p. j. fiat decoct. in aqua, addendo vini albi parum, & sacchari ℥ ij. ob inflammationem. foveatur totus venter.*

Item ℞. *destillati restauratiui & aq. cardui passat. in manica, cum electuar. diatracag. frigid. an. ℥ ij. in quibus dissolu. diamargar. frigid. ℥ j. rasur. ebor. ℥ s. theriacis ℥ j. syrup. de limonibus ℥ j. fiat potus.*

ANNOTATIONES.

1. Si quis legat historiam de morbo caliacò apud Celsum, videat penè historià huius morbi; nam singula symptomata congruunt inter se. Hollerius talem morbum ad febrem ^{acuta} poterit referre; perpetua enim iactatio, hypochondriorum contentio, materia est crassus humor, acer & biliosus, tunicis stomachi imbibitus.

2. In hac muliere, sicut & in nonnullis aliis, quorum hinc historia continetur initio magnus est æstus, & respiratio magna est ut analoga: sed subinde per refrigeratio sequitur: & cum æstuant interna non magnum spiritum ducunt, sed sicut Benzoini. Huius rei rationem reddit Galenus comment. in historià 3. sect. 3. lib. 3. Epidem. ubi notat contingere in febribus istis malis ut initio ingens admodum sit incendium, & magna sit respiratio, & partium calor: sed statim ita digeritur totus calor febrilis penè consumptus feruifactis humoribus putribus, ut remaneat paucus & languidus calor natiuus: & ille calor natiuus (ait) prius extinguitur quàm denuò febris illa accendatur: hinc mors non longè sequitur. Locus commemoratione dignissimus est.

3. Huiusmodi colicam lethalem, vel affectum similem in quo ob doloris vehementiam, animi & defectiones sequuntur, & renocatur calor intro refrigeratis partibus extimis, explicare videtur Hippocrates aphor. 20. lib. 7. In forti dolore ventris partium extremarum frigiditas, malum.

4. Eodem morbo paulò post periit auriga quidam. Primo die dolor leuis ad latus sinistrum, qui statim & pedetentim ad regionem lieuis descendis ac increvit: vomitiones frequentes, dolor stomachi secundo & tertio

tertio: perſeuerabant vomitiones rerum viridium, aruginofarum: dolor lateris non affligebat: in ventre inferiore vagos dolores percipiebat. Quarto, de nocte omnia exacerbantur, partes extrema refrigeſcunt: cogimur præ ſuffocatione mittere ſanguinem, quòd ita requireret ager: vomitiones tanquam lutofæ nigrique humoris. Syncope: mors. Omnem autem uſum remediorum mors ipſa anteuertit.

CONSILIVM LVII.

De alui fluore in muliere grauida

CIRCA initium huius libri narrata eſt hiſtoria vxoris cuiusdam theſaurarij quæ ab alui fluore dyſenterico tertio poſt partum die, qui totius morbi viceſimus erat, interiit. *Vide ante Conſil 15.* Conditiones fluoris iſtius, & quæ aderant præua ſigna, vt vomitus mox æruginofus, nunc bilioſus, & meracus, febris, hepatis tumor ^{ἐπώδυνος} non poterant non ad malum apparere. Quæſtio eſſe poſſit an vterum gerenti alui fluor ſit calamitoſus. Hippocrates quidẽ ſcripſit, *Si grauidæ aluus plurimum profluat, metus eſt abortiõnis.* *Aph. 34 lib. 5.* Quod verum, quia & ob dolores, & defraudationem ipſius fœtus magnæ corporifœto mutationes contingunt. Sed ex omnibus Hippocratis pronunciatis vnum eſt in Prorrheticis animaduerſione dignum, & ad prognofin, & ad curandi occaſionem præbendam accommodatum. Narrat eò loci duas eſſe dyſenterias, vnã cum febre, variis excrementis, hepatis inflammatione, aut præcordiorum, aut ventris, cum ciborum auerſione: Aliæ quidem ſunt ſine hiſ ſignis cum ramentis quidem & ſanguine, ſed breuiores ſunt, & eas vocat ^{λευκοιτελας} fructuoſas commodasque ægris, quod aut à diurnis, aut breuibus morbis ægros afferant. De hiſ poſterioribus loquens ait: *Quæ vterum geſtant ab huiusmodi dyſenterijs, & ad partum, & ex partu euadunt, fœtus ſanos habent, etiam per multos meſes & ſanguine, & ramentis excretis.* Ergo cum in illa muliere mala illa ſigna apparuerint, quorum iniecta mentio eſt, non mirum ſi præceps mortis periculum ingruerit. Et obſeruatum eſt in illuſtriſſima domina ab Inſula per maiorem grauiditatis partem ſæuam ſatis dy-

306 CONSILIORVM MEDICINALIVM
fenteriam affuisse, hinc tamen, salua euasit & incolu-
mis, vitalem foetum edidit. Est enim vbi dysenteria
malæ sunt cum præsentè partiũ naturalium praua dispositione
perennis sit graueolentium excrementorum prouentus: est
vbi tantum congeries facta est excrementorum, quorum
euacuatio & foetum & foetam in melioris valetudinis bo-
nam spem adducit.

CONSILIVM LVIII.

De singultu febris superueniente.

*Vide Cõ.
fl. 25.*

CIRCA principium libri huius de singultu in febrem lon-
gam incidente dictum est, & quâ ratione constituenda
sit febris singultuosa, cuius Hippocrates meminit in quibus-
dam locis, vt illò loci annotatur. Omiseramus omnes sin-
gultus causas recensere: quod hoc loco datâ operâ à nobis
præstandum est. Ac duo proponuntur, prius vt singultus
causæ explicentur: posterius, vt quæratutur cut in febres lon-
gas singultus incidat, præsertim cum marasmo & cutis squa-
lore coniunctas, quindecim aut viginti ante obitum diebus;
an id ratione exhausti: & si ratione exhausti, quâ id ratione
fiat. Quæ omnia non minùs cogniti digna sunt, quàm vtili-
tate vberrima. Ac primùm singultum definiunt, motum de-
prauatum ventriculi & contra naturam, eum propriè con-
uulsio non sit, sed *anquã de m*, vt vocat Galenus. Conuulsio
enim propriè cadit in partes quæ mouentur *oc; ca; p; m; s;*: con-
uulsioque symptoma dicitur causæ morbificæ tantum, sin-
gultus autem, tussis, sternutamentum naturæ à causa mor-
fica irritatæ. Autor est Galenus & singultum, & conuulsio-
nem ab inanitione & repletione fieri sententia Hippocratis:
quanquam venenatam qualitatem acremque vaporem tan-
quam quid tertium singultus conuulsui causam alio in lo-
co idem Galenus constituit; quod plerisque negotium de-
dit in tutanda Hippocratis sententia, duas tantum causas
generales astruentis. Nonnullis videtur Galeni sententiam
aptè commodèque defendi posse, si dicant per accidens tan-
tum venenatam auram conuulsionem propriè dictam com-

*2. de sym.
caus.
Com. in d
phoe. 13.
lib. 6.
aph.*

mittere, nimirum feriendo aut cerebri ventriculos, aut nervos: per se autem singultum eundem auram committere. Ut conuulsionis propriè dictæ causæ duæ statuantur per se, inanitio, & repletio, tertia autem ex euentu, qualitas venenata vt in febribus pestilentibus singultuosis apparet: singultus autem ipsius tres ponuntur causæ, inanitio, repletio, & vapor ferinus. Quasi verò dum è tibia vlcerata, aut cancrosa effertur vapor attingens ventriculos cerebri, non efficiat epilepsiam, aut conuulsionem propriè dictam, vt eâ ratione argumenta illa tantùm diuerticula constituentur.

Tamen quoniam rationalis Medicus Hippocrates generalibus suis theorematis contentus iis fidem adhiberi vult, nec inferiùs demittēs se ad particulares quasdam causas singultus contemplandas, earum vim & ingenium explicat, quod apprimè ad medendum confert: ideo ne temere persuasi illâ propositione generali, Omnis conuulsio aut ab inanitione, aut à repletionem est: in singultu in febrem pestilentem incidente euacuandi consiliũ captemus, Galenus *τιμωρον* *Gorrans* ex rerum priuata obseruatione instituens ad legitimè curandum quasi neglectis duabus illis causis tertiam astruit. Nam *in dist.* *λοτζ.* exempli gratiâ, in pressu costæ, in maligna qualitate, in refrigeratione summa, in descensu intestini, si, vt ferè fit, singultus contingat, an is à repletionem, an ab inanitionem? Si à repletionem est, ecquæ illa est repletio? Repletio tamen est: cum nemo tam medicæ artis ignarus statuat inanitionem illius conuulsionis causam esse. Cum itaque repletionem causam sui agnoscat, quâ illi ope succurrendum est? Si enim à repletionem principium causamque ducit, huic inanitio vtile est remedium. Nemo tamen auræ pestilenti, aut frigidæ intemperiei, aut singultui à prolapsu intestini nato euacuans remedium instituat: vt necesse fuerit Galeno ad peculiarem remediorum institutionem tertiam aliquam & singultus & conuulsionis causam inducere: ad eorum opinionem debilitandam, qui vt errore vindicent Galenum, tertiam illam causam conuulsionis in singultu, non autem in conuulsionem propriè dicta comprehendant.

His omissis, vt peculiare singultus causas perstringamus, dicam adhuc quod mihi hac in parte probabile videtur. Eodem iure cum Hippocrate duas & conuulsionis & singultus

causas tantum constituyente agere possumus, quo & idem Hippocrates cum veteribus qui quatuor primas qualitates sanitatis & morbi causas statuebant: Et tamen hos reprehendit, quasi non & Hippocrates & tota Medicorum familia primarum quatuor qualitatum *πρωτὰ κρᾶσις* sanitatis fundamentum, vt & illius *ἁπορίας* euerfionem ægrotationis causam iampridem posuerit; vt non ineptè generali proloquio illi veteres ab Hippocrate tamen frustra, vt videtur, reprehensi, quatuor primas qualitates & morbi & sanitatis causas ponere voluerint. Quid ergo sibi vult Hippocrates cum eos erroris insimulat? Quia vniuersalius hoc fecerint, ratifatis esse ad Medicinam faciendam in generali rerum contèplatione versari: nec infrà descendentes quid in quaque re proprium sit considerant. Quomodo magnâ ægrotantium clade plerique qui se physicos profitentur, ex eo iam magnos medendi artifices & principes existere se falsò sibi persuadent, quod in naturali rerum speculatione *ἢ τῆ ἀεργυμᾶτις* magnos progressus fecisse se opinentur. Quod non satis est: immò ne sufficit quidem Medicorum theorematon vim omnè tenere, nisi ad inferiora te dimittas; quod Hippocrates *τελευτή* vocat. Atque eodem modo Hippocrates Gnidios medendi magistros fugillat, qui speciosis remediorum nominibus & titulis cum in populo iam iactationem habere se perspicerent, inde se in magnos medicos euadere se arbitrarentur. Quod vt vitaret Galenus in assignandis conuulsionis & singultus causis, non satis putauit factum si inanitionem aut euacuationem & repletionem horum causas poneret: sunt enim generaliores, & sensui magis subditæ, sed tertiam causam agnoscit, vt speciales notiones prosequatur quibus ad medendum doceamur. Possumus & quartam & quintam causam agnoscere, quam ægrè aut ad inanitionem, aut ad repletionem referemus. Aut si referantur, nihilò magis proficitur, sed tantum res inuoluitur, & nescitur sæpè quid opis afferendum: vt frustra recurratur ad illam distinctionem quam supra attulimus, nimirum quòd singultus per se à tribus causis fiat; repletionem, inanitionem, & aurâ. Conuulsio autem non fit ab aura per se, sed *ἢ τὸ συνελθὸν* tantum. In vlcere maligno dum effertur vapor epilepsiam inferens, an non illa epileptica conuulsio per se fit? Quidni? Sic Galenus in 3. Aphorismorum confusè & apoplexiæ & epilepsiæ causam eandem, crassum frigidumque humorem statuit, & locum: ergo &

Lib. de
vet. Me-
dicina.

Lib. 1. de
dieta
a-
ctor.

apho. 3.
lib. 3.

repletione est: tamen alio loco dum disputat de sternutamento (idem autem est iudicium de sternutamento & epilepsia) ait non quemuis humorem (de frigido præsertim intelligit) in capite redundantem sternutationem afferre, sed flatuosam esse oportet, & acrimoniam acquirere. Hic patet Galenum iam seniore, prudentioremque factum ad specialiores causas descendere, nec ita sese vniuersalibus pronuntiatis addicere, ne specie recti decipiamur.

Sed iam pensum absoluamus. Singultum facit inanitio, facit & repletio. Verum quidem illud, & vulgo ipsi cognitum. Repletio vel à flatu est, vel ab humore acri, vel ab humore lento, frigidoque: & pro causarum varietate variant quoque remedia. Nam vt veteres practici loquuntur, vel per contemperationem curatur, vel discussionem, vel excussionem. Primo modo cum ab humore acri est: secundo, cum à flatu: tertio cum ab humore tenaci ac contumaci ventriculi parietes offarciēt. Sic Hippocrates de singultu 3. disputans, ait *A singultu habitum sternutatio liberat.* Et in Commentario Galenus exemplo puerorum, qui repleti subinde singultiunt, docet repletionem maxime singultus causam esse. Nam qui fiunt ab exhausto, sunt rariores, ait. Vnam autem ex causis externis repletionis causam statuit frigus & frigiditatem, seu perfrigerationem. In Græco est *ἡ ψυχρότης καὶ σφίξις*, Leoniceus vertit, *rigor, & frigiditas*, nos melius *crudor* (Gallis, *morfondure*) siue frigus, & perfrigeratio. Huiusmodi autem externum frigus, quia nervosa corpora reddit, minimè perspirantia: unde fit vt in iis humor supprimatur. Et hæc Galenus illo loco. Qui autem humor agglutinatus tunicis ventriculi cum maiore vi ad demolitionem sui indigeat, sternutatio confert. Galenus in Aphorismis vomitum & singultum eiusdem ferè generis esse statuit: hoc autem inter se distingui, quòd vomitu ea exigantur quæ in ventriculo natant; singultu autem naturam procurare eorum excretionem quæ tenaciùs adhærent tunicis ventriculi. Atque omninò à flatu singultum fieri videmus, ab humore acri, præsertim superius orificium ventriculi feriente: vel quòd à corrupto cibo fit, vel quòd ab hepatis cysti refluat, vel quòd ibi collectus fit per phlogosin ventriculi, vel quòd ab inflammato hepate resudet, vt paulò post dicemus. Item fit ab humoris adhæsu, vt dictum est ante, compressione costæ, quod annotauit Fernelius, ab intemperie

Aph. 13.
lib. 6.Aph. 33.
lib. 6.

frigidâ ventriculi, vt de eo notum esse potest, qui cùm gracilis esset, & superius orificium ventriculi delicatius frigidiusque haberet, Medicis persuadere voluit ne in febre continua quâ conflictabatur aquam propinarent: quod cùm tamen fecissent, & eum singultire, & conuelli fecerunt, vnde interiit. Singultiebat sæpe si quid frigidius cepisset. Hæc Galenus. Ad has singultus causas referri potest prolapsio intestini quod in senibus contingit maximè, & sæpè moriuntur. Febris singultuosa non est quoque omittenda, de qua Hippocrates. Agnouerunt & veteres inflammationem ventriculi, hepatis, meningon cerebri, mesenterij singultum afferre posse, quod per resudationem fit, & per consensum. Ac de cerebri inflammatione quæ singultum efficiat, extat Hippocratis aphorismus, *A vomitu singultus & oculatorum rubor, malum.* Cuius aphorismi ex comment. Galeni hæc est *ἡ αἴτια*. Sæpe contingit vt materiâ inhærente ventriculi parietibus, natura per vomitū conetur deicere id quod molestum est: etsi præeuntibus vomitionibus singultus remaneat, malum. Quod tamen alienum à ratione videbitur. Nam prius dictum & singultum, & vomitum eiusdem esse generis: in hoc differre, quod singultus maior sit conatus naturæ ad amolliendum quod ventriculo inhæret: vomitus maior vis non est, sed mediocris conatus ad euacuandum id quod in ventriculo fluctuat. Ergo tametsi præcedant vomitus, & post eos remaneat singultus, absolutè malum non est: sed declaratur impactio materiæ quæ tolli non potest nisi maiore vi. Quid ergo sibi vult Hippocrates? Particula illa, *ἢ ἐμέτε*, à vomitu, trifariam potest intelligi, vel vt simpliciter ob contumaciam materiæ prægresso vomitu singultus remaneat, nequeunte materiâ vomitu tanquam quodam minore conatu excuti: & hic singultus malus non est. Vel vt singultus vomitum consequatur, tanquam τὸ ἐμπεριπυκνωθῆναι, ob exhaustum. Fieri enim potest vt adeò creber sit vomitus & vehemens, vt inderatione euacuationis singultus nascatur tanquam malum signum & causa. De hoc aphorismus non intelligit, vt nec de priore. Tertio modo vomitum singultus insequitur vt malum signum. nam cùm vomitu euacuetur materia, libereturque eo quo premitur pondere, si frequens fuerit, singultus occasio tollitur. quod si ne singultus quidem tollatur, immò augeatur, significat ab alia causa nasci singultum quàm à crassa materia, sed à phlogosi & inflammatione, aut

3 cap. lib.
de consuetudine.

4. Actus.

Apho. 3.
lib 7.

ventriculi, aut cerebri, aut meningon. Potest enim, vt iam dictum est, post vomitum sequi absolutè singultus ob contumaciam materiei vomitui non cedenti, sed singultum quo excludatur requirenti: sed hîc dat Hippocrates miro quodam artificio signum *διαγνώσκειν*, quo iudicare possis an singultus qui remanet hæres post vomitum, tantum sit ob materiei vitium, an ob causam aliam, nempe inflammationem. Illud porrò signum est, *Rubor oculorum*, non is quidem qui fugax est ob conatum vomendi, sed qui inflammationis habet aliquid. Rubor autem iste comes ipsius singultus qui vomitui successit, quatenus singultum comitatur: declarat aut cerebrum aut ventriculum inflammatum, cuius occasione singultus refedit, remansitque post nonnullas vomitu factas *κατάσεις*. Itaque aphorismus absolutè pronunciatus non stetit, *A vomitu singultus, malum*: sed adiectione *τὸ σμῆμα διαγνώσκειν*, verus ita efficitur, *A vomitu singultus, & oculorum rubor, malum*. De singultu à repletionem, de febre singultuosa, siue per se talis sit, siue in prolapsione intestinorum accidat, de que eorum curatione abundè dictum est ab Hollerio in Methodo medendi. Nunc quod est secundi instituti præstemus, nimirum qualis sit singultus ab inanitione, & quâ is ratione fiat.

Ab inanitione & conuulsio, & singultus, & desipientia contingunt. De desipientia à plerisque est dubitatum, quòd desipientiæ medentium opera in eo versari videatur, vt recurrant ad medicamenta purgantia, ad cucurbitulas, & ad sectionem venæ, quod hanc omnem à repletionem oriri credant. Vnde Galenus comment. in aphorism. lib. 7. *A profluuium sanguinis desipientia ac conuulsio, malum*. scribit illum aphorismum magnam vim habere ad persuadendum desipientiam ab inanitione etiam nasci posse: quòd verisimile sit ætate Galeni Medicos extitisse, quibus persuaderi non possit ab inanitione desipientiam proficisci non posse. Agnoscit autem Galenus & ob profluuium sanguinis, & ob vigilias immodicas oriri posse desipientiam: ita vt quæ ob profluuium istud fiat, ab exhausto sit, quæ ob vigilias ab inanitione: quanquam fieri possit vt immodicis vigiliis sanguis biliosus redditus, aut bilis ficior ac æstuantior principium, causamque det illi desipientiæ. Hæc Galenus; & nos id experientiam obseruauimus. Nam ad ripam Sequanæ quidam cum mensibus quatuor febre quartanâ erraticâ que laborasset, emacia-

tus planè, squalidus cœpit tantisper desipere, delirare, crebrò resurgere, & inde cataphorâ seu catalepsi prehêsus, quâ interiit. An credibile ista omnia symptomata à repletionem esse, cum ita corpus totum contabuisset & emacruisset? Hoc Rondelietius diligens rerum obseruator annotauit, scribens Caron, Cataphoran *επι κρημνισθη* in febres tertianas longas, in quartanas incidere. Item in suburbio Sancti Vi&torij iuuenis febre malignâ fatis decubuit: sexto die sanguis cœpit affatim fluere, vix ac ne vix sisti potuit: Ab eo singultus successit (dubitabant an ab inanitione, an à grumo sanguinis in ventriculum delapsi) cœpit tremere, delirare, desipere. Num & tremor, & desipientia ab exhausto contigit? Immò (quod ab instituto non alienum, & Hippocrates ipse non veritus, sæpe loquendi vulgares formulas proferre, vt id quod dicitur sensus nostros feriret magis) vulgò iam pridem persuasum est, deliria ab inanito fieri posse. Cùm enim in inedia quandam mente aberrare vident, dicunt proptereâ delirare quòd hinc cerebrum vacuum sit; ita enim vocant. Et id verisimile est admodum. Proptereâ hallucinantur, cælòquetoto errant, qui in talibus deliriis ad hieram diacolocyntidos, ad confectum de dactylis, & alia id genus valida medicamenta concurrunt. Ergo singultus ab inanitione est. Nec falli oportet in febribus longis in quibus oboritur cùm hepar præcalidum est & ficcatur: quod dum fit, tenue serum resudat ab hepate, feritque ventriculum, hinc singultus nata occasio. Ob hepatis autem inflammationem patientis viciniam singultum oriri, eumque ad repletionem referri posse, ex Hippocrate potest colligi. Huius verba sunt: *In hepatis inflammatione*

apbo. 17 *lib. 7.* *apbo. 58.* *lib. 5.* *Com. in apbo. 58.* *lib. 5.* *Com. in apbo. 17.* *lib. 7.*

singultus, malum. Et alio loco: *iecoris inflammationem patienti singultus supervenit.* Galenus singultum esse *επι πνευματι* scribit, id est, auctioris mali occasione fit. Huius rationem reddit, quia propter neruorum communicationem ventriculus patitur, non semper quidem, sed cùm iecur ad maximam attollitur inflammationem, iisdem penè verbis alio in commentario vtitur: Singultus fit non quomodocumque affecto hepate, nec semper, sed cum feruente inflammatione ad magnitudinem attollitur. Sic oportet & maximam & pessimam esse inflammationem, ait Galenus. Sed hîc magna difficultas oboritur, & non negligenda; An læsio ventriculi ex qua singultus oritur, sequatur ob tumorem, & ratione tumoris ob pressum ventriculi ab hepate clato

elato, crassefactoque & intumefcente; quod Galenus paulò antè dicebat, cùm ad elationem in magnitudinem recurrebat: An verò fiat non ratione pressus & tumoris, sed quia acer ichor & serum biliosum à parte inflammata resudet, feriatque os superius ventriculi? Quid hìc dicam nescio, nam paulò antè huius rei causam assignat inflationem tumoremque iecinoris, idque ex sua sententia: paulò post tamen id ex veterum tantum opinione constituit. Verba sunt: *Nonnulli putant magnitudinem inflammationis ventriculum premere, ac singultum facere, nequeunte spiritu exire.* Hanc sententiam non valde videtur probare: nec verisimile est ob spiritus interclusionem hoc symptoma aduenire. Sic eam quidem sententiã probare quidem potest quatenus dicit præ tumoris magnitudine ventriculum offendi, & inde ad singultiendum impelli, non autem quòd spiritus via interceptiatur. Posteriores autem rationem quã nitebamur docere ab humore tenui & bilioso resudante ab hepate inflammato singultum excitari, ipsemet Galenus astruit commẽtario prædicto. *Et quidem bile (ait Galenus) satis calida & multa in hepatis inflammatione genita, confluentẽque ad intestinorum principium & superfluente, necnon ad ventriculum recurrente os ipsius mordeci cõtingit, & ita singultum nasci.* Quod probabilius multò videtur. Atque ita in inflammatione hepatis tribus de causis potest singultus oboriri, ob pressum ventriculi à tumore ob inflammationem excitato: (at sine tumore in iis quibus feruet hepar nasci potest: nec in inflammatione, credibile est ita in magnitudinem hepar attolli, vt pressum commemorabilem afferat.) Secundã ratione ob ichorem qui ab omni parte inflammata transsumitur: vt in inflammatione membranæ costis obtentæ tussicula oboritur, transsumpto ichore à parte deflagante.

Tertiã ratione ob generationem bilis, quæ cùm redundet, refluit ad ventriculum, ibique id symptomatis solet promouere. Quartam Philotheus rationem addit minus reliquis probabilem. Ideò enim ait singultum inflammationis hepaticæ sobolem esse, præsertim si concavas occupet, & ingens fuerit, quòd ea magna inflammatio humores à ventriculo vicino trahat, & sic exhauriat illum, quo exhausto singultus ab inanitione insequitur. Progressu quidem temporis hoc fieri potest: Sed respondeat Philotheus qui fiat vt tam breui singultus ab inanitione ob viciniam inflammati hepatis sequatur. Hepatitis enim

morbus acutus est, & intra paucos dies necat: immò initio etiã
inanitionis potest nasci singultus, cum non sit probabile ab ex-
 hausto tam breui ventriculum laborare. Quæ duæ rationes
 à nobis productæ, consistæque, tolerabiliter videntur infrin-
 gere ac labefactare opinionem Philorhei. Addi & potest hæc,
 cur in summa fame in qua suctionis sensus est, non adest sin-
 gultus? Est enim probabile si hepar deslagrans exhauriat, &
 citò singultum afferat, vt in exacta inedia idem contingat.
 Nam potest respondere Philotheus id quod scriptum est ap-
 ud Galenum cap. 3. lib. 6. de locis malè affectis, cum distin-
 guit diabetem à canina appetentia. In canina appetentia vi-
 tium statim deprehenditur, & vis, quia in animali parte id fit:
 in diabete autem non item, quia fit in parte naturali quæ sui
 mali sensum non habet vt & ventriculus: potest, inquam, re-
 spondere illam exquisiti sensus facultatem quã donatus est
 ventriculus ob neruorum propagines multiplices, in causa
 esse cur penuriam, suctum, emunctionemque, vt ita loquar,
 & minimam & statim percipiat. Vnde fit vt in simis existen-
 te inflammatione, eaque magna & commemorabili, dere-
 pente pars calida trahat, calfaciat, exorbeat; eaque subita
 mutatio, & veluti *ab ipso* facta, singultui occasionem dat. At
 verò fames, quia non subitam affert mutationem, non ita sin-
 gultum affert: suctionis quidem sensum inducit, sed nõ aliud
 symptoma: nisi quòd quidam conuulsi sint aliquando, sed id
 referunt ad bilem quæ ferit in ieiunitate & inedia, superius
 orificium ventriculi.

Porro si inanitio singultum efficit; cur qui tabidi, aut he-
 tici moriuntur singultuendi finem non faciunt cum ab ex-
 hausto laborent? Et quibus aluus immodicè fluit, aut sanguis
 fluxit immodicus, contingit singultus & conuulsio propriè
 dicta: Sed qui sæpe tabuerunt, non prius singultuunt quàm
 dum iam iam sunt animam acturi; vnde vulgus extremum
 singultum aptè satis appellat, quasi naturã non persentiente
 inanitionem præcedentem vt quæ sensum fieret: sed iam iam
 pereunte facultate naturali singultus excitatur? Quæstio hæc
 difficillima est, & commentatione dignissima, vt quæ intel-
 lecta perspectaque non minùs autoritatis pondere, quàm vt-
 litatis vbertate, iactationem in populo sit habitura. Cum re-
 pletio est aliqua, aut venenata aura, aut acre quippiam in ore

ventriculi, aut inhærens tunicis ventriculi, non dubiũ quin legitimã ratione ventriculus ipse molestias depellere annitens, in se ipse conuellatur, singultumque efficiat conuulsionis propriè dictæ æmulum. Sed quo modo præeunte insigni aliquã euacuatione singultus ab inanitione fiat maiore quæstione dignum est. Nam, vt antè commentabamur, si inanitione conuulsionem afferat in corpore vniuerso, & singultum in ventriculo, cur in hecticis in quibus extenuationis summa sunt omnia, & summa inanitione, propalam explicatur, frequenter singultus non adsunt? Primum hæc de conuulsione & singultu disputatio satius potest explicari: deinde in angustius cogi ac redigi. Nam & contra Galenum olim à subtilissimis rerum indagatoribus disputatum est, vt conficeretur inanitionem ipsius conuulsionis causam non esse. Ratio autem potior illorum erat illa quam exposuimus, nimirũ quod emaciatos & à morbo tabefactos ac colliquefactos conuulsionibus exerceri oporteret: quod non vsu-venit, nisi quod complicatum sit coniunctumque cum ipso marcere quod partibus conuulsionem afferat. Atque huic obiectioni ita solutionem opponunt: Vt morbus fiat, oportet mutationem fieri subitam *ὡς ἀβέβαιον*; quæ enim lentè *ὡς ἡ βίβλος* fiunt, id est paulatim, pigròque gressu, ea non imprimunt quid corpori, nec mutationem alterationemve effatu dignam afferunt: vt propterea conuellendi occasio non adsit, tametsi ea emaciatione tabesque reciprocè cum inanitione coeat; id est, tabes & carniũ collapsus & marcor ad inanitionem referatur. Sed cum fortè fortunã, aut criticè, aut aliã vllã ratione profunditur alius, aut sanguis, aut euacuatio aliqua *ὡς ἐκκαταρτικὴ* contingit, è regione adest singultus, aut conuulsio aliqua, quæ hominem sic repenti & affatim euacuatum adoritur. Et hac maximè ratione singultus sequitur ob inanitionem. Quamquam duorum alterum esse, aut vtrumque necesse est, vel vt ventriculus minimam inanitionem sui sentiens tanquam quod sibi molestum singultiat, vel quod tametsi inanitione ventriculum ipsum non attingat, tamen ex euentu sensum habet inanitionis aliarum partium. Quod ad prius attinet, fieri potest vt quia animalis sensus est in ventriculo, minimam læsionem sentiat ventriculus, in ceteris partibus idem non contingit, quod is sensus animalis non ita insit. Quod fuit

316 CONSILIORVM MEDICINALIVM
argumentum Galeni in libris de locis affectis, dum probaret
cur caninæ appetentiæ singula momēta, vires, & tempora per-
ciperentur: ipsius autem diabetæ non item. Nam cum animale
munus obitur exactè in parte aliqua, minimâ oblatâ occasione
rei triftis sensio percipitur. Sed hic quærat cur in inedia non
conuellatur ventriculus ratione exhausti, si minimæ rei triftis
sensio insit ventriculo? De posteriore ita nos statuemus. Ex
euentu inanitionem aliarum partium ventriculus præsentit,
subodoraturque, quòd tanquam in chorea fiat partium harum
& illarum attractio, deinde attractio suctum inducit, & suctus
suctionis sensum: cuius cum tota ratio in ventriculo ipso ver-
tatur, non est dubium si potest aliarum partium penuriam sen-
tire. Accedit quod inanitio ipsa attingat quoque ventriculum
ipsum, sed non ita vt & ceteras partes. Nam si marcor, macies,
& exhaustum eodem modo & gradu ventriculum ipsum attingeret
quo & partes ceteras, fieri non posset vt animans subsisteret.
Propterea in corde natura aquosum quid in pericardio cõ-
stituit, vt & si totum corpus deflagraret, haberet tamen cor
tanquam vltimò moriens quo sese sustentaret, & à tam subita
deflagratione vindicaret. Ita & in vetriculo semper est aliquid
pingue, muccosum, offarciens rugas & parietes ventriculi, vt
minimè sentiat damnum: accedit quod si qua alia pars ingestorum
gratiam recipit, ventriculus est maximè.

Sed hæc tam accurata exactaque vix conferunt ad curandū:
Tamen magni interest scire in singultu quid agat, quid patiatur,
quæ causa, ne temerè singultum ab inanitione, pro singultu à
repletionem accipiamus. Plurimum autem refert ad Therapiam
an hic aut ille sit singultus.

ANNOTATIONES.

*Idem fortè dici potest de singultu & conuulsione, quod & de dolore
capitis. Nam dolor capitis fit aliquando per sympathiam absolutam, vt
cum neruo lesò statim cerebrum compatitur sympathiâ absolutâ. nec enim
vapor, nec materia vlla intercedit ad talem affectum committendum. Ita
quoque est quedam conuulsio & singultus, qui nec repletionem, nec ina-
nitionem, quæ sunt perspicua causa, agnoscit; sed absolutè fit, per modum
quemdam vix exprimibilem, vt sic loquar.*

2. Cum & desipientia, & singultus, & conuulsio ab inanitione fiat;

male cum aliquis talis affectus contingit, statim recurrunt Medici ad attenuantia & calefacientia. In quo aberratur: & talem errorem conuulsiit Galenus lib. 11. Simplic. cap. de castoreo.

3. Lib. 1. Epidemior. meorum obseruavi ex sententia Hippocratis, medicamentum irritum & inutile posse huiusmodi symptomata excitare. quod notandum est. Item filius domini Pouart Regij in Camera comptorum Auditoris, cum bimestri tertiana laborasset, nec ad medicamentum adduci potuisset, cum calum incanduisset paulum, datur medicamentum, cui indormiendum imprudens Pharmacopæus censuit. Medicamentum inane fuit. Mox, nil exclusit. Ab eo tempore vix febris exers. De dolore capitis, de quo prius non conquerebatur, queritur. Dum paroxysmus repetit repente ardens fit, elatis in cerebrum vaporibus, immo & febre ipsa iam cerebrum occupante (vnde calor acerrimi sensus apparebat) ac si febris esset capitalis, (vt sic loquar.) Per viginti quatuor horas ardens fere fuit, & rursus eum prehenderat. Virtus erat debilis. Nil natura prestitit, quamuis irritata. Conuulsus interiit. In cerebro nil deprehensum. Vena intumuerant parum. Vi febris interiit obfesso cerebro quoque, vt interea non esset flabellatio cordis ob respirationem non liberam. Si enim sanis cum dolores capitis derepente oriuntur, ij muti sunt, & apoplectici moriuntur, quid non eueniet simile aegris? Aphorism. 51. lib. 6. Ad illum locum Rondeletij allegatum addi potest quod scribit Hippocrates lib. 4. Epidemiorum, vbi notat quartanam febrem tum cessauisse cum homo factus esset τρεῖς ἡμέρας, aut τετραῖς ἡμέρας. Immo commemorabilis est locus Comment. in historiam de Pythione histor. 1. lib. 3. Epid. vbi dicebant Interpretes Hippocratis Pythionem delirasse quod à venere abstinuisset multo genito ac congesto semine, quod obruendo cerebrum delirij causa foret, eo modo quo in apertione capitis pressus manuum cerebrum offendit. At Galenus refutat hanc opinionem, putatque oppressionem cerebri, siue sit cum humore, siue à manu, siue à terebra, aut alio modo, non causam esse delirij, sed potius affectionis cuiusdam apoplectica ac comatosa. Qui locus preclarus est, vt scias delirium & desipientiam aut ab exhausto esse potius, aut ab humore non tam quantitate quam qualitate peccante.

Rr. iij.

CONSILIVM LIX.

De febre purpurata.

IOANNES Dodeuars in regiis negotiis quæ ad rem bellicam pertinerent occupari solitus, dum circa mensem Octobrem infinitum prope iter velocissimorum equorū cursu demetitur, ac conficit, Lutetiæ in morbū grauē incidit. Et vt homo erat acutus, agilis, expeditus, multa animo ac cogitatione versans, biliosus, irasci facilis, ita suæ naturæ congenerem in morbum præceps ruit. In hoc ægro fortè nos longiùs prouchi oporteret, quàm ratio proposita postuleret. Nam admirabilis rerum trahere nos potest ordo, si singulorum vim explicare institutum esset quæ in morbo contigerunt. Cùm itaque diu & noctu laboribus penè confectus fuisset, cùm quiescere cœpit, eum cum leui horrore febrisprehendit, noctem insomnem duxit: deinde magna liquidorum excrementorum copia, nil autem crassum excretum est: nauseę frequentes: paulum quieuit nonnullis supra infrãve excretis. Febris cœpit increfcere, iactationes & vacuitas somni, dolores ad regionem ventriculi & lienis, vrinæ ardentes quodammodo vineę, aut vino giluo dilutæ, aliquando mali aurei colorem non ita saturum referebant. Cruda: sitis inexhausta, etsi cyathos duos aut tres aquæ hausisset, siccauissetque, ne minimum tamen refrigerij hoc afferre videbatur, ac si in ardentem fornacem iniectum id esset. Animi defectiones, præsertim cùm resurgere vellet, omnium artuum confractio & lassitudo mixta ex phlegmonosa & tensiua: & quod mirum fuit, intercalaris pulsus erat, intermissio, inæqualitas, & ea intermissio in multis pulsationibus apparebat. Tertio die sinistrum crus pustulis rubeis humilibus maculatum erat, quod nobis terrori fuit. Sed hoc sibi familiare esse nuntiauit. Febris eundem typum non seruabat: noctes aliæ aliis erant molestiores. Medicamenta quæ initio exhibita sunt, educebant aliquid subrubeum, subflauum, sed paucum, & non nisi magnâ vi. Omnia cruda erant, & nisi moræ impatiens fuisset, medicisque vim quodammodo afferret, vt morbum primo quoque tempore oppugnarent, incumbendum tantum fuisset coctioni, ne-

gotiumque naturæ totum committi credique debuisset. Sed & venam secare, & purgare coacti fuimus, idque frustra, cum nos videremus nihilomagi è re ægri esse. Sed satis ægri fuit faciendum importunitati. Morbus longus fuit admodum, nec ante tres menses sibi restitui visus est. Notandum interea rigentem hyemem quæ tunc si aliàs vnquam sæuisset, ad morbum producendum attulisse plurimum, quod & meatus occluderentur, & materia contumacior redderetur. Accedit quod nisi ita initio materia cruda iactata fuisset, melius actum fuisset cum ægro. Eum in quartanam casurum sperabamus, & quod illo tēpore magna quartanarum febrium copia in populo iactabat sese, tum quod de liene quereretur. Tertio, quod expulsis symptomaticè iis quæ liquidiora forent, remaneret materia incinerata, vt vocant Practici, adustaque quæ cunctando putredinem accerferet, & ægrum nostrum febre quartanâ cumularet. Ne longè à vero aberrauimus; nam tres aut quatuor paroxyfmi quartani illum oppresserunt.

Hic multa considerari possunt, quorum explicatio utilitatis vbertate sit nos delectatura. Primum ex historia morbi, & excretis innotescere potuit id quod principio erat implicitum ac inuolutum, nimirum quæ morbi species, & à qua causa. Secundo vnde ista extimarum perfrigeratio fugax aliquando: leipthymicæ, ætus ingens & nullâ ratione extinguendus: pulsus in homine iuvene inæqualitas, & intercalaris quædam intermissio, quæ periculo non carebat. Lassitudo ista, iactationes, dolor ad lienem, vrinæ quales descripsimus. Quæ omnia sigillatim explicabuntur. Id quod maximè nobis terrori fuit, pulsus inæqualitas, & intercalaris intermissio in vna pulsatione erat, initio quidem ordinata quodammodo erat: recreatis verò viribus inordinata extitit. At fatius est multò in rhythmico isto vitio sam inæqualitatem ordinatam non esse. Vt enim in rebus è natura ordo quippiam habet laudis & præstantiæ: ita in rebus contra naturam, non potest non ad malum apparere. Causa autem quæ nos hîc commouerit atque perturbarit, est quod nos legissemus aliquando apud Galenum & inæqualitatem in pulsibus malam esse, & hac deteriore intermissione. Fernelius scribit periculosissimam esse pulsus intermissionem in iuuenibus, minùs in pueris, minimè in senibus. Tamen ait aut ex articularum obstructione ortam, aut asthma, aut diuturno affectu,

non ita exitialem esse iuuenibus. Ex vnus pulsus intermissione multifenes ac pueri euaserunt; iuuenum nullus, ait: quæ pugnantia videntur. Nam aut ex asthma, aut arteriarum obstructione, aut affectu aliquo longo (præsertim minimè aduersà valetudine) dixit intermissionem non esse lethalem. Sed cum loquitur de bona valetudine præsentē, quæstionem videtur dirimere. Si enim in ceteris satis robustus & magnus sit pulsus, non dubium quin intermissio aliqua non ita periculum creet: sed si pulsus paruus, languidus, inæqualis, & austariò accedat intermissio, quæ spes esse possit? Galenus cap. 4. lib. 2 de præfag. ex pulsibus, de pulsuum inæqualitate multa, eaque præclara: primumque statuit aut in vna pulsatione obseruandam esse inæqualitatē, aut in multis quòd (*ἡ ἀσπυρία* vocatur *ἡ οὐσμητική*) aitque in vno pulsu inæqualitatē deteriore esse eā quæ in acervo ac cumulo fit. Differunt autem inæqualitas & intermissio cum hæc ad illam referatur. Quod Galenus docet cum scribit: *Periculosum est omninò non moueri arteriam, quod *δυνατότερον* dicitur: quod si quæ alia species inæqualitatis adest, periculosum esse dicitur.* Interpres grammaticè tantùm & obscurè locum illum vertit: ac primum ex alio loco inæqualitatis pulsus causas repetit oppilationem, compressionem instrumenti, humorum copiam collatione factâ cum facultate, cordis intemperiem inæqualem. In genere igitur hæc inæqualitatis causæ statuuntur. ⁴ Intermissio autem pulsus agnoscit causam suæ facultatis à copia humorum oppressionem, eiusdem impedimentum quominus motum tempore suo auspiceretur, idque aut ob crassitudinem, aut copiam humorum vnde oscillorum cordi vicinarum arteriarum sequitur obstructio. Item sæpè oscillis illis offunditur materia quæ vinculi modo intercipit motum. Interdum inflammationes, scirrhi, tumoresque partium quibus arteriæ infixæ sunt, impediunt ne liberè dilatentur, vnde motus intermissio nonnulla. Vnde in syncopis & palpitationibus cordis hæc intermissiones parent: si quid enim tunicis arteriarum, aut cordis ipsius corpori altè defixum fuerit, in propinquo mors, intemperies inæqualis cordis intermissionis causa vna non ita perniciofa est. Hæc enim inæqualitatem potius parere nata est, quæ ineuntibus febribus putridis maximè conspicua est. Galenus lib. de febribus quod ad hunc locum maximè pertinet in febribus putridis agnoscit duo quæ propria sunt, non tamen inseparabilia.

Lib. 2. de
cau. pul.

Cap.
lib. 1.

ἐπιπέσει δὲ ἐν τῷ, coarctationē pulsus appello, & ἀνώμαλον, inæqualitatē, accedit tertium ἐπιπαροξύνεσθαι, id est, repetere, geminare, annotationem nouam habere febrem, cum videlicet accessione iam vigorem aut suum clementum assecuta, rigoris sensus quidam excitatur ac si post liminō noua accessio succederet. Quod in febribus putridis multis conspicitur: & nos anno 1572. totā hyeme, & 1573 toto tempore verno & æstate quæ naturam indolēmq; hyemis, aut potius autumnī referret id in innumeris, præsertimque in mulieribus obseruauimus. Quod non aliūde contigisse suspicio fuit, quā ob materiæ inæqualitatem quæ difficultatē pepasmi afferre solet. Græcis illud ἐπιπαροξύνεσθαι dicitur accommodato satis vocabulo. At δὲ λήψις fit ob copiam materiæ quæ facultatem in aliquas angustias cogens pulsus coarctationem angustiamque facit. Ἀνώμαλον proprium quidem est febrium putridarum, siue illa in calore, siue in pulsu spectetur. In pulsu quidem ob fuliginosorum putriumque vaporum copiam. Galenus autem illo loco ait, sæpe in ipso ore ventriculi collecto quodam prauo humore mordaci aut frigido paruitatem inæqualitatemque pulsus inuehit: & cum in principiis paroxysmorum viridum humorum eructatio in os ventriculi contingat, vnde nausæ & vomitiones; mirum non est si affecto ore ventriculi pulsus sit ἀνώμαλος. Paruitatem quidem cum quadam inæqualitate, cum frigidus est humor: sin acer & mordax humor est, inæqualitas paruitatem pulsus exuperabit. Quod notandum est, ne temerè initio morborum siue adsit febris, siue non adsit, obseruatā aut inæqualitate, aut intermissione quadam ad venenum aut δειδὸν recurramus, magnū aliquid nos dicturos rati si diuinitatem quandam in morbo hoc aut illo dixerimus esse. At sæpè vna ventriculi oris superioris obfidio propter contumaciter adhærens aliquid pituitosum illi parti, hoc symptomaton genus iuniores & inexpertos Medicos perterrefaciens inuehit: maximè verò si pituitosa materia circum partes has accendatur, contumaci manente materiâ. Nam quandam τῶν τοῦ species inducit.

Nunc ad intermissionem reuertamur. Aliquando intermittit pulsus tantum quantum temporis esse possit in alia promotenda pulsatione, aliquando intermittit diutiùs, & per duorum pulsuum tempus. Hoc posterius funestum est, nec ab eo quicquam conualuit. Per tempus verò totum vnus pulsus, aut pau-

lò diutiùs intermissionem factam sæpe in plerisque qui conu-
 luerint obseruauit Galenus, præsertim si iam affectâ ætate, aut
 præcipitati senes essent. Quod minùs mirum in senibus, ta-
 met si periculosum esse videatur iam ipsam ob ætatem ad vie-
 tam facultatem accedere istam intermissionem à morbo. Sed,
 quod notandum, adductis senibus, & iis quos valetudinariorum
 vocamus, docet à magnis causis valentes de sanitatis gradu
 deiici, quod cùm contigerit, periculosiùs ægrotant. At imbecilli
 & senes minimâ etiam occasione aut morbo occupantur,
 aut intermissio pulsus eis accidit, quod minùs in his mirum vi-
 deri debet. Itaque ab intermissione pulsus pueri & senes non
 intereunt, iuuenes intereunt: nisi fortè iuuenes illi imbecilli
 naturâ sint, & senes validi; nam tunc faciliè decipi possumus. Il-
 lud enim notum ex Hippocrate, *Qui lab'oribus assuefacti fuerint,*
licet aut senes aut imbecilli sint, non consuetis licet validis ac iunioribus,
alacrius ferunt. Itaque est vbi in iuvene imbecillo minùs sit for-
 midabilis pulsus intermissio, quàm in sene robustiore. De pue-
 ris ac senibus quod ipse obseruauit, dicam. Carpentarius qui-
 dam nomine Gilet annos pene 78 natus, imbecillis pulmoni-
 bus ac purulentis, vt fidem euentus fecit, crudeli fati pleuriti-
 de detentus iacebat. Inæqualis pulsus & intermittens quod no-
 bis non mediocrem metum, incussit. Ista anomalia perseuera-
 bat: sæpe medendi fiduciam quam habebamus per sectionem
 venæ repetitam, vt ferè fit, minuit ista intermissio. Tamen ista
 quam adduximus opinione audacior erectiorque factus, ve-
 nam ter quaterque secui, conualuit. 6 Intermissio hæc ab æta-
 te erat, iuuante quoque duritie pulsus, tum ratione inflamma-
 tionis, tum duritiei vasorum. Quod animum addidit vt etiam
 num in ista anomalia securiores essemus, erat pulsus magnitu-
 do. Si enim ad intermissionem pulsus crebritas cum paruitate
 accedat, angustior longè spes est. In pictore Petro Dangers
 obseruauimus perspicuam pulsus intermissionem in magna af-
 fatimque facta destillatione: hoc illi familiare est; & tandem
 prehendimus duabus de causis hoc illi vsu venire etiam cùm
 primùm incipit ægrotare. 7 Prior est illi connata superioris ori-
 fici; ventriculi infirmitas, vt minima etiam occasione in leipo-
 thymiam deliquiumque animi præceps ruat: sed pane in vino
 infriato in os iniecto statim recreatur. Posterior est ingens
 copia materiæ pituitosæ & frigidæ à cerebro imbecillo factæ

obysum modioli continenter illabente. Reiectâ enim vomitione materia multa statim priores vires recuperat. Et nos illū nouimus à grauibus funestisque morbis quibus sæpe subiacet, defunctum superstitemque euasisse. In D. Barthelemy iam grandi ætate eadem à nobis pulsus inæqualitas & intermissio, cum magnitudine tamen obseruata est sæpè, integris satis viribus, & corpus alacre ad surgendum. Et quod mirum est, sæpe de industria in molliusculis pueris istam inæqualitatem conspicuam vidimus, præsertim cùm dormirent.

Ac de inæqualitate pulsus non modò in multis pulsationibus, sed in vna pulsatione, quod longè deterius esse paulò antè dictum est. Extat historia apud Galenum de Antipatro, cui inæqualis pulsus erat admodum, cùm tamen anhelosus non esset. Et tandem argumentis coniecturisque est affecutus Galenus leues pulmonum arterias infarctas obstructasque esse. Quæ cùm plerique Medici agnouerint inuento quodâ de pulsus inæqualitate conquerenti, non temerè de morte repentina pronuntiabunt, sed diligenter causis rei eius indagatis, aliis securitatem prædicent, perniciem aliis minabuntur. Et quoniam locus postulat vt mentione de pulsu factâ (cuius cognitionem soli Deo & Galeno Gordonius ille vir bonus & candidus tribuit) de speciebus quippiam dicatur, non erit alienum ab instituto paulò apertius de re disputare.

In pulsibus quinque obseruari volunt; motum, quietem, dilatationem arteriæ, ictum, corpus. Ac ratione motus differentiarum hæ obseruantur; celeritas, tarditas. Ratione quietis, frequens, rarus. Natura non potest duos motus contrarios moliri quin sit interiecta quies aliqua. Galenus autem quietem distinguit in internam & externam: Ratione dilatationis, paruitas & magnitudo in pulsibus obseruatur: Ratione ictus, qui & à nonnullis occurfus dicitur, imbecillitas seu remissio, & fortitudo siue vehementia spectatur. Ratione corporis ipsius arteriæ, plenitudo & durities (quanquam durities sine plenitudine esse possit, vt in hecticis annotauit Galenus lib. 1. de diff. febrü) vacuitas & mollities. Hinc constitutæ sunt differentiarum in pulsibus,

Ratione motus,	{ celer,	Ratione dilata-	{ magnus,
	{ tardus,	tionis,	{ paruus.
Ratione quietis,	{ frequens,	Ratione	{ imbecillus, seu remissus.
	{ rardus.	ictus,	{ fortis, vehemens.
		Ratione corporis	{ plenus, durus.
			{ vacuus, mollis.

Cap. vii.
lib. 4. de
loc. aff.

Quinque
in pulsu
obseruã-
da.

Porro in corpore arteriæ vel consideramus trinam dimensionem, vel corpus ipsum per se. Si priore modo, pulsum latum angustum statuemus, profundum humilem, longum breuem. Si autem posteriore modo duritiem seu plenitudinem spectamus, vnde pulsus plenus & durus, & vacuitatem seu molliem, vnde pulsus vacuus & mollis. In dilatatione autem magnitudinem & paruitatem considerandam diximus, quò pertinet observatio trium dimensionum. Nam magnus dicitur pulsus qui longus, latus, profundus simul est. Sed hoc ad corpus arteriæ referri potest, quatenus in hoc trinam dimensionem spectari diximus. A rhythmo differentia duci possunt, vt cum pulsus non est secundum ætatem, sexum laborantis, tempus. Innumera alia hoc loco considerari possunt, quæ quoniam à Galeno pertractata sunt abundè, horum diffusiore explicatione superfedendum videatur.

2. Secundum verò quod à nobis in hoc ægro est observatum, fuit partium extimarum perfrigeratio fugax: quæ reuera in morbis diligenter observanda est. nam partium extimarum frigus quoddam est positivum, sed periodicum, vt initio paroxysmorum, & tale frigus minimè est pertimescendum: contra verò timendum est in inflammationibus partium internarum cum calor intrò reuocatur, vt in Aphorism. explicat Galen. 3. Aliud frigus est veluti priuatiuum per quandam extinctionem caloris naturalis: & bifariam apparet, priore modo in morituris, cum partes liuent iam per necrosin partium frigus quoddam est priuatiuum: Aliud autè frigus, non quin partes non calfiant (quod Hippocrates *ἀπὸ ἀσθενείας* vocat) sed calefactio ista à calore febrili est. Victo autem naturali temperatòque calore partes refrigerantur, & tamen caloris febrilis fauorem nonnullū percipiunt.

De quo frigore iuxta ac colore reciproco dictum est ab Hippocrate: *Summe corporis partes si celeriter in utrumque mutantur, malum.* Nec abs re addit *celeriter*; vt videtur obiectio de hyeme, & calore æstiuo. nam in illa extimæ partes refrigerantur, sed non citò calfiunt. *Sed in morbis malignis*, ait Galen. in comment. *una etiam hora mutatio ad contraria percipitur: Contingit autem ea mutatio cum partes extima propriam caliditatem non habuerint, sed à calore febrili calfiunt, qui à centro corporis incipiens, flammaeque similis corpus depascens extrema concalfacit: & cum ille febrilis calor transpirauerit, refrigerantur extincta scilicet propria caliditate. Et illic est frigus pri-*

Part. 18.
sect. 2. lib
Præterbet

natium: non tale quale in morte, sed proximè accedens. De
 eodem frigore dictum est à Galeno in historia de Pythione. Hist. 2.
lib. 3.
Epid.
 Nam primo die iagens febris erat & æstus: secundo autem ei
 partes extima refrigerantur, præsertim manus & caput, & erat
brevis, ad verbum *brevis spiritus*, cui consentit quod & octavo
 die contigit; nam dicit, *spiritus exilis & imminutus*. Si itaque fe-
 bris erat acuta, cur frequens & magnus non erat spiritus? saltem
 si frequens sit & brevis, dolorem significat supra septum trans-
 iersum: sed si frequens & brevis, malus; deterior si rarus & bre-
 uis, siue parvus; qui si cum respiratione quadam siue potius ex-
 piratione frigida sit, iam facultas vitalis emoritur: In acuta
 parvus rarus, qui *brevis moris* nomine includitur, pessimum signū
 est. Hoc explicat Galenus commentario illo in historiam de
 Pythione, his verbis: *Causa cur cum primo die acuta febris fuerit, se-
 cundo breuem spiritum ducat, est, quod primo die calor febrilis per pu-
 trescentes humores accensus ipse digeratur; calor autem naturalis adeo
 infirmus relinquatur, ut iam prius extinguatur, quam febrilis de integro
 accendatur, velut iam feruescētis, qui cōpatrescerent, succis*. Sic secu-
 nda die dominantis frigoris signum est maximum. Quo ex loco
 patet refrigerationem partium extimarum per extinctionem
 caloris naturalis contingere. Atque hoc loco quæstio dignissi-
 ma cogniti poni potest, Si mutatio in calidum & frigidum par-
 tium extimarum adeo perniciose est, ut ante ex lib. 2. Protrhi-
 docuimus, cur non æquè in malis ducenda mutatio in vtrum-
 que in corpore toto? At ex Aphorismis mutatio in corpore vni-
 uerso, ut corpus modò calfiat, modò refrigeretur, longitudi-
 nem tantum morbi significat, cur non & idem significat partium
 extremarum *metaboli*? At antè docuimus aliquid multò grauius
 designare. Et verò probabilius est plus subesse periculi si am-
 bigua ista mutatio totum corpus attingat, quam si partes tan-
 tum extimas. Etenim etiam in bene habentibus facile manus,
 pedes, nasus mutantur, non ita facile corpus reliquum, ob sub-
 lecta viscera calida. Quod si totum corpus modò calfiat, modò
 aliter afficiatur, non vacare videtur periculo. At ita respondere
 oportet: Cum Hippocrates celerem partium extimarum in v-
 trumque mutationem damnat, id de febribus acutis intelligi
 debet, in quibus si omninò partes extimæ refrigerantur, reuo-
 catio caloris ob phlegmonem visceris significatur: si verò in
 vtrumque partes mutantur, dominatus caloris febrilis signifi-

catur, & domatio extinctioque caloris blandi & naturalis. Ideo cum Galenus in Comment. in partic. illam 8. lib. 2. Prorrheticam illam mutationem explicat, meminit febrium malignarum, utpote in quibus peculiariter id symptoma contingat. Sed cum lib. 4. Aphorismor. totius corporis mutationes in calidum & frigus damnat, reuera non intelligit de febribus acutis. Nec enim facta mentione febris absolute enunciat mutationem ista longitudinis morbi esse argumentum. At si in acuto morbo contingeret, non est credibile longi morbi signum esse, cum id pugnet cum natura morbi acuti. Quod si mutatio in utroque toti corpori conueniat, quis dubitat ad malum id non apparere in morbo acuto? Immo forte maiorem perniciem afferet quam mutatio reciproca partium extimarum. Tamen ^{ut Hippoc.} mutationis signa in partibus maxime extimis apparent, ideo illarum Hippocrates precipue meminisse solet. In febribus autem non acutis, aut aliis morbis totius corporis mutatio longitudinem morbi designat, ob materiae ^{inter se} diuersitatem. Quod videmus vsu venire in febribus cum catarrho iunctis, in quibus sensum caloris modo habent aegri, modo sensum frigoris, non modo in partibus corporis extimis, sed etiam in toto corpore ipso. Item in febribus epialis non solum est sensus caloris & frigoris simul, in quo Epialis natura consistit: sed etiam mox calor percipitur, mox frigus. ¹¹ Praeterea ex sententia Galeni, quicumque sunt cacochymi, dum repente incalescunt, horrore tenentur, nec non sensationem habent reciprocam caloris & frigoris: & tamen haec non significant malum aliquod, sed tantum longitudinem morbi. Ceterum ut de mutatione ista caloris & frigoris aliquid statuatur, sciendum idem esse iudicium de caloris & frigoris mutatione, quod de frigidis sudoribus, de quibus in Aphorismis. Nam ut frigidi sudores cum febre acuta perniciem significant, & in mitiori febre morbi diurnitatem: ita & mutatio in utroque siue sit extimarum partium, siue totius corporis in acutis morbis perniciosum est quid: in aliis morbis aliud significat. Sed de vicissitudine ista caloris & frigoris, unde, & quid significet, antea dictum est plenissime. De ea plura qui volet, eo animi, seque ipse conuertat. De lassitudine quae aegrotis nostro aderat, ita dicere possumus: videbatur non esse spontanea; siquidem labores quos summos pertulerat, eam lassitudinem satis poterant inuehere, ¹² tamen erat & alia quaedam species ex iis lassitudinibus quae spontanea dicuntur. Ac

Commi.

part. 26.

sect. 3. lib.

6 Epid.

4. Apho.

primùm spontaneæ lassitudines dicuntur sponte natæ, nō quòd
 non sit causa aliqua, sed causa intus latet aliqua lassitudinis spe-
 cie sese proferens; non autem procatarcticum quid habet: ta-
 met si fortè ab extra aliquid peti possit: sed tamen de essentia
 ipsius lassitudinis non est. Ex libris sanit. tuen. & Aphorismis, *Com. in*
 triplex est lassitudo; vna tensiua, vlcerosa altera, tertia phleg- *aph. 5. lib*
 monodes ex vtrisque orta. Tensiua à plenitudine est, vlcerosa *2.*
 à cacochymia. Phlegmonosa ab vtraque causa est, ex sententia *Cap. 6. lib.*
 Galeni. Febris autem laboriosa aliquid aliud peculiare habet, *3. sanit.*
 vt ex eodem Galeno parère potest. In hoc ægro nostro erat *tuend.*
 lassitudo quædam phlegmonosa. & cum is integrâ olim sanita- *Com. in*
 te fruitus esset, non nisi magna de causa desanitationis statione de- *part. 2.*
 trudi potuit; vnde mirum non fuit si morbus admodum lon- *sect. 4. lib.*
 gus & periculosus fuerit: Et omnia initio ita cruda fuerunt, vt *6. Epid.*
 nil aggredi tentare que auderemus. Tamen quoniam omnium *Com. in*
 minimè patiens erat æger, temerè secta vena, & multa tentata, *aphor. 3. lib*
 quorum nullum melius fuisset attigisse, sed negotij partem ma- *32. 33 lib*
 ximam naturæ commisisse. Eductus sanguis planè laudabilis: *4. Aphor.*
 nihilò sedatus æstus. Quoniam prima regio humore bilioso,
 crasso & veluti sanguineo aut prærubro erat offerta, cuius ex-
 clusionem facilem impediabat rigens hyems quæ tunc sæuiebat.
 Quod nos terruit, fuit veluti cruris sinistri maculæ subrubræ, ve-
 rebamur ne exanthemata eruperent, siue ecchymata ab humori-
 bus superfluis & tenuibus; vt notat Galenus lib. 3. Epid. Quæ *Com. in*
 exanthemata in plerisque sunt *part. 51.*
 Sileno parère potest. Cui cum lethaliter ægotanti papulæ ru- *sect. 3. lib*
 bentes, paruæ, varis similes, nec abscessum facientes erupis-
 set, naturâ morbo reluctantante, tamen interijt. Et tamen ait Galenus *3. Epid.*
 in Comment. ea eruptio causa fuit cur nono die non interierit, *38. sect. 2.*
 cum ei necessariò intereundum esset, sed in diem vndecimum *lib. 1. E-*
 mors dilatata fuerit. Dolor ad lienem metum afferebat, ne illic *pid. lib. 2.*
 abscessus fieret; tamen in inflammationis manifestæ argumenta nō
 erant. Causam istius doloris ad longam equitatione referre ba-
 mus, in qua ducuntur ilia, & anhelitus sæpe interrumpitur: ta-
 met si iste dolor hypochondrij sinistri nos in suspicionem tra-
 heret latentis cuiusdã mali; vt sæpe in Epid. annotauit Hippocr.
 in historia de Sileno adducta paulò antè & alibi passim.

De intermissione, aut potius intercalari intermissione ita nos
 philosophabamur. A plerisque qui citatis velocibusque equis

multum iter ocylsimè fecissent, accepimus se sæpe cùm quieti se traderent, inæqualitatem istam in pulsu percepisse. Nam exercitatio immodica tandem accersens *κίπν* aliud facit quàm mediocris: nam mediocris crebros, magnos & celeres pulsus facit; immodica autem, præsertim cùm ventum est ad resolutionem aliquam, languidos, tardos & raros facit. Sic in isto ægro animo voluebamus quí fieret vt præeunte tanto labore pulsus esset satis magnus & celer, cum ratione immodicæ exercitationis tardus imbecillúsque esse deberet. Huiusrei probabiles causæ fuerunt; Æstus ingens celeritatem requirebat, & ætas hominis adhuc virilis impediēbat quominus tarditas & imbecillitas in pulsu esset, cùm tamen satis esset causæ cur & paruus, & tardus, & rarus esset pulsus, præsertim in tanta totius corporis agitatione immodica & veluti confractione. Sic æstus ingens, ætas hominis pro paruo magnum, pro raro frequentem, pro tardo celerem satis pulsus induxerunt: sed tamen causæ morbificæ & lassitudo & exercitatio immodica corpus frangēs saltem inæqualitatis auctor fuit: & natura retinuit celeritatem & magnitudinem, sed à tot causis tentata non potuit efficere quin inæqualitas foret. Accedebat autem maximè obsidio oris superioris ventriculi quod in isto homine omnium maximè bilioso exquisiti erat sensus: & à bile immodica tentabatur, vnde *κίπν* frequens: & morbi euetus satis abundè docuit tanto æstu & copiâ humoris biliosi corpus occupatum fuisse, vt nil supra. Docuimus autem antè (ni fallor) obsidionem oris ventriculi vel ab humore frigido, vel ab acri humore, aut ichore inæqualitatem in pulsu committere. Vnum prætereà fuit quod terrorem attulerit, minxit sæpe oleosum, quod summo estui interno acceptum ferebatur. Historia duodecima lib. 1. Epid. sect. 3. Hippocrates meminisse excretas esse vrinas oleosas, quas mortem significare ait Galenus in Commentario. Tamen in 3 de morbis vulgaribus locus est præclarus, quo docet excretionem vrinarum oleosarum malam quidem esse, sed non perinde exitiosam, vt plerique autumant: multaque illic de vrinis oleosis legere possis quæ in communem vsum afferri possunt, quoties illis de rebus erit cogitandum.

*sub fin. 1
Epid.*

*Histor 1
sect. 3. lib
3. Epid.
Vide par.
35. lib. 2
Prognost*

Potro in ægro proposito cùm subesset æstus ingens præcordiorum, omni ratione prouisum est ne vires illud incendium quæteret. Iusculis frequentibus vitalinis carnibus ei consultū est:

est: Item clysteribus & iisdem decoctionibus. In enematon frequenti vsu statum est, nec olea, nec mel, nec saccharum dissoluebatur. Quoniam quoties aluus inferior æstuat, feruet, & ambusta est, vt loquitur Hippocrates in libro de aëre & locis, à pinguibus & oleosis est temperandum. Perseueratum est in vsu catholiconis. Tandem sub finem consultum est ventriculo vsu confectionis de hiera dupla aloë. Instabilis admodum morbus fuit, verebamurque ne ex empyreumate prioris morbi febris quartana, aut alia similis cresceret ac surgeret. Ad fitim summam cum partium imbecillitate quæ sequuntur præscripta fuerunt.

℞. semin. psyll. ℥ s. mastich. ʒ ij. car. passul. ℥ j. sem. cyton. ʒ j. fiant roduli, mandantur macerati aqu. rosar.

℞. aqu. fontana lib. s. destill. restaur. ℥ iij. aceti alb. ʒ vi. mellis Narbonens. ℥ j. santal. alb. ℥ ij. s. fiat decoct. ad tertia partis consumptionem, & perfectam despumationem. Postquam refrixerit, coletur, & clarificet ʒ. albuminib. onorum, & santal. citr. & cinam. aromatizetur.

℞. endiuia vtriusque, cichorij, boraginis vtriusque an. m. j. Depurentur succi, & coentur trinâ vice ad clarificationem.

℞. succi pomorum redolent. ʒ vi. sacchari lib. j. fiat syrupus semicoct.

℞. rhei infusi in aqu. endiuia ʒ iij. myrob. citrin. & Indorum an. ʒ ij. agarici trochisc. ʒ j. anisi ʒ j. cinam. ʒ j. fiat potio sæpe repetenda cum ℥ s. syrupi prædicti.

ANNOTATIONES.

1. In hoc agro biliosa crassa, sincera, flaua, maligna, vt vocat Galen. comment. in part. 14. lib. 3. Acut. progrediente morbo: quæquidem biliosa, siue retinentur mala sunt, siue excernuntur mala sunt; nam iactationes, dysenterias, defectiones animi inducunt.

2. Apud Galenum sub finem lib. de præsagitione ad Posthumum, commemorabilis historia est de quadam iuvene, cui in pulsu intermissio erat, & ea naturalis, à qua periculum impendere non putaret Galenus.

3. Nam minus est perniciosum inter multas pulsationes quandam inequalitatem esse, quam in vna. Quia in vna pulsatione magis ordinata, constansque natura debet esse, quod si ne in hac quidem multo est periculosius: tamen obiici potest de pulsu in febribus intermissentibus à putredine ortis. Nam cum systole sit diastole contractior, etiam in vna pulsatione inequalis est.

4. Inter ceteros locos vnus est maxime huc pertinens in Commentario Akakia in lib. I. ad Glapiconem.

5. Nam (ut verè dicam) vnde Cardiognus & sine febre, & cum febre nasci solet, inde ista in pulsu insignis mutatio: & humor potius exclusione eget, & aliquà ^{compunctio}, quam alteratione per alexipharmacas vt damnetur error eorum qui in morbis perpetuò illud ^{ἀξιόπιστα δὲ} con-stitiunt.

6. Cùm enim inæqualitas est, non ita citò terri terri oportet, nisi cætera consenserint. Si enim natura validè in aliis ipsius pulsus numeris argumenta adsint, non ita metuendum est.

7. Galenus cap. 6. lib. 4. de presagitione ex pulsibus, docet inæquales esse solere pulsus in affectione oris ventriculi, alios affecto fundo eius. Locus præclarus & huc maxime pertinens. Inæqualitas ista & etiã intermissio quædam ab oppressione & copia potest accidere. Et cùm Galenus ait inæqualitatem & intermissionem in articularum obstructione & asthma minùs esse terrificam; quod de asthma dixit. Idem potest audiri de infarctu pulmonum & copia pituitæ, licet homo ita repletus, quod forte latum habeat thoracem, non sit asthmaticus. Sic est vbi debet esse formidabile istud vitium in pulsu, est vbi non esse debet. Et ne quis terreatur, sciendum istas inæqualitates ab oppressione esse maxime. Nam Galenus lib. de pulsibus ad tyrones, inæqualitates in pulsibus propria sunt facultates presse & grauata. Sic oportet sensim deonerare naturam, & pulsui sua reddetur inæqualitas.

8. Trina dimensionis observatio & in differentiis corporis ipsius arterie & dilatationis obseruari solet, sed diuerso quodam modo. Nam quia dilatatio incidit in corpus tale quale est, cui competit trina dimensio. Itaque ipsius trina dimensionis observatio consideranda est & quatenus ad corpus arterie spectat, & ad dilatationem.

9. Sitis in eo erat implacabilis, iactationes, leipothymia, prærubabilis fuit excretio, non statim, sed longo tempore mitificata materia. Dolores fugaces. Verum fuit quod scribit Hippocrates lib. de veteri medicina, non à calore simplici, aut à frigore, sed ab amaro, acido, acri estimandos morbos esse; vt in vacuando potius, quàm in alterando laboremus.

10. Comment. in aphorism. 48. lib. 4. Multò verò apertius histor. part. 8. sect. 2. lib. 3. Epidem. cùm explicat cur partes extima læscerent & refrigerarentur. Quamquam Practici frigus initio paroxysmorum priuariuum dicunt per subtractionem caloris: & frigus positiuum dicunt, vt illud quod in catarrhosis percipitur, aut iis in quibus multus collectus humor pituitosus, qui dum incalescit sensum frigoris infert, vt in Epialis

videtur. Item materia frigidiuscula calfactio frigoris sensum infert.

11. Sicui egro unquam, huic Ioanni adenas accommodandum videtur quod scripsit Galenus ad historiam de Sileno 1. Epidem. sect. 2. Si quis laborando & operando se ad lassitudinem vsque affligat, potest autem largè, deinde intempestiuè sese exerceat, id est, aut à cibo, aut vbi tardiùs cocti fuerint cibi, antequam probè in sanguinem cibus versus sit, hic partim bilem ob labores acceruat, partim crudos & incoctos humores ex potu & intempestiuis exercitationibus. Sunt autem morbi multò grauißimi in quibus vtriusque magna colligitur copia. Immo ego addo, febres semiteritiane fiunt. Hic ager citatis equis multum itineris confecerat. Et nota in talibus febribus etiam initio sedimentum esse; sed conueniens non est & intempestiuum. Ita Galen. id frequens est (supp. sedimentum arvensi) febribus in quibus multus calor & flammens feruorem accendit quendã crudorum & crassorum humorum ad particul. 26. sect. 2. lib. 1. Epidem.

12. Causa procatartica solam diariam aut leuem affectum generat Galeno in histor. de Sileno.

13. Lassitudo que νότος dicitur, cum quis dolet minimo tactu, spontanea propriè non dicitur.

14. Cap. 4. lib. de atra bile docet quomodo salutariter totum corpus pustulis nigris fuerit obsitum. Nam si pauca sint, nil est criticum.

CONSILIVM LX.

De Epilepsia.

MVLIER nata annos iam sex & viginti, bene habita, oeties iam enixa, sagax, solertique aded ingenio & alacri ad obeunda omnia animi munia, blasa aliquantulum, coepit nonuulla pati symptomata, quorum perseuerantia morbum lunaticum minata est.

Ac primùm coepit animo aliquantulum deficere, vertiginosum quid pati: actunc non animaduertit quid dicat, omnique obliuiscitur. Multa temerè effutit, parum considerans quorsum illud. Cum hæc præcessissent, iam iam primã illã affectione vires nocte de nocte opprimitur, contremiscit, vociferatur, ac grauiter tunc laborat. Deinde quasi sopita manet dimidium horæ. Et frustra loqui conatur. Et quod omnium de-

332 CONSILIORVM MEDICINALIVM
terrimum, non ita pridem iam duodecies paroxyfmos quos dā
fufiinuit bis die in quibus illa conuellitur, fpumantique eft ore,
inclamat, fufpiratque. Et quo magis animo turbatur, eo citius
redit accessio. Iam probatum eft posteriorem paroxyfimum
multò leuiorem reddi, immò fæpè planè non repetere dato
iufculo ex decoctione vifci quercini. Nunquam medicamen-
tum fumpferat. Continenter aqua ab ore defluit: & in vltimis
paroxyfmis tota facies rubore fuffunditur, manentque veluti
exanthematon quædam veftigia quarto à paroxyfmo die.

Hæc funt Parifienfibus Medicis propofita ad difputandum,
vt de affectionis caufa, fpecie, loco, & curatione decerneretur.

Ac primùm omnium qui affuerunt Medicorum communis
fuit opinio mulierem hanc epilepfia effe obnoxiam, quòd om-
nia quæ præcefferunt videntur confirmare. Dubitatum eft de
caufa, an vapor tantùm, an humor, & quinam, vnde. Cùm enim
epilepfia in genere tres fint differentia, prima per propriam
cerebri affectionem, fecunda per confenfum ventriculi, tertia
ob partem peculiariter affectam à qua aliquid manat, conuul-
fionem epilepticam creaturum, magni refert ad morbi cura-
tionem, quænam fit fpecies, & quænam idea, & fedes primùm
affecta, ne parti alteri quàm deceat confulatur.

Ac primùm cuidam vifum eft, non à propria cerebri affe-
ctione natam epilepfiam, nec ab vtero effe, fed à vifceribus
ipfis: & quæcumque illa fit affectio, & vnde vis fit ei videtur
immedicabilis duabus de caufis: & quia iam grandæuam pre-
hendit: *Quæcumque autem affectio comitialis post 25 annum prehen-
dit, ea cum ægris confenfuit Hippocrati in Aphorifmis: Tum*
quia hæreditaria & gentilitia quodammodo effe videtur; Me-
dicis enim ea de re inquirentibus narratum eft eius mulieris
auum aliquando epilepfia prehenfum effe. Quod autem à vi-
fceribus fit, non ab vtero, aut à capite, ita collegit tribus ratio-
nibus; Primâ, quia fit fagax, expedito & folerti animo, inge-
niofa. At cùm quis eft epilepticus affecto primùm & per fe ce-
rebro, maximâ ex parte hebes eft, obtufus, obliuiofus, fociors,
ignauus, oculis concauis, fonniculofus, graui capite, vertigi-
nofus, & nullis fignis præeuntibus (vt in hac muliere contin-
git) ftatim concidit. At qui ob affectas partes capiti fubiectas
eft epilepticus, non ftatim concidit, fed pleraque patitur tan-
quam futuram accessione præfagientia.

Secunda ratio est, quòd incubum passa sit sæpè, oppressio-
nem stomachi, animi quandam defectionem, suspiciosa fue-
rit; quæ omnia male affectorum viscerum aut à sordibus & hu-
morum inquinamentis implicatorum argumenta sunt: Non
quin dispositio sit in cerebro à parentibus contracta: sed causa
continens à cerebro non est, sed à visceribus.

Quanquam hæc magna difficultas oriri posset. Galenus cau-
sam præcipuam periclorum lib. 2. de different. febr. sub finem
statuit inuistam quandam cuique parti dispositionem, quæ no-
uâ occasione, vt nouo affluxu humorum sese manifestè prodit;
dico affluxum humorum, vel qui in parte ipsa generantur, vel
qui aliunde sunt. Exempli causâ, si cui hemicrania innata sit ob
prauam partis cerebri *dispositi-
onem*, non priùs solet repetere quàm
fortè ab ipso cerebro, aut partibus subiectis humor aduenerit
qui partem laceffat: an non tamen hemicrania per *causam*
dicatur. Sic, si dispositio in cerebro iam iam sit à parentibus
contracta, quæ tamen non priùs sese proferat quàm malignus
vapor crassus aut tenuis à partibus inferis venerit qui parti mo-
lestus sit: vnde exfuscitetur pars ad expulsionem vnde con-
uulsio sequatur: An non epilepsia ista per propriam affectionem
dicatur? Itaque ille sibi pugnat, qui dixit dispositiuam ipsam (vt
sic dicam) in cerebro esse, sed causam in præcordiis. Quanquã
excusari potest; nam reverã non repeteret paroxysmus nisi
impuritas viscerum concurreret. Et illud est quod Galenus di-
cit, epilepsiam post 25. annum agnoscere causam sui prauam
diætã:

Tertia ratio quã contendit ab vtero non esse, est quòd illa
vterum gerens tam sæpe nõprehendatur epilepsia, quàm cum
vtero non gerit: quod contrã contingeret. Nam si ab vtero
esset, cum fœtus meliorem alimenti partem absumat, relinqua-
turque impurius, impuritas ipsa iuncta cum prauo illo humore
qui supponitur mali autor (si ab vtero esset) reueheret paroxys-
mos, & malum malo cumularet: At tempore gestationis im-
munis ferè est. Acedit quod hysterica aliquando passa esset.
At nihil vnquam talè.

Nos autem qui hæc scribimus, ita disputationis & quæstio-
nis filum direximus.

In morbis modus generationis illorum est animaduertendus;
symptomata, eorumque successio, quorum omnium animad-

uersione ad rerum diagnosin peruenitur, & confusio deuitatur. Vertigines, tenebrosæ obuersationes & marmarygæ, syncope imago quædam, oppressio diaphragmatis, clamores, aphonia, symptomata sunt & epilepsiæ, & apoplexiæ, & syncopes cardiacæ, & aliorum morborû communia, & in plerisque obseruantur. Sed non satis est obseruare hæc, sed signa *δυσκολία* siue

*Com. in
parr. 2.
lib. 1.
Prorrhæ*

abundè est, sed quæ cuiusque rei propria, & partis, vt ideam morbi venari possimus. Exempli causâ; difficultas respirationis affectarum partium thoracicarum nota est, & peripneumonia, & pleuritidis, an sufficit hæc nosse? Nequaquam. Sed ad specialia magis descendendum est, vt hoc vel illud, huius aut illius rei sit vmbra, nota, significationis argumentum & signû. Quod hîc videre est, cum symptomaton concursus iste nihil adhuc certi afferat.

² Porro morborum alij citò generantur, cum tamen non tam prompta sit causæ generatio, quàm prompta est morbi ipsius apparitio. Causa enim latebat ignaua, & subitò per morbum sese expressit; quod notat Galenus ³ Epidem. in historia de eo qui primo die phreniticus factus est. Alij non statim se proferunt, sed veluti per ambages & circuitiones, habentque varia symptomata prius quæ sunt veluti paranympsi ac præcursores maioris morbi aduentantis. Quod cum aliàs, tum huic mulieri contigit, in qua per varia symptomata veluti præeuntia præludia ad epilepsiam munitur via. Nam in historia proposita triplex tempus obseruatur, & in vltimo tantum certa epilepsiæ signa apparuerunt.

Primum aliquid tenebrosum passa est, vt vertigines, quæ sepe apoplexiam, aut epilepsiam minantur: an verò per propriam cerebri affectionem, an per consensum dubitandum. Nam vertigo & tenebrosa obuersatio signum vniuocum non est aut affecti certò cerebri, aut ventriculi. Cum enim ex Galeno illud sit commercium inter ventriculum & cerebrum, vt facilè suas affectiones communicent, non facilè quis distinguet quæ pars prior afficiatur, & quæ posterior. Sic vertigo, nausea, vomitus, cardiogmus. Equiuoca signa sunt cum ferè æquè ad affectionem cerebri & ventriculi consequatur. In quo Medicorum iudicium fixum constansque esse debet, ne temerè pars incusetur quæ in vitio non sit. Præterea mulier ista multa effutiebatur, quod malè affecti cerebri nota est aut per se aut per consensum,

*Cap. 3 lib
3. de loc.
aff.*

Vnde nouimus hystericas multas risum in paroxysmo cohibere non potuisse, alias multiloquas extitisse.

Secundo verò loco hypochondriorum & respirationis quædam fuit oppressio, & imaginatio quædam falsa rei opprimentis & incubantis, quod incubum designat: incubus autem epilepsiæ rudimentum quoddam est: inamò & epilepsia nocturna dicitur à plerisque.

Tertio periodica quædam conuulsio apparuit totius corporis, cum læsione quadam mentis & sensuum. In quo verè character Epilepsiæ exprimitur. Nam conuulsionem totius corporis esse necessum est. ³ Quamquam Syluius quodam loco annotat vidisse se quendam Epilepticum cecidisse ob prauam lienis dispositionem, illumque vna tantum in corporis parte conuulsum fuisse. Ad superiora accedit occurfus spumæ quæ nec à capite malum esse certò declarat, immo nec Epilepsiæ signum vniuocum est. ⁴ Si fiat translatio à partibus inferioribus per pulmones, refractio materiei cuiusdam pituitosæ à spiritu statulento agitante spumam potest generare. Rondeletius contendit epilepsiæ certam non esse notam & signum inseparabile; quia spuma abesse potest in paroxysmo epileptico duabus de causis: tum si à vapore tantum est Epilepsia, tum si paroxysmus breuis est & non violentus.

⁵ Ergo verum illud Hippocratis, cum quis repente aphonos fit, venarum fiunt interceptiones & oppletiones, si sine occasione id fiat, aut forti aliqua causa, id est, si nulla excusatio afferri possit aut ictus, aut ægritudinis perturbationisque animi. Interceptio ista aut Epilepsiã, aut Apoplexiã, aut syncopè cardiacam inducere potest, item & histericũ *m. dos.* Nam quatuor hæc nomine *m. dos. aq. vitas* includi possunt. Cum itaque hîc sit aphonia quædam, quatuor prædictorum morborum vnum adesse necesse est. At certis signis deprehenditur esse Epilepsia.

6. Cæterum hæc aut præhendit pueros, aut puberes, aut iuuenes, aut grandiores ætate. Partic. 5. sectio. 1. lib. 6. Epid. locus est notandus de Epilep. cum, ait Galen. Epilepsia iuniores attingit illud vt ab ætate est, ita quoque mutatione ætatis affectus minuitur & tollitur. vnde Hipp. *Quibus morbi comitiales, ante pubertatem mutationem accipiunt.* Quod bifariam intelligi potest. Nam, *ante pubertatem*, possumus intelligere vel inclusiue, vel exclusiue, y tajiunt. Exclusiue ad annum vsque 25. in-

includit ad tempus adolescentiæ. Vnde apho. 28. lib. 3. non dixit *ante pubertatem*, sed, *in pubertate*; quod notandum. Iuuenes prehendi epilepsiã non placet Galeno in Aphorismis, licet ita Hippocrati videatur; quia, vt ait Galenus, temperamentum iuuenum generationi epilepsiæ contrarium est. Postea addit, si prehendantur eo morbo., id diætæ vitio tribui oportere, & quia prauo vtantur cibo, & multa intempestiue faciant. At grandiores ætate absolutè à diætæ vitio epilepticos reddi statuit, 6 Epidem. Nec amplius ætati fidendum ait ac si me dicam manum per se adhibeat, sed ad artis Asclepiadæ asy lum confugiendum esse censet; id enim à diætæ vitio est, immò tantum tribuit ipsi diætæ, vt epilepsiam ratione ætatis solui posse neget, nisi legitima sit victus ratio, immò ne si in pubertate ipsa epilepsia accedat (quia Hippocrates ante pubertatem mutationem contingere debere vult) quanquam tunc tantum opis ab ætate expectari non potest quantum antea: quia & tempus agnoscendæ veneris in viris supponitur iam præterisse, & menstruæ purgationis in mulieribus, tamen solui tunc posse putat Galenus si in diætata non peccetur. Quod fortè & generaliùs potest accipi, ne putemus omnem epilepsiam incurabilem esse quæ paulò grandiores prehendit. Nam mirum est tantum posse diætam ipsam vt miserandum hoc malum inuehat immedicabile planè, cum tamen hoc excepto, nullum ferè sit malum adeò graue diætæ vitio inuectum quod non possit emendari & tolli. Vnde colligere est morbum hunc cerebro labem quæ elui non possit, inurere, quod omnem humanum captum planè superet.

Itaque cum hæc mulier iam grandis ætate miserandi huius mali molestias senserit, id diætæ vitio tribui potest. Sed pace Galeni dicam, secretiorem & occultiorem causam esse oportet; nam nisi labem hanc à vetere sua prosapia contraxisset, mulierem tam benè habitam, tam solidam, & integrè sanam morbi procellis conflictari non solitam non esset credibile à nõnullo diætæ vitio tam turpiter in hunc morbum lapsam fuisse. Sic oportet vehementem aliquam fuisse causam quæ hoc symptoma antè non visum & insolens induxerit.

Duo hinc quæri possunt non omittenda, cum à parentibus propensitatem hanc in epilepsiam contraxerit; quæ fiat vt nihil epilepticum, senserit in pueritia, cum tamen hæc ætas huic morbo

Aph. 29.
lib. 3.

Apho. 7.
lib. 5.

morbo vltro sit opportuna. Posterius quod quæri potest, Cùm mulieres etiam maximè valentes, præcedente imprægnatione præfertim circa tertium mensem multis malis exercentur, boulimo, inappetentiâ, malaciâ, & ceteris id genus, vel capitis, lumborumque dolore; quî fiat vt hæc imprægnationis tempore paroxysmo epileptico non prehendantur, postea verò vtero non gerens faciliè prehendantur.

Quod ad prius attinet, reuerâ ex hoc praua cerebri dispositio patet, quòd grandior iam ætate epileptica facta fuerit. Nam si imbecillitas neruosi generis epilepsiæ causa fuisset in hac, nõ dubium quin puella epileptica fuisset: at latebat mala dispositio, nec se prædidit nisi quo tempore iam malum incurabile est.

Et quod sæpè pepererit nouies enixa potest partim impedisse quo minùs tam citò non sese epileptica diathesis prodiderit, quod purgationes euntes & ab epilepsia, & à podagra, & aliis morbis possunt ad tempus vindicare, quibus implicantur quæ nihil tale habent. Partim conferre potest ad augendam dispositionem. Nam nemo dubitat iuniores puellas nuptas, & frequenter enixas tantò imbecilliores reddi (quod ad cerebrum attinet) quantò frequentius enixæ fuerint: immò magna earum pars catarrhis, & doloribus capitis immedicabilibus detinetur. Quæ omnia verisimilia sunt. Prætereà vulgò obseruatur dispositionem morborum à parentibus contractorum non tam citò apparere, sed tandiu latere occultarique donec quid peccatum sit quod eius accessum maturet. Vnde plerisque gentilitia est elephantiasis, quæ tamen non sese prodit nisi cùm iam grandior ætas fuerit, aut quòd ita prouideat natura mali explicationem quoad potest, impediens, aut quo anno parentes in eum morbum inciderint, eodem & liberi inciderunt: quæ ratio probabilior est. Et cùm sese malum prodit, siue epilepsia, siue elephantiasis fuerit, non est opinandum illud iam demum nasci, sed mali seminarium diu latuisse, cuius argumenta tandem sese prodant. Tum autem maximè sese proferunt cùm mala accedit diæta, quæ etiam per se tale malum afferre potest, sed non ita immedicabile. Plerique enim nostrâ ætate epileptici verè fuerunt ob prauam diætã, at non recurrunt paroxysmi vbi prouisum cautumque ægro est. Sed cùm natiua est inclinatio à praua diætã facta, & veluti tandem explicata, ea multò immedicabilior est quàm quæ simpliciter à praua diætã fuerit. Et ita proba-

338 CONSILIORVM MEDICINALIVM
biles rationes à nobis videntur confictæ, vt tandem id intelli-
geretur quod in quæstione positum erat; Qui nimirum fiat vt
mulier illa iam ad epilepsiam nata ante annum ætatis suæ vice-
simum octauum prehensa non fuerit, ac præsertim puerili suâ
ætatulâ.

Posterio rem quæstionem paulò post explicabimus, si priùs
nonnulla remedia artulerimus quæ ad profligandam epilepsiã
per cerebri primariam affectionem contractam instituta sunt,
quorum hîc series est proposita.

Cuidam autem epilepsiã laboranti per propriam cerebri af-
fectionem remedia hæc quæ sequuntur sunt instituta: Primum
repurgatus est tabellâ vnâ electuar. diacarthami: deinde itum
est ad remedia sequentia.

℞ rad. pæoniae recenter euulsa ℥ j. visci quercini recent. ʒ vi. galan-
ga, calami aromat. & corr. citri sicci an. ℥. s. beton. meliss. hyssopi, salu.
maiora. chamæd. chamæpyt. an. m. j. buglos. borag. & vtriusq. cichor.
cum radicib. herbarum capill. an. m. j. s. rutæ & absynth. pont. an. m. s.
passul. sebest. an. par. x. seminũ rutæ & fesel. an. ʒ j. anis. & fœnic. an.
ʒ j. s. sem. callitrichi & pæon. an. ʒ ij. flor. stæchad. sambu. rorism. & ge-
nist. an. p. j. fiat decoctio, & fortis express. Cape de colat. lib. j. s. sacch.
quod suff. oxym. scyll. ʒ ij. pulu. diamb. & diamosc. dulc. an. ʒ ij. fiat
syrupus pro 4 dosibus.

℞ mas. pil. coctiarum fetid. & assajereth. an. ʒ j. agar. troch. &
rhei an. ʒ s. rad. & sem. pæoniae decrescente lunâ collectæ an. ʒ j. castor.
pinguis ʒ. B. cum syrup. de stæchad. fiat maza ad vsum.

℞ maza prescriptæ ʒ j. formentum octo pilula cum aqu. vita. capiat
finito syrupo predicto.

Deinceps bis in mense aut singulis viginti diebus cap. de maza præ-
scripta ʒ s. de qua formabuntur pilula tres vel quatuor. deglutiet eas post
primum somnum.

℞ succi betæ & maioranæ an. ʒ j. mellis anthos ʒ ij. decoct. hordei in-
tegrè cocti ʒ viij. fiat caputpurg. quo vtatur secundum artem per tres
dies continuos manè ore aquâ pleno.

℞ theriac. Monspel. quinque annorum ʒ ij. rad. pæon. & sem. eiusd.
an. ʒ j. visci quercini, & cineris cranij humani an. ʒ j. coralli rubri vsti
& loti aqua absynth. vngul. alc. an. ʒ s. cum syrup. conseru. citri. fiat
opiata, de qua capiat ceteris diebus ad molem castanæa tribus horis ante
annem cibum.

℞ ol. costi & nard. an. ʒ j. ol. nucis mosc. ʒ s. rad. & sem. pæon.

vifci querc. sem. fefel. an. ʒ j. gummi ammon. aceto scyll. soluti ʒ j. f. eeta quod suff. fiat unguen. ungetur occiput ad radicem colli horâ somni, addendo vntionis tempore aque vita parum.

℞ aloes ʒ ij. rhubarb. ʒ ij. pula. rosar. & folior. salu. an. ʒ s. cum syr. de strachad. fiat maza vtenda quotidie vnâ horâ ante cibum.

Applicetur ruptorium postica parti capitis, hietque vlcus per tres aut quatuor annos.

Hæc velut per transfennam dicta, scriptaque sint, retexendum orationis filum est, quod horum remediorum scriptione interruptum est.

Ex duobus quæ discutienda proposita sunt, vnum satis pro animi voto explicatum est, secundum autem nunc restat explicandum; nimirum quæ fiat vt hæc mulier cùm prægnans esset, non ita facile epileptica concideret, ac cùm vtero non gereret. An hoc significat aut vterum in vitio esse, aliquidque conferre ad epilepsiam, aut contrâ. Nam si vterus faciat ad paroxysmum epilepticum, cum concepto semine humorum veluti fiat concussio, deinde quædam ob suppressionem putredo, vapor qui inde efferretur plurimum ad epilepsiam cõferre videretur. Sed hæc plurimum habent difficultatis.

*Mulier
vteru
gens non
conuelli-
tur, non
gerit, fa-
cile con-
uelli-
tur.*

Ac primùm aliquid non longè dissimile legere possumus apud Hippocratem. Nam scribit in Pheris mulierem extitisse cui caput valde condoleret, idque multo tempore dolor is nullâ ope medicâ leuabatur. Cùm irent menses, leuius habebat; cùm concepisset, dolores relinquebât. Noui quoque & mulierẽ veterem hemicranjâ laborantẽ cùm frequenti cardiogmo: ne minimũ quidem appulsum caloris, aut frigoris, aut fumi ferre potest quin doleat, dum fœta est, alacris, iucunda, & immunis ab omni est dolore. Item Auicennas cap. ii. lib. 3. fen. 21. tract. i. citat ex Hippocratis lib. de superfoet. mulieribus sæpè nõ gravidis crurum & lumborum dolores oboriri, qui concepto fœtu in vtero cessant; quia, inquit Princeps, per conceptum partes illæ calfiunt, hinc dolore liberantur. Legi librum de superfoetatione, & illo loco Hippocrates non tantum meminit doloris lumborum, sed & capitis, & aliarum partium. Verba eius sunt; *Si dolors in coxendice mulieri contigerint, aut in capite, aut in manibus, aut aliquâ aliâ corporis parte, & cùm prægnans est deserint, post conceptum ab vtero exolutum, si repetunt, huius odorata ad vterum suffire conuenit, & bibere quoque expedit.* Quibus ex verbis colligere est

s. Epis.

*Hip. lib.
de super-
foetat.*

istos dolores redeuntes post partum, in conceptu desinentes, ante conceptum affligentes, originem sui agnoscere in utero: alioqui enim Hippocrates non consulisset suffitum ad uterum, sed singulis partibus prouidisset quæ laborant. Hoc itaque argumentum esse potest, uterum in hac muliere epileptica conferre aliqui dant istam perniciosam affectionem. Etenim dictum est tardius paroxysmum experiri, aut omnino non experiri cum utero concepti: cum foeta non est facile ab eodem corripitur.

Et illo prædicto loco lib. 5 Epidemiorum, quo proponitur historia de muliere doloribus capitis cum utero non gereret, conflictari solita, eadem ferè cum iis quæ lib. de superfœtatione scribuntur, recenset: nam ait odoratis ad uterum appositis iuuari, & euntibus mensibus. Sed iam quæramus de istis doloribus quomodo imprægnationis tempore leniri, aut tolli possint. Si dolor iste capitis (idem postea dicemus de epilepsia, cuius ergo hæc instituitur disputatio) primarius est in capite, tantum abest ut sedari possit grauiditatis tempore, ut contra adaugeatur. Nam per conceptum calefit uterus, ut ex Auicenna antea docuimus, reuocatio fit caloris ad centrum, & præsertim ad uterum, partes reliquæ sunt quodam modo destitutæ fauore caloris & spiritus influentis, declarant & frigiditas partium extimarum in foetis mulieribus, & earundem decoloratio. Sic duo sequuntur incommoda in capite: prius quidem quod frigidius sit solito, & propterea infirmius, & ad propulandas morborum molestias imbecillius: posterius uero quod calfactus uterus præ ceteris partibus, facta inibi humorum & spirituum quadam coitione & ueluti cõsulcatione, innumeros penè summittat vapores in caput grauiditatis tempore, qui vapores maligni erunt, quia humores à quibus excitantur magna ex parte uitiosi sint, naturam quippe magis sanam humorum partem in foetus alimentum consumente. Itaque si frigidius sit caput in conceptu, si opportunius vaporibus ab utero manantibus; si quidem epileptica dispositio est in cerebro, & materia eiusdem, credibilius erit tempore grauiditatis facilius paroxysmo prehendi, cum eotempore tot symptomata tentent grauidas, malacia, anorexia, & alia penè innumera quæ alio tempore non pullulant. Unde & Fernelius notat multas mulieres epilepsiam prehendi solitas cum utero gerunt, & foetu excluso nunquam aliquid tale patiuntur. Sed dicat aliquis: Sic ita fanè, ab

vtero aut capitis dolor, aut epilepsia ipsa oriatur, vt idem contingat mulieri quod & ei à cuius crure aura infecta veneno sensim ad caput efferretur, an non & grauiditatis tempore facilius recurreret paroxysmus? ¹⁶ Nam eò confluunt multi humores, calescit vterus; hinc vaporum ilias, prauis sese implent cibus grauidæ, sic & à praua diæta, & à conculcatione humorum in vterinis partibus videtur vterus facilius posse reuehere paroxysmum quàm cum foetu non impeditur. Reuerà tamen secundùm opinionem Hippocratis credibilius est mulierem epilepticam esse ab vtero aut præcordiis, quæprehenditur paroxysmo facilius vacuo vtero, quàm pleno. Nam si affectio epileptica & materia in cerebro esset, tempore grauiditatis facilius corripiretur, vtpote cerebro imbecilliore reddito & frigidiores; sed quia in vtero aut ab vtero est, tempore imprægnationis quasi conclusio fit, & implicatio humorum, immò & si qui vapores à præcordiis efferri solebant, facto veluti materiae recursum ad vterum, non tam facile feriunt, seseque produnt. *Cap. 3.
lib. 5. de
partium
morbis.* Quam videtur probabilis ratio prius per dubitationem adducta, quòd nimirum si ab vtero esset, per imprægnationem facilius recurreret. Vnde obseruatum à Fernelio epilepsiam ab vtero grauiditatis tempore prehendere, ideòque visas à se plerasque mulieres quæ quoties vtero gestant epileptica corruunt, expeditas verò nunquam id experiri.

Sed hæc disputatione multò longius produci possent, quorum tamen non prætermittenda fuit obseruatio, cum plurimùm interfit à qua parte prima mali labe; ne temerè pars vna pro altera remediis oneretur ac fatigetur. Quidam ex Medicis diætæ & humoribus prouidendum putauerunt, alij ad vterum & caput confugerunt, alij ad hepar cuius calidi temperamenti argumentum est efflorescentia quorundam exanthematon, & suffusio faciei post paroxysmum etiam stabilis.

Nos quatuor causas mali assignabamus; innatam in cerebro infirmitatem, & veluti gentilitiam, quòd eius auus epilepticus interiisset. Accedit & subtilitas, sagacitas, agilitasque cerebri quæ sæpè de facili epilepsiam accersit, vt Rondeletius annotat, quòd substantia cerebri raræ sit contexturæ, & delicata admodum. Vnde qui ita affecti sunt facile cœcutiunt ob igneam spiritus animalis naturam quæ facile afficitur, vertiginosi sunt, & præcipitia sine periculo intueri nequeunt. Sic epileptica dif-

positio in cerebro est, sed non propterea causa materialis, nempe frigida & lenta pituita. Secundo, praua victus ratio, & quod nunquam medicamentum sumpserit. Nam si sibi arte medicâ consulisset in diæta & pharmacis, malum fortè interuertisset. Tertio, partium subiectarum consensus: nam breuitas paroxysmi à vapore solo malum esse natum significare potest. Et quod frequens sit saluatio, id à cerebro esse potest, & à ventriculo malè coquente. Vnde qui laborant melancholiâ hypochondriacâ facilem habent saluæ in os occursum.

Com. in
apho. 16.
lib. 3. 8.
com. in
apho. 45.
lib. 2.

Quod ad curationem spectat, illud obiter monendum, non valde probari vsum rerum impensè calidarum & attenuantiũ. Nam siue à crassa viscidâque materia est epilepsia, vt placet Galeno, siue à flatulenta materia & acri non valde ex vsu sunt ista. In priore quidem, quia in flatum conuertent. Vnde quidã dicunt radicem apij ideò in epilepsia interdici, quòd materiam acuat, & proinde malum suâ tenuitate adaugeat. Quod si verũ est, quod dicemus de euphorbio, castoreo, sagapeno, scamoneo, & alijs id genus in epilepsia præscribi solitis. Alij dicunt non eâ ratione cauendum esse ab radice apij, sed quòd tota substantia in hoc morbo nociua sit. Si à flatulenta aut acri materia est, præsertim si ab acri, multò etiam minùs conueniẽt ista calida. At omnem ferè epilepsiam à materia quadam acri principium neruorum impetente oriri vel hoc argumento confici potest. Magna est affinitas & *αισθησια* inter sternutationem & morbum caducum: immò hoc discrimen statui volunt, quòd cum eadem vtrique sit materia, in morbo caduco natura inferior sit causa morbum faciente; in sternutamento verò exaduersum; natura quippe humore superior est. Vt sternutatio minoris cuiusdam epilepsie naturam & ideam referat. Atqui ex Galeno, *Sternutamentum non fit si quis humor in capite superfluat, sed si flatulentus sit, aut mordax.* Vnde si à quauis materia frigida sternutaret quis, comatosi & veternosi sternutarent, at id non fit. Idem ergo de epilepsia intelligi debet. Et idem est argumentum Ferneli vt conuincat epilepsiam à pituitoso non esse humore. Sed huius argumenti primus autor est Galenus.

Com. in
apho. 51.
lib. 7.

Lib. de
morbo
acro.

Vt mulieri epilepticæ prouideretur, iis quæ sequuntur remedijs innixi sunt Medici ad præcautionem, & curationem, si eius spes nonnulla sit, quæ tamen perexigua est. Nam cum auo nata sit epileptico, probabile est labem aliquam contraxisse, quæ

tempore detecta fuerit: quod primus obseruauit Hippocrates, qui à primordiis generationis epilepsiæ gentilitiæ originem repetit. *In utero, ait, priusquam cerebrum conformetur, oportet quodammodo florescere, purgari, ac desiccari. Si neque magis nec minùs repurgetur quàm oporteat, sanum animal existit: si magis repurgetur, ac siccet colliquatio quædam tinnitus aurium contingunt; si non satis repurgetur, in epilepsiam propensio contingit.* Hæc Hippocrates. Et alio in loco inueteratæ epilepsiæ nullum remedium quærit; quia, inquit, cerebrum eroditur à pituita, & eliquescit. Id quod autem colliquatur aqua fit, quæ cerebrum circumalluit: & ita perpetua est generatio & fomes morbi, tum quod ad diathesin ipsam pertinet, tum quoad materiam & causam morbi coniunctam.

Ac in remediis ipsis maximè rerum non naturalium ratio habenda est aëris & cibi. Cibi quidem, quod improba victus ratio ad generationem & productionem morbi plurimum conferat: immò (vt antè docuimus) in grandioribus, cum eos non antea prehenderat morbus, comitialis affectionis causam agnoscit Galenus 6 Epid. & in aphor. improbam diætam. De aëre autem nemo dubitat quin hic magni sit momenti. Vnde Hippocrates agnoscit vetos primùm ad morbi generationem, & paroxysmorum recursum facere: Eodemque in libro scribit cerebrum esse interpretem eorum quæ in aëre fiunt, quia cerebro ipsi sapientiam aër exhibet. Quod in eo sensu accipi potest: Inter partes corporis aëris aut molestias, aut eiusdem benignitatem sentit. Vnde plerique præsentunt mutationem aëris, aut serenitatem, aut tempestatem. sic cerebrum in iis internuncius est aëris. Multa eodem loco cerebri dignitati attribuuntur, quæ hic recensere est alienum. Nunc ad remediorum sylum properemus.

Viuat abstemia secura, vitet omnem tristitiæ occasionem, aëre libero, serenòque viuat, perflabilem locum incolat, vitet palustria, lacustria, diùm, & cetera id genus. Primo vere post purificationem aperiatur vena basilica dextra.

Sunt qui in epilepsia locum secundæ venæ esse negent, quod rarò fiat à sanguine, rariùs à bile. Immò Hippocrates pituitosos solos videtur statuere huic morbo obnoxios: quod mirum tamen est. Galenus vult mitti sanguinem in epilepsia ex cruribus petiùs quàm ex cubito, idque ad faciendam reuulsionem è parte quæ certò afficietur, nempe è capite. ¹³ Loquitur autem

Lib. de morbo sacro.

Lib. 6 fac. 10 bo. Lib. san. 1 c. 19

illo loco de præcautione: & quod intelligitur de imminente morbo, aliud est imminere morbum qui certò hanc aut illam partem sit obsessurus, aliud imminere in orbem, de quo non constet adhuc quamnam partem obsidere debeat. Vt puta, cum indifferenter modò alicui caput, modò pes, modò hæc aut illa pars, aut totum corpus doleat, cum sectio venæ suscipitur sine vlla distinctione, aut è maleolo, aut annulari digito, aut è gibbero mittetur sanguis aut scarificabitur. Sed si certum ratumque sit de parte occupanda, vt de capite in epilepsia, ad præcautionem ineunte vere è maleolo detrahetur sanguis. Sed magna controuersia oritur, num epilepticos feces ex vena cubiti, quod ita probatur: Galenus & Hippocrates aiunt, in imminentibus morbis per distantiora reuulsionem esse procurandam: in præsentibus per locum proximum. At eadem est fors, & conditio morbi iam præsentis & morbi imminenti, qui certò partem hanc aut illam est occupaturus. Ergo si in præsentem morbo vt epilepsia è cubito sanguis ducitur, quia dolorum proximum ventrem secare oportet, sequitur vt in eadem epilepsia imminente; quia de obsidione capitis certi sumus, eadem quoque vena cubiti prudenter feriat. Quod autem eadem sit conditio morbi præsentis, & eius qui imminet, dummodò certum sit hanc partem obsessum iri, ita ex Galeni verbis eliciemus:

Gal. cap.
16, lib. de
sanguin
miss.

Hippocr
lib. de of-
fisiu natu.
E. sect. 6
lib. 6. E.
pid.

Cap. 19.
lib. de sa-
guin. mis.

*Quibus pars aliqua, nisi euacuati fuerint, infestatur certò, non eque ex
quavis particula vacuabis (ac si de parte laboratura non constaret) sed
perinde atque in iis qui iam laborare incipiunt. Et miror quomodo
dicat postea: Ergo epilepticos & vertiginosos ex cruribus vacuabis.
quod non videtur agendum. Affectiones enim hæc cum sine vlla
controuersia capitis sint è brachio potiùs tanquam è propin-
quiore parte, videtur detrahi debere sanguis. ¹⁴ Cum futurus
Comitalis sit curandus, ac si iam actu laboraret. Reuerà si cu-
randi scopus est, & vacuandi consilium, non est dubium quin
in epilepsia è gibbero detrahendum sit: sed si præseruare, præ-
cauere, ac reuellerè tantùm animus est, è longinqua parte re-
tractio fieri debet. Sic enim non fit magna repenti mutatio, &
consuetudo tandem mutatur, ne amplius eò feratur sanguis.*

Consultum est vt os quotidie manè lauaret aquâ, in qua sal-
uia, aut rosmarinus maceratus esset, aut viscus quercinus. Te-
neat in ore passul. corticem citri conditi, caryophyll. vel for-
mulas has.

℞ pulu. caryophyll. gr. vj. nucis moscat. galang. cypp. mastich. an. ʒss. cabeb. ʒj. piper. longi ʒss. Excipe in gumm. tragac. infuso in aqua rosismar. aut decoct. eius, addendo parum sacchari. Fiant trochisci. Utatur massapanis post pastus, pane biscocto, & puluere.

℞ puluer. electuarij aromat. ros. diarrhodon abb. letitie gal. an ʒj. rasura eboris, cornu cerui vsti an. ʒss. cranij humani, visci quercini, sem. pœonia, & ocimi an. ʒj. sacchari in aqua melissa soluti. Fiat electuar.

℞ rasura cornu cerui ʒss. cornu cerui vsti ʒj. rasur. ebor. ofis de corde cerui an ʒj. sem. pœonia maris, visci quercini an. ʒss. sem. contra ʒj. s. rhei barb. electi & agarici albi an. ʒij. sacchar. albi duplum. Capiat cochlear vnum quolibet manè.

℞ coriandri conditi vnus coopertura ʒj. ambræ gris. ʒj. coralli rubri ʒss. sem. anisi & fœniculi conditi an. ʒij. puluer. ros ʒss. rasura eboris, cornu cerui an. ʒj. cinam. ʒss. cum saccharo. fiat puluis utendus à pastu.

Fricentur quotidie crura, & iis aliquando applicentur cucurbitula. Utatur clystere qui sequitur, saepe.

℞ origani, calam. satureia, buglos. borag. mercur. an. m. j. rad. alth. ʒj. semin. cumi, seseleos, ruta & pœonia an. ʒj. s. folior. sena ʒij. fiat decoct. ad lib. j. In colat. dissol. mellis mercur. sacch. rubr. an. ʒj. catholici, & confect. hamech an. ʒss. butyr. recen. ʒij. fiat clyster.

℞ aloes ʒij. mastich. ʒj. diamb. ʒss. rad. pœonia, visci quercini, an. ʒss. corall. rub. gr. vj. ambræ gris. ʒss. pulu. hieræ ʒij. pilul. cocciarū & fœtid. an. ʒj. s. agar. & rhei an. ʒij. cum aqua decoction. radice angelicæ & pauco zingib. fiat maza pilul. utenda. Decimo quoque quinta die: aliquando serò, aliquando horâ quartâ manè. Vel loco pilularum accipiet aliquando de syrupo sequente.

℞ omnium capill. m. j. chamædr. chamæpit. an. m. j. lupul. prima veris an. m. j. s. absynthij pont. m. s. scolopen. ceterach, agrimon. hepat. buglos. borag. stæchad. vtriusque an. m. j. semin. ruta, iunip. sesel. pœon. an. ʒj. s. radice omnium aperitiuar (præter radicem apj) in vino albo aut aceto scyllitico maceratar. an. ʒj. passul. ʒj. visci quercini & polyp. an. ʒvj. rad. pœon. ʒj. pulu. cranij human. ʒj. s. folior. sena ʒij. sant. citrin. ʒij. fiat decoct. addendo sub finem agar. recen. trochisc. ʒj. s. turbitih gummosi ʒss. zinziber. ʒss. express. ʒvj. rhuarb. infusi cum cinam. & nuce mosc. in parte decocti, cum oxymel. scyllit. & syrup. de hyssop. & stæchad. an. ʒj. sacchari suffic. quantitate. Fiat syrupus aromatizatus nucè moschatâ: utatur ad ʒij. aut ʒij. s. cum decocto passul. & visci quercini.

℞ rad. pæoniæ. lap. acut. an. ℥ij. chelidon. petrosel. aspar. gram. polyp. ireos flor. an. ℥s. chicor. m. j. rad. enula campana, acor. cyp. semin. anisi, fænic. cus. melon. an. ℥j. stœchad. arab. ℥vj. semin. pæonia ℥s. beton. meliss. scolop. vng. caball. hyssop. an. m. j. summitat. absynth. & aneth. an. p. s. Fiat decoct. ad lib. j. in qua infunde folior. sena ℥iij. agar. ℥ij. dissol. sacchar. quod suff.

℞ pulu. diarrhod. ℥ij. coriandri prepar. ℥j. s. rasur. ebor. cran. humani an. ℥j. visci quercini, rad. pæonia, torment. dictamni an. ℥s. pulu. diamb. ℥s. plives archont. ℥s. sem. anisi & fænic conditi an. ℥j. s. cum saccharo in aqua decoctionis angelica & pauco cinam. dissol. Fiat electuar. per tabellas.

℞ conseru. buglos. borag. florum aurenciorum an. ℥s. conser. enule campana, anth. stœch. meliss. an. ℥ij. conser. saluia ℥ij. theriac. & mithridat. an. ℥iij. cortic. citrij cond. ℥s. pulu. diamb. & arom. ros. an. gr. v. nucis mosc. ℥s. pulu. cranij hum. ℥j. visci quercini & rad. pæonia an. ℥s. cum syrupo conseruat. citrij, & syrup. reg. Sabo. Fiat conditum foliis auri copertum.

Habeat bracteolas auri domi, ut utatur suo condito.

℞ theriaces & mithrid. an. ℥j. s. conseruat. anthos, meliss. stœchad. an. ℥s. diamargar. diarrhod. abb. an. ℥j. aromat. ros. ℥s. corah. ℥j. visci querc. ℥ij. cranij hum. ℥j. cum lib. ij. aque decoctionis salu. agrest. sem. iuniperi, sesel. ruta, pæonia & rad. eiu. Fiat distill. per alamb. de qua utatur manè cum pauco saccharo ad dulcorandum, & tempore paroxysmi.

Vngula alces est circumferenda in anulari digito.

Appendeat collo sacculus ex radice pæonia, floribus stœch. visco quercino, rad. pæonia, & semin. seseleos.

Item ℞ cubeb. ℥ij. nigell. rom. ℥iij. mastich. ℥j. s.

In paroxysmo ℞ rad. azari ℥j. oxymel. scyllitici ℥s. aqua saluia ℥ij. fiat potus.

℞ ros. rub. & thuris an. ℥j. ligni aloes ℥j. Fiat puluis pro suffitu operim. capitis.

Item commendatur decoctum sarseparilla cum passulis, sem. pæonia, sem. citrij, & carduo benedicto.

ANNOTATIONES.

℞ Autor libri de morbo sacro omnia hæc symptomata enumerat contingere in epilepsia, quia humor pituitosus sanguini admiscetur, & turbat

corpus. Sed qua illo loco dicuntur non planè vera videbuntur.

2. Hippocrates lib. 1. de Dieta: Morbi, ait, paulatim fiunt, & crescunt, & paulatim collecti affatim & acruatim apparent.

3. Hippocrates lib. de morbo sacro primus id obseruauit, ut propterea dicere possis epilepsiam non esse totius corporis conuulsionem.

4. Hippocrates lib. de morbo sacro spumam in epilepsia à pulmonibus esse ait.

5. Mirum quod scribit Hippocrates lib. de sacro morbo, Epilepsiam fieri per oppletionem interceptionemque venarum ob phlegma à capite descendens. Sic non est necesse solum consistere in cerebro ut id fiat, sed venas alias oppleri & intercipi necesse est. Et locus multò magis est notandus par. 27. lib. 4 Acutorum, ubi loquitur de Apoplexia & Epilepsia, & morbis qui à venis reddunt. Interceptiones & oppletiones venarum sunt cum humores in venis continentur, & in eis conculcantur (quod siccescere vocat Hippocrates, sed improprie, ut monet Galenus.) Quod stilli humores fluentes diuertant in locos venas ipsas tenentes, fiunt apoplexia & epilepsia, ait Hippocrates, quod probat Galenus. Per locos intelligit cor, hepar, venam cauam. Ergo ex illo loco patet hepatis, aut iecoris, aut cordis occupationem ab eo humore qui prius in venis erat, epilepsiam & apoplexiam facere. Non meminit cerebri: quanquam de eo potest idem intelligi. Sic colliges apoplexiam & epilepsiam fieri quando loci, id est partes principes occupantur, & eorum capacitates: Conuulsionem & paraplegiã quando vena ipse occupantur.

6. Hippocrates lib. de morbo sacro cum docet cur pueri fiant epileptici, non recurrit ad infirmitatem generis neruosi, sed excellentiorem multò rationem confingit.

7. Ac reuera cum Galenus in 4 Aphorism. disputat de rigoribus, ait diathesin esse causam symptomaton & paroxysmorum reducum (nullã factã materiei ipsius mentione) tacite innuit in morbis periodo redeuntibus plurimum posse diathesin. Idem Hippocrates ait, Epilepsia natos annos viginti nonprehendit, nisi morbus sit *αὐτὸς ὀφθαλμοῦ*, non quod necesse fuerit corripri ante annum vicesimum, sed quòd dispositio sit in cerebro: & hoc vocat *αὐτὸς ὀφθαλμοῦ εἶναι νόσον*.

8. Item subtilis hac ratio potest reddi: Morbi qui in pueros incidunt, maximè ad nutricatum sunt referendi, cum videlicet aut mater per se malè disposita fuit, aut gestationis tempus in morbis & infirmitate consumpsit. Sed quorum morborum latens origo ad semen praesertim patris refertur, non ita in pueritia ij morbi pullulant & se produnt, quandiu valet natura, & nisi quid peccatum sit: sed atate maximè progressa sese

proferunt. Sic quoniam scitum est mulierem satam esse semine parentis qui epileptico, mirum non sit si primâ atate nil tale senserit.

9. Ac reuera in tempore impregnationis semper aliquid commemorabile contingit, siue in bonam, siue in malam partem. Vnde cum suspicio est grauiditatis, & dolor acerbus & longus dentium prehendit, tunc mulieres colligunt certò impregnationem, quod abs re non dictum est. Et Hippocrates lib. 2. Epidem. 2. sectione, meminit mulieris cui pregnantii exanthemata apparebant. Quod solemne illi fortè erat cum concepisset.

10. Ad hanc difficultatem, quæ est, cur mulieribus malè sanis ex conceptu commoditas proueniat: contra sanis maiora symptomata & deteriora eueniant: cum contra fieri debeat, pertinet locus notandus ad finem libri de Carnibus Hippocratis, ubi docet mulieres puras grauius affici initio conceptus quàm impuras. Et si impure afficiantur, non ita percipiunt. Obseruatione autem dignum est quod Aphrodisæus ait, conceptum esse actionem contra naturam.

11. Ex Hippocrate lib. de morbo sacro, alia ratio multò acceptior offerri potest. Breuior est paroxysmus ob sanguinis dominatum. Ita enim pituita mali autor inferior est sanguine, idcò non ita accessio producitur. Et ratio hæc est cur iuuenes facti epileptici diu non diuexentur. Hippocrates lib. de sacro morbo, non biliosos, sed pituitosos epilepsia attingit. Et in omnibus epilepticis vult congelationem quandam esse sanguinis ob admistam sanguini pituitam.

12. Et Galen. comm. ad aphor. 22. lib. 3. cum reddit rationem cur epilepsie autumno frequentiores ait, id fieri ob repentinâs ad contraria transformationes; Calor enim media die frigus primâ & ultimâ diei parte viget. Nil autem adcò comitiales accessiones, sicut talis varietas, aptum est generare. Et hic locus obseruatione dignus est, ut epilepsie obnoxius inæqualitates istas deuitet.

13. Si epilepsia à partibus inferis non est, idque ob copiam humorum intra vasa contentorum, quorsum vena sectio? Nisi fortè spirituum quadam confusio, aut sanguinis causa esse videatur. Si in cerebro & diathesis & causa est materialis, eaque à massa sanguinis separata, minùs quadrat vena sectio. Porro si ab humore frigido est, quare non potius de nocte paroxysmus prehendit, immò ferè interdium? Aristoteles vult de nocte prehendere: sed Hieronymus Gabucinius hoc confutat.

14. Vnde part. 24. lib. 4. de Dieta acut. loquens de morbis per oppletionem venarum, cuiusmodi est epilepsia, & apoplexia, ut Galen. interpretatur, vult è brachio mitti sanguinem. Illoque loco de plenitudine maxime mentio inferitur.

CONSILIVM LXI.

Pro Sacrifico ad elephantiasim vergente.

SACRIFICVS cùm omnium intemperantissimè vixisset, & Spotiùs à pane & vino quàm à scortis temperasset, indèque bis autter lue hispanicà laborasset, tandem ita affectus est, vt elephantiasis ei minari videretur: nec tamen verè erat elephantiasis. Tamen vt contingit sæpe eos quibus aut malè curata lues est, aut qui post sudamina intemperantiùs quàm antè vixerunt, elephanticos reddi, aut impetiginosos, aut strumosos & chæradicos, ita nil horum ab isto intemperante homine abfuit. Quin & crus dextrum totum ita induruit, multis locis chæradum argumento apparente aliquo, vt vix exigua spes salutis esset.

Itaque inito consilio ita prouisum morbo est. Ac primùm iussus est in totum abstinere vino, aut eo dilutissimo vteretur. Consultum est vt vesceretur carnibus elixis, & pullis nutritis pastâ ex carne colubrorum factâ. Theriacâ bis aut ter septimana vteretur ad 3 j. cum aqua melissæ, aut foliorum bryoniæ.

Bis mense Catholico cum 3 ij. confect. hamech purgaretur.

Aperiretur vena basilica sinistra.

Balneis aquæ dulcis vteretur.

Decocto melissæ, buglos. borag. lupul. & cerefolij addito momento croci.

Foueretur per intumefacta decoct. herbarum remollientium, & digentium, & præsertim gerennij, mercurialis, facta in aqua & vino albo.

Liniretur pars unguento facta ex spolio serpentis cum axungia porci, radice cucumeris asinini & bryoniæ. Autumno autem vteretur decoct. sarsapariliæ.

Eidem homini syrupus postea ordinatus sequens.

℞. rad. lapat. acut. ʒvj. serpen. maior. cort. rad. capp. ʒij. agrim. rotius, adiant. cusc. fumiter. scolopend. an. m. ij. 4 semin. frigid. maio. sem. endiu. fumiter. cusc. fœnic. an. ʒss. passul. glycyrr. thamar. an. ʒij. fiat decoct. ad lib. 4. ℞. præd. decoct. lib. ij. dissol. oxy. simpl. lib. v. sacch. lib. j. fiat syrupus.

℞. residuū, in quo infund. rad. elleb. nig. ʒj. fol. sena. ʒiiij. agar. troch. ʒij. 4. Epith. ʒj. s. cinam. & sant. citr. an. ʒij. s. oxym. ʒij. sacch. lib. j. fiat syrupus.

CONSILIVM LXII.

De fluore vterino.

MV L I E R optimo habitu prædita, quadrata, solita munia probè exercens, annos nata quadraginta, nunquam enixa, doloribus capitis affici non solita, conqueritur de quadam proluvie humoris albuginosi, præsertim cum iam fluxerunt menses. Illius enim proluvie eadem est periodus quæ & mensium. Durat quinque ferè dies. Non graueolet: non perfeuerat, nec visa est anticipare, aut tardare. Hic quaeritur unde hoc? Dolet maximè lumboꝝ & hypogastrium. Initum est consilium quo malo huic occurratur. Ego verò ita de morbo disputauit.

Vt foeda humorum proluuies longo tempore fluens ad talem & maciem corpus adducit, ita intempestiue suppressa plurimorum morborum prouentum affert. Vnde antè narratum est de vetula cui fluor muliebris multorum annorum repente repressus diabetem, & tandem mortem attulit. Id de quo queritur mulier hæc, symptoma quoddam vteri est, cuius causa aut in capite, aut in visceribus, aut in vtero est. Hinc enim gonorrhœa muliebris contingit, vt & virilis, non foeda tamen, hinc & fluor muliebris originem ducit, quem Auicennas non ineptè cursum matricis appellat: Gonorrhœam esse id persuadet, quod & ex interuallis repetat, non autem continuo vexet, vt & fluor verus mulierum facere solet, sed velut stato circuitu post menstruam purgationem. Vnde aut semen est, aut quædam materia seminalis crudior quæ in nutrimentum foetus consumeretur si vterum gestaret. Secundum argumentum: Non graueolet, nec foedum est, vt esse solet in vterino fluxu, sed est quid albumineum, aliquando serosum: fortè phlegma crudum est falsò semen representans. Tertium argumentum: Cum boni admodum habitus sit, cum sit restibilis foecunditatis, tamen vtero nunquam gestasset; fieri potest vt multum seminis crudi cumularit, si modò semen vocari debet. Hinc fit vt aut copiâ, aut imbecillitate vasorum, aut testiculorum mulieris excretio fiat illa periodica.

Contra verò afferri potest, si vterinus fluor est, aut est à capite, aut ab hepate, aut à toto corpore, aut ab vtero ipso. Si in vtero, aut illic est humiditas immodica, aut vlcus, aut malum aliud latens eius floris scaturigo. Malum illic residere arguunt dolores ad lumbos, crura, & inguina. item ad imum ventrem. Ab aliis partibus non esse hoc arguit, quòd cachexia nulla sit, quam tamen adesse esset necesse, præsertim si ab hepate esset. Tamen nulla sensio est vlcis in vtero, etsi vlcus esset aliquando syncope adesset, & quòd efflueret, dysodes esset. Item si malè affectus esset vterus, aliquid eius affectionis corpus referret. Nam ex Galeno in Aphor. vt vterus affectus est, & ita corpus; quòd notandum est. Item & facillè patitur congressum viri, quòd non solent mulieres quibus ab vtero fluor est præsertim.

Vt de muliere typographi in via D. Iacobi constat, quæ cùm annos aliquot duritiem in imo ventre habuisset, tandem ^{p̄o yu-} ^{vap̄is} facta est obnoxia, & congressum non patitur, præsertim spermatis appulsùm.

Quòd autem non continenter effluat vt aliis mulieribus fluorem patientibus contingit, id habet aliquid peculiare. Reuerà variant morbi pro corporum distinctione.

³ Res cùm ad examen adducta fuit, de ea ita nos tandem iudicauimus. Malum hoc est floris vterini species, non verè fluor, quòd non sit continuus, quòd non olida fœdâque materies excernatur, quòd sit periodica, quòd sit veluti albuminea. Est autem quædam materia pituitosa quæ non admiscetur toti sanguini, quæ si in intestinis contineretur, iliacas & colicas passiones inferret, & illa continetur quasi segregata circum partes vterinas; referatisque venis per menstruam purgationem, quâ datâ viâ effluit eius nonnulla pars: reliquum verò resistit, gravitatem in partibus illis inferens. Et nisi tandem ea materia reliquis humoribus remisceatur, fieri non potest vt conualescat.

In hoc affectu curando nec impensè calida & aperientia, nec astringentia ex vsu esse possunt. nam illa perturbant nimis: hæc inferrent grauiora symptomata illum humorem supprimendo. Itaque visum est commodum si vteretur clysteribus ex decoct. arth. nep. centaur. min. agrimon. origani, absynth. mercur. cum maluis, feminibus calidis & temperatis, dissoluendo confectionem Hamech.

Pro purgante medicamento sumat rheum, agaricum, cum

352 **CONSILIORVM MEDICINALIYM**
confectione Hamech. Deinde aperiatur vena basilica. Tãdem parato corpore vsu rerum aperitiuarum vtatur decoct. folliculorum, agarico, & puluere hieræ, quæ in hoc corpore suspecta esse non debet, tametsi sit visceribus præcalidis, quod aloë non transcendat hepar. Tandem per decem dies vtatur decocto farseparil. cum semine pœoniæ & cardui benedicti. Repetantur clysteres frequenter. Paretur syrupus ex follicul. agarico & turbith.

In simili affectu ad exigendas humorum reliquias maza pilularum institut a

℞ aloes lotæ ℥ ʒ. aristoloch. rotund. ℥ s. myrrha ʒ ij. castor. ʒ j. s. cum syrupo de hysop. fiat maza.

℞ lixiuij clari, cineris sarmentorum lib. vj. bulliant folior succorum salu. menib. absynth. orig. calament. thymi, aneth. chamam. an. m. j. mastich. ʒ j. fiat fctus pro imo ventre.

℞ vernicis, mastich. carab. an. ʒ ij. nucis mosch. caryophyll. an. ʒ j. fiat puluis gross. pro suffitu vteri.

Hic præclara quæstio proponi discutique potest, quæ fiat vt sæpe mulieres fluore muliebri præhendantur, an quod vterus attrahat, an quod humores eò ferantur. Magni enim momenti est scire vtrum fiat, cum controuersia sit de vtero an attrahat, an non. Nam si vterus attrahit, minùs valida esse debent medicamenta, quàm si non attraheret, vt paulò post doccebitur. Hac de re procerum artis medicæ audienda opinio. Galen. cap. 22. lib. 5. de simpl. med. facult. docet distinctionem eorum quæ menses, lac, & vrinam prouocant: quæ tametsi in nonnullis consentiant, tamen in natura specifica plurimùm distinguuntur. Nam lacti prouocando conferunt calfacientia, non desiccantia: mensibus magis calfacientia, non valenter desiccantia. Vrinæ calfacientia & desiccantia. Rationem autem reddit Galenus eodem capite cur valentiora in mensium prouocatione, quàm lactis vsurpentur, primùm quod vterus nil conferat ad delationem sanguinis & attractionem: mammæ verò contrà. Nam mittitur sanguis menstruus in vteri venas, non attrahitur: in mammas non tantùm mittitur, sed attrahitur, ideò leuiore præsidio opus est, adeò vt medicamenta lac in mammas conferentia menses mouere non possint. Prætercà vteri venæ magis aperiri debent quàm mammarum venæ: proptercà calidioribus multò vsus esse debet. Tertio sanguis qui ad vterum fer-

etur materiam menstruam suppeditaturus fluxilior esse debet quam is qui est ad mammas futura materia lactis. Itaque opinione Galeni vterus non attrahit. Tamen cum duplex sit attractio, vna particularis, quâ vnaquæque pars sibi id quod proprium est attrahit & allectat; altera communior, quâ partes quæ commune quoddam officium in corpore habent, attrahunt quoque, siue quod attrahitur sit familiare, siue tantum sit excrementum: vtraque ratione videtur vterus attrahere, quo fit vt Galeni opinio minus probabilis esse videatur. Nam cur non attraheret vt & reliquæ partes? Et si in cerebrum humorum raptus sit, & vaporum, cur non potius in vterum? Propterea Hippocrates scribit, *Intra hominem partes alliciunt vesica, caput, vterus in mulieribus. hæ enim omnes manifestè trahunt, & semper plena sunt attracta humiditatis.* Quæ Hippocratis autoritas sententiã Galeni planè labefactat. Nec plus temporis in iis rebus terendum putamus, cum certum sit vterum attrahere. At tantâ facultate tractus præditum esse, quantâ & mammæ, non est credibile. Cordi enim propinquiora vbera attrahunt magis, vterus verò cum in fundo situs sit, potius fit humorum deturbatio, quam attractio. Et hæc inehercules probabilia videntur.

ANNOTATIONES.

1. Reuerã ex Hippocrate lib. 1. de morbis mulier. fieri potest vt quarundam mulierum & vterus sit humidior, & eius acetabula mucore sint plena; unde concipiendi, retinendique & seminis & fetus difficultas sic profluium si quod euenit, non multorum dubium est, tamen proprie ipsius vterus esse dicitur.

2. Aut nisi vlcus est, quanquam defloratio propter acrimoniam humoris contingens potest difficultatem congressus afferre.

3. Frustrã hæc dubitamus quæ huius morbi natura sit. Nam est profluium muliebri, non illud quidem quod vulgò apparet. Et Hippocrates primus hoc animaduertit lib. 2. de morbis mulierum, cum quadruplex profluium explicat. Sed inter ceteros locos vnus est lib. 1. de morbis mulierum, ubi ideam huius morbi explicat.

CONSILIVM LXIII.

De Voluulo.

IOANNES Puthomme post curas aliquot, & intempestivas
 Icomestationes in quibus liberaliter satis genio indulgebat,
 nec mero parcebat, rerum domesticarum curam gerens, quod
 nunquam solitus fuerat, per aluum inferiorem satis largam san-
 guinis copiam profudit. Huic sollemnis erat euacuatio per ve-
 nas hæmorrhoidales: tandem veritum est ne si immoderatiùs
 sanguis ille flueret, de viribus nimium detraheretur. Ei bolo
 cassiæ, & meo iudicio venæ sectione consultum est. Malum ces-
 savit. Non ita longè post queritur de doloribus acerrimis ad vé-
 trè in modo colicorù dolorù ægrum vexantibus. At colica pas-
 sio non erat ea quæ propriè dicta est, pulsus erat citatus: vrinæ
 aliàs aqueæ, aliàs bile saturatæ: ad vtrumque renem dolor erat
 fixus, ac si in partibus illis aut lapis insideret, aut aliquid simile:
 nullum ventum flatumque per ventrem emittebat. Clysteri-
 bus iuuabatur, sed momento tantum. Ægrescebat medendo.
 Indita enemata carminatiua nihil aut parum adiuuabatur. Ali-
 quando magnam vrinæ copiam profudit. Insomnes dies no-
 ctesque ducebat: perpetui ructus erant: nec non ac si immine-
 ret præfocatio, sentiebat dolores summos ad sternum, & thora-
 cem. Regio renum appressu leui dolebat grauissimè: Si quies-
 ceret dolor per tempus breue, mox acerbior redibat. Nil vo-
 muit. Si colica passio fuisset, aut dolor colicus, vomitus aliqui
 aut præcessissent, aut adessent, vt ex Galeno patet. Tamen nil
 tale apparuit. Borborygmi aliqui aderant sine tumore aliquo.
 Venter non detumuit. Medici inter se digladiabantur de essen-
 tia morbi & natura. Alij tanquam colicâ laborantem variis re-
 mediis calidissimis eum fatigabant, agarico, foliculis, syrupo
 rosarum solutiuo. Denique magnam frigidorum humorum co-
 piam esse rati, eò suam conuertebant operam, vt calida medi-
 camenta & phlegmagoga præscriberent. Nil est profectum: sed
 ægrescebat medendo. Alius verò perpetuò sicca remanebat,
 & nil reddebat nisi, quod vocat Hippocrates, *οὐδὲν ἀδύκτω*. Flatus
 verò omnis exitus præcludebatur, immò quod à Pharmacopeo

Comm. in
 apbor. 1.
 sect. 1. li.
 6. Epid.

relatum est, cum clyisma indebatur, recti intestini pars extrema contorta paulum videbatur, & non nisi vi iniiciebatur, & glans immittebatur. Cataplasmatibus anodynis dolor leuabatur. Dicebat se tumultuantes quosdam flatus sentire, non quomodo in colico dolore, sed efferi erant quidam flatus diuellentes membranas, & dolores & profundos in mesenterio excitantes, & sublimis in peritonæo tunica, vnde minimo digitorum appressu ciulabat præ dolore. At in colicis doloribus nil tale contingit. Nulla per os excretio fiebat. Alii autem Medici, & multò acutiùs, veriùsque obseruatâ victus ratione, quod multis & generosis vinis assuescet, genio indulisset, susque deque habitâ diætâ vsus fuisset. Item obseruatò pulsu inflammationis cuiusdam in toto mesenterio latentis indice. Præterea obseruatâ illâ per anum sanguinis excretionem, quæ repressa aliquantum fuisset, quod ne immodica foret Medici vererentur, cum fortassis melius fuisset cum nonnulla virium iactura affatim adhuc sanguinem effluxisse. Omnibus (inquam) iis obseruatis collegerunt in toto ventre inferiore voluolosam esse quandam affectionem ab inflammatione quadam, aut potiùs calore concepto in toto mesenterio & intestinis ex-olida putrique materia flatu maligno excitante, vnde torminosi dolores & ructus perpetui, & stomachi sine vomitione occultæ subuersiones. Quæ materia reses, & ignaua, & pigra erat, ea sensum doloris modò grauis, modò pungentis in profundo præsertim ad renum regionem excitabat: eleuatus verò ex eadem maligno spiritu vagos erraticosque ^{σπέρμα} prouocabat. Neque verò materiam istam pigram necesse erat efferri, sed in parte in qua residebat dolor excitabatur, qui ab eadem parte tanquam radice sese sensim insinuando ac propagando in partibus vicinis dolorem excitabat. Hanc doloris ideam Galenus videtur vocasse *πύου διαίρεσιν*, ^{Cap. 7 l. 2. de loc. aff.} *verunt turgentem: qui nimirum à parte primò affecta, veluti à radice incipiens, celeriter in partes adiacentes traducitur.* Nam causa morbi in loco conquiescit. Vel enim dolorem *εμπύου μετέω* vocare possumus, *in fixum*; sed tamen aliæ partes, præsertim si qua sit continuitas affici possunt. Causa illius doloris vel est copia humorum confertim ingruentium, vel spiritus flatuosus. Sed reuera, vel ratione ægrotantium rem non intelligentium, vel rei ipsius que per se obscura est & implicita, difficilis admodum est cognitio speciei doloris. Dolores autem istos reciprocos, reuolutos, re-

Init. cap.
7. lib 2
de loc. aff.
H. p. 1. ar.
8 lib 3.

ductosque Hippocrates in Prorrhet. vocat; *εμψυα*; atque illo aphorismo mihi videtur quodammodo adumbrasse morbum quo miserimus iste æger cruciabatur: *Quibus (ait) lumborum tenues & diuini dolores & ad hypochondrium reducti, renouitque, & ciborum auersio cum febre, dolor his valens contentusque ad caput peruenit, citò cum quadam conuulsione interim.* id est: Sæpe circû præcordia & mesenterium residet & restagnat materia olida putrisque; quæ si contingeret aut cholera morbus, aut vchemens alui fluxus, nullam molestiam planè afferret: ied cunctando varia inducit symptomata, initio quidem exiguos & torminosos excitat dolores; sed sensim atque sensim ac magis collecta, & exitu prohibita, maiores malignitatis neruos naçta tandem fastidium cibi accersit, & febrem: rursus febris materiam deteriore redit. Tandem aliquando effera magis reddita quaquauerfum erumpit, & suæ malignitatis notas edit, prout in hanc aut illam reperit partem. Quod certè huic ægro contigisset, si febris maior fuisset, quæ materiam deteriore reddidisset, & nisi materia coërcita intus fuissetibus nostris.

Præterea frequentes elyteres injecti, medicamenta præscripta, tametsi minimè idonea, tamen impediuerunt quominus exaggeraretur humor, taliæque symptomata ederet tandem, qualia in Prorrheticis ab Hippocrate describi diximus. De doloribus *εμψυα* dictum in Definition.

Aut certè cum morbum speciem quandam voluuli esse dicemus, sumpto nomine voluuli non strictè, sed late, vt apud Hippocratem sumitur; Ait enim phlegma à capite descendens voluulos diuturnos excitare, id est, dolores iliacos, & voluulosos, & torminosos, in quibus imus venter & hypochondrium vtrûque dolet. Nec enim credibile voluulum morbum esse diuturnum, nisi improprie sumatur. Cum itaque intestina tum ob flatibus nonnullos, tum ob copiam humoris maligni in mesenterio & intestinis collecti dolent, & totus venter, eaque torqueri quodammodo, conuulsive (*Græcè εμψυα*) videntur, voluulosa dicitur passio, vt ex Hippocratis loco superius adducto patere potest. Simile quid apud Hippocratem legere est in lib. de affectionibus, vbi triplicem voluulum constituit; vnum hyemalem, vt cum quis nimio victu calido & humido vitur, & non sese deambulationibus dedit, &c. Alium arcuarum, qui æstatis tempore in regionibus palustribusprehendit, & æstiuus dicitur.

Lib. de
affectionibus
vbi.

voluulus, in eoque æger auruginosus fit. Tertium hæmatitem & autumnalem, quem eodem loco describit. Nomine voluulorum intelligit quosdam dolores torminosos, voluulosque ob prauam diætam aut temporis intempestiuitatem nascentes, qui pro diuersis effectibus & temporibus in quibus pullulant, varias conditiones & nomina sortiuntur. Æger noster hæmatete & autumnali voluulo præhendi visus est. Nam vt antè demonstrauimus, sanguinis fœculenti residuum erat aliquod ab excretionem quæ præcesserat, à quo prima mali labes. Et tale quid Hippocrates visus est obseruasse in Coacis, *dores ex lumbis diuturni: ores febris tertianæ modo exacerbantes* (id est, quorum dolorum non semper est acerbitas, sed vnus diei dant inducias, ac si motum quendam haberent tertianum) *grumosum san. utnem egere faciunt*; id est, dolores isti excitantur à conclusa in ventre materia nigricante, adusta; & veluti sanguine fœculento existente, quorum remissio non fit, nisi eiusmodi materia fœculentæ aut ob putredinem, aut moram diuturnam nigritiem adeptæ, e corpore fiat exclusio. Quæ omnia diligenter sunt notanda. Et Fernelius dolores ventris non absimiles doloribus colicis (cum tamen non sint) agnouit quodam circuitu periodoque repetentes, in quibus ægri miserè consistantur. In hoc ægro dominabatur calor præter naturam, flatuum malorum quales in libro de flatibus describit Hippocrates, copia & vis excitabatur, meatus non erant liberi, vnde exitu prohibebantur, & reuolui cogebantur ad superiores partes: denique materia non dissipabatur, idèò flatum non emittebat, nec cum bombo, nec sine bombo, st ridore: de quibus flatibus Hippocr. in Prognost. *Flatum emittiere sine bombo & st ridore, saluberrimum*: quod significetur vis caloris facile materiam dissipantis; item libertas meatum: & tamè optabilius vnà cum bombo flatum excludi quam illuc reuolui. Reuolui autem Græcè dicitur *ἀνακλίσθαι*. Itaque ad erymon & proprietatem nominis *ἀνακλίσθαι* alludit senex. Porro reuoluitur flatum cum non exit, aut incendio partis, aut deprauato motu intestinorum, proprio autem vitiatò. & ista flatuum deuolutio in tenuibus intestinis tormina parit, alium pulsat, nauisam excitat, & si ad diaphragma appellens respirationem vitiat: quæ omnia in ægro paruerunt. Nam & tormina in tenuibus intestinis excitata sunt, & nauisam aderat, & aliquando species quædam suffocationis, quæ omnia ob flatuum reuolutio-

Cap. de
colico do-
lore.

Part. 24
lib. 2.

nem ad superiora contigerunt; reuolutionem autem peperit & incendium, & motus deprauatus intestinorum. Horum quoque demonstratio peti potest ex lib. 4 Aphor. cum ait: *Quæ illa suspensa obmurmurant, lumborum dolore superueniente alui humectantur, nisi flatus erumpant, aut vrina profluuium consequatur.* Hæc verò in febribus. Murmur etenim fit ex flatu iunctâ humiditate; si non separetur flatus à materia, aluus necessariò humectatur; si separetur, aluus non humectatur, sed aut flatus, aut vrinæ excretio fit. Et quod addit, *in febribus*; considerat vel febres symptomaticas, vel febres essentielles. Symptomaticæ sunt vt in pleuritide, peripneumonia, in quibus si murmura oriantur, aut suspendeant hypochondria, non perinde tamen aut flatus erumpunt, & murmurita contingit, vt aut vrina fluat, aut aluus feratur. Si enim murmur adfit, non est quid secundùm naturam, sed tantùm quid symptomaticum: propterea humiditas murmuris causa, naturâ duce non facit aut alui, aut vrinæ profluuium. Sed in febribus essentialibus, quia non pars aliqua peculiaritèr laborat, sed totum genus venosum, œconomia naturalis laborat, vitiatur coctio, hinc à cruditate flatus surgunt cum murmure: hinc naturæ motu aut ij flatus erumpunt, aut vrina fluit, aut aluus. In ægro nostro vrina aliquando largè fluxit, vnde diabetæ metus esset, factâque humidæ materiæ erat secretio ad renes, dolores tamen non cessauerunt, quia flatus non simul eruperunt: quod si erupissent, facta fuisset dolorum solutio.

Itaque intemperies erat calida flatus excitans, motus intestinorum deprauatus, angustia venarum. Idemque contingeret quod & Galenus contingere ait in melancholia flatuosa; vt legere est lib. de locis affect. Sed quæri potest, quomodo flatuosa esset aluus inferior, cum calor esset multus, immò & essentia morbi in calore & intemperie & phlogosi constituitur? Nam ex Hippocrate, icterici non valdè sunt flatuosi, ob dominatum caloris acris, & paucitatem crudi humoris qui flatuum est materia. Nam tametsi in 4^o Aphorismor. habitualis & hæctica intestinorum & ventris inferioris dispositio hydropis sicci causa sit, & inflationis ventris ipsius, non tamen ista habitualis dispositio à calore est, sed à frigore, quanquam tantum non est quantum in reliquis hydropis speciebus. Dicemus ictericos quidem non esse flatuosos per se, sed per accidens, nimi-

Aph. 73.
lib. 4.

Cap. 7.
lib. 3.
loc. aff.

Aph. ult.
lib. 5.

Com. in
apho. 73.
lib. 11.
4.

rum si partium ad ventrem attinentium sit imbecillitas. Maxime autem imbecillitas contrahitur ob paupertatem caloris naturalis, & dominatum caloris contra naturam omnia peruertentis; immò & omne alimentum in corruptelam & malignum spiritum conuertentis. Quod si corpus in quo intemperies est calida, ab omni crudo humore immune esset, flatuum quidem ilias non glisceret: sed si qua crudorum succorum quantitas sit, facile adaugetur ob calorem contra naturam. De ictericis an flatuosi sint, an non, dictum à nobis in Comment. de Definitionibus Medicis.

Ceterum, indicauit abundè curatio qua ex causa morbus foret. Nam cum immedicabilis per multos dies permanisset, vsurpatis præsertim validioribus medicamentis rerum quæ sequuntur, vsu plurimum est adiutus. Primum relictis grauioribus enematis, in blandioribus statum est. Vena secta ter vt inflammatio tolleretur. Sanguis inflammatus & corruptus. Iuscula temperata & insulsa data sunt. A vino temperauit. Ter die in balneum descendit temperatum ex aqua dulci. Sequenti die data tabella diacarth. ex iusculo pulli ad dacrydij vim debilitandam. Deinde rursus in balneum descendit. ⁴ Paulè post morbus cœpit humescere, phlogosis temperari, liberari obstructa, flatus erumpere: erumpentibus alleuatio multa. Deinde syrupo violato sæpè vsus, & potione sequenti.

℞. sem. metonum, cucum. an. ʒj. s. sem. citry & sænic. an. ʒj. granorum alkeken. & Kermes an. ʒj. malu. bismal. & scabios. an. m. j. cinnamomi ʒj. fiat decoct. ad dosim. In colat. dissol. vini hippocratici ʒss. succi amygdal. dulcium ʒj. s. utatur longè à pasto.

Reperatur idem poculum sæpe.

Item fots post balneum adhibitus est sequens:

℞. malu. bismal. an. m. j. florum chamam. melilot. summit. aneth. an. m. s. absynth. pont. menthe, an. m. s. semina. lini ʒj. cypper. scenan. an. ʒij. ben albi, ben rub. an. ʒj. Fiant sacculi qui bulliant in aqua & vino pro fots ventris totius & ventriculi, cum spongia.

A fots liniatur oleis sequentibus:

℞. butyr. recent. ʒj. mucag. sem. lini & altheæ an. ʒj. puluer. mastich. & cypperi, an. ʒj. ol. absynth. mastich. & chamam. an. ʒj. ol. rosati ʒss. aceti ʒss. misce, fiat litus ad ventrem totum.

Item adhibitus pullus gallinaceus & catulus ventriculo.

His remedijs leuatus. Cessantibus ventris doloribus grauis-

ANNOTATIONES.

1. Si verè morbum illum nominare velis, speciem quandam cholera sitica appellares, de cuius notis & signis dictum est antè.

2. Urina erat pene cruda & incocta, quod declarabat incendium venum præproperè serum attrahentium: & suppressionem humoris biliosi, qua suppressa malum deterius reddebat.

3. Est ubi quis sunt icterici sunt flatuosi, est ubi non sunt flatuosi, secundùm sententiam Hippocratis. Nam cum fit icterus per inflammationem partium, nec pituitosa crudaque materia subest que in flatum vertatur, tunc absunt flatus. Sed si aut præcesserat congestio materia pituitosa aut chyli propter prauam simarum hepatis dispositionem, corruptio sequitur, etiam in ictero potest esse flatuum multitudo. Vel dicemus ex agitatione materia crude, & caloris contra naturam excitatos esse flatus malignos. Idemque factum esse quod in generatione flatuum, de qua in nostris Definitionibus. Galenus comment. in partic. 21. lib. 4. Acutor. ait à spiritus interceptione non inferri flagrantem hypochondrio affectionem. Quod verum est. Sed flagrans in hypochondrio dispositio potest flatus excitare.

4. Quod mirum est quiescentibus post balnea doloribus ventris & renum, cepit dolere tibias & malleolos, adeò vt per omnes noctes clamaret, nec ullà ratione sedarentur, Hunc morbum graphicè explicat Hippocrates, lib. de intern. affect.

CONSILIUM LXIV.

De Febre quartana.

ILLVSTRIS Domina de Palluaquea in quartanam incidit circa mensem Augustum, cum tempus æstiuum totum inæquale fuisset. Verè enim ab Hippocrate literis mandatum est, Cum eadem die modo calor, modo frigus apparet, autumnale morbos parit. Ista enim inæqualitas naturæ infesta est. Hinc febrium erraticarum quæ quartanarum sunt prodromi origo. Hoc autem idè fit, quod temporis diuturnitate corporis habitum siccent, ac humores adurant. In Græco est *διὰ τὸ ἐν ἡλίῳ* quidam ver-

tunt, ob pituitam, nos autem, propter calefactionem, retorrefactionemque vertimus: vtrifque calefactio fit caufa incinerationis; hinc fenfim corpus refrigefcit, reficcaturque, vnde propenfio in quartanam. Vel potiùs nomine *ελυμπος* audiemus pituitam ficcam, craffam, retorridam, non autem humidam ac ferofam. Hæc nobilis mulier temperamento eft fatis fanguineo tamen deurgente ad ficcum quam ad calidum. Et cum *τῶν ἑπιπυρῶν* duo fint genera, alij calidi & humidi funt, hepaticique dicuntur, & multum fanguinis generant, pulfus habent plenos, elatos, magnos; multum fumunt alimentum, febribus continuis, fynochis, putridis que funt obnoxij; & cum perfpiratione careant, fiunt melancholici, non atrabilarij, fed melancholici à face fanguinis & craffitie, & veras legitimasque quartanas habent, cum fanguis non bene repurgatus, aut cum plus æquo fuccrefcit in corpore: & tales quartanæ funt longæ quidem, fed fecuræ. De iis dixit Hippocrates; *Τραυβῆρι melanchολικοῖς* funt. Alij colorem habent rubrum, & hepar præcalidum habent: fed calor in humiditate pofitus non eft, fed in nescio quo fqualore, ficcitate, humiditatis inopia. Et hi tametsi rubore aliàs fugaci, aliàs non fugaci perfundantur, fuffundanturque, tamen hoc non eft iudicium abundantis fanguinis, fed calidioris hepatis fanguinem acrem, fubtilem, ferofumque generantis. Sic funt pauci fanguinis, pulfu fatis celeri, non elato, non pleno, valetudinarij viuunt, ferofis humoribus abundant, febribus longis, hefticis, hæmitritæis detinentur, fluoribus hepaticis; & fi in quartanas incidunt, aliàs in inæquales quartanas, aliàs continuitatem habent, vtpote fanguine non humectato, nec corde, & inæqualitate in pulfibus perfeuerante. Urinas meciunt aqueas, & aliàs in quartanam incidunt atrabiliariam, horrificam, quia humor biliofus ferofus, dulci aqueo ac temperato humore non moderatus facile exandefcit, & in atrabiliariam naturam immutatur. Priores *ἐπιπυρῶν* facile ferunt venæ fectiones, & ab iis non læduntur: posteriores non nifi cum fuma difficultate; vix enim fele recipiunt, recolligunt, ac recuperant, & hypochondriacis morbis laborant, & obftructionibus mefenterij, & tenaces funt, & mœffi, & facile terrentur, & apprehendunt: immò in hydropem ficcum facile delabuntur, & prauas habent actiones vt hi qui febre laborant, nam febrientem habent vè-trem. Alij mediij funt. *Domina de Palloyseau* media ferè eft,

362 CONSILIORVM MEDICINALIVM
nam nec nimis siccum hepar, nec multâ humiditate temperatum habet. Domina Dorsæa accedit potius ad posteriores, cum pulsus habeat paruos, celeres, vix perceptibiles, colorem saturatum, fugacem, aliàs pleniorẽ, siccitatem summam; & vt ita loquar, igneitatẽ; vt mirum non sit si tempore inæquali vtraque in febrem quartanam inciderit. Et quibus ita affectam hepar non tam sæpè laborant, præsertim si sibi in victu temperauerint: sed cum in morbum inciderunt eo vix ac ne vix defunguntur. Et tamen videtur febris eis morbus esse congener. Vtraque mulier nunquam habitior fuerat, nunquam plenioris vultus ac pinguioris, nunquam ad functiones paratior & alacrior: sed vtrique solemnis erat quædam fluxio alui, quæ dum fieret, vt erat vindex morborum, ita dum resistit, cessatque, eorundem est promotrix, aduocatrix & conseruatrix. Vni quidem, quoniam cum hepar aliqua ex parte siccus sit & calidus, multa biliosa & ichorosa generat, quæ aluum facillè turbant, ac emouent. Sed dices: Si hepar siccum, siccitas autem facultatem retentricem iuuat, cur non retinet potius? Dicemus autem quod attinet ad illam *ευξία* & *κόρη*, vtramque malam fuisse. Omnis enim *ευξία* & *κόρη* quæ præter rationem aduenit, quæque nature legibus consuetis non continetur, immò potius est ob veteris & solemnis euacuationis suppressionem, quàm ob partium solidarum repletionem & instaurationem, mala est vt signum & vt causa. Vt signum, quia cum extenuationis sint argumenta in aliis partibus, repletionis autem in aliis: inæqualitas illa nutritionis declarat solum abdomen plenum esse, mesenterium plenum, vnde vetus stercus retentum illam *κόρη* secundum quid, non absolutè bonam inducit. Quod si æqualis esset ea *ευξία*, declararet omnes partes solidas alimentum cepisse: vt causa autem mala est, quoniam morbos à cacochymia & à plenitudine indicat. A plenitudine quidem non sanguinis, sed humorum in abdomine contentorum, quæ plenitudo cum cacochymia confunditur. Hinc quibus mulieribus menses, aut viris hæmorrhoides subsistunt, eæ impinguntur, an propterea bene habent? Non, immò est instar euexiæ athletarum. Et Hippocrates doctè lib. de morbis, dum de suffusione pituitæ à capite loquitur, aut carnes rarefactas & exalfectas diffusam illam pituitam facillè in se recipere, & postea *ευξία* inferre. Sed illa *ευξία* lubrica est, & periculi plena. Item libro Coacar. animad-

uerfionum, Coloris bonitas, & sudores fine febre, aut inordinatam diætam docent, aut vetus stercus subesse. Veteris stercoris nomine potest audire euacuationem aliquam solemnem subsistentem. An hæc bonitas coloris bona est? Nequaquam: immò prodromos & antesignanus morborum. Vt nec ea bonitas coloris quæ in peripneumoniacis apparet. Ideò decipiebantur veteres, qui minimè contenti bonâ valetudine; & bonitate actionum sanguinem & lacertos quærebant, ex eoque metuebantur sanitatem, cum quis succulentus & plenus, & bene habitus foret. Sed eos Galenus reprehendit. Sic non quoties quis saturato rubore est, dicere oportet eum esse valdè sanum: nec item quoties quis ita affectus est, dicere oportet eum esse tẽperamento sanguineo. Nam esse tales certũ est colores quale alimentum, non propterea tamen sanguinis dominatum declarat rubens genæ. Nam bifariam rubent genæ, aut propter sanguinis abundantiam, & tunc eos sanguinos esse dices, & ij quadrati esse solent, rudibundi; parum de rebus solliciti (nisi inclinante æstate corpus minimè perspiret) & liberaliores esse oportet in sanguine mittendo: aut ob caloris excessum cum humorum ichorosorum copia & dominatu, præsertim si in iis potiùs sit *αἰμαρρομία*, quàm *χοληρρομία*. Scire enim oportet in aliis hepar suas habere inclinationes infernas, in aliis supernas. Vnde pedes sæpè quibusdam sunt frigidissimi, quibus manus calidissimæ: & contrà. Si ob caloris tantum excessum, ij sunt sæpè macri, furiosi, biliosi, mœsti, iniuriosi, iniqui, tenaces, mali, versuti, melancholici, vrinæ sæpè aqueas habent, ut pote hepate exurgente statim ob calorem & siccitatem id quod humidum est, & multum meiunt, quod falsò catarrhis attribuant, cum sit veluti diabetica affectio; eo enim pacto affectum est hepar, quo aliquando renes: immò in renibus non potest non esse talis diathesis qualis in hepate: facillè enim consentiunt. Declarauit ille æger qui veluti diabetem habebat in vico de la Mortellerie, cum certissima essent argumenta siccitatis, squaliditatis, & arentis & calidi hepatis. Et hoc diligenter notandum est. Caue ergo ne valdè decipiaris iudicans de temperamento sanguinis ex eo quod quis foret subrubeus; fallax enim id est. Hippocrates videtur aliam causam colorationis statuere in suis libris; colorum mutationes fiunt corde venas laxante, aut eodem constringente; laxante quidem florescentes, pellucidi,

Lib. de
off. med.

364 CONSILIORVM MEDICINALIVM
rubicundi; constringente virides & ^{κόχινος}. Ac si dicat in quibusdam per effumationem tantum & vaporum emissionem colorem induci, qui vapores si retineantur, tum mala coloratio adesse solet. Sed id potius pendet ex dispositione ea quam diximus. Nisi dicas eor quoque plurimum posse ob spiritus & calorem quem pulmonibus inducit. Ut quibus pulsus parvus & languidus, constrictusque, si color rubeus adsit, non vi caloris adsit, sed nescio cuius vaporis qui effertur. Quibus autem cor bene dilatatur, & sanguinei sunt, iis bona coloratio ex se. De febre autem quæ mulierem istam adorta fuerat, ita disputatum est. In omni morborum depulsione de morbo primum constare oportet. Atque de morbo quidem quis, quæ idea, ut quæ huius aut illius corporis ^{ιδιαιότητων} sequatur. Nam pro corporum varietate euariant quoque. Si morbi species non statim se se prodat, maior pars negotij naturæ committitur. Illa enim legitimâ vitæ ratione adhibitâ patefaciet id de quo dubitatur, cum incerta medicatio non nisi dispendio decernatur. Hoc autem maximè in inconstantibus temporibus fit. Quod in hac muliere spectatur. Nam qui morbus primò & per se (quod tamen rarò vsu venit, & ideo declarat diathesin iam in partibus factam) quartanæ typum periodum receperat, mox eundem reiiciens confusus in sese est. Quartanæ esse periodus declarat, ætas consentiens, tempus inæquale & autumnale. Ut quæadmodum eadem die modo calor, modo frigus fit: ita inæqualibus temporibus inæquales motus febres morbi que habeant. Et quod argumentum maximum dignotionis morbi, quodque Galenus 1. ad Glauconem plurimi facit, immò pluris quam circuitionis formam, est quòd hoc tempore multales grassentur morbi. Contra tamè quartanam non esse aliquis doceat, quòd nulla ferè ^{αποπέλι}, cum tamen Galenus asserat maximè in quartanis omne quòd exustum est discuti ac euacuari. Sed fortè de ordinatis intelligit. Item quòd accessio in sudores non definit, quòd tamen 1. ad Glauconem requirit Galenus. Quòd acerrimus calor qualis in tertianis, quòd nullus rigor, immò ne horror quidem. Quòd fit tribus de causis, aut quòd sensus præstantia non sit, quòd materies retusa sit, & naturam non stimulet, aut quòd nulla motionis vehementia. Cùm enim rigor motus sit multus, id est numerosas habens motiones, cum impetu, breue habens quietis tempus: horror omnia quidem ha-

*Libr. de
syph.*

*Galen. ad
Glauconem.*

*2 de diff.
febr.*

bet, sed remiffiora, frigus sine motu in cute sentitur. In rigore corpus concutitur, virtute cum humore lactante: in horrore cutis & muscoli cum quadam lassitudine, pigritiâ, & mouendi difficultate concutitur. In frigore nulla concussio, sed sola cutis inalgescit. Rigorem afferunt sensus præstantia, materia naturam irritans, & motionis vehementia. Si causæ hæc validiores, rigor inducetur: si remittantur, id est, sensus hebetior, materia minus calida, acris, ad motum pigrior, virtus robusta, horror: id est, cutis & musculorum concussio. Tertianam veram rigor antecedit, quia caliditas exauiorem sensum reddit, humor mordicat, virtus robusta est ob siccitatem mediocrem quam habent biliosi. In quotidiana humoris frigiditate sensus obtunditur, humore robur facit, materia nec mordet, nec facile mouetur, idè adest solum frigus. Quartanas & spurias tertianas & quotidianas quibus bilis admista, & semitertianas anteit, horror medium locum occupans inter frigus & rigorem. Nam causæ non sunt vt in tertiana validæ, nec vt in quotidiana languidæ. Et Galenus ait perfrigerationem aliquando tertianas anteire, & leuem rigorem, præsertim si virtus debilis, & sensus hebes sit. Immo (quod notandum est) permultæ continuæ, & quæ vnica sunt, accensione, à leui rigore & frigore incipiunt, immò & pleuritides ob materiæ vel inæqualitatem & malignitatem: maximè verò id obseruatur in corporibus delicatioribus: in tertianis pulsus magni, vehementes, celeres, omnis inæqualitatis, præterquam febrilis expertes. Magnitudo & celeritas ad robur arteriæ, vrgentem necessitatem & sequax instrumentum refertur: frequentia ad necessitatem, vehementia ad robur. Galenus lib. de typis, paruum & frequentem pulsus agnoscit. Sed locus erroneus est, & facile illis ascribo qui hunc librum Galeni esse negent.

Nec enim ea paruitas pulsus in tertiana esse potest, sed in quartanis pulsus medio loco constitutus est inter pulsus tertianarum & quartanarum. Pulsus rari & tardi sunt, nisi crescat aut vrgeat febris. Nam postulante vsu crebriores & celeriores sunt, ita tamen vt natiua quædam tarditas & raritas maneat. Rari pulsus sunt, cum interpositis longis intervallis arteria pulsat: tardi cum longo tempore paruum spatium percurritur. In pulsu causa agens est virtus, quæ per-

366 CONSILIORVM MEDICINALIYM
 spatium arteriam mouet, ab eius medio ad circumferentiam
 dum distenditur, & eandem reflectit à circumferentia ad me-
 dium, interpositâ quiete dum contrahitur. Sic cum vrget ne-
 cessitas, spatiumque liberum est, & corpus arteriæ quod
 mouetur virtuti paret quæ agit; tunc pulsus magnus celer &
 frequens fit. Contrâ si vsus non vrget, spatium non liberum,
 arteria virtuti non obsequatur, pulsus fit rarus, tardus. Nam
 nec vsus celer refrigerium desiderat, nec spatium liberum
 est, sed humorum vaporumque copiâ præpeditum. Inæqua-
 litas in pulsu quartanariorum facile deprehenditur etiam in
 vno pulsu. Cum enim inæqualitas fiat vrgente necessitate,
 facultate obsequente, sed motum interrumpente, impedi-
 téque materiæ copiâ, aut crassitudine, aut instrumenti affe-
 ctu, vt obstructione, aut compressione, vel constrictione in-
 æqualitas necessariò insequitur. Hæc omnia doctissimus
 Scholiastes & Paraphrastes Galeni in priore ad Glauconem
 exemplis & hypothesibus illustrauit: quæ omnia memoriâ
 sunt dignissima. Sed hæc intelliguntur de iis præsertim quar-
 tanis, in quibus ater succus frigidus & siccus, calidus tantum
 per modum putredinis febrem accedit. Nam prout humor,
 aut est *επιεργηδης* aut *επιουδης*; ita facultate validâ, aut infirmâ, vltu
 postulante, aut non pro conditione humoris, & instrumen-
 to hoc vel illo modo affecto; ita pulsus de raritate aut tardi-
 tate remittit, acceditque ad tertianarum aut quotidianarum
 pulsus. Nam nemo dubitat plerisque succrescere humores
 biliosos futuræ tertianæ parentes, qui tamen retusi, debili-
 tati que, aliterque affecti quàm deceat, aut quòd adsit autu-
 nus iam, aut instet, aliam naturam accersant, febremque
 quartanam inferant. Quemadmodum enim humor naturâ
 suâ frigidus, & talis à tempestate factus, cum alioqui ratione
 suæ frigiditatis inferiora petere debeat, tamen ad partes su-
 periores conscendit in iuuenibus; quod temperamentum
 calidum corporis suscipientis & patientis humorem alium
 cursum motumque capere cogat quàm ipsa natura suadeat:
 Ita quoque humor natus ex se tertianam inuehere, ratione
 tempestatatis potest tanquam de sua discedens natura aliam
 inducere febrem. Istam hypothesim ex Hippocrate & Gale-
 no desumpsimus: reddit enim rationem cur iuuenibus paro-
 tides molles & pituitosæ natæ fuerint, cum materia ipsa cali-

*Comm. in
 part. 11.
 sect. 1.
 h. Epid.*

ginosa frigidâque foret, natâque ad generandos in partibus inferis abcessus: quia, inquit, iuuenes erant, vt calor iuuenilis materiam aliorum conuerterit quàm à natura haberet. Nunc redeamus: Ergo in illa muliere hæc argumenta suadebant non veram esse quartanam, quòd nulla apyrexia, quòd accessio in sudores non desineret, quòd horror non esset; denique quoniâ inæqualitas in vno pulsu quæ in quartanis maximè esse solet, vt antè dictum est, nec natia tarditas varietas que adesset. Quod fit quòd exquisitus non sit humor atrabilarius frigidus & siccus, vt cinis; sed biliosus, qui tamen caliginosior factus, alius febris autor factus est quàm pro ratione sui, quòd vrgeat necessitas magis flabellationis, quàm in veris quartanis, in quibus quoniam humor frigidior sicciorque est, non tantam molestiam affert calor, immò in plerisque plus ipsa horrida concussio conuassatióque molesta est quàm calor febrilis. Accedit quòd in hac biliosa muliere non ita instrumentum præpeditum est vaporum à materia frigida siccâque elatorum crassitie & copia, debuerat incidere in tertianam, sed humor qui erat biliosus aliam naturam acquisiuit, immò & malignitatem, vnde quandam continuitatem afferebat. Nam illud est valdè notandum quòd scribit Galenus, *Nulla febris cum inflammatione, aut maligna humorum putredine intermissionem habet: cum verò intermittit febris, utrumque abest.* At dices: Si quo tempore cacoethia humorum est, autumno maximè: ergo acutissimi morbi pullulare debent. Sed dicimus & acutissimos & longissimos morbos in autumnum incidere: hos quidem cum potius congeries est fæcis quàm humoris maligni: illos verò cum contra fit. Ac quòd id accidat autumno, Hippocrates scribit, *Primum, quòd quartanæ autumno longissimæ, & idem de aliis quibusdam morbis. De malignis ita scribit: Autumno morbi acutissimi & exitiales magna ex parte.* Galenus rationem reddit, *quòd eodem die calor & frigus adsit: Item quòd æstatem autumnus sequatur, in qua assantur humores, & vires debilitantur: tum quia humores sub finem æstatis ad distillationem erant parati, appetente autumno intrò trudentur. Et hæc omnibus communia sunt, maiora verò ex multitudine prætorum humorum cum fructibus vsi fuerunt multis.* Idem quòd in Aphorism. repetit, in Epid. & in lib. 6. *Ferinum autumno & cordis dolores, & horridum, & melancholicum. Quadruplex,*

Com. in
aph. 49.
lib. 4.

Aph. 25.
lib. 2.

Aphor. 9.
lib. 1.

Lib. 2.
pid. 10.

autem est feritas: vna, lumbricorum; secunda, mania; destillationis altera; quarta, cancri & elephantiaeos. Horum malorum causas duas assignauit; vnam mali humoris qui tunc generatur abundantiam, alteram temporis illius inæqualitatem. Denique hoc tempore grassantur morbi mali ob cacoethiam humoris, venenatam qualitatem, inflammationem, impedimentum partium principum, difficultatem curandi, cruditatem humorum cacoehymia coniuictam, temporis inæqualitatem, ob adustionem ratione ætatis præterita: virium debilitatem præterito tempore allatam, inclinationem humoris foris, intro, & præsertim mane & vesperi. Hippocrates enim vesperi morbos autumnales maximè recrudescere: denique ob fructuum vsum immodicum.

In muliere ista humor biliosus est dilutus quidem, & *ελαφύτος* *πιεθρός*, efferatus tamen tam malam febrem committit. Et forte ille humor aliquâ tenuitate præditus, subigendo, tenuando, agitando, causa est tam inæqualis *επισημασίας*, vt idem faciat quod theriaca initio febrium quartanarum data; hæc enim duplices triplicesque quartanas facit, quia tempore & loco non præscripta incidit penetrando, & vnum humorem diuidit, duosque ex vno facit. Statim à sumpto cibo micat calor, aut ratione eius subtilitatis: vel quia intus calor est siccus & arens, qui quemadmodum in hecticis, rei humidæ accessu facillè facillè exuscitatur, & *ἐκλάμπει*. Quod ad curationem; Audito Quartanæ nomine statim ad incidentia, tenuantia, calfacientia, vel etiam vehementiuscula confugimus: sed hæc omnia hîc locum non habent. Nam ideâ distinguitur ab aliis quartanis. Maximè verò diætæ ratio habenda, quod futura morbi longitudo vires validas requirat. Abstinentum glutinantibus, succum crassum generantibus, humectandum: quanquam Galen. videtur interdiceret humectantia. Sed codex græcus erroneus est; nam cum dicit temperandum *ἀπὸ τῶν ἐξεραινόντων*, legendum *ἐνεραινόντων*: nam refrigerantia & siccantia nocent. Quæstio, an in quartana sectioni venæ locus sit. Galenus in tertiana notha, & in quartana, cum de sectione venæ agit, ex hypothese de ea loquitur. De tertiana nothâ ita: *Si sanguinis missione opus est, ea non omitatur*; quasi in tertianis nothis non probet necessariò venæ sectione. At Galenus de tertiana notha loquitur, quæ maximam affinitatem cum quotidianis habet. De quartana ita sensit: *Quartanas*

Lib. 1. ad
Glauc.

1. ad
Glauc.

ad Glau-
cep. 10.

per

per initia moderatè tractabis. Nullum vehemens medicamentum aut
 evacuationem adhibebis, nisi sanguis admodum exuperare videatur. Et si
 secta vena sanguis niger ac crassus, qualis maximè in lienosis perspicitur,
 profluat, audacter mittendus; sin flauus ac tenuis, statim sistendus.
 Idem Galenus de melancholicis loquens, differit. Cum, ait, opi- 7. cap. l.
 nio erit in vniuersi corporis vena melancholicum sanguinem contineri, 3. de loc.
 quò certiore habeas notitiã, vena mediã secetur. Quò si fluens aff.
 sanguis non videatur melancholicus, sistatur: sin melancholicus appareat
 vacua quantum pro laborantis natura videatur. Itaque de quartana
 ex hypothesi loquitur; Si sanguis admodum exuperet: vbi notanda
 vis vocis admodum. Nec dubium esse debet quin si corpus frigidum
 sit & siccum (quod corpus verè quartanis implicatur) à sectione
 venæ temperandum sit. At mulier hæc de qua res agitur, calida est
 & sicca, æstuat, fitit, iactatio, leuia deliria, empyreuma magnum,
 continuitas quædam, immò nondum status typus: metus orgasmici,
 vrinæ sunt flammeæ, mulier est. Mulieres autem luculentiores
 phlebotomias ferunt. Itaque secunda vena est opportunè. Purgationes
 non ita valent ne duplex quartana incidat: vt de Medico narrat
 Galenus, qui quartanario succum cyrenaicum præscribit, coniicitque
 ægrum in triplicem quartanam. 1. ad
Glauc.

Designis prognosticis ita statuendum est. Omnis securitas aut
 ex parte morbi, aut subiecti, aut vtriusque. Morbus diuturnus,
 securus ferè, vt ait Galenus passim: immò ab aliis morbis vindicat,
 ait Hippocrates. Quanquam Galenus docet comm. part. 7.
 in partic. 4. sect. 3. lib. 1. Epidem. eas febres quartanas, quæ ex sect. 6. lib.
 liene sequuntur, id est vitium aliquod peculiare in liene hy- 6. Epid.
 dropem similemque affectum prouocare: non quin propterea 83. part.
 quartana eo nomine non sit secunda, sed ex euentu id fit. Et ne 4. sect. 3.
 cessariò febris hæc quartana longa futura est, primùm quod lib. 1. E-
 per fetalis est, & maximè quæ hyemem attingit: deinde quia pid.
 corpus inclinantis ætatis est, minimùm perspirans. Tertiò quia
 epidemius nunc morbus est, vt quemadmodum tempestas est
 generatrix, ita & conseruatrix esse dicatur. Nisi quis obiciat
 morbum minùs longum fore, quòd ita sit inordinatus: & quæ-
 cumque febres eadem horâ repetunt, sunt ægrè solubiles. Hic
 enim intelligi non debet de autumnalibus quos certa de causa
 erraticos esse diximus. Accedit quòd huic mulieri lien sit infir-
 mus. Si autem infirmitas lienis æstiuas quartanas facit, contra

Lib. de
aëre &
locis.

aphorismum, sicut quodam loco Hippocrates animaduertit, multò magis conferet ista lienis infirmitas ad conseruationem quartanarum. Nec certè aliter cessit. Nam per duos annos perseuerauit ea febris, aliàs ordinata, aliàs complicata, aliàs continua, aliàs aliter affecta. Et in vigore accessionis quoniam turgescebat humor biliosus, erant deliria perpetua. Sed quod mirum est, & Medicis multùm negotij dedit, est quod exacto primo anno tanta fatuæ pituitæ copia in os recurfabat, vt hoc ori stomachi infestum esset, multùm ægræ tædij afferret, necnon appetentiam omnem proiiceret. Dubitabatur an id à pulmonibus foret, an à capite, an ab hypochondriis natante aluo humiditate, quæ liberum exitum non haberet. Illa mulier pulmões habebat infirmos, & fata erat stirpe plurimùm morbis obnoxia. Caput quoque incalcraftum erat à calore febrili. Quemadmodum autem sol incalfaciens cerebrum *stagnans* facit (vt ait Hippocrates) corpusque multà imbuit humiditate: ita calor febrilis & consumere potest humiditatem partibus existentibus robustis, & liquefacere partibus existentibus infirmis, & loco legitimæ nutritionis multam humiditatem potest tanquã causa per accidens inducere. Per accidens, quoniam partes debilitat, sic vt proprium alimentum non probè conficiant; & quoniam appetentiam deiicit, corpusque sitibundum reddit, rerum liquidiorum crebrior vsus est, & proinde multarum humiditatum prouentus. Atque ego existimo tantæ humiditatis & pulmões & caput aut res fuisse. Et illud annotauit Galenus in febribus quartanis, loquens de iis quæ superueniunt talibus febribus: *Quartanum typum insequuntur inappetentiæ, salinationes, aliquando ex causis contrariis appetentiæ intense, tussiculæque ipsis adest, quando corporis habitus corrumpitur.* Et loquens paulò antè de quotidianis, quod antè est etiam annotatum: sed tamen ob loci excellentiam repetere non erit alienum, *aut productis quotidianis rheumatismos thoracis succedere.* Quod fit aliis partibus debilitatis, & à suppressione proprii excrementi quod à se amandare nequeunt laborantibus. Vnde cum mulier hæc potius amuletis & palliatiuâ curâ à quartana liberata esset, & quandam comparasset, inopinatò incidit in inflammationem pulmonis, à qua breuiter interijt. Præterea idem Galenus vnum obseruauit de quartanis, quod perpetuæ memoriæ tradendum est, cum & ad prognosim pertineat, & ad præcauendum ne quid tale contin-

Lib. 1. de
morbis.

Lib. de
Typis.

gat, lib. de Typis. Typus quartanus dum febris vehementior euadit ipse sibi complicator, vt duo & tres fiant quartani, vel etiam vsque ad quandam continuitatem perueniant: rursus dum moderatior est, ad vnum typum reducitur, fit etiam periculosus ob implicita mala, quia phthisim & hydropicas suffusiones sæpè efficiat. Metuebamus huic mulieri hydropem, præsertim siccum; sed nil tale contigit. Remedia quæ sequuntur præscripta fuerunt.

℞. conseru. buglos. cichorij, ceterach & apij an. ℥j. s. folior. sena pulueris sat. ℥ ij. rheibarb. electi ℥ss. cum decocto polypodij. fiat opiata vixenda sape. Decoctum polypodij erit factum perfecte cum saccharo.

℞. succor. menth. absynth. buglos. an. ℥ ij. in quibus infunde agari-
ci albi ℥ ij. fiat syrupus coctus perfecte cum saccharo.

℞. succorum depurat. buglos. borag. pomor. de curtispend. meliss. sca-
ril. an. ℥j. sacchari qu. suff. fiat syrupus, de quo capiat sub linem access.

ANNOTATIONES.

1. Huc pertinet illud Hippocratis 2 Epidem. ζῳνία excitata in quibusdam coloris bonitatem affert.

2. Plerique casuri in quartanas, sentiunt dolorem lienis. Hinc Galen. cap. 4. lib. de Typis, asserit quartanam sequi lienis phlegmonem & tumorem. Oportet dicere quod cum febris quartana primò apprehendit iam est dispositio aliqua in corpore ad susceptionem, & materia in angustiis venarum quodammodo est infiltrata, vt loquuntur veteres, ita vt ea dispositio & infiltratio sequens aut contumaciam materia, aut eiusdem tenuitatem, morbi longi aut breuis sit causa. Nec credere oportet in corpore semper ipsius lienis aut iecoris fomitem esse morbi. Nam in humoribus est qui aut circum lienem continentur, aut circa hepar. Tales autem humores retinent de natura partium quibus vicini sunt.

3. Et lib. de Typis, ait tertianas, & quartanas accessionem habere breuem, αἰών longam: quotidiana autem longam habent accessionem, breuem autem αἰών. Nomine autem anæseos intelligere quoque oportet intermissionem. In 2. de different. febr. intermissionis tempus paruum esse vult. At tamen lib. 1. ad Glaucon. contrarium asserit, immò raritatem & tarditatem in pulsu post accessionem agnoscit.

CONSILIVM LXV.

In quo quaestiones tres explicantur. Prima de Hypnoticis: Secunda de vsu medicamentorum, & praepropera venae sectione in febribus quibusdam. Tertia de ratione purgandi macilenta corpora.

Dvo sunt hoc consilio plurimum annotanda, quorum observatio ad artem praecclare & castè exercendam conferret. Primum de vsu hypnoticorum: secundum de vsu medicamentorum, & praepropera venae sectione in plerisque febribus, in quibus aegri aestuant quidem, & tamen non sitiunt valdè, tamen si lingua indicet multum subesse caloris. Tertium addam de corporibus macilentis, quae cum purgare volumus, eis etiam aegrotantium ipsorum voto valida applicamus remedia. Ad primum inflectit sese oratio nostra. Somnus triplex est, naturalis, à causa naturali, ut cum suavis vapor cerebri meatus leniter obstruit & humectat: in quo satis est capi sensus aut intercepti vt ferientur, cessentque ab opere: vnde cantu, strepitu cytharae, illapsu inflexuque blando aquae somnus blandus irrepit, non partà vllà in cerebro obstructione, nec vllà re cerebrum opplente. Quod tamen Aristoteli placuit, vt existimaret nunquam illabi quempiam in somnum nisi res aliqua cerebrum oppleat, aut saltem colliquatio fiat aliqua. Quod absolum videtur. Vnde enim colliquatio ista cum cantus, blandaque & sonora vox somnum inducit? Galenus autem docet somnū etiam longum nondum contra naturam existentem etiam à sola cerebri refrigeratione oriri, nullā de humore factā mentione. Quod autem solius refrigerationis mentio facta fuerit, patet ex ea diuisione quam proponit; *si refrigeratio (ait) cerebro contingat, somnum profundum facit; si refrigeratio fortis iuncta humiditati lethargicas affectiones inducit; si autem siccitati, ~~etiam à~~ ^{etiam à} ~~est~~*. Sic à sola refrigeratione, mediocri tamen, somnus profundus conciliatur, qui nondum aut comatis, aut similis affectus rationem habet, nisi difficilis sit experfectionis. Cum enim hoc contingit tum contra naturam somnus existit. Et tamen licet non sit difficilis experfectione, non desinit quidam somnus longus in malis duci.

Proptereaque errauerunt quidam veteres existimantes nullū somnum longum mediocritatem superare, esseque contra naturam: vigilias vero contra naturam quasdam longas posse existere. Sed si vigiliæ modum superant, naturamque lædunt, cur non & somnus? Horum dogmata à Galeno pluribus labefactantur in commentariis in aphor. vti & eorum qui soporiferas affectiones & contra naturam existentes, somnum esse longum dixerunt, præsertim dum incipiunt. Sic quidam somnus est naturalis per blandam anathymiasin cerebrum capientem, actionesque cessare ferientem, sensibus quodammodo ligatis, qui per vigilias absoluntur. Alius est contra naturam à causa alieniore, vt Galenus pluribus locis explicat, vt in catalepsi, cataphora, apoplexia, yeterno, & alius generis eiusdem apparet. Tertius autem medius, ab vtrisque causis nascens, & is à naturali longius recedit, contra tamen naturam nondum planè existit. Eiusmodi somnus in pueris & temulentis apparet, & interdum iuuat ad coctionem & ebrietatem tollendam. Vnde Carus ab Hippocrate non videtur omninè damnatus, tametsi contra naturam affectio sit, & affectio sit soporifera (quæ vox somnum maximè contra naturam reddit, vt ex Aphorism. patet) Galenus in Comment. & in pueris & temulentis, & ægris obseruauit, præsertim cum diu per morbum vigilassent, profuisse plurimum. Plura illo commentario 2. Prorrh. legere possis. Porro ille somnus qui quantitate potius quàm qualitate molestâ. Sed est somnus alius veluti quartus vsu rerum soporiferarum inductus, cuius gratiâ sermo hic est institutus, vt doceamus quibus modis inducto illo somno in ægrorum commoda peccetur, & cum ita peccetur, quæ ratio sit ineunda, & quatenus in eius inductione, nemietate & insolentiâ erretur, sit insitendum. Cæterum somnus ille hypnoticis inductus, cum blandam benignamque anathymiasin causam sui agnoscat, à naturali descendit, somnòque contra naturam similior redditur; quod refrigeratione & humedatione fiat, duabus nimirum rebus febrium causæ calidæ & siccæ oppositus. Et quatenus ita inducitur contra naturam aut præter naturam somnus dicitur, quatenus autem non nihil adiumenti affert, immò plus commodi naturam, recreando

Gal. in
aphor. 3.
lib. 2.

Cap. 5. l.
3. de loc.
affect. &
comm. in
aphor. 3.
lib. 2.

In Pror-
rhet. par.
28, lib. 2.

Com. in
aphor. 3.

diuturnis vigiliis lassatam, tritam, fractam, debilitatamque, quam detrimenti, quod inducatur à rebus contra naturam existentibus, quodque aliquando in malam *ἀσθενησιν*, trahat cerebrū.

*Aphor. 1
lib. 2. A
Pao.*

Sic mediocritas tenenda maximè est. Vt autem somnus etiam maximè naturalis, aliàs iuuat, aliàs nocet, vt initio paroxysmorum; sic somnus contra naturam etiam iuuat ex euentu, cum sit melius naturam vigiliis afflictam quacunque ratione leuari, quam eam finire atteri, ac afflictiozem reddi. Vnumquodque autem ex eo metuendum, quod aut officiat, aut iuuet, vt de hæmorrhagia Galenus contendit, quæ etsi contra naturam suo genere existat, opus tamen naturæ vtilitate ipsa conferenda, dicatur.

*Lib. de
differen.
motib.*

Idem de somno. Sed in eo conciliando prodigos nos esse non oportet, satis est esse liberales. Etenim & incuntibus morbis, & in vigore, & omni tempore morbi, siue etiam calidi, siue frigidi morbi sint, dummodò aliqua sit somni vacuitas, vt videantur Medici semper aliquid moliri, hypnoticorum vsu sese ægris consulere arbitrantur. At errant longè. Nam sæpè *κατασκευασ*, & alia id genus mala inducunt. Dum enim exitu prohibentur excrementa *ἀπομαρμα*, cerebrum offenditur. Galenus ex sententia

*Com. in
part. 55.
lib. 2 de
dica. acut.*

Hippocratis sententiam commemoratione dignam profert de incommodis vigiliarum immodicarum, præsertim factâ quadam ad insuetas mutatione vigilias, & somni longioris præter consuetudinem inducti, disputans. Exempli gratiâ, in morbo aut sanitate quis vigilat etiam supra mediocritatem, somnifera adhibes, tu in contrariam partem naturam adducis, & mutationem affers, noces plurimum. Nam & vigilie *ἰσχυρὰ* cibos crudos incoctosque reddunt, ait illo loco Hippocrates: & mutatio ad somnum multum siue per se, siue de industria inductum, quod in comment. elegantissimè Galenus vocat *ὑπνον ἐπιτηδουδέτην* torporem, segnitiam, langorem, grauitatem capitatis, & *ἐφθόνην* affert, vt dicit Hippocrates. Nomine *ἡ ἐφθόνη* accommodatè & significanter Galenus vult intelligi *τὸ τὰν ἕκλυον*, id est virium ac roboris exolutionem: Latine autem redditur *ἐφθόνη* excoctio: & homines qui immodicè dormiunt *ἐφθόνοι* dicuntur, latine recocti excoctique, gallicè *perboulus*; quod eorum caro fit humidior reddita, habitusque corporis albicantior & tumidior, idque fit ob suppressionem fuliginosi excrementi, halituosique, quod per vigilias digeri deberet ac exhalare. Plura

illo commentario legi possunt. Et hæc præsertim in sanis intelliguntur, quibus arctior profundiorque somnus placet & longior. Sed in ægris est vbi hypnotica conferant, est vbi officiant plurimum.

In affectibus calidis cerebri, vigiliis, & febribus continuis soporifera maximè Medici vsurpant. Vigiliæ fiunt propter calorem primæ partis sensificæ, ait Galenus, idque vel propter simplicem intemperiem, vel ob copiam biliosi humoris in eadem parte ferocientis. Hoc videndum in calidis affectionibus cerebri, siue sit intemperies simplex, siue cum humore, ne imprudenter vsurpemus hypnotica, siue in tempore, siue in vsu crebritate. nam sic ex calida intemperie fit frigida, quod pessimum est. Accedit quod exitu prohibeantur humores tenues, siue quod per ventrem euacuari possent, siue per halitum. At dices, incrassantur? quid tum? Bonum quidem eorum acrimoniam retundere vsu temperantium, non autem stupefacientiũ vsu. Et licet retundant, ista retusio à talibus facta plus afferet incommodi nam diffatu per cutim, & refluxu à capite tanquã parte principe prohibentur humores, deinde repressi in capite vsu stupefacientium vim suam cerebro imprimunt. Vnde videmus etiam fatuos, stolidosque quosdam effici vsu narcoticorum etiam moderatorũ. In tempore quidem peccatur, cum initio morborum damus, obstruimus enim tunc, materiamque crudiorẽ reddimus, & naturam hebetiorem reddimus, nedum vegetiorem. Et omnium grauissimè peccant etiã in vigore morborum stupefacientia hypnoticãque præscribentes: nam tunc natura aggreditur coctionem, materia est mitificata, facultas vitalis & naturalis fortes etiamnum persistunt, animalis autem infirma est: ob quam infirmitatem Galenus vetat ne quid tentemus. ³ At stupefacientia cerebrum ipsum hebetius reddendo, infirmius faciunt; propterea error committitur maximus. *Quin* etiam contra quod Galenus dicit in vigore aliquando facultates sunt attonitæ & imbecillæ, ac tunc hypnoticon non cõfert. sopiuntur enim ipsæ facultates, nec *ἐπεδρωσίου* humoris percipiunt: & ita crisis non fit. Dicam quod experientiã compertum est, huc pertinens maximè & obseruandum diligenter, ne quid tale in communem hominum perniciem perpetretur. Gener cuiusdam satellitis Regij nomine Candæi febre causode laborabat,

Com. in
3 lib. 2.

Medico-
rũ error.

Com. in
apho. 29.
lib. 3.

Intomnis erat. Circa nonum diem cùm naturæ aggressio cõ-
 cursioque expectanda esset, capiti pulvis exenteratus est ap-
 plicatus, eodẽmque tẽpore syrupus diacodyonis cum deco-
 cto lactucæ præscriptus. Illi & præsentibus visa sunt mitiora.
 Tribus aut quatuor horis post cùm sese in somnum conuer-
 tisset, inuentus est exanimis & extinctus. * Credibile est hoc
 contigisse quod per stupefacientia somniferæque facultates
 languidiores redditæ forent, die præsertim critico. Si hu-
 mores non stimularunt naturam, aut eam languidam stimu-
 larunt, eodẽmque vsu suppressâ malignâ materiâ quæ per
 sudores aut aluum proiici debuisset: sic mors de repente in-
 uasit. Idem in Cymæterio Sancti Ioannis mulieri contigit,
 cùm in vigore morbi stupefacientia præscripta essent; nam
 de repente refrixerunt partes, ac interiit. Idem ad insigne S.
 Trinitatis vicò S. Antonij. Itaque nec initio morborum, nec
 in vigore sunt admouenda stupefacientia, præsertim in acutis,
 nec pulli exenterati; nam multùm conturbant, & ad ca-
 put alliciunt suo calore; vnde sensuum fit oblæsiõ. At op-
 portunè dari possunt in morborum incremento.

*De phre-
 nitis de c.
 6.*

Præter autem exemplorum fidem, idem clariùs manife-
 stiùsque reddi potest autoritate Tralliani, qui narcoticorum
 anodynorumque vsum viribus præsertim infirmis suspectum
 esse ait, immò etiam mortem sæpè inde aduenire confirmat.
 Nam influxum refluxumque humoris impediunt, obstruunt,
 naturam hebetant, eiusque aciem retundunt, & alia consi-
 milia afferre solent. De iis plura legere possis apud Dona-
 tum ab Altomari.

De corporibus macilentis, attenuatis, squalentibus, ari-
 dis, astrictæque aluo præditis hoc loco agendum est, an his
 validioribus medicamentis sit consulendum, quod non nisi
 ægrè aluus illis soluatur. Cùm vna ex causis astrictiõis alui
 causa sit retentricis firmitas, præcordiorumque ^{causis}, vi-
 demus frustrâ eiusmodi naturas validioribus medicamentis
 vexare, aut quod eorum querelis obtemperemus, qui ope-
 ram nostram ludant, pote quibus medicamento nostro aluus
 non sit soluta, aut quòd malè credamus: quòd aluus ægrius,
 & magis ^{ægrè} aridius egerit, redditque, vt in Prorrheticis &
 Prognost. loquitur Hippocrates, eò de validioribus medi-
 camentis

camentis esse agitandum. At longè fallimur. Eiusmodi ventres siccos, arentes, ex Hippocratis libris vocare possumus, *ambustos, exustos* ve duobus in locis: priore, cùm loquitur de lapidi generatione ob æstum ventris: *Quibus*, ait, *alium ardens ac feruida fuerit, his vesica coardescit*. Posteriore autem dum loquitur de aquarum delectu: *Quorum ventres duri sunt, & ad hoc idonei ut amburantur, his dulcissima, leuissima, ac splendidissima aqua ex usu sunt*. Non duras aquas præscribit, non aluminosas, non nitrosas, quæ tamen viderentur alium sollicitare, contra dulcia, mollia, liquidaque præscribit. ⁵ Eadem & medicamentorum ratio esse debet. Nam vt ad ventres ardentis, aquæ molles & dulces; ad ventres, inquam, ciendos conferunt, sic & medicamenta eccoprotica, lenientia, mitigantia, leniendo soluentia. Contrà verò obsunt plurimùm ea quæ astringendo purgant, aut quæ impensè calfaciunt, vt omnia quæ scammonium recipiunt. Nam cùm siccitas ex iis sit quæ facultatem retentricem roborant, firmantque, ex quo alui pigrities consequatur, nemo dabit plurimùm incommodi allatum iri si impensè siccantia & calfacientia medicamenta corpori facultatem retentricem præ siccitate robustam habenti exhibeantur. ⁶ Sic pueriliter errant Medici id genus medicamentorum consulentes. Itaque cùm corpora gracilia, sicca, duritie alui prædita ad medicamentorum vsum adducimus, lenientia potius quàm valdè attrahentia vsurpare debemus. Immò ea corpora præhumeatere oportet eo modo quo & consulit Hippocrates in Aphorismis, loquens de vsu Elleborismi. Idè quidam ex nostratibus Medicis sic illa corpora purgabat, vt per tres dies continuos, & bolis cassiæ tanquam alimento sumptis, & iusculis vitulinis præhumeatere ac præpararet. Quæ omnia admonita volumus, vt ignaris, aut doctis quidem, sed tritâ viâ vtentibus: & ita turpiter hallucinatis recta medendi ratio præmonstretur. Aliquid simile scriptum est ab Aëtio in sua medendi methodo. Item eadem res breuibus verbis à nobis explicatur huius libri initio.

Tertium à nobis erat institutum de iis qui febricitant insigniter satis, sed non valdè sitiunt, & leuibus momentis exhorrescunt, in quibus non est æquum vsum magnorum remediorum accelerare, præsertim cælo paulò frigidiore. Innumeros vidimus hyeme tepidiore febricitantes eo modo quo descriptum à nobis est, quibus Medici præproperè vulgatam nimium me-

Lib. de
aere &
aquis.

Aphor.

Cap. 4.
Tetrabil.
3. serm. 1.
& ca. 13.
causa.
Terribilis
& f. res.
causa.

dendi viam sequentes, & sectionem & purgationem adhibent, decepti & illâ vulgatâ nimium viâ, & malè in vsum conuertentes illos Hippocratis aphorismos Hippocr. *In principis morborum si quid videtur mouendum, moue.* Item, *In acutis passionibus raro, & id initio, &c.* Item, *In his tardare, malum.* Nam alius aphorismus, *Cocta medicari ac mouere, non cruda, modò non turgent, nec in principis, &c.* Hic (inquam) aphorismus est multò generalior eo quo nituntur, *In principis morborum si quid mouendum, moue.* Etenim per comparationem tantùm loquitur, conferens principium & augmentum cum aliis temporibus, in quibus ab opere desistendum suadet. Sed cùm vetat mouere ea quæ cruda sunt, cauet ne remediis nostris agitemus frustrâ ægros quòd ludatur opera. Et cùm vult non morandum esse, sed statim aliquid moliendum de acutis morbis agit. Dicimus autem in acutis reuerâ non esse procrastinandum, sed statim moliendum aliquid: non idem est iudiciùm de iis qui parem acutiem non habent. Et reuerâ in vtrisque ecoprotica dare sufficit, non scâmoniata eradicantia medicamenta, in quo grauiter peccatur. Et reuerâ quibus blando medicamento initio consultum est, ij meliùs habuerunt, progressóque morbo sine strophis plus vno medicamentulo exercuerunt, quàm valido medicamento initio. Et ausim hoc affirmare plerosque vsu eiusmodi medicamentorum dum frustrâ conamur initio materiam euellere, excreuisse tantùm multam serositatem quæ morbum contumaciore reddidit, & nil profuit. Et maxime in eo errant Medici quod aphorismum istum, *si quid videtur mouendum, &c.* & *Tardare malum*, æquè æstate & hyeme & autumno vsurpant. Potiùs audire debent illud, *Plurima non turgent*, vt non ita ad medicationes festinent, & sectionem venæ. Et reuerâ sectione venæ ita citò celebrata in morbis non acutis, laudabilis tantùm sanguis educitur eum magna virium iactura. Sic melius esset leniens medicamentum bis exhibere, & sectionem differre. Sed hæc satis per se manifesta sunt, & tamen plerosque latent veteri mendendi methòdo addictos. Etenim nemo dubitat hyeme & autumno contumaciores esse humores, & minùs fluxiles quàm æstate, aut verno tempore, præsertim sub finem. Et ita frustrâ, temerèque fortibus medicationibus diuexantur ægri. Signa porrò duo adiunximus febribus hybernis, in satis ingenti febre non magnam sitim, & frequentem frigoris sensationem, & rigo-

res. ⁸ Quæ duo posteriora non tam sunt à motu humorum, quàm quia conclusus calor est intùs in venis insidens multò maior quàm se foris proferat; ideò reuocatio fit spirituum & sanguinis. Itaque nimium externi frigoris appulsum faciliè percipiunt, & ita leuiter exhorrescunt. Accedit & humoris qui tunc in vitio est contumacia. Nam retinens de natura hyemis est partim biliosus, partim pituitosus; vt mirum non sit si istam inæqualitatem inducat.

ANNOTATIONES.

1. Aliud est coctum & mitificatum, aliud crudum & incoctum. Nam quæ coctionem admittunt, in familiaremque natura succum conuertuntur: tã à natura non item, sed tantum mitificantur.
2. Hippocr. dicentur effæti, turgiduli, & excocti. Et Hippocr. quod notandum est, notat quandam constitutionem temporis, in qua febres desinebant statim, sed reuertebantur, & agri erant acuti, & incocti. Excocti.
3. Quæstio præclara est; An facultatis animalis ratio sit habenda in morbis: Et an verum quod Galenus ait; Nil tentandum in vigore morborum, cum facultas animalis sit infirma, an ea infirmitas sit estimanda. Non ceriè quoad motum, nil attinet enim moueri; sed quoad sensum. Vnde videmus obstupefactis sensibus motus naturales fieri symptomatizos; Magna enim facultatum inter se consensio est.
4. Somnus per se stupefacit, corpus torpidum reddit ac graue: meatus obstruit, vt præclare Hippocrates lib. de flatibus docet: multò magis id præstat si præter naturam inducatur. Maxime autem usum somniferorum verebimur in iis quibus frigidius cerebrum, quamuis vigilent; quia facile vires exerit in cerebrum res somnifera.
5. Ego obseruauit in operibus artis, medicamentum etiam blandum horis pomeridianis tribus horis à prandio exhibitum magnum habere effectum. Hinc discere possumus in his quibus aluus admodum astricta est ex usu esse si quatuor horis à prandio exhibeamus pharmacum.
6. Tamen Hippocrates lib. de Locis in homine, tutius macilentos purgat quàm crassos.
7. Præsertim nisi sit explicatus pulsus, aut ceriè scias à sanguinis copia obrutum pulsum, non à copia humorum in mesarao contentorum.
8. Galenus com. in part. 2.6. sect. 3. lib. 6. Epid. scribit omnes cacochy-
mos cum repente calsiunt inhorrescere.

CONSILIVM LXVI.

De fluore vterino. Pro illustri Domina de Marchaumont.

ANTE disputatum est de profluuio ab vtero, cuius variae cause, & species ab Hippocrate explicantur in libris de morbis mulier. vt antè dictum est. Hic remedia præscribentur quibus fluor quidam vterinus in illustri Domina oppugnatus fuit, sed non victus, qui illi ardorem summum & dolorem in lumbis excitabat; vt iis mulieribus contingit quæ ita affectæ sunt.

℞ rad. petrosel. fœnicul. cort. cappar. an. ℥ ij. polyp. rad. plantag. an. ℥ j. chamædr. & capill. an. m. x. buglos. beton. scariol. agrimon. an. m. j. s. sem. melon. cucum. bardane, urtica, pipinel. milij solis an. ℥ s. sem. raphani ℥ ij. summitat. málua, veronica, urtica, herniaria an. m. j. pass. glyc. ana ℥ s. mercurial. m. ij. fiat decoct. In colat. ad lib. dissol. sacchari albi lib. j. express. ℥ ij. rhab. & ℥ j. agar. infus. in parte decoct.

℞ succorum pomor. de cartip. buglos. meliss. borag. an. ℥ ij. decoct. passul. glyc. thamarind. florum violar. lib. s. inf. sol. sena ℥ ij. agar. ℥ j. s. sacch. lib. j. fiat syrupus coctus. Dosis ℥ ij. ex decoct. semin. acerof. portulaca, melon. florum nenuph.

Ob istum ardorem hoc fuit institutum.

℞ unguenti refriger. ℥ ij. pro litu renum. ℞ medull. crurum cervi ℥ j. s. Lauetur pluries in aqua ros. adde ol. ros. ℥ j. mastich. ℥ ij. fiat litus pro spina dorsi.

Ingressa est balneum, & mastiche cum oleo absynth. & cera stomacho applicata est.

℞ faucium lucij, coralli rub. an. ℥ ij. cornu cervi vsti, margar. elect. carab. an. ℥ j. tartari vini albi prepar. ℥ j. sacchari ros. quod suff. fiat puluis, cuius capiat duo cochlearia cum decoct. absynthij.

℞ electuarij diatrag. frig. ℥ j. glycyrrh. ℥ ij. terra sigil. lota aqu. ros. ℥ j. 4 semin. frigid. maior. & seminis papaueris albi an. ℥ j. s. fiat puluis, vtatur cum syrupo violato.

℞ pulpæ sem. melon. cucurb. citrul. amygdalarum dulcium an. ℥ j. terantur, & fiat emulsio cum decoct. rad. gram. asparagi, glycyrr. addendo sacchari ℥ j.

Et cum illi lien obduruisset, hoc quod sequitur est institutum.

℞ gummi pini, cera noua, an. ℥ ij. picis naualis & resina an. ℥ j. sulphuris viui ℥ ij. dissolu. in aceto forti: omnia extende super alutam pro regione lienis.

Fotus astringens.

℞ aqua fabrorum lib. s. malicor. balaust. nucis cupr. & berberis an. ℥ ss. fiat decoct. in colat. dissol. sangu. dracon. thuris an. ℥ i.

Eidem cum menstrua non fluerent olim quæ sequuntur prescripta fuerunt.

℞ rub. maioris, fœnic. petrosel. asparagi, rad. capp. polypod. cort. tamar. an. ℥ ss. rad. bistor. ℥ ij. agripal. calaminth. an. m. s. omnium capil. an. p. ij. meliss. hyssopi, agrimon. scariol. an. m. j. semin. anisi, endiuia, cascate an. ℥ ij. florum card. anthos, genest. an. p. j. fiat decoct. ad lib. In colat. dissol. syrup. de arth. ℥ ij. diarrhod. abbat. ℥ ij. fiat apozema.

℞ ceterach. pulueris. rasura eboris, cornu cerui, cara, an. ℥ j. cinam. gr. ij. puluer. electuar. j. diacub. ℥ s. ossis de corde cerui, margar. elect. puluer. diarrhod. aromat. ros. an. gr. viij. cum saccharo in aqu. buglosa soluto. Fiat electuarium per tabellas. Deinde fiat fotus ex decoct. herbarum uterinarum, rad. apij, cypp. calami aromat. rad. fœnic. apij, rub. maior. valeriana, artemisia, nepet. pulegij, calament. bistorta, dictamni.

℞ trochiscor. de myrrha ℥ ss. iniectorum in carbones fumus excipiatur.

℞ succor. arthemis. hyss. agripal. herbe cati. an. quart. j. saccha. quod sufficit. fiat syrupus: capiat ℥ j. s. cum ℥ ij decoct. lupulorum, arthemisia & cinamomi.

℞ ladani ℥ ij. benioin ℥ j. s. caryophyll. ℥ ij. cum oleo de ben. Fiat suffitus concinnatis trochiscis.

In acerbo dolore vmbilici, & partium vicinarum.

℞ emplastri de mucag. Unguent. dialib. gummi ammoniaci in aqua vite soluti an. ℥ j. sagap. opop. an. ℥ ij. rad. aristoloch. irecos, an. ℥ ij. s. cum terebinth. Fiat emplastrum, factus sacculus ex ℥ ij. s. radic. althea, origan. calament. arth. thymo, bismal. seminib. lini & fœnugr.

℞ prædiesti decoct. lib. j. in qua dissol. confect. de baccis an. ℥ ss. olei rut. & anet. an. ℥ j. s. mithridat. ℥ ij. s. fiat chlyster.

℞ syrup. de arthem. ℥ j. s. decoct. rura, aristoloch. & dictamni ℥ ij.

℞ trochisco. de myrrh. ℥ ij. castorei ℥ ij. pulu. aristolochie rotund. ℥ j. agar. trochisc. ℥ ij. salis gemme ℥ ij. croci ℥ j. cum syrupo de arthem. Fiat massa.

Et cum quereretur quod non conciperet, hoc prescriptum est.

℞ succorum calamintha, nepeta, agripalm. arthemif. scolop. meliss.
an. ℥ iij. decoctionis sequ. lib. j.

℞ rad. bistort. eryng. aristoloch. an. ℥ s. pulegij, thymi, epithy. an. p. j
sem. anisi, fœniculi an. z ij. lingue anis p. ij. rub. maior. ℥ s. matricem
leporis, coagul. eiusdem z ij. Fiat decoct. in lib. s. succorum pomorum, &
lib. j. aque arthemif. & lib. s. aque marian. Coletur totum, & bulliat
donec redeat ad lib. j.

℞ prædictam lib. prædictos succos, in quibus maceretur nodulus z ij.
radicis bistortæ, & z iij aristoloch. & myrrh. z j. croci scr. j. sacchari albi
buglos. lib. j. fiat syrupus coctus: capiat manè z j. s. cum decoct. arthemif.

℞ puluer. matricis leporis in furno siccata, rad. aristoloch. an. z ij.
sete intinct in xermes margarit. elect. an. z j. carab. ℥ j. sacch. buglos.
z ij. s. Capiat quotidie cochlear unum cum decocto puleg. & pass.

℞ ros. rubr. z ij. myrrh. mastich. an. z j. myrril. sang. drac. an. z s.
styr. calami ℥ s. ladani z ij. ambra gris. moschi, ligni aloes an. ℥ s. fiant
trochisci pond. z j. excipiatur fumus manè.

℞ olibani & myrrh. an. z s. ladan. benioin an. ℥ j. sem. carui, dauci,
cumin. & pastinaca, agrest. an. ℥ j. folior. orig. sicci z j. fiat puluis &
cum terebinth. & floribus lauendula fiant trochisci: utatur in sella per-
forata.

CONSILIVM LXVII.

De febre hectica..

Iacob Carpent naturâ biliosus, & præcalidis visceribus
præditus, post purulentas urinas in febrem hecticam inci-
dit intestinis vlceratis. Tandem aluus liquidis excrementis flu-
xit facultate hepatis & œconomiâ iam iam labascente & labo-
factatâ. Verumque illud in eo compertum est quod ab Hip-
pocrate dictum est; Si ex aluo tenuia, agro minimè sentiente, cum
tamen liberè ratiocinetur, malum ut hepatico. De cuius aphorismi
veritate antè dictum est. Nam summam paupertatem caloris
naturalis, casumque facultatis in hepate sitæ significat. Ventum
est ad lac asinæ: & cum ne hilum proficeretur, infirmitatisque
& virium lapsus maiora ederentur argumenta, destillato in-
staurante ei consultum est.

℞ turtures num. 3. pedes vituli & agni iuuenis vel capreolorum an.

num. 4. hepata gallinarum & capi iuuenis an. 6. num. pellicularum stomachi gallinarum ℥ j. berberis conditi, granorum granatorum an. ℥ ij. carnes quatuor myrobol. emblic. carnosar. pinearum pistacearum an. ℥ ij. iuiub. sebest. an num. 20. testud. nemo. tres, conser. rosar. symph. an. ℥ ij. micam panis albi macerati in decocto capi iuuenis, decoctionis duorum pullorum & carn. vitullin. alterator. cum seminib. frigidis, & papau. & hordei lib. ij. fiat omnium distillatio in alambico.

℥ rosar. rubr. malabath. an. p. ij. scabios. & rad. dictam. an. p. s. rad. cyp. cal. aromat. scænarth. an. ℥ j. s. ligni aloes & cedri an. ℥ ij. Fias decoct. in vino albo & aqu. rosar. In colat. ad lib. j. dissolu. pulv. diamargar. frig. ℥ ij. theriac. & misbrid. an. ℥ j. s. fiat epith. pro corde.

CONSILIVM LXVIII.

De Gonorrhœa virulenta.

NOBILIS mulier à marito inita, qui cum prostibulo impuro concubuerat, inquinatur: hinc gonorrhœa virulenta malè fluorem muliebrem repræsentans. Quæ excernuntur cum virore pallefcunt. Iam fluxus ille per annos persecrauerat, illam à varijs morbis vindicans. Tamen propter contagionem massæque sanguinis labem valetudinaria est; quoniam, credo, non satis largiter virulentus ille humor decurrit. Menses planè subsistunt. Atque hinc illincque metus ingruit quidam. Nam si supprimatur illud *beu. u. d. s.* & virulentum, pernicijs consequetur, sin fluat tametsi suo exita commoditatem affert, tamen in maciem ita laborantem coniiciet. Quod ple-risque vsuuenit; siquidem non potest non afficere partes per quas traducitur, ineunte vere quo præsertim tempore omnia repuerascunt, summam in renibus grauitatem sentit. Deicitur appetentia: languet: munia non obit sua. Dolores in ventre excitantur toto. Quo medicamento exrheo & syrupo laxat. sæpè adiuta fuerat, eodem occurritur: malum recrudescit. Tandem diu noctûque ita vexatur vt ferendo non sit. Pulsus languidus & sepultus: facultatum omnium ferè concussio, ac maximè vitalis. Surfum deorsum fertur materia. Quaritur quid sit opus. Sensim atque sensim crescunt dolores pungentes & ferientes, diuellentésque membranas. Dolor turgens est, & qualem Ga-

384 CONSILIORVM MEDICINALIVM
lenus describit in lib. 3. de locis aff. id est, in partibus quibusdam sentitur dolor veluti à remota alia parte velut radice deriuatus; quod notandum est, falsò credunt colicum esse dolorè: propterea que, vt ferè fit, liberales nos esse debere in vsu rerum calidarum: immò tali vsu agradesbat magis: In eam sententiam ventum est, vt crederemus in prouocando illo fluore incumbendum esse, alioqui frustra operam duros. Atque ita prouisum est. Primùm is clyster iniectus.

℞ malua, bismal. arthemisia an. m. j. sem. pæonia rubentis ℥ j. agri-palma p. j. rad. petrosel. asparagi an. ℥ j. sem. lini, fœnuigr. an. ℥ s. fiat decoct. In colat: dissol. terebinth. ℥ ij. sacchar. rub. ℥ j. olei lilior. & chamamel. an. ℥ j. s. vitellos ouorum duorum. fiat clyster.

Eodem die excitatus vomitus materiei virulentæ, & eius que olim per inferiora ferebatur. Non à ventriculo erat, sed ab iccinore & regione renum, vt coniecturis deprehendebatur. Quæstio, an esset sistendus, an iuuandus. Non placuit iuuare, ne materiam quæ per inferiora moueri deberet, aliorsum reuelleremus. Vrgentibus doloribus coacti sumus adhibere balneum, vti succo amygdalar. dulc. cum vino hippocrat. Cessabant statim dolores: è balneo egressæ redibant. Secta venain maleolo adhibiti pessi ex hiera diacolocynt. puluere hieræ & galyopf. addita styraceliquida: & inuoluti sunt santalo. Deinde pilulis de hiera cum agarico & rheo consultum est. Tandem repetiti clysteres primo similes. Et præscriptus bolus sequens post balnea:

℞ terebinth. veneta ℥ ij. rheib. ℥ j. cum syrup. capil. ven. capiat.

Secta vena in brachio ob turgentem in lumbis dolorem. Applicatæ cruribus cucurbitulæ. Tandem ad decoctum farseparrillæ ventum est ad proliciendos sudores. Prouocati sunt atque ij admodum foetentes. Vtcunque conualuit.

CONSILIVM LXIX.

De febre erratica.

PVER annos natus nouem, præcalidis visceribus, & capite satis amplo, cum olim satis imbecillus & valerudinarius, iam paulò grandior factus, certis quibusdam interuallis accessionem

tionem habet febrilem cum atroce capitis dolore. Derepentè & incogitatòprehendit dolor capitis, deinde febris vehemētissima cum oculorum rubore & genarum, ac si ynocho prehenderetur. Accessio est duodecim ferè horarum, aliquando multò minor, & sudore finitur: Tum alacer existit. Quæritur quæ causa huius febris quinquies sexiesve in anno repetentis: & quid tandem sit euenturum inde. Non est dubium quin ex Galeno, periodo reducès febres & dispositionem partis, & materiam habeant causam sui. Quænam dispositio, an in cerebro, an in hepate, an in mesenterio? Fortè in cerebro est, vnde dicimus quosdam esse febres partium proprias, vt hepaticas febres, lienosas, cuiusmodi febres virginum fœdis coloribus laborantium, alias cephalicas, quæ non modò symptomaticæ dicuntur, sed & essentielles. Sic collectæ in cerebro materiæ motu, siue putredine (quæ non ita facilè acquiritur in cerebro vt in ventre inferiore) febris excitari potest, quæ discussione materiæ facile euanescit. Et quod magis mirum, hæmitriteæ febres tabificæ dicuntur, ac si peculiariter affectionem pulmonum sequerentur, quod Galeno in Epidemiis placuisse videtur. Et ego legi siue apud Galenum, siue apud alium nescio quem auctorem, septenas febres, id est quæ septimo quoque die, & quintanas quæ quinto quoque die repetunt, tabidorum proprias esse, ac si peculiarem collectionem humoris in pulmone contenti sequerentur: & tamèn essentielles febres dicuntur. Si in isto puello materia in mesenterio coërcita, sed mota, & non exclusa, tam tetrum capitis dolorem excitans, febrem facit; cur non plurium horarum aut dierum? cur non putret? Si putris, cur putredinis notas non edit? & tamèn vrinæ sunt admodum tenues & aqueæ, quas in pueris damnat Hippocrates. Si putris, cur non promittit producitque febrem? Nec enim diaria esse videtur, cum huius non sit proprium tam sæuum symptoma inducere, & tantam in vrinis mutationem asserre. Mihi videbatur febris à liene esse, quòd Hippocrates obseruauerit in febris erraticis vrinas tenues esse splenicis: & etiam sæpè sine tumore perspicuo dolet illi regio lienis: quod declarat in eo esse imbecillitatem & circum partem illam melancholici humoris à natura biliosi retinentis collectionem, à qua efferuntur vapores non maligni quidem (vnde enim tanta malignitas in puero) sed veluti flatulenti qui dolorem acerbum efferunt: qui si

Gal. sub
sim. lib. 2.
de diff. febr.

Et Hippocrati
part. 9.
sect. 2. lib
1. Epid.
Quintana febres
& ania
tabem,
& tabidis factis
adsunt.

Lib. 3
Pregn. 3

In Coas.

in cor reperent, palmum cordis afferrent, si in ventriculos cerebri aliquid epilepticum: sed per inanes meandros feruntur, vnde dolor tantum capitis excitatur. Et revera tenuitas urinarum, error febris, taciturnitas pueri, dolor ad sinistrum hypochondrium surgens, splenicum quid significant. Accedit & prima educatio. Nam & mater, & nutrix magnis molestiis in gestationis & lactationis tempore captæ fuerunt. At ex Hippocrate qualia gestationis tempore patitur mater, talia infans: & idem de nutrice. Aduſtio enim quædam facta est humorum. Id iuuat plurimum hepatis calida intemperies, quæ succos exurit. Quod si aut maior copia foret materia, aut à pituita non superaretur; aut si putredinem acquireret maiorem, cum leue tantum rudimentum esse videatur, maior quoque febris sequeretur: Et nisi prouideatur, verendum ne aut quartanarius, aut epilepticus per consensum fiat, aut successu temporis per propriam cerebri affectionem. Et illum humorem verum putredinis characterem non habentem natura secernere nititur, sed non excludit tamen. Ac verendum ne illud tandem contingat quod in Prorrheticis ab Hippocrate dictum est: *Cui circa lumbos dolores sine appetitus amissione voluntur ac reuoluuntur, iis si dolor adangetur atque intenditur cum febre & cibi fastidio, convulsivum aliquid fit*: supp. per translationem materiei quæ diu in ventre inferiore cunctata malignitatem acquisiuit; cuius ratione in cerebro epileptica symptomata est excitatura: Ac tandem tempus ipsum nobis aperiet quid futurum sit. Tamen dum id expectatur, non erit alienum & toti corpori, & partibus quibusdam consulere: ac toti quidem corpori sequenti decoct.

℞ lupulor. & florum violar. an. p. j. radicum aperitivar. an. ʒ ij. infunde folior. senæ ʒ iij. cinamomi ʒ j. In express. dissol. syrup. de cichor. simpl. ʒ ss. fiat potus.

℞ conferu. rosar. buglos. & rorismar. an. ʒ ij. theriacæ ʒ ss. cum syrupo conferu. citrij. fiat opiata vtenda sero.

Item ℞ rad. epula-camp. rad. bryonie an. ʒ ij. polypod. fumiter. scolopend. ceterach & maluar. an. ʒ j. florum sambuci, chamæmeli, stæchad. an. p. j. sem. sænugr. lini an. ʒ ss. coquant. in aqu. & vino albo. Confundantur. addendo ceram. fiat in modum emplastri ex mucag. retum prædictarum. Sed prius oportet fouere partem decocto illo.

Inter cetera verò conferet vere hoc nouo venam basilicam dextram ad vnum vasculum tundere.

CONSILIVM LXX.

De Hydrope.

PETRVS Guerardus mense octobri cum de stomachi inflatione quereretur, post curas aliquot medicamentum sumpsit. Satis laudabilem effectum præstitit. Hic vir quoties in morbos incidit, à Medicis pro desperato sæpè relinquitur, ad eò magnis, obscuris, incognitisque morbis impetitur. Nam hinc vires elanguent, & cum virium infirmitate magna est cacochymia, vt quod affectionis remedium est, cum virium pugnet custodia. Qualia illi contigerint, & quid consilij captum fuerit, aperiam. Inappetens ciborum erat: aut nulla, aut exigua febris. Sputa pessima. Paulò post in metaphreno tumores, & in tibiis. facies tumens: pulsus languidus, paruus, sæpè inæqualis: frequentes defectiones, quibus nisi vino occurreretur, metus esset repentini interitus. Octauo post decubitum die circa æquinoctium hybernum, & cum ecliptica lunæ affectione conuulsus est planè, ac in propinquo mortem esse putabamus. De mutatione crebra pulsus ita philosophabamur: Hoc enim contingit vel affectione propriâ cordis, vel ratione orificij ventriculi oppressi, vel contumacis in primis venis obstructionis, quæ liberum spiritibus ingressum & regressum impedit; vel pulmonum infarctorum: vel quia legitimum non suppetit alimentum cordi, pote elatis, aut paucis, aut prauis spiritibus à materia olida contenta in ventre. Nam cum à vena arteriosa suppedatur alimentum corruptum & semiustum, aut quia per arteriam venosam impeditam non liberè transfluit aër, mirum non est si magna mutatio in pulsu contingat. At maior horum pars concurrere videtur. Quod autem inæqualitas perspicua fit in multis pulsibus, & nonnunquam intercalaris intermissio, id eo modo contingere videtur quo & in Antipatro ob obstructionem læuium arteriarum: potest & propter pulmonum ipsorum infarctum prouenire, aut mollitudinem & laxitatem eorundem, vt pote qui in costam incumbunt; quod annotauit Hippocrates. Maximè verò videtur fieri ex prauitate anathymiascos, declarauit, indicauitque curatio. Nam pro gradibus purgationis pul-

*Gal. lib.
4. de loc.
aff. cap.
vlt.
Lib. de
locis in
hominib.*

Lib. de
morbis.

monum, præfertim si inflammatio sit, insignem mutationem pulsus, & animi defectionem. Quod nos animaduertimus sæpè: immò & quoties multâ pituitâ offarcti sunt pulmones, & si à capite catarrhus illabitur. Testis Petrus Dangers pictor, & vidua domini Bigand: & putant sibi animum deficere. Quod pauci animaduertentes, illud ad inanitionem reuocant, & ad repletionem confugiunt. Idem in hoc ægro videtur quod & in conualescentibus. Nam vt ex Galeno patet, ideò non proficiunt, aut quia infirmitas corporis est, aut cacochymia: vtrumque in hunc ægrum cadere videtur; nam & partium est infirmitas à praua diætâ fortè ac vitæ instituto contracta, & cacochymia subest, quod ex symptomatis potest apparere; vt mirum non sit si & ea appetat quæ ex vsu non sunt, & edendo non proficiat. Nam & ipsarum partium natia & gentilitia est imbecillitas, & multa in multis partibus cacochymia quæ impedit quominus calor naturalis quantulus est elucere queat.

in lib. 2.
Aphor.

Quod ad tumores istos œdematosos attinet, dicimus eos trifariam contingere, aut vt in morbis longis, vnde ægros insufflatos dicimus infirmitate caloris naturalis, & hoc tantum ex euentu fit: aut tanquam morbus est, aut vt symptoma. Symptoma, vt in hydrope; idque bifariam, aut affecto hepate primariò, secundariòve, vnde verus nascitur hydrops: aut per colliuationem quandam carniū, & velut putrefactionem. Hinc Hippocr. in lib. de affect. aut de morbis, ait, hydropem, improprie dictū, fieri cum in morbis longis diu ægri impurgati manent, hinc corruptio carnis, & tumores œdematosi. Morbus autem tumor est cum alius consequens non est, sed per se & primò actionem lædit.

2. Prover.
rhet.

Cacopragia hepatis & tumoris autor est, & extenuationis. Tumoris, si in defectu sanguificationis consistat res, extenuationis autem si vitium in humore sit. Quanquam Hippocrates obseruat in morbis funestissimis contingere quandam leucoplegmatix speciem ob malignam qualitatem & flatulentam, quod in domino le Fuzelier phthifico à nobis visum est, cui totum corpus moribundo intumuit, ac facile disparuit. Sic & à pulmonibus, & ab hepate, & aliene extenuatio & tumor potest contingere. Quod de liene annotauit Hippocrates: *Quibus corpus extenuatur, lien efflorescit, & contra. vt etiam ex Hippocrate*

Lib. de
loc. in ho.
Lib. 2. de
nat. fac.

Galenus demonstrat. Sed in huiusmodi tumoribus solum humorem agnoscere, non autem flatum quoque admistum repugnat sensui. Vnde enim fluxus & refluxus tam subitus in hydrope, vt modò intumeant pedes, ventre deturgente, aut contrà, nisi comes sit flatus earum mutationum autor? ² Quod de hydrope ipso demonstrat Hippocrates lib. de flatibus. Sic aut inopia erit caloris naturalis flatum discutere nequeuntis, aut dominatus caloris præter naturam, materiam phlegmaticam in ventum faciliè conuertentis. Vnde alio loco docuimus auruginosos contra sententiam Hippocratis flatuosos esse posse. Et admirabilis locus est apud Hippocratem dum rationem redditur cur in hydrope dolor non sit, cùm tamen partes tumeant: in arthritide cùm tantus tumor non sit, & proinde non tanta distensio (quæ ex sententia Galeni in Aphorismis doloris causa est in articulari affectu) ait autem in hydrope humorem non consistere, sed vagari, propterea que dolorem non inferre: contrà in arthritide & paucum esse, & consistere. Atque vt breuè absoluam: In morbis dignoscendis videndum an sint simplices, an complicati: & rursus an sit aliquid gentilitiũ, an peculiari diætæ & vitæ instituti ratione aliquid fiat. Complicati morbi sunt cùm diuersæ partes confluantur, quarum vt natura diuersa, symptomata quoque sunt varia, & tametsi conimuni naturâ conueniant, tamen specifica distinguuntur in ægro complicati morbi videntur, catarrhus, tumor œdematosus, deliquia animi frequentia quæ eum valdè exercuerunt: quæ omnia ab eodem fonte manare videntur. Oedematosum tuniorem appressorum digitorum manentia vestigia designant. Multis de causis (vt antè dictum est) tumor iste euenire potuit, quarum non vna in hoc ægro consideranda est, sed plures. Vnum tantum monere oportet, an non etiam à cerebro repetenda sit illius tumoris origo, præsertim quatenus metaphrenum intumescit. Etenim Hippocrates scribit etiam hydropis originem à cerebro repeti debere: quomodo audiendus Hippocrates in Aphorism. cùm ait, *hydropem esse manie solutorium*, quòd sit translata à corpore cerebri vi motique naturæ materia in partes subiectas.

Lib. de locis in hezime.

Com. in aphe. 49. lib. 6.

Lib. 2 loc. in hoc

Aphor. 5 lib.

Quicquid sit in affectuum complicatione, difficile tenetur pars primaria affectus causa, quòd sæpè à capite in partes superiores, sæpè ab his in illas fiat defluxio, sæpè proprii humoris generatio per corruptionem propriam ob partis diathesim ma-

390 CONSILIORVM MEDICINALIVM
lam. Quæ omnia morborum difficilem cognitionem reddunt.
In hoc ægro eadem ratio habenda quæ & ædium ruinosarum, vt pro gradibus purgationis in instaurando per epicrasin corpore operam demus.

Ad eductionem putris materiæ quæ pulmonibus tenaciter adhæret, ex vsu erunt thoracici linctus ex decocto rad. ari, petrosel. glycyrr. cryng. ireos hyssop. bipinel. fem. bombacis cum syrupo capill. ven. oxymelite, & syrupo de hyssopo.

Corde applicatum est emplastrum ex confer. buglos. borag. confect. Alkermes, mithrid. theriaca, puluere malabathri, & meliss.

Ventriculo fatus ex his quæ vim haberent roborandi, & coquendi. Ad hepar oxyrrhodinum ex oleo absynth. & rosarum, cum ceroto santalino. Deinde institutus syrupus hic:

℞. omnium herbar. capillarium an. m. j. seminis carth. ℥ j. vngula cabal. m. ij. radicum omn. aperitiuar. in vino albo maceratar. an. ℥ j. ireos floren. & eryngiorum an. ℥ s. buglos. cichory, pimpin. scolopen. polypody, an. m. j. fiat decoct. ad lib. j. addendo cicerum rubr. & flor. violar. an. p. ij. in qua infunde rheib. ℥ ij. santal. citr. & cinnam. an. ℥ j. s. fiat syrupus coctus cum lib. j. sacch. & ℥ ij. syrup. rosar. palid.

Item ℞. agar. trochisc. ℥ ij. rheib. ℥ j. s. pulu. hiera ℥ ij. massa pilul. assaiereth & sine quibus an. ℥ j. cum succo absynth. fiat massa pilul. vrenda vt dicetur.

Deinde opiata sunt instituta, & condita, quibus vtebatur, superbibendo parum vini albi odoriferi, aut vini hippocrat.

ANNOTATIONES.

1. Hippocrates obseruat quod qui purgati non sunt in morbis, per succrescentem cacochymiam in hydropem incidunt. An verò cacochymia hydropis causa? Ita herclè. Ita enim Galenus explicans illud Hippocratis, quod tempore pestifero quidam in hydropem inciderint, hydrops ex abundantia prauorum succorum quosdam inuasit. Comm. in part. 15. sect. 3. lib. 3. Epid.

2. Et hæc sunt argumenta Hippocr. lib. de flatibus. Humor enim nisi comitem flatum habeat, id non potest efficere.

3. Mirum non est si hydrops in hoc agro ferè inexpugnabilis fuerit. Etenim verum illud est quod à Celso scribitur cap. 21. lib. 3. Hydrops sæpè per se incipit, sæpè alteri vetusto morbo, maximè que quartana superue-

nit, facilius in feruis quàm in liberis tollitur: quia cum desideret famem, sitim, mille alia tædia, longamque patientiam, promptius his succurritur qui facile coguntur, quàm quibus inutilis libertas est.

CONSILIVM LXXI.

De febre maligna.

IOANNES Cheuarry post labores aliquot, cursus, equitationes & comestiones, cœpit lassitudine tentari tensuâ: febris continua, lingua prærubra, sitis inexhausta, omnium ferè partium *ἀδυναμία* sine causa manifesta, yrinæ laudabiles nimium: ecthymata tandem paruerunt: roborato ore ventriculi & corde, euacuatâ multâ bile olidâ restitutus est. Morbus à quadam erat colliquatione, quod declararunt dolores in faucibus tam internis quàm externis (vt sic loquar) Item deiectiones tenues & liquidæ, quas Hippocrat. *ὕδατι χλα* vocat in Epidemiis. Nam quod in bile tenui⁹ erat excernebatur, crassior pars remanebat. In partibus imis erat phlogosis, cuius occasione constitimus in blandis medicamentis, iis que lenibus & humectantibus, cum ratione summæ infirmitatis, quæ præter rationem aderat, vix ac ne vix sectionem venæ aggredi auderemus. Ac reuerâ non est audacter tentanda, sed parcè & cum meditatione. Nec nos mouit quod in acutis mouere oporteat, cum hoc præsertim de iis audiendum sit in quibus orgasmus est: in hoc autem agro omnia videbantur initia & tranquilla, sed latentis putredinis aut malignitatis erat suspicio. Accedit quod hyeme febris ista orta esset, in qua humores quodammodo *ελεγματίζοντα* febris erat laboriosa, non eâ tantum ratione, quia labores, corporisque motiones præcessissent, sed ob lassitudinis sensum ob copiam humorum viscosorum febrem committentium, vt in Epidemiis explicat Galenus.

Et vt Hippocrates sub finem prioris Prorrhæ, sect. 1. duplicem facit phrenitiam, vnam manifestam, alteram occultam: occultam quidem, in qua signa manifesta non apparent, sed tabes quædam mala impressa manet in cerebro; ita duplex est febris, vna manifesta, quæ se pulsu & yrinis manifestè prodit, occulta quæ neutro sese manifestat. Hæc deterior est, quoniam & Me-

*Com. in
pars. 3.
sect. 4.
lib. 6. E-
pid.*

392 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 dicos sæpè fugit. Huius generis est febris quæ ægrum diuexat.
 iactationes sunt, ἀλλοιοί ται τρώδες κ' ἀνέμοι, κοπρι, vrinæ tenues, sed
 flammeæ; pulsus frequens, sed remissus, & quasi compressus,
 sed analogus interno incendio. Ingens sitis, dolor gutturis &
 faucium, qualem antè in malis temporum constitutionibus ob-
 oriri obseruauimus, & per modum colliquationis; impotentia
 & infirmitas maxima sine causa manifesta: deinde eruptio ec-
 thymaton.

In facultate naturali sitis, fastidium sine magno calore qui
 foris appareret, vrinæ tenues. In animali impotentia maxima,
 & ad motum pigrities & tarditas. In vitali, pulsus remissio. In-
 differentia, ecthymata, iactationes & ἀλλοιοί, lassitudines, dolo-
 res gutturis.

Impotentia ista terrori fuit, quia in febre mediocri corpus
 ita impotens esse præter rationem, malum; nam nulla est κενεργία,
 quod declarat vel intemperiem partis principis, vel copiam
 materiæ grauantis, vel obsidionem cordis à maligno, vt ex Ga-
 leno videri potest.

Com. in
 part. 5,
 lib. 2.
 Proorrh.
 Lib. de
 aère &
 loc.
 & Acut.
 In Epid.

Sic in egro isto febris laboriosa erat, & idem ei contingebat
 quod & in sicca ophthalmia, in qua quod est tenuissimum ex-
 cernitur, crassius verò manet; aut vt in angina sicca eidem Hip-
 pocr. Vrinx erant tenues, sed erant boni coloris, quod si ad te-
 nuitatem malus aliquis color accessisset, pessimæ essent, vt do-
 ctè in histor. de Clazomenio obseruat Hippocrat. & post eum
 Galenus.

Ecthymata appàuerunt vt in Sileno, sed potiùs fuerunt pa-
 pulæ rubræ & tenues, aut maculæ ob ingentem phlogosim quæ
 ex materia coercita anathymiasim tetram educebat ac suscita-
 bat. In ista imbecillitate non voluimus dare hypnotica, ne na-
 turam pigram magis redderemus. Iuuimus ægrum vsu acidorū,
 & eorum quæ contra malignam vim pugnarent. Sanguinis de-
 tractioni pepercimus, nec abs re. Quoties enim ingentis cuius-
 dam ariditatis in partibus imis suspicio est, & argumenta, nec-
 non obsidio facultatum, & ἀδυναμία, audax ne esto in secanda
 vena: aut si secare consilium est propter phlogosim, parcissimè
 id manu faciendum est; alioqui in magnum discriminè vitæ ægrū
 coniciēs. Quod & in ripa Celestinorum in vxore cuiusdam
 cinerum venditoris obseruauimus, quam febris maligna occu-
 pabat; sensim enim nature motu, qui tamen symptomaticus
 vide.

videbatur, euacuatâ fœdâ materiâ, mox aqueâ, mox paulò crassiore & bilioso: item confirmatis corde & ventriculo, & vsu epithematon temperatiore reddito calore per Dei immortalis gratiam primæ eam restituimus sanitati, cùm tamen multa lethifera signa apparuissent.

In tonfore Caroli successore, cùm laboraret ferè eadem febre, immò horriffica esset, id est in continuitate quosdam ex interuallis horrores, obseruauimus aliquando frequenti venæ sectioni locum esse, aliquando eandem repetitam plurimum obesse. Prodest quidem cùm iactationes & ἀκροὶ καὶ ἄραι, non tam fiunt à maligno, quàm à calore impensè aucto, & à cacochymii sanguinis copia: cuius argumenta sunt rigores aut horrores, qui non tam fiunt per caloris affectionem, aut eius absentiam, quàm putrentis humoris membranæ & partibus spermaticis sentientibus molesti prouentum. Nam postquam horruerunt, statim incalescunt, deinde rigescunt. Galenus autem in Epidem. scribit illud vsuuenire vt quoties humores corrupti incalescant, leues horrores inducant. Quod cùm euenit, audacius sectio venæ tentari debet, non vt quid semel fiat (quia in humorum prauorum prouentu rarò vires sufficiunt) sed iteratò. Atque huic tonfori multa sectione venæ occurrimus, vt insigniter sæuientem febrem confoderemus ac iugularem. Sed cùm horrores qui adsunt materiæ ἀσώματιαν & τὸ ἐπὶ τῆς ψυχῆς significant, aut cùm verè periodici sunt, aut symptomatici, caue ne hinc secandæ venæ occasionem quæras. Item cùm iactationes & ἀσπρόεια oris ventriculi κλάσιν sequuntur, cunctantiùs timidiùsque sectionem venæ aggredieris. Ideò aliquando est vbi potius febris ratio habenda, quàm causæ febrem committentis in cacochymia consistentis. Est vbi etiam potior ratio habenda causæ ipsius quàm febris. Quanquam purgatio febris causam potius respicit, quàm febrem ipsam: sectio venæ & febrem & causam.

Tom. I.

Ddd

CONSILIVM LXXII.

De febre maligna.

STABVLARIYS in vico de la Mortellerie à castris rediens, Sbenè quidem habebat. Militiæ morbo detentus erat: & nos eum à pulmonis inflammatione vindicaueramus. Corpore erat squalido, visceribus admodum intemperatis. Vino meraco apprimè delectabatur. Circa vesperum cùm leuiter febriret, indulfit tamen genio. Circa quartam nocturnam febre adeò insigni prehensus est, præcedente horrore, vt animam agere videretur. Pulsus insigniter elatus, magnus, validus, frequens: ingens in præcordiis ætus, hypochondriorum murmur obaudiebatur, mox contrahebantur: frequens magnaque respiratio, oppressio, iactationes, vrinæ flammæ, aluus nigra reddebat, vomituriebat: per quatuor horas viguit febris: sensim declinauit. De vtroque latere queritur ac si pleuriticus foret. Percipiebatur raptus humorum sursum. Febris erat plena iactatione: lingua scabra. Intumescabant sensim hypochondria. Tertia nocturna cùm *Ceryximus* effectus fuisset, & extima alfissent, moritur. Cadauer intumuit adeò vt semidoliolū referret. Rubentibus, nigricantibusque maculis obseritur. Malignus erat morbus. Et de eo Galenus videtur agere in Epidem. dum obseruat contingere in febribus malignissimis & acutissimis, vt initio incendiij febrilis summa sint omnia: magna & frequens respiratio, in toto corpore fusio, perceptioque caloris contra naturā, eiusque acerrimi. Sed paulò post deferuent partes, defæuitque febris, adeò vt ea nulla restare videatur. Æger *Ceryximus* fit, quoniam cùm summus esset adeo calor, vt nullus eo maior extare queat, digeritur præuè feruefactis omninò humoribus, & spiritibus exustis retostisque, vt remaneat tantùm paucus ac exiguus calor natiuus. Eique quantulus est, exigua, breuisque spiritus ductio sufficit. Atque calor iste natiuus priùs extinguitur, quam noua denuò accessio febrilis surgere queat.

ANNOTATIONES.

1. Quod huic agro contigit ut morituro aluus inflaretur, & corpus inflaretur, & corpus obsereretur maculis. Idem Nicolai filio enenit lib. 7. Epid.

CONSILIVM LXXIII.

De Convulsione, & complicatis vteri affectibus.

VXOR Ioannis Tancre Equitis Regi, filium suum primogenitum peperit. Hic exuecus aridusque emissus est: sed tamen quæ aqua cum foetu effluere debuit, ea obstetricum & clinicarum mulierum testimonio sensim atque sensim effluxit. *dispositio* fuit adeo ut crederent vtero vim aliquam illatam esse. Toto tempore decubitus aluo fuit admodum obstricta, & iam dolores aliquos in ventre sentiebat. Indita sunt enemata, & medicamenta satis valida præscripta sunt. Aluus inde non multum subducitur. Præterito tempore decubitus cum iam sibi admunia prima redeundum putaret, & lac artificio suppressum esset, quod eam lactare coniunx nollet, circum vmbilicum adeoque inum ventrem dolores oriuntur. Enemata induntur valida, & potiones. Indurescit inde aluus magis, minusque cedit remediis. Dolores inualescunt. Ad mulierum consilium res redit. Tunc & fouere, & vterinum affectum causari, immittere in balneum, medicorum consilium tanquam eius rei ignarorum reiicere, condemnare. Terebinthinam cum stupis applicare, & sexcenta alia vsurpare remedia, frequentes clysteres indere ex carminatiuis & anodynis. Incredibile dictu quanta fuerit vsurpatorum remediorum sylua. Et prout quæque mulier erudita videbatur, ita eius remedia probata sunt. Aliæ quæ vteri reponendi artem profitentur, & manu, & igne, & cucurbitulis multa moliantur. Nil proficitur, ægrefcit medendo humores vsu istorum remediorum impensè calidorum funduntur, ichorosi & saniosi fiunt, ferociunt, acuunturque nil tale cogitantibus. In ista humorum concalcatione & agitatione, cum tamen propter astrictiorem aluum exitu supernè infernèque prohiberentur,

ægram conuulsiones epilepticæ veræ adoriuntur, intra horas duodecim octies aut nouies conuellitur, omniâque terrore & stupore plena sunt. Ad diuinitatem istud referunt, propterea que nil ampliùs reliquum esse præsidij autumant. Cessante conuulsione epilepticâ ἀπαυος tamen manebat. Lingua exerebatur semipedis longitudine. Intumuerat, fauciabatur, ac concerpebatur. Hæc nono morbi die paruerunt cum meo quidem iudicio naturam tæderet tantæ diurnitatis, eaque aliquid moliri vellet. Ad Medicos rebus penè conclamatis concursus est. Spectatores fabulæ toto die fuerunt: clysmata ex hiera diacolocynthidos & aliis subdiderunt: aquarum theriacalium & cõsimilium vsu consuluerunt. Puluis hieræ poculo datus est. Aliis videbatur opportuna sectio venæ, quod secretio videretur illius materiæ quæ per alui suppressionem in hypochondriis τὸ κέντρον acquisiuerat: & quæ in genus neruosum translata, cum olim in venis conclusa foret, conuellendi occasionem dedit. Inepta aliis visa est, cum natura videretur fathiscere, & quod in paroxysmis epilepticis vsurpata crimine non careret. Siue hic ratio plus valuerit quàm fortuna, aut contrà (siquidem fortunâ duce potiùs periculo ægrè tentatum hoc est) sanguis demitur ad tria ingentia vascula. Assatim riuulosæque fluit. Ab eo tempore non conuellitur, sed redit ad se: tamen subsultus quidam & contractiunculæ, quæ potiùs ex sententia Galen. πωπυρὰ, quàm ἀσπυρὰ dicentur, apparent. Die sequenti initum est consilium. Illius affectionis causa creditur sanguinis cumulus, impetus & incitatio, necnon excrementorum in aluo proventus. Et cum aluus densa esset, facta quædam est humorum & sanguinis conculcatio; hinc phlogosis, & à phlogosi vasorum contractio & angustia, ac si aluus ambusta & sicca diceretur. Sic metus erat voluuli. Et nisi conuulsiones istæ incidissent per quandam serosæ partis & malignioris (vt ita dicam) sequestrationem, voluulus incidisset. Hippocrates hunc morbum adumbrauit, cum ait dolores in hypochondriis resides & reuolutos, si augeantur; & febrem fastidiumque cibi accersant, conuulsionem afferre per diadochen & metastasim humorum malignam qualitatem, temporis successu per suppressionem adæptorum. Ac credibilis iuuenem istam mulierculam hepate visceribusque præcalidis præditam, & tamen superficie corporis subalbida, molliusculaque carne (ynde faciliè ea imbuitur san-

Lib. 3.
Perrhe.

guine, inflammationesque concitat (vt de mulieribus docet Hippocrates mammarum muliebrium exemplo ²) in eam affectionem incidisse tribus de causis : ob alui suppressionem, quæ ipsa per se incommoda affert multa, ob exuberantiam sanguinis, qui in mamas fluere prohibitus est. Tertio ob cacochymiã. Sic prudenter prouisum est vt bis, terve sanguis detraheretur ad tollendam plenitudinem & phlogosin, quam vsus rerum admotarum calidiorum adauxerat, colluies humorum adimeretur, aluus leniretur. Lenienda enim aluus fuit, non irritanda vehementibus medicamentis & siccantibus calfacientibusque. Quod notandum est, & à nobis obseruatum in capite de eare præscripto, vt leuetur eorum error, qui cum vident aluum tardam, ad impensè calida confugiunt. Contrà plus proficitur vsu rerum temperatarum. Iniecti ergo sunt clysteres primis contrarij, ex decoctis capitum veruecinorum, & omazorum cum borag. buglos. vtraque malua, & radicibus eius, seminibus melonum, cucumeris, endiuie, ex diaprun. non laxatiuo, diacassia. Immò oleum fuit suspectum ob calorem, nisi quod liliaceum & violatum magnâ copiã iniectum est. Reiecta sunt ea quæ calfacerent in vsu τῶν ἀψιδίων, & χαλυσίων, & temperatorum consistitur. Stuppæ iniectæ sunt in aquam egelidam vt saturarentur, deinde in sesquilibra butyri recentis, & tantumadè olei viol. imbutæ sunt toti abdomini applicitæ. Potiones ex oleo amygdal. dulc. recenter extracto, cum decocto maluarum, buglos. semin. frigid. lactuc. & sem. alkekengi, ex cassia soluta, catholicone, diapruno simplici, cum syrupo viol. alias syrupo rosarum pallid. Quod validis medicamentis obtineri non potuit, id rerum blandiorum vsus est affectus. ³ Si quando alias in ea muliere maximè obseruari debuit quod scribit Hippocrates: *Cauendum est ne inflammatas partes medicamentis vexemus,* ⁴ *Acute* &c. Repetitæ sunt istæ potiones, & iuscula liquidissima. Tandem ad colluuiem contumaciorem & abstrusam magis in iusculis tabell. diacarthami sæpè dissoluimus magno profectu. Sæpè id factum hinc benè habuit. Urinæ præ calore nigrescebant, & flammeæ erant : statim aluus subsistebat, & spirato dea reddebat. Immò narrabat egrasce circum lumbos & in regione venarum vteri sentire pulsùm, subsultumque arteriarum, & calorem immodicum. Nisi viribus metuissemus, largissimè sanguinem dempsissemus. Per octo aut duodecim dies benè

habet. Sed tamen dolores se mediocres in regione pubis & lumborum perſentiscere dicebat. Sed hi aliis inferiores erāt. Ecce dum eam primæ ſanitati reſtitutam credimus, grauius quàm antè conflictatur, de nocte exacerbantur dolores, ad eò vt ea manus ſibi inferre cogitet. Interdiu leuantur, alius astringitur, in inguinibus dolorem ſentit, & in ſuris tibiærum maximè in plantis pedum intolerabilem. Inſomnis nullo conſiſtit loco. Vomitiones æruginosæ frequentes: renum regio inflammari videtur. Ad prima remedia & venæ ſectio- nem recurritur. Parum proficitur. Vrinæ aliàs flammeæ, aliàs aqueæ, aliàs ſabuloſæ apparent: ſic erant diſtantes. Et quod vrinæ diſtantes turbationem aliquam declarant, Hippocrat. cùm in eadem vrina eſt diſtantia, id eſt inæqualitas conten- torum. Idem poteſt dici de vrinis cùm vno die ac altero aliàs aliter affectæ excernuntur. Nos vterinum aliquid eſſe dice- bamus. Et obſtetrices & chirurgi narrabant collum vteri quodammodò diſtortum, & ingentem intus calorem perci- pi. Ligamentorum cornuumque erat affectio aliqua. dolor tunc repetiit cùm illa ſomniaſet ſe à ſuo coniuge iniri, & coi- re voluptuoſè. Sic factus erat eò ſanguinis concurſus, & fu- ror, appetentiæque vteri contigerat. Quodque mirandum, magis ab vtero ſtatus erumpebant; quod Aëtius obſeruat in cap. de inflatione vteri, & ſatyriaſi. ⁴ Et vt ingenuè dicam, complicati erant affectus: ſatyriaſis erat quædam, & phlogo- ſis circum vterum. Secta vena in brachio, ſecta in malleolo magnâ quantitate. Cataplaſmata lenientia admota. Oxy- rhodini embroche frequens. Nil aut parum proficitur. Tan- dem conſulitur clyſteribus anodynis, in quibus philonium romanum diſſoluitur. Iniicitur oleum liliorum & violar. in vterum. Peſſi ex terebinth. bdellio, opopan. ariſtolo. & tamenſi phlogoſeos & *εμφλογίματος* ſuſpicio foret: tamen quia o vteri non contingebant, ex vſu peſſariorum profluuium ſanguinis ex vtero expectabamus, eoque conſilio venam ma- leoli tutuderamus. Iuuabatur peſſis, fortè ob titillationem. Clinica mulier candelas ex ſebo indebat loco peſſuli: mani- feſtam ſentiebat alleuationem. Ipditi ſunt hi peſſi.

Apb 133
lib. 7.

Aëtius
ſerm. 4
ſectab. 4

℞ opopan. bdellij, gummi elemi an. ℥ ſ. terebinth. ʒ ꝑ. cera ʒj. fiat peſſus acutus puluere diacolocynthidos.

Inſeſſus ex ruta, chamamelo, meliloto.

Sed cum hæc non iuuarent, & dolores vrgerent, & pectinis, inguinum, maximè que surarum, & plantarum pedis cum caloris sensu. Periclitatum est hoc remedium.

℞. r1d. alth. & lilior. an. ℥ iij. mal. senecio. viol. bisfal. melil. chama-mel. creffionis an. m. iij. sem. lini, cytonior. psyll. fænic. burgund. & alth. an. ℥ j. s. hysci. & papau. albi an. m. iij. fiat decoctio in aqua. fiat passatura: in qua adde opij thebaici & populeonis an. ℥ s. Fiat cataplasma admouendum pubi, poplitibus, & inguinibus.

Vesicae suilla impleantur eo decocto, & admoventur. Eadem materialia capiuntur, & coquantur pro semicupio. Per metrenchyten de eo decocto in uterum iniectio fiat.

Renibus applicatum emplastrum ex philonio rom. & unguento Comitif. Hoc remedio conualuit, dormiuit, sedati sunt omnes dolores.

ANNOTATIONES.

1. Colicos dolores sæpe in epilepsiam desinere nouum non est, immò & in artuum resolutionem. Quod Paulus Aegineta annotauit, & post eum Auicennas.

2. Conuulsiones istæ feбри superuenerant, & febrē quodammodo soluerunt. Ita enim aliquando conuulsio commode feбри superuenit, ut ad finem lib. de crisi bus docet Hippocr.

3. Et si quando aliàs in hoc maximè verum fuit quod eodem loco 4^o Acutor. in precordiorum inflammatione sectionem venæ esse principale remedium. Vide historiam Nicolæ le Bé. Et cum dolor in nostra agræ regionem uteri attingeret, mirum cur toties è brachio sanguinem sustulerimus, potius à maleolo trahendus erat. Vnde questio præclara, an in uteri inflammatione & dolores immo in suppressione mensium demendus sanguis è brachio. Non vult Galenus cap. vi. lib. de sang. missione. Reclamat quoque & demonstrat Akakia in 2. ad Glaucon. Contra sentit Aëtius. Ac credo quosdam Medicos medendo aberrare plurimum.

4. Si ea quæ ab Hippocrate dicuntur de flatu in utero legamus lib. 2. de morbis mulier. multa huic mulieri talia symptomata euenisse congeriemus. Hac autem inflatio cum est inter angustias uteri, dolor est maior. Non reformidat venæ sectionem, cum caloris magni magna sit suspicio. Potuit esse inflammatio aliqua. Nam cum uteri fundus aut cavitās inflammatur, in imo ventre dolor est, & minimo digitorum pressu irritatur. Nec est quod obiciat quis vehementem non fuisse febrē; non enim

400 CONSILIORVM MEDICINALIVM
in eo affectu ingentem esse necesse est: cum multis de causis moderata esse
possit. Tamen accidentia horrida sunt sæpè, & quæ Aëtius cap. 83. Te-
trab. 4. serm. 4. describit. Chirurgi manu egram contingentibus quo-
dammodo relaxatus uterus esse videbatur: quod non absimile videri po-
terat; siquidem fieri non posset quin præ dolore magna aliqua mutatio in
utero contingeret. Accedit frequens vsus chalaesticorum & oleorum, &
rerum humidarum propter dolores applicatorum, quæ aliquam relaxatio-
nem afferre potuerunt, immò appetentia coitus & veneris abstinentia
paulalium de loco suo dimoueri potuit.

s. Hippocratis non reformidat vsum narcoticorum in doloribus uteri.

CONSILIVM LXXVI.

De Pleuritide.

FILIO LA domini Floræi cum sub dio, partim in sole versa-
ta esset, dolere caput cœpit, & tussire. Febris præhendit
acuta, & quæ tamen ex interuallis maior esse videretur. Omnes
noctes plenæ molestiarum fuerunt. Maximè enim ad sextam
serotinam & febris & reliqua exacerbabantur. Iactabatur, nul-
lo consistebat loco. Tussis & tussendi cupiditas illam perpetuò
infestabat. Nil è pulmone educere poterat, tametsi esset stri-
dula. In pulmone humoris concursatio, quæ obaudiretur. Sitis
erat ingens & implacabilis. Frequens & breuis respiratio cum
difficultate. Postquam tussiuerat, statim eiulabat. Aliquando
in partibus extimis febris mitescere videbatur. Immo leniter
perfrigerabantur ac si noua foret accessio. Sed illud fallax fuit:
Pugnabatur cum febre, & tussi quod eam partim à capite exci-
tari crederemus, partim à resudatione ichoris à calefacta pitui-
ta in pulmone. Octauo die symptomaticus alui fluor. Nono in-
teriiit. Aperto cadauere latus sinistrum purulentum erat, & pars
pulmonis quæ illud contingeret. Immo & pus, in capacitatem
fusum erat. Pleuritis fuit.

Nos valdè decepti fuimus existimantes tussim à capite esse.
Sed quod tam frequens esset, & sicca, & cum difficultate spi-
randi iuncta, illud aut inflammationem in pulmone, aut in latere,
aut in vtroque satis significare poterat. Tamen vnum desidera-
batur, vt ægra de dolore lateris quereretur: Hoc expectabamus,
interca

intercèa ignoratione rei præsidium in inflammationibus thoracis vsurpari solitum magno incommodo omisimus. Et si illud vsurpauissemus certis signis nequeentes assequi vtra pars esset affecta, è latere dextro sanguinem nullo profectu detraxissemus. Itaque puellæ peruicacia & morositas maximam periculi partem creauit. Rubor genarum non erat, tamen ferè perpetuò adest in inflammatione partium thoracis. Item aliquando clauso ore dormiebat: quod nos in eam adduxit opinionem, vt crederemus costas non esse obsessas. Sed omnis ista ratio nos decepit valdè. Tamen vix excusari possumus quin sanguinem demere debuerimus cum inflammationis in thorace magna esset suspicio. Ad sectionem venæ & insignis febris, & inflammationis suspicio, & sitis inextinguibilis, & iactationes ob incendium natæ, & maximè difficultas illa spirandi hortari debuerat. Nam cum difficultatis differentia à motu ipso sumantur, vt velox, tardaque respiratio dicatur, à materia calida & frigida, à thorace, magna, parua, à quiete densa, rara, quemadmodum magna & frequens incendium in corde arguit, magna & rara delirium: parua & frequens in febribus aut œdema, aut impedimentum in thorace, vt inflammationem, aut quid simile. Cum videremus ingenti præsentè æstu puellam habere frequentem admodum respirationem, & tamen paruam veluti oppresso & coangustato thorace, de inflammatione aliqua suspicari nos oportebat. Tamen hoc asserimus sæpè nos obseruasse in pueris valdè febrientibus frequentem paruamque respirationem, licèt affectus thorax non esset. Sed nonnunquam magna intercudit respiratio in omnem dimensionem dilatato thorace. At in hac puella nil tale obseruauimus: immò cum dilatata thoracem vellet, subsultabat quodammodo, & vociferabatur. Hæc à nobis eo consilio scribuntur, vt cum aliàs, tum maximè puerorum curam suscipientes, tanto diligentiores in eorum morbis nos præstemus, quantò minùs certos de suarum affectionum idea reddere nos solent. Immò cum pueris tanquàm mutis ægris nos rem habere existimemus, vt quoniam ex relatione, quæ tamen in dignoscendis morbis plurimi facienda est, nil certi, nilque pensi habemus, aliis coniecturis, signis & symptomatù obseruationibus nitamur, alioqui puerorù salus valdè periclitatur. Nec enim ab ista ægra puella expectandum erat vt

402 CONSILIORVM MEDICINALIVM
dolorem lateris pungentem quereretur quò secundæ venæ oc-
casionem porrigeret, sed aliis modis res erat assequenda.

CONSILIVM LXXVII.

De febre semitertiana.

DOMINA de Chalmontio & ea mulier quæ ad insigne en-
sis regij commorabatur, eadem ferè febre detineri vide-
bantur, sed forte fatóque inæquali. Vna enim iam grandæ-
uis, & malè pulmonibus affecta interiit, altera non item. Febris
erat assidua, aliàs interdiù, aliàs noctu exacerbationes habens.
Vna dies leuior, altera acerbior, in morem *τετλιοφύδων* aut *ημιτετλιων*.
Non tertiana erat exquisita, quia horas duodecim superabat;
non absolutè tertiana, quia horas quindecim superat, vt sentit
Galenus: fortè longa videbitur tertiana, quòd tempus inter-
missionis fit admodum breue. Tamen quoniam nulla febris va-
cuitas visa est, nomine tertianæ donanda non fuit. Et si fortè
remissio aliqua erat, minimâ occasione præhendebat horror
cum perfrictione quadam, adedò vt ad hemitritæon accedere
videretur. Nisi fortè timeamus ne Galenus nos rideat, vt &
quosdam ætatis suæ Medicos, qui longam tertianam cum hæ-
mitritæo confundebant. At longa tertiana remissionem habet
& intermissionem aliquam, hemitritæus nil habet intermissio-
nis, vt Galenus in Epidemiis scribit. Quanquam lib. de Typis
longè aliter sentiens, hemitritæis aliquam intermissionem at-
tribuit. Sed puto hunc librum Galeni non esse. Febris dicta
τετλιοφύδων, latinè tertiumgena, constituitur ab Hippocrate conti-
nua altero die remittens; quòd Hippocrates *επιεπιεφύδων* vocat,
tertio quoque die exacerbatur. Hæc febris in mulieres dictas
incidere videbatur. huius hæc est descriptio:

Com. in
apho. 23
sect. 2. lib
6 Epid.
Ibid.

Galenus
secu pu-
gnas.

Sec. 2. li.
2 Ep. d.

Cum annus frigidus aquilonius cum humiditate fuisset, omnes per hyemem commodè habebant. At sub ver decubuerunt. Febres tunc continua tertianarum more inuadebant, violentissima, longissima (idque ob coctionis difficultatem, & oppressionem naturæ a vehementioribus symptomatibus) laboriosissima: lenes à primo, de cetero incresebant: aliquantum remittebantur, rursum ex intermissione vehementius incesebant, &c. Itaque febris quæ mulierem illam adoriebatur, erat potius

tem vitalem omnium validissimam habebat (nec enim tamdiu tam violentæ diræque febris molestias tulisset) de eaque tamdiu dici potuit quod in aphor. scripsit Hippocr. *Qui consueti sunt la-*

*Aph. 42
lib. 2.*

bores ferre, etsi imbecilli sint, aut senes, non consuetis fortibus atque iuuenibus facilius ferunt. Itaque pulsus erat validus, cum vitalis facultas esset valida, auctus erat vsus, instrumentum cedebat, vt mirum non fuerit si talis pulsus extiterit. & reuerà talis ad finem vsque perseueravit. Sed quod magis mirum fuit, est quod vno die quinquies aut sexies rigeret ac si noua accessio foret. Horroris illius aut rigoris causam aut coniciebant nouæ materie accensionem, aut suppuratum in pulmonibus, aut aliquid simile. Obseruatum est ab antiquis frequentis & per vices repentis causam horroris esse suppuratum: quod in pulmonibus hoc facit: sed si in pulmonibus id fiat, multò magis, aut pariter quoque in aliis partibus fieri debet. Aperto cadauere sinistra pars pulmonis erat purulenta: sed id crebri horroris causa non erat. Nam statim ab isto horrore calor adurens surgebat manum tangentis feriens, adeoque vola manus & planta pedum incaluerat, vt nullus ferè eum calorem ferret. Horroris autem illius causa esse potuit inæqualitas quædam materie, & *ἡ ἑτερογενής*, vt quæ materia in maioribus venis coercetur, & vniusmodi est continuam faciat calore continenter cordi communicato, necnon vaporè elato: quod dum fit à calore isto alia corrumpitur materia in habitu corporis (in quo sicut periodicarum febrium continetur & consistit) eaque materia reduplicationis est causa; quæ reduplicatio habet aut leuem perfrigerationem; aut horrorem antesignanum, vt idem fiat quod in hemitriteis febribus quas *κατ' ἄρξιν γεννάσθαι* passim cum Hippocrate Galenus appellat. Quotidiana enim habet frigus tantum, & si continua est, non habet. Tertianæ autem rigorem habet: & tamen cum hemitriteis ex quotidiana continua (quod tamen minùs propriè dicitur, cum nomen quotidianæ continuitatis nomen excludere videatur) & tertianam intermittente componatur, dum ita confunduntur, symptomata quoque confusa habent. Et qui horror per se neutrius est si sola spectetur, vtriusque confusè esse potest. Et libri prioris ad Glauconem Paraphrastes dum querit in quas febres rigor horrorque incidant, agnoscit intermittentes, quibus nimirum horror aut rigor periodicus est, antesignanus; item semitertianas quibus proprias.

est horror; immò *αὐτὸς ὁμοῖος* horridicæ dicuntur. Quanquam Galenus docet posse existere semitertianas sine horrore: sed hoc in vno tantum casu ponit, cum scilicet tabescentes comitatur febris semitertiana: successu enim temporis horroris occasio tollitur, præsertim materia pituitosa consumitur horroris causa, nisi fortè aliunde horrescendi veniat occasio. Aut enim à suppurato oriri potest, aut fortè quia diuturnitate temporis corpus & ex carne & ex angue redditum minimâ occasione inhorrescit. Ergo de periodicis & semitertianis dicta sint. Nunc de continuis. Quædam sunt continuæ, homonymos tamen dictæ, quæ cum ex multis particularibus accessionibus procedant, fit vt prioris finem altera accessio cum horrore præueniat: & in his horror adest. Aliæ quoque permultæ sunt continuæ, & quæ vnâ finiuntur accessione, à leui rigore vel frigore incipientes ob materiæ inæqualitatem, vel malignitatem. Sunt & aliæ quas Hippocrates horridicas vocat (ego verò hoc non legi, nam solas semitertianas horridicas vocat, & hanc admittit appellationem Galenus) quod per totam ferè accessionem earum corpus inhorrescat, idque vel reduplicato febris incremento, vel eo ipso citra reduplicationem inæqualiter incremente. In quibus si longioribus interuallis horror remeat, reduplicatio dicitur & fit, maximè in semitertianis; sin breuioribus, horridicus, inæqualisque motus dicitur. ⁴ Sed audiamus ipsum Galenum, quæ citat Paraphrastes, locum enim haud legi. *Febrium continuarum tertio die repetentium quædam cum horrore venientes, cum à primo impetu ad incrementum se conferunt, tametsi non mediocriter progressæ videantur, alterum horrorem cum constrictione inducunt; ab hoc alterum incrementum, deinde aliam constrictionem & horrorem. nam iterum hæc & ter repetunt. Postridie aliam priore minorem habent accessionem sine priorum repetitione, isque est perpetuus orbis, vt binæ binis diebus fiant accessiones. Et illud, binas, binis diebus, interpretor, tertio quoque die duæ accessiones fieri videntur. Aliæ sunt continua tertio quoque die repetitiones habentes citra illas horridicas inuasiones, vnamque habent accessionem tertio quoque die, accessione carent secundo die. vnum enim habent continuum & equabile ab inuasionem ad vigorem incrementum. Priores febres *ἡμιτεταρτάς* vocaueris, posteriores *τεταρτάς* quæ *ἡμιστάσθους* medium locum habent inter *ἡμιστάσθους* & intermittentes febres: nam illis sunt meliores, his verò deteriores. Et pro vtrisque notanda hæc distinctio, quod in hemitertianis tertio*

Com. in
part. 5.
sect. 3. lib
1. Epid.

Com. in
part. 5.
sect. 3. lib
1. Epid.

ibid.

quoque die duæ fiant accessiones, & secundo die sit vna accessio. Quod mirum cur secundo die dicat fieri vnam accessionem, cum continua sit quotidiana. Sed ego puto manifestum quoddam esse argumentum cuiusdam ἐπισημιασ, quod non adest in iis quas vocat τριτημοφύεις. Nam tertio quoque die sine horrore habent aliquam repetitionem, seu accessionem, secundo die non habent accessionem, cum sit vniufmodi febris. Item sciendum in hemitritæis manifestos esse horrores & inæqualitates, quod in his quæ dicuntur τριτημοφύεις non cernitur. Nisi fortè dicas & obijcias illud Hippocratis descriptionem febriliū τριτημοφύειν facientis in Epid. *Rigores omnibus inordinati erant & errantes.* Si ergo horrores ita in illas continuas incidunt, in quo distinguetur hemitritæus ἀπὸ τοῦ τριτημοφύειν? Nos dicimus aliud esse inordinatos esse rigores minimosque in febribus cōtinuis, aliud dicere ordinatos esse. Nam in hæmitritæis non sunt inordinati, errantes & minimi, sed validi, statim, & vehementes. Et ideo propriè dicitur horrida. Sed si in alia febre continua erratici incidunt horrores, non perinde horridæ vocabuntur. Quod vt plenius intelligatur, causa & hemitritæi & triteophyeos est explicanda. Verus hemitritæus à duobus humoribus, est à bilioso & pituitoso: & si æqualiter exuperet humor vterque ex-

Part. 25.
sect. 2. li.
1. Epid.

Com. in
part. 25.
sect. 2. lib
1. Epid.

Com. in
part. 5
sect. 2. li.
1. Epid.

quisitus, fiet semitertianus typus. Prout autem humor vnus paucior est altero, ita quoque aut vera aut non vera semitertiana est. Vera febris τριτημοφύειν ab humore quidem bilioso, sed lentiore febre fit & coctu difficiliore. Quod si horrores habeat, non iam vnum humorem agnoscit, sed duos, & ad hemitritæon accedit. Proinde Galenus eod. Commentario de triteophysis horrores errabundos loquens, ait eas à duobus humoribus oriri, pituitosis & biliosis. Et ferè dum τριτημοφύειν explicat, idem dicit quod & de hemitritæis. Atque vt ingenue dicam, magna est societas inter vtrasque, præsertim cum horrores sunt coniuncti. Itaque cum doctiss. Akakia de illis horridicis continuis scribit: *Si longioribus interuallis horror remeat, reduplicatio & dicitur, & fit, maximè in semitertianis: sin breuioribus, horridicus inæqualis que motus dicitur.* Obscurius enim dicit quod nos antè diximus: Si statim ac vehementes, & ex maiori interuallo horrores redeuntes, tunc vera est semitertiana: sin erratici sint horrores, parui, & ex breuioribus interuallis, continua potius τριτημοφύειν dicetur. In hac muliere febris erat τριτημοφύειν, ad semitertianæ naturam

accedens, & humor pituitosus quidam secretus videbatur, qui nouorum horrorem erat occasio. Nec alienum erit monere Galeno placuisse cum veteribus febres istas *τετανοεις* inflammationem sequi partium internarum. Quod & in hac muliere obseruatum est: totum enim corpus internum incendio conflabat; & cum iræ esset præcipitis, in cysti cholidocho nouem lapilli ciceribus rubris duplo maiores inuenti sunt. Hepar incendio incanduerat: totus sanguis putris erat & lacteus. Obiit die 27 totius morbi.

Sed & vnum animaduertere oportet, quod & thersian, & diagnofin in primis facit omnibus iecorariis, id est, quibus gradus hepar, amplius, tumentius & calidius, cum febribus magnisprehenduntur, maxima ex parte tempore vrgentis febris dolores in clauiculis ², & secundum omoplatas sentire satis vehementes. In pleuritide quidem cum vno loco inflammatio aut phlegmone consistat, tamen in parte longè remota ob communicationem & continuitatem membranarum dolor intolerabilis sæpè sentitur qui maiores sæpè molestias exhibet quàm ipsa pleuritis. Et signa diagnosticam pleuritidis aut superiores, aut inferiores partes occupantis Hippocrates defumit ex dolore aut clauiculas aut ilcos regionem occupante, hepate accenso, aut inflammato, aut per insignem febrem æstuante plurimum, dolor potest ad iugulum peruenire.⁸ Reperio enim bifariam dolorem tensiuum ratione ipsius iecoris surgere. Aut enim hepar nothis costis alligatur, & tunc dolor ad clauiculam percipitur ratione distentæ membranæ⁹. Quibus non adligatur, à vasorum ipsorum potius quàm membranarum distensione dolor surgit. Et vt ait Galenus, proprius venæ arteriæque dolor, veluti in longitudinem extensæ chordæ speciem refert. Quod est notandum, ne cum hos dolores in febribus aut inflammationibus hepatis ortos videris, frustra de catarrho comminiscaris. Probabile est enim dolores pro partium affectarum fitu aut esse *ἀρτηρίων* aut *νευρίων*. Actum die 15 Septemb. 1574.

ANNOTATIONES.

1. Hæc febris fuit ea, quam *τέτον* vocat Hippocrates libro de internis affectionibus.

2. Febres *τετανοεις* mediæ sunt inter hemitritas & tertianas lon-

408 CONSILIORVM MEDICINALIVM
gas, aut alias febres qua habent intermissionem. Comm. in Aphorif. 23.
sect. 2. lib. 6 Epidem.

3. Galenus docet quàm acer calor excitetur ob fumosam substantiam à pituita putri & salsa excitatam. Comment. in part. 16. lib. 4 Acut.
Reuerà inaequalitas materia causa fuit illius horroris tam frequentis.

4. Ista desumuntur ex Epidemiorum Commentario, & proprie ad τεταραχweis febres possunt attribui.

5. Vel leges: In binis diebus tres fieri accessiones, ut uno leuiori die fiat una accessio pituitosa, secundo dua accessiones.

6. Nomen πνευματισμοσ also etiam in continuis potest usurpari. nam cum febris exasperatur, licet continua sit, potest dici πνευματισμοσ.

7. Nam quemadmodum ineuntibus paroxysmus intumescit & expanditur hepar contingens diaphragma, unde difficilis spiratio contingit: ita quoque dum estuat iecur, intumescencia est quadam; hinc tractui similis contentio: quo fit ut per communicationem vasa superiora afficiantur.

8. Quia tamen corpus hepatis vnum est & continuum, sepe signa inflammatarum gibbarum & simarum exquisitè dignosci non possunt.

9. Membranarum dolor est punctorius, sensimque expanditur, punctorio sensu tanquam in centro laborantis loci in parte est. Tensionis sensus circumcirca musculum est. Vlt. cap. lib. de sanguinis missione, & cap. 1. lib. 2. locor. affect. Sic vnum & idem potest punctorium sensum inferre & tensionum, sed diuersà ratione.

CONSILIVM LXXVIII.

De sanguinis spūto.

DVAE sunt partes in ægro isto, quæ aut infirmitatem, aut vitium, aut vtrumque videntur contraxisse, pulmo, & lien. Quæ cum aliàs, tum maximè in iis quibus hepatis intemperies est aliqua calida, propterea acrioris sanguinis parès & procreatrix, facilè suæ infirmitatis signum edunt aliquod. Lien quidem, dum hepar non bene repurgat, quòd plus succi nigri generetur, aut quòd imbecillus fiat, potè legitimo alimento à iecore suppeditato, non confirmatus. Pulmo autem, quia cum sit pars biliosa, facilè attrahens ob motus perennitatem, ut in Epidemiis

epidemiis Hippocrates annotauit; *Attractio, pulmo, incendium,*
 id est, æstus ingens in partibus, & raritas, motusque perpetui-
 tas pulmonis attractionis sanguinis & spiritus maximæ causæ
 existunt, fit vt si acrior fit sanguis qui à iecore fluit, rapiturque,
 augeatur aliqua ex parte intemperies, & hæmoptysi æger fit
 obnoxius; vnde tabes: quod huic ægro nostro iam à longo tē-
 pore contigit. Nam qui vnà cum tussi è pulmone sanguis edu-
 citur, extunditurque, exulcerationis sensum exhibens, satis
 declarat duorum alterum, aut acriorem esse sanguinem qui ab
 hepate in cor, & ab hoc in venam arteriosam refilit, vnde ali-
 qua fit *discretio*: aut tenuiorem esse, vnde anastomosis, aut dia-
 pedesis. Nam cum nutritio pulmonis, & aliarum partium, sen-
 tentiâ Galeni non tam per oscilla venarum, quam per earum
 tunieas fiat; natura arteriosam venam machinata est artificiosè,
 ne vasis raritas & pulmonis validior attractio efficeret vt statim
 sanguis, qui est pulmonis nutrimentum, absumeretur, & sic cau-
 sa esset marcoris ipsius pulmonis, affectumque illum induce-
 ret, quem Hippocrates in libris de Morbis tabem siccam vo-
 cat, quemadmodum & pulmonem siccum. Sic vasis arteriosi
 crassities facit vt restagnet, resideatque sanguis, & tardiùs in
 nutritionem pulmonis faceffat. Itaque si qua venæ arteriosæ
 tenuitas à natura est data, & ab ipsa conformatione, vt iis con-
 tingit quibus naturâ venæ sunt angustæ, & instar tenuium sta-
 minum, ij facillè sanguinem è pulmone educunt: sed id pericu-
 lo caret, cum tribuendum hoc sit tenuitati ipsius vasis. Sed si
 vas ipsum ritè conformatum, si crassiusculum & pluribus villis
 intextum, & tamen eductio fit sputi cruenti sæpè; hoc caco-
 chymia, acrimoniaque humorum ascribendum. Ita enim om-
 nis humor acer erodit, sibi viam facit, cuniculosque agit. Pro-
 pterea perperam Medici faciunt, qui vbi primùm aliquem hæ-
 moptoicum vident, illum frequenti venæ sectione fatigant: sic
 enim pulmone & lateribus infirmitas conciliatur. Itaque distin-
 ctione opus est. nam si eductio sanguinis aut propter tenuita-
 tem sanguinis, aut venæ arteriosæ gracilitatem contingit, hinc
 parciores in secunda vena esse oportet: sin omnibus ritè com-
 paratis ob sanguinis prauitatem id fiat, liberaliores esse fas est,
 alioqui grauiter in commoda ægrorum peccatur. Nos autem in
 hoc ægro nostro potiùs animaduertimus coniciimusque
 sanguinis calorem, acrimoniamque cuiusdam *discretio* causam

410 CONSILIORVM MEDICINALIVM
esse, quæ in tabem ægrum coniectura est, nisi arte provideatur.
Quemadmodum enim hominibus alatis quos 6 Epid. ^{νεφροσπινος}
vocat, sententia Galeni flatus ruptionis venaum causa esse po-
test, qui flatus ob imbecillitatem caloris surgere solet in eius-
modi hominibus ita alatis factis per facultatis formatrix im-
potentiam; vnde tibi obnoxij sunt maximè, ita quoque acer
calor eiusdem affectus causa esse potest, dum humores & spiri-
tus generat acres, subtiles, acutos & mordaces. ¹ Iuuare quo-
que potest destillatio à capite. Tamen in eam venimus opinio-
nem, vt non existimemus caput per se non esse affectum, sed ex
euentu tantum. Si enim destillatio ipsa hæmoptoicos autor
fuisse, iam tabidus interiisset. Quinto enim Methodi medendi
cap. 14 & 15 satis docet Galenus quàm breuè tabescant quibus
ferina destillatio sputi cruenti autor est. ² Sed si aut conforma-
tionis vitio, aut acrimoniâ sanguinis id fiat, non tam præceps
est morbus. Sic errant qui in omni metu tabis, & omni tussi ad
caput recurrunt tanquam autorem primarium. Sæpè enim id
tantum contingit secundariò. Hippocrates hoc primus anim-
aduertit lib. 1 de Morbis, dum docet quomodo caput pulmone
consentiat in attractione. Nam pulmo calfactus attrahit, & ca-
put facillè calefit; vnde vtraque pars conspirat in perniciem
ægri. Tamen facillè qui affectus erat secundarius, fit primarius
in iis qui ad tabem deurgunt ob tabificam qualitatem. ³ Huius
ægri affectum lib. 2 de Morbis depinxit, dum describit affectum
quem Græcè vocat *εσλω*, quæ non oritur aut vitio parentum,
aut vlcere concepto in pulmone, sed tantum propter intempe-
riem quandam partium. Ideoque ait cum affectum esse curabi-
lem, & ante annos decem non necare.

De splene non putamus laborandum: quandoquidem non
existimamus id tanti esse vt eò conuertamus nostram indu-
striam. Etsi enim signa quædam elucet quæ aliquid hypochō-
driæ cum respiciunt ac redolent, putamus leuiora ista fore si he-
pati consultum fuerit. Accidit fortè quod cum natura sit satis
hilaris, diurnæ infirmitatis tædio affectus, & sanitatis deside-
rio languens, animum suum demiserit, contraxeritque.

Ac censemus primo quoque tempore repurgato prius cor-
pore illum ad vsum lactis asinini relegandum esse, habeat domi-
paratam opiatam ex decocto rerum aperientium & thoracica-
rum cum multo polypodio, in quo incoquantur ʒ iij folior.

senæ, additis ꝑ̄ ij. cassi. & ꝑ̄ j. conferu. buglos. & capill. ven. fiet opiata vtenda aliquando, vt tibi videbitur.

Censemus semel aliquando repurgandum satis valido medicamento, vt diaphœnico, aut electuario diacarth. dissoluto in iusculo ad elidendam vim scammonij. Et ne mirum sit cur probetur aliquando validior purgatio, cum in morbis thoracis ab omnibus recentioribus lenientia medicamenta probentur: dicimus id fieri propter humorum acrimoniam & cacochymiam, quam non superabit leniens & eccoproticum medicamentum. Quod facimus consilio Galeni, quem Fracastoreus secutus est cap. 15. lib. 5. Methodi, vbi disputat de curatione hæmoptoicorum per diaurosin & capitis vitium. Locus præclarus. Bis anno secabitur vena, ineunte autumno proximo secanda erit. Vesperi cubiturus vtatur conferuâ rosarum, nenuph. viol. additis gran. mastic. & olib. habeat syrupos domi ad iuuandam expectorationem. Quantum fieri potest vino abstineat. Vtatur elixis potius. Paretur puluis ex saccharo cando, pulm. vulpis, penid. glycyrrh. cuius cochlear in ouum immittatur, & capiat manè. Vel trochisci ex hoc puluere formabuntur cum gum. tragacant. addito pulu. boli arm. aq. rosar. lot.

ANNOTATIONES.

1. Omnis puris excretio post sputum sanguinis mala. Spuitionem sanguinis omnem non sequitur puris excretio: sed si n̄, ut dicitur. Talis est autem omnino ex pulmone. Hippocr. Aphor. 15. lib. 7.

2. Sed hunc morbum melius Hippocrates explicat lib. de internis affect. & vocat tabem ex descensu putris pituita. Locus præclarus. Hippocrates valenter purgat.

3. Talis phthoe à capite est, dià τὸ δὲ πῶς τῆς, vt Hippocrates 2. de morbis loquitur initio. Sed inter ceteros locus vnus præclarus est lib. 1. de morbis, quomodo pituita liquefacta descensus afferat incommoda in oculis, pulmone, ventriculo.

4. Circa hunc agrum, & alias consimiles duo queri possunt: An validis opus habet medicamentis: quod Hippocrat. & Galen. videtur conuenire. Item an in suspitione puris & affectorum pulmonum, iusculorum, & rerum liquidiorum visus conferat. Nam putres sunt sæpè declarat puris sputum, nec modo vomica est aliqua, sed corpus ipsum vitiosum est. Si siccum sano propinquius, errant qui nimium humectant. De hac Gale-

412
CONSILIORVM MEDICINALIVM
nus cap. vlt. lib. 4. loc. affect. & lib. 2 Epidemiorum.
3. Hippocrates conformiter ad istam opinionem lib. de internis affect. in
descensu putris à capite pituita valenter purgat.

CONSILIVM LXXIX.

De Febre Typhode.

VXOR Domini Vieillart mense Iulio incidit in febrem typhoden ab antiquis vocatam. Focis eius in partibus alio propinquis erat conceptus in materia phlegmatica mista bile, aut in materia biliosa pituita facta, vt ita loquar; & symptomata elucebant vtriusque humoris mixtionem significantia. Cum febris exacerbabatur obmutescibat, pulsus deficere videbatur, syncopizabat, vigilabat, obdormiscebat alias; & id genus terrificæ erant symptomata. Verebantur medici ne cerebrum secundariò læsum tandem alteraretur, vnde aut cataphora, aut coma vigilans sequeretur. Tametsi autem langueret pulsus, tamen à validis medicamentis Medici non destiterunt, quòd viderent exigendam, oppugnandamque multiplicem materiam mali authorem.

Sæpè repurgata est medicamento ex rheo & foliculis. Clysteres frequentes iniecti ad euacuationem & reuulsionem. Vicesies sumpsit cornu vnicornis, & reliqua cardiaca. Sed id frustra fiebat, cum malum tyrannidem in cerebrum exerceret, vnde metus cataphoræ & paraphrenitidis, his remediis occursum est.

℞. folior. pæonia, sænic. salvia, maiora. betonica, an. m. j. rad. pæonia, angel. acori an. ʒ ij. scariola, acetos. florum nenuph. an. m. j. mercur. betæ an. m. y. Fiat decolt. in sero lactis, addendo epithym. p. ij. In solat. dissol. confect. hamech ʒ j. diaphæn. ʒ ij. syrup. rosar. pallid. ʒ ij. fiat clyster.

℞. olei castor. ʒ j. ol. cham. em. ʒ j. s. pro litu colli.

℞. olei cham. em. ʒ ij. curi. pulu. angel. & castorei. fiat litus.

℞. aquar. pæonia & angel. an. ʒ ij. passent. permanicam hippoc.

℞. theriacis & mithrid. veteris an. ʒ ss. confer. rosar. borag. meliss.

an. ʒ ij. pro corde.

℞. de still. restaurat. & aquæ bord. an. lib. s. vtatur.

Cum ingens in toto ventre incendium perciperetur, hoc quod sequitur præscriptum est.

℞. mucag. sem. alth. psyllij & cyton. extract. in aqu. ros. an. ℥iij. ceroti santal. ℥j. aceti ℥ij. ol. ros. & chamem. an. ℥j. s. Fiat linimentum pro toto ventre.

℞. aqu. imperialis & aqu. salvia an. ℥ij. Utatur. Item & mithridatio.

℞. decoct. hordei ℥iv. syrup. nenuph. ℥j. s.

Ertune incumbabant Medici in somni conciliationem.

Parata hordeata ex cremore hordei non contusi, sed expressi. Dealbata est hordeatum amygdalis, & dulcoratum saccharo ros.

℞. cos. alkermes ℥j. conser. buglos. nenuphar. an. ℥j. rasur. unicolor. gr. ij. cum folijs auri. fiat bolus.

Repurgata confect. hamech & rheobarb.

℞. conser. nenuphar. & ros. an. ℥vj. aceti ℥j. s. lactuca m. s. Fiat frontale.

℞. rasur. unicolor. gr. iv. rasura eboris, margar. elect. an. gr. v. capiat cum aqua caradui.

℞. absynt. ros. rub. fol. salvia, maior. an. m. j. santal. ℥ij. Fiant sacculi pro stomacho.

Clysteres inieci dissolutis ℥ij castia & ℥j. catholic.

℞. aqu. lactuc. solan. acetos. ros. an. ℥ij. aceti ros. ℥j. s. pulu. rosarum, santal. an. ℥ij. pulu. absynth. ℥j. Fiat epithema pro iecore.

℞. flor. nenuph. viol. buglos. an. p. j. folior. lactu. m. s. papau. albi, cap. i. semin. meron. ℥j. Fiat decoct. pro dosi. & cum ℥j. diacody. potus.

℞. sem. raphan. ℥j. sem. atripl. ℥j. coquantur in oxymel. simpl. In colat ad ℥iij. dissol. succi amygdalar. dulc. ℥j. s. fiat vomitorium.

Ad renes fiunt irrigationes ex aqua solari, semperniui, lactuca, cum aceto.

CONSILIVM LXXX.

De Gonorrhœa virulenta.

MERCATOR quidam vnâ muliere non contentus, quantum licuit libidinosè vixit; & cum prostibulis versatus, inquinatus est, vnde & gonorrhœa & ylcus clacacoëthea in

414. CONSILIORVM MEDICINALIVM
in pudendo manauerunt: Tamen sibi præcauens, aduocato
Medicorum consilio, in luum non incidit. Sed cum rem leui-
usculam putaret, femine illius virulentæ gonorrhœæ intempe-
stiuus suppressæ rediuuio sentit dolorem acerbum in spina, &
lumborum regione: immò in pene vlcuscula repullulant, sta-
timque euanescent. Difficultatem spirandi nonnullam habet,
ai bœt. ror est, macrescit in dies, dolet totam spinam, & lumbos.
Inito consilio dictum est id totum esse à reliquis istius virulen-
tiæ, quæ sensim vires acquirit: immò & rudimentum esse illius
affectionis quam Hippocrates in libris de Morbis tabem ex
dorso vocauit. Itaque tametsi ad oppugnandam vim morbi va-
leret vsus guaiaci, tamen de macie erat verendum. Itaque cre-
ditur satius esse corpus reficere, & interea non esse alienum vt
interponeretur vsus hydroticorum temperaturum, vt non pro-
liciantur sudores, sed vt potius sensim humores deficcetur, &
maligna qualitas emendetur. Consilij hæc sunt capita.

*Bis hebdomade iniiciatur clyster emolliens & detergens. Primo quo-
que tempore utatur bolo castiæ cum rheobarbaro. Aperiatur basilica dex-
tri brachij ad tria vascula.*

*Utatur semel parca terebinth. cum syrupo de althea. Pauca autem
sit quantitas, ne hinc aluus soluat, sed tantum vt vasa munda fiant.*

Linatur frequenter spina oleo massiches, cytonio rosato cum aceto.

Deinde utatur lacte asinino per dies viginti continuos.

In partibus decocto sarsaparilia diluto satis, idque cum passulis.

*Tandem cum renutritus fuerit, ad decoctum schina & sarsaparilia
minimè dilutum adducetur, si semen mali longius disseminetur.*

Et cum perseueraret dolor, & calor summus in renibus, hoc
quod sequitur fuit institutum.

*℞. sapa lib. f. macaginis decoctionis malua, bis mal. violarum, se-
minis psyllij, melonum: adde opij ʒ ij. & applicetur instar cataplasma-
tis regioni renum.*

CONSILIVM LXXX.

De febre Affode.

LAVRENTIVS Prætor post curas, sollicitudines, iras, & intemperantem victum, generosorumque vinorū vsu, horruit, & insigniter febricitavit. De eo verum illud Hippocratis: *Morbi sensim generantur, sed affatim repenteque adoriantur.* Cum solita exerceret munia in acutissimam febrem incidit, statimque magna virium iactura apparuit. Nox implacidissima, iactationes, æstus, fitis implacabilis, facies paulò post hippocratis. Natura visa est choleram morbum tentare. Excreta sunt *ἰδατόχροα*; multi generis, foetidissima: pulsus parvus, frequens, difficilis respiratio, sopor: oppressio stomachi: defurgebat sæpè, sed inaniter, & falsa quædam erat imaginatio & opinio aut flatus, aut doloris ventrem vrgentis, quod animum laborare, delirioque occupari significat; quemadmodum Hippocrates scripsit, & apertius Galenus in Comment. *Ventrem tum murmurantem, tum rugientem cum inanibus surrectionibus, quidam phreniticon esse contendunt. Sic duobus errant modis: nam nec ea que sub sensum cadunt sentiunt, quanquam cum dolore fiant: vel que sub sensum cadunt videntur sentire. Altero modo, quia sæpè è lecto desurgunt ac se sollicitari & demorsi essent: & tamen non mordentur. Sic falsò se morderi putant.* Tametsi ex vsu videretur sectio venæ, nil tentatum est ob virium metum. Tamen vrgente difficultate spirandi, & æstu summo, secta vena. Nihilò leuius habuit. Quæcumque excernerentur siue suprà siue infrà, omnia cruda erant. Urinæ citrinæ, confusæ: *ἰσχυρæ*: & post missum sanguinem deterior virium conditio fuit. Quinto interiit. Morbus peracutus fuit. Aliquid fuit *πνευμονοειδὲς*; tamen pulsus inflammationem nō indicabat. Ex interuallis dolor erat lateris aliquis, sed fugax. Rondeletius autem obseruat cum peripneumoniis adesse dolores nonnullos laterum & sterni, febris, vt prædictum est, vehementissima adorsa est, & statim secuta est virium magna iactura. Iactatio erat & anxietas *ἀνέματος* infirmitatem naturæ & obfidionem ventriculi designans. Et febris erat. *ἀερόδης*. Nec mi-

Par. 16.

L. 3.

Præterea?

416 **CONSILIORVM MEDICINALIVM**
rùm si horrida statim fuit febris, qualis phrenitico obtigit in
Epidemiis. Nil profectum, quòd remedia morbo essent infe-
riora.

CONSILIVM LXXXI.

De hepatis inflammatione.

IOANNIS Puthonne vxor post sollicitudines, curas, cùm
valdè cacochyma esset, in ardentissimam febrem incidit.
Nullo loco stare poterat: vires febris eundo acquirebat. lacta-
batur plurimùm: vtrumque hypochondrium intumuerat. Ne
minimum quidem digitorum pulsum ferebat. Densitas erat
linguæ ob ingens incendium & defectum humiditatis. Septimo
icterica interiit. At hic icterus licèt suo die critico eruperit, ta-
men funestus fuit, quia non tam erat à suffusione bilis quæ fe-
brem committeret, quàm à phlogosi ipsius hepatis. Et reuerà
leuiter tantùm corporis superficies erat infecta, nec morbi par
erat suffusio. Hepar erat inflammatum, & fauces præcludi visæ
sunt, quod ad clauiculas dolor pertineret. Sanguis tantùm se-
mel detractus, quòd iam morbi dies exactus foret antequam
Medicus vocaretur.

CONSILIVM LXXXII.

De febre continua cum eruptione parotidum.

TONSOR quidam iuuenis pituitosus partim & sanguineus
cùm loco & tempore curaretur, septimo die morbi sudo-
res habuit copiosos. Octauo die summa virium erat iactura fa-
cta: & cùm febris expers foret, nec non satis luculentam ha-
buisset hæmorrhagiam, tamen nono die parotides apparuerūt.
Illæ erant satis mansuetæ, potiùs quantitatem materiæ quàm
qualitatem secute ac præferentes. Digerendis illis consultum
est, mox suppurandis. Nil profectum est. Tamen cùm recurre-
ret materia quæ aliorum rapi videbatur, tandem maioribus
machinamentis suppuratum tentandum fuit. Hinc discas sæpè
non

non esse funestas parotides, vt in plerisque solent, præsertim si materia earum sit *εὐδαμνὴ καὶ εὐσπυρῆς*, quomodo multas in Epidem. in- 1 Epid.
 nocuas esse testatur. At in Prorrhethico bifariam parotidon sect. r.
 eruptionem malam esse probat, tum quòd per parotidas abscef- 3 Prorr-
 sus morbo non fit par; tum quòd qui abscessus ad partes supe- thes.
 riores fiunt, perniciosi esse soleant.

CONSILIVM LXXXIII.

De febre continua.

CVIVSDAM Victoris vxor cùm febre laboraret cōtinuâ morbo iam progresso Medicos accersiuit. Affecto iam morbo illud faciendū fuit, quod iam factum, si de re maturius consultum, oportuisset. Et cùm serò melius fuerit præstari quam nunquam, quòd res operam celerem postularet, nono die secta est vena ad duo vascula. Natura istâ sectione irritata crisin anteuertit. Itaque vesperi illa toto horruit corpore, *εὐδαιμονία* longa, vox clangosa, *μεγάλαι αεγασίαι πύον*. Partium extimarum frigus qualiter in iam morituris apparet. De funere cogitabatur. Cùm exigua salutis spes foret, qualicumque ista excretionem natura erecta fuit. Fluxus dysentericus: conualuit.

Hinc discere oportet nefas esse tumultuariam nonnullorum curandi rationem sequi, qui susquedēque ferunt si diebus criticis, aut aliis quibusvis aut feriantur venæ, aut medicamenta præscribantur. At nos obseruauimus sæpè leues irritationes ab artificio Medici factas, motus & perturbationes, tumultusque excitare magnos. Et si instātibus crisibus (præsertim si morbus biliosus sit, & benè ordinatus) medicamenta dantur, sæpè hypercatharsetis inducunt. Quod centies verum deprehendi. Et Lib. de
Medica-
mentis

CONSILIVM LXXXIV.

De febre continua cum grauibus symptomatis.

ROBERTVM febris continua magnas de nocte exacerbationes habens corripuit. Incolumis illac-tenus vixerat. Membra delassata fractaque appulsam manus non ferentia. Dolor capitis acerbus: iactationes perpetuæ. Quarto die purgatus: quinto secta vena; sexto apozemate ex folliculis repurgatus. Biliofa multa: septimo nil apparuit. Vrinæ non multum flammeæ, tenues, sed boni coloris. Quod si ad tenuitatem coloris prauitas accessisset, pessimum id foret. Sed saltem ad morbi longitudinem apparuerunt, vt Clazomenio contigit. Octauo iterum repurgatus. Nono comatosus factus & delirus. Febris ingens: vrinæ tenues, subflauæ. Alius eo minimè sentiente perenniter fluebat. Id symptomaticum erat, quia sensim fiebat. Omnis excretio biliofa. Decimo & vndecimo eadem. Lingua obtremiscens. Quod Galenus ad facultatis animalis imbecillitatem refert, estque signum non constantis mentis. *Cerebrum enim, ait, afficitur, affecti que ipsa calida est: quod calor motionem perpetuam asserat, contra frigus immobilitatem.* Et in Aphorismis: *Si lingua repente incontinens fiat, aut aliqua pars stupore elanguit, hoc melancholicum est.* Galenus in comment. *πὶ μελαγχολικῶν* interpretatur non vt ad affectum melancholicum referatur, sed ad humoris dominatum. Quamquam *ἡ μελαγχολία καὶ τὰ μελαγχολικὰ* non ad humorem, sed ad diathesin & affectionem, affectionis que specie referatur. Sic incontinentia linguæ repente incidens est *μελαγχολία* quid, id est, ait Galenus, est ab humore melancholico quatenus est quid viscidum, lentum, crassum, propter similitudinem ad pituitam accedens: vt tum humor melancholicus, tum pituitosus illius affectus causa dicatur. Quamquam stupor & *αἰδέτηα* linguæ non sunt affectus melancholici, id est qui redeleant, respiciantque naturam veri humoris melancholici. Sed homonymos affectus melancholici dicuntur. Priorem rationem de analogia inter humorem melancholicum & pituitam fufius explicat Galenus; ait enim apoplexias, conuulsiones, cacitates promiscuè & ab humore melancholico, & à pituita fieri.

L. Epid.

*Com. in
part. 20
lib. 1.
Prorrh.*

*Aph. 40.
lib. 7.*

*Com. in
Aph. 56.
lib. 6.*

quoniam vtrique humori communis est crassitudo. Sed furor non fit à succo melancholico quatenus frigiditatem habet & crassitudinem: siquidem oportet aliquid esse quod irriter & incitet. Et cum dicit Galen. interpretans illud Hippoc. quomodo quadragenariis & quinquagen. apoplexiæ fiant, ait illa in ætate maximè abūdare τὸν τῆς μελαίνου χυμοῦ. Interpretes vertit, succū atræ bilis, nos potiùs succū melancholicū dicemus. Nam atra bilis propriè dicta non facit istas ἀκινήσις, ἐκπληξίς, sed potiùs efferat, impellitque corpus. hinc in Aphor. si, ait, multitudo humorum est μελαγχολικῶν, timores fiunt, & affectus qui propriè melancholici dicuntur: sin talis non fuerit, id est, si ad aliam naturam vergat, si aut potiùs de humore pituitoso respiciat, aut de bilioso, aut alius generis humore, labores ac conuulsiones. Et tamen antè dixit promiscuè & succum melancholicum & pituitam cæcitates, apoplexias, conuulsiones facere, non autem furores, quòd ad furores qualitas aliqua requiratur. Cum itaque quinquagesimo anno fiunt apoplexiæ, non dicuntur fieri ab atrabilario humore, vt vertit Interpretes, sed à succo melancholico qui hac ætate superfluit. Atque vt tandem finis fiat, ac loci inter se concilientur, sciendum humorem melancholicum, immò & pituitosum, aut potiùs ratione materiæ & molis affectus inducere, aut ratione qualitatis malæ quam vterque accersuit humor. Si ratione molis, conuulsiones, apoplexiæ, & similes affectus inducuntur, vt cæcitates. Si ratione qualitatis, pauores, timores, pathemata melancholica, vt deliria sine febre. Quomodo doctissimè Galenus docet, quomodo vere, hyeme, & autumnò dolores podagrici excitentur ab eodem humore, sed non eodem numero. Nam hyeme & vere hos dolores citat, & quatenus copiâ peccat, & quatenus qualitate: at autumnò quatenus qualitate peccat: quod omninò animaduertendum est. Sed reuertamur ad id vnde digressi sumus. Mirum cur dicat Galenus tremorem linguæ affecto cefebro ob humorem biliosum, non autem frigidum, quòd cum tremor motus quidam sit, necesse est humor sit mouens, qui ἀκινήσις non afferat: At melancholus & pituitosus & stuporem, & ἀσθένειαν linguæ, & ἀνομιαν aneit. Vnde & Epid. de humore pituitoso, eiusque sero loquens. ait vtrique esse proprium vt stuporèm frigusque inducat. Si frigidus, tenax, lentus & crassus humor ratione sui crassamenti tetamos, conuulsiones, ac concussiuos motus efficiat, quare non potiùs

Aph. 57.
lib. 6.Com. in
Aph. 67.
lib. 4Aph. 55:
lib. 6:Com. in
pari: 38.
sect. 2:
lib. 6:

immobilitatem inducat? Nam hoc ex superioribus demonstra-
 tum est. ² Soporosus erat: an ille sopor malus? Locus est in-
 signis apud Hippocratem, quo quarit, *το κατὰ μέρος ἀεὶ ἢ κατὰ μέρος*. An
 affectio carotica, aut somnus profundus siue sopor ubique ma-
 lus? Cùm autem *ἄερος* & in bonam partem & in malam sumat-
 tur (quanquam omnis à quacumque causa ortum duxerit, si cū
 somno naturali à causis moderatis & naturalibus orto cōfera-
 tur, in malis poni potest) dubitari potest an existere possit vt
 non terrefaciat Medicos, & ij non statim admoneatur ad quid-
 uis molendum contra soporem inexpugnabilem. Somnus na-
 turalis fit à bona cerebri temperie, & suavi blandoque vapore.
 Nos non pluribus explicabimus somni & soporis differentias,
 & à quibus causis oriantur, quibus ve signis distinguantur, cū
 illa enucleata à nobis fuerint antè. Galenus comm. in particul.
 illam multis modis. *κατὰ μέρος* contingere posse docet, & somnum
 vix excitabilem solutūque difficilem (quomodo *ἄερος* definitur)
 aliquando bonum esse posse vt signum & vt causam expli-
 cauit. Sed addit, *si carus intelligitur profundus, & vix excitabilis
 somnus, & carus morbosus nullam genere desidentem diathesin habeat,*
 id est, si nulla sit mala dispositio aut humoris, aut partis, vt nil
 sit præter excessum quemdam humoris quantitate opprimen-
 tis & sensus ligantis: vel nomine *ἰ διαθεσις* & naturam, & con-
 ditionem affectus audiemus. Vt *ἄερος* distinguatur morbosus à
 somno profundo, quod somnus profundus ex copia humidi
 vtilis generari possit; *ἄερος* *ποσίδης* ex pituita vnde cerebrum hu-
 medtatur & refrigeratur, & iam ad lethargicam affectionem
 accedit. Sic profundus somnus habet humorem multum,
 vtilē, quantitate peccantem, cerebrum ferè solum hume-
 ctantem: *ἄερος* *κρύμα*, *κατὰ μέρος*, frigidum; lentum, viscosumque &
 inexpugnabilem humorem *ἀκρῆσις* & carentiam quandam sen-
 sus inuehentem. Et hoc modo omnis carus malus. Profundus
 somnus improprie *ἄερος* dici potest. Itaque Galenus ait, *ἀκρῆσις
 κατὰ μέρος ἰ διαθεσις, ἐν ὅποιον μύρον ἰ διαθεσις ἔστι: dummodo fateamur dia-
 thesin somni profundi, & ἄερος non distingui, de solo nomine contro-
 uertitur.* Profundè dormire multos ponit Galenus temulentos:
 Pueros,

Ægros, qui per quatuor aut quinque dies vigilauerunt. Et pro-
 fundus somnus his bonus vt signum & vt causa. Alij profundè
 dormiunt, & ipsa diathesis longè diuersa est.

Qui sine motu & sensu soporantur, qui nec voce, nec puncturis, nec stimulis excitantur.

Quibus musculus temporalis percutitur.

In principiis accessionum febrilium, immò in febribus ardentibus.

Et hic profundus somnus malus, vt signum, & vt causa. & *καὶ οὐκ ἔστιν*, & *ἀνδραγῆς, καὶ ἐξ, καὶ τὰ φ* *ἐξ* que nominari potest. Omnis talis sopor malus vt signum & vt causa. Nam & causa longè contra naturam est quantitate & qualitate peccans, & resolutio, oppressioque nonnunquam primisensifici, id est cerebri, adest. In nostro ægro sopor iste malus erat. De funere iam cogitabamus. Sed cum die duodecimo febris aucta videretur, & natura recreata, venam aperuimus: inde omnia fœliciora fuerunt. Credo naturam istâ sectione quasi flabellato sanguine erectam. Decimo quarto sudores. Urinæ boni quidem coloris, sed non indicabant illud incendium quod intus erat. Aluus perpetuò fluebat symptomaticè. Videbatur in nescio qua materia secreta à venis calor conceptus. Sed cum febris continua esset, tamen sæpè *καὶ ἀπυρεξίης* sensus erat aliquis, cum tamen nulla foret: immutari que illa febris falsa erat & mentita. Simile quid in Epidemiis legitur, cum tamen febres essent continuæ. Nam *Histo. 12*
§ 13. Hippocrates per tres dies apparuisse febris vacuitatem fatetur. *part. 1. § 1.* Ex hac historia doceri possumus symptomaticas sæpè alui fluxiones, vt cum sine sensu ægri, sensim atque sensim humores secedunt (*διαλαγήματα τὰ ἰόντα* vocat Hippocrates) quod & copiâ, & perpetuam generationem, & naturæ quandam resolutionem significat, profuisse *κατὰ συνελθόντος*. In morbis omnibus malignis *§ 1. spher.* qualiscumque fuerit excretio, quoniam virulentæ materiæ excretionem quomodocumque id fiat, iuuatur plurimum, profutura est. Et quod & humoris qualitate, & excretionis modo symptomaticum esse dicitur, id ex euentu, si quid vitium restiterit, criticum erit. Secundo puto ideò laxis fibris aluum laxatam esse, quod ad diem ferè criticum medicamentum datum sit. At iam ex Hippocrate docuimus medicamentis præscriptis diebus instantibus criticis, aut secta vena hypercatharsis esse faciles: quod nos in plerisque obseruauimus. Nam sequuntur sæpè sudores diaphoretici. Si natura valeat, aut arte erecta fuerit, liberantur quidem, sed diu imbecilli manent, & vix à morbis releuantur: sin imbecilla fuerit natura, eodem die quo vel

medicamentum datum, vel secta vena, moriuntur. Quod calamitatis & infamiae est plenissimum. Verum antequam huic consilio finem imponamus, non erit alienum annotare quae paulo ante diximus ex Galen. comment. in Prorrh. In affectionibus febrilibus, praesertim *επισημαίται*, cum exacerbantur morbi ac repullulant, saepe esse *κρίσις ἐν καύμῃ*. Mirum cur Galenus non dixit *κατὰ τὸς πυρετῶν*, sed dixit *κατὰ τὸς πυρετῶδεις*. Quod forte abs re dictum non est, & magnam animadversione dignum existimo. Ac primum scire oportet duplicem esse febrem, unam essentialem, symptomatice aliam. A febribus autem absolute dictis & essentialibus dicuntur capi qui absque inflammatione, vel abscessu, vel dolore, vel erysipelate, vel absque aliquo membro praecipue affecto aegrotant. Item addit comment. in aphor. 66. lib. 4. *Contumacem obstructionem & fortem, cui febris superveniens symptomatice esse dicitur.* Si autem vel inflammatio aliqua sit, vel aliquid simile quod febrem excitet, is absolute febricitare non dicitur. Haec Galenus. Cum itaque in februm exacerbationibus *κατὰ τὸς πυρετῶδεις* per febriles morbos, non autem absolute dixit *κατὰ τὸς πυρετῶν*, videtur id significare. Catoche, cataleptica affectio cadit in febres, praesertim eas quas committit nescio quae in parte dispositio; ut cum materia est in cerebro, & doctrina gratia febris cephalica dicitur, per motum humoris in capite contenti, qui a massa sanguinis & concretionem separatus esse dicitur: aut cum est in ventriculo, aut in hepate fit febris Elodes, Typhodes, Erysipelatodes: atque tunc si catoche incidat, non dicitur proprie cadere in febrem, sed in affectum febrilem. nam febres essentialia, quarum materia per venas sparsa & fusa est, ex se non habent coniunctas catochas, catalepticas, comata. Sed sub finem earum symptomatice potest aut coma, aut similis affectio advenire, & hoc malum ut signum & ut causa. Sed cum in Epistimasia morborum febrilium soporosi affectus surgunt, affectionem & pravam dispositionem non in genere venoso, sed aut in ventriculo, aut mesenterio, aut in cerebro ipso significat: & ad pravam exitum saepe febres tendunt. In tribus id genus febris observavimus. Vxor domini Vieillard, de qua abunde supra, eam habuit, & febris erat typhodis, exacerbatae quae febre mox delirabat, mox attonita sopitaque plane erat. Filius domini Magni Medici annos 10 natus, idem passus est. Idem quoque & Procurator Dumou-

tier, de quo in principio ferè huius libri. Quæ omnia annotata volui, vt hoc tanquam insolens non dicant Medici, sed vt inquisitâ tanti mali causâ, legitima medendi methodus inueniatur.

ANNOTATIONES:

1. In eo sensu *ixooð. us & παρὰ τὴν φύσιν*, id est *ἄνωγος* ait melancholicos morbos experiri solere: quod mirum est, cum virique sint frigidi, humidi, molles, effæminati, & veluti aquei. Hippocrates lib. 2. Epidem. sect. 5.
2. De somno initio febrium, in febribus, & dum corpus aestuat intus. Hippocrates comment. in part. 17. sect. 4. lib. 6 Epid.
3. Tamen quidam Coma ab oppressione cerebri oriri dicunt; Caron ab eiusdem resolutione.
4. Reperio a'iam soporosam affectionem Lethargum appellatam, idque ob speciem quandam peripneumonia. Vide lib. 2 nostri Ephemer. Quomodo comata etiam in principio febrium ardentium inciderint, annotat Galenus ex Hippocrate comm. in partic. 37. sect. 3. lib. 3 Epid.
5. Etsi per hypercatharsin istam educuntur putria, corruptaque; tamen melius fuerat ea non agitauisse. Multa enim sunt in corpore corrupta quæ suo gremio adhuc natura continet ac regit, et si facultatem eius retentricem sorti medicamento & attrahente concutias; non miram si laxatio sibilis omnia effluant magno virium dispendio.
6. Quæstio verò esse possit an coma incidens in febrem sub finem fiat vitio particularis cerebri, vel vitio totius corporis. Particulari vitio, vt quoniam in morbis longis & acutis quibusdam singula partes sese exonerant, si in cerebro materia moueatur quæ coma inferat. Vniuersi corporis vitio, vt fiat per dispositionem veneni morbum causantis in cerebrum ipsum: & talia comata & symptomata incidunt in febres desinentes natura falsas crises moliente. Id enim est indicatorium, non indicans.

CONSILIVM LXXXV.

De febre maligna.

IOANNES de Longueuille à castris rediens febre malignâ prehensus est, quæ multos in castris statiuus ad Rupellam in-

424 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 gulauit. Admirabile est qualia symptomata contigerint, vt po-
 stea narrabo. Initio febris mitis, qualis accendi solet potius in
 spiritibus & in materia phlegmatica quam in biliosa, quod mo-
 tus subitos non haberet. Dolor capitis ab initio saeuissimus: do-
 lores vagi: calor multus intus: pulsus satis frequens, sed non
 multum elatus: lingua initio plane arida, & tamen calor similis
 non percipiebatur. Aluus satis belle reddebat. Circa septimum
 secta vena, & sanguis plane putris educitur. Singulis noctibus
 omnia grauiora, visa est lingua nigricans: vrinae initio confuse
 & flammæ, biliosæ. Nono vrina citrina, mala, lufca. Delira-
 bat: facies *ὄλεθρος*: oculi ardentes, aliàs comatosus: delirij aut
 lethargici affectus erat metus. Itaque consilio quorundam pra-
 cticorum non reformidantium vsum vehementioris catharti-
 ci, tametsi febrilis calor dehortari videatur, data est tabella ele-
 ctuarij diacarthami in iusculo, quæ elicit multam materiam
 OLIDAM, albicantem, ac si diceres puluem quandam. Hoc autem
 factum vt maiore vi reuelleretur vapor ab ista materia eleuatus
 qui subest, aut coma, aut lethargum esset induciturus, vnde pa-
 rotidon metus fieret. Noctem vndecimam molestiarum ple-
 nissimam habuit. Mane deficiebat pulsus, mox formicans ap-
 paruit. Idem penè per tres horas mansit. Mortem in propinquo
 denuciabamus. Credibile tunc naturam moliri voluisse crisin,
 sed & debilis, & materiâ nondum præparatâ id non potuit.
 Cordi applicatur catapl. ex mithridatio, theriaca, addito pul-
 uere diamargar, frigid. Potu datur theriaca, confectio Alker-
 mes cum aqua theriacali, aquis cardiacis, vino albo, syrup. gra-
 natorum & granis aliquot ambræ. Pulsus ad se redit post infi-
 gnem illam mutationem, & iactationes multas. Vrinae ab eo
 tempore inæquales, sed maxima ex parte crudæ erant & aqueæ:
 & tamen non habebant alienum colorem aut contentum. Nil
 de incedio interno declarabant, omnia cruda erant. Cibum ca-
 piebat, lingua aridissima; quod mirum, cum vrinae aliter sese ha-
 berent. Aluus cœpit liquida deiicere. Decimo quarto nil com-
 memorabile. Semisopitus, Nil de materia in præcordiis con-
 tenta excernebatur, quæ verè illius febris causa erat, & seges.
 Summa erat virium infirmitas. Decimosexto datum rheum: te-
 nuia *ἰδαρόχλα* excreuit: nil crassum: nullus sudor. Vrinae tenues
 perseverabant: tales apparuerunt quales in Clazomenio: & lon-
 gitude morbi significata est. Et nisi ætatis firmitas obstitisset,

vix eam vim morbi sustinuiſſet. A die duodecimo nil ſeceſſit craſſum niſi ſub finem effectus medicamenti. Morbus qui acutus erat, incipit longus eſſe: ſenſim euacuatur educiturque materia in hypochondriis contenta: & quod educitur, craſſitie pultem referebat. Sic conualeſcit. Conſultum eſt vt ad tenuis ichoris excretionem qui ſæpè ſpiritus contaminat febre etiamnum præſente, ſed concedente multùm exhiberentur ꝛ viij decoctionis ſchinæ cum multa ſcabioſa paratę, additâ ꝓ cinnamomi.

Hinc diſcere oportet eos qui optimo habitu præditi ſunt, & integrâ ſanitate, non lubricâ, vt plerique biliôſi, tenues, fruuntur, dum de ſanitatis ſtatione depelluntur, crudos admodùm morbos experiri, & horum vires ſuſtentari debere donec morbus mitificetur. Vnde in plerisque qui omnium robuſtiſſimi eſſent, iſtâ malignâ temporis conſtitutione horrenda ſymptomata obſeruauimus: & ij penè ſani morbis tentati ſunt, ab iſſdemque iugulati ſunt. Itaque hîc magna cautio adhibenda, ne ſi valida initio medicamenta data fuerint, agitemus materiam quam educere nequeamus; intereâque nil aliud agamus quàm vt naturam infirmemus, minùſque idoneam reddamus ad ſuſtinentiam tantam morbi contumaciam & longitudinem.

CONSILIVM LXXXVI.

De febre maligna.

IOANNES du Teil ſimili ferè morbo correptus eſt. Is iuuenis erat, robuſtus, lacertofus, expeditus; & incredibile dictu quot & quanta affuerint ſymptomata, vt ancipites fuerimus de morbi exitu ad vicesimum quintum diem. Audio illum mœrore aliquo affectum quòd res in Amore ſecundæ non eſſent: At tamen quorundam Medicorum opinione, procatarcticarum cauſarum obſeruatio in morbis curandis inutilis videatur, tamen in dignoſcendis, præſertim quod ad ideam morbi ſpectat, plurimùm poſſe videtur. Hinc Hippocrates in *hiſtoria de Siſtano*, cauſarum procatarcticarum meminit, & non abs re, vt Galenus in *Comment.* docet. Mirum quod ait Galenus in lib. *de different. febr. febres putridas à cauſa procatartica non*

*Hiſt. 2.
lib. 3.
Epid.
Cap. 7.
lib. 2.*

oriri. Cur itaque Hippocrates caufarum procatarticarum meminuit, vt cum loquitur de quodam, qui cum rudimentum febris haberet, incidit in febrem perniciofam: quod cum iam leuiter febricitaret, largiter potauit. Illum errorem commiffum tanti facit Galenus, vt periculum creauiffe exiftimarit. Itē dum Euryanaclidis filiae hiftoriam commemorat, caufam procatarticam quandam non omifit: hanc racemum guffaffe dicebant. Etfi conditio vitæ, vt fi quis ruri degat, aut in vrbe; ad constitutionem morborum tenendam apprimè conducit, cur non & caufa procatartica? Sed cum Galenus loco fupradictō ait caufas procatarticas putridam febrem non parere, non negat quin poffit excitari à caufa procatartica, fed putrens nifi fuerit humor, non generatur febris putrida. Nam loquens de Sileno ait, illum in diariam debuiffe incidere ob caufas iftas externas: fed quia corpus morbo erat obnoxium, facile imprefio facta eft in humoribus. Pluribus commentar. in illam hiftoriā explicat quā ratione à caufis illis procatarticis tam perniciofæ febres excitentur. Itaque mœftitia concepta potuit aliquid afferre. Et hinc non verebor dicere obferuaffe me omnes morbos qui mœroribus affectibusque animi fuccelfere, aut eodē perpetuos comites habent, effe *καταρτικὴς καὶ πυρετικὴς*. Cum medicamentum blandum fumpiffet, voluit fibi venam fecari poft ridie: & cum noctem implacidiffimam habuiffet, manè toto erupit fudor corpore: & cum indicta effet hora Chirurgus fecandæ venæ, aut erumpebat adhuc fudor, aut paulò antè præcefferat, cum imprudenter iam præ fudore corpore refoluto vena referatur; vnde animus defecit, nec mirum eft. Adeo occasio præceps eft, & aliàs captanda eft, aliàs omittendā: tametfi hoc vel illud agendum meritò videatur. Parum fanguinis detractum eft, ob deliquium fuccedens. Ab eo tempore adeo languidus fuit, vt nullā parte corpus mouere poffet, immò ne minimam manus contrectationem ferebat: an id ab illo errore commiffio manarit, ignoratur. Tamen hoc potuit iuuare plurimum. Febris erat adeo *καταρτικὴς*, (morbum autem malè moratum definit Galenus cum mitior non fit, tametfi omnia legitime fuerint adminiftrata) vt id ratione febris contingere potuerit. Febris continua: iactationes affiduæ, virium lapfus. Ad fextum diem pulfus plenus quafi explicatâ febre, hinc capitur fecandæ venæ occasio. Nil alleuatur. Vrinæ flammeæ, aliàs fanorum

Hift. 2.
 eēt. 3. lib.
 1 Epid.
 Hift. 6.
 fect. 2. li.
 3 Epid.

Com. in
 par. 1. fec.
 3. lib. 1
 Epid.

Quid
 morbus
καταρτικὴς
 Sns.
 Comi in
 par. 1.
 fect. 3. li.
 1 Epid.

similes, cum tamen febris perseveraret: quod in superiore ægro obseruatum est. Non sentiebat quicquam mali, sed mens ægrotabat. Morbus in eodem statu perseverabat: non meminerat multorum: semisopitus erat: comatosus: & reverà nisi symptomatica per aluum euacuatio successisset (quam euacuationem qualiscumque sit, in malis morbis iuuare plurimum, antè demonstratum est) aut comatosus interiisset, aut molestas parotides habuisset. Sed subductio alui illa, illo minimè sentiente, & perenniter suas syndones concatante, infœlici eo exitu illum liberavit. Item vrinam reddere non meminerat. Satis bellè cibum capiebat, & capere meminerat: cetera obliuiscabatur. Fluente aluo etiam nil manifestò febris remittebatur: sed tandem obseruatum illum fluorem febris finem attulisse. Tanquam pondus iners in lecto iacebat, prouolebatur non suo, sed aliorum nutu. In neutrum latus suo nutu decumbere poterat. Nulla mutatio in pulsu, in vrinis erat. Et quod mirum, diebus criticis natura aliquid moliri volebat: sed cum nil præclare facere posset, manabant sudores frigidi: pulsus deficiebat, contrahebatur. Si natura potens fuisset, crisis in eos dies incidisset. Deinde prior pulsus redibat. Lingua aridissima, sitis tamen nulla; nec enim se sitire putabat. At *ἡ ψυχή πάρα λόγους λυδίεισσι κελόν.* Sed delirabat. Ignorabatur quæ causa tantæ virium ruinæ foret cum corpus iuuenile foret. mos illius morbi inauditus. Nō potuit non suspectus esse morbus, quod sine causa manifesta aded impotès factus fuisset. Ad decimū sextū & septimū diem circa os sacrum tumor niger ambusto & carbunculo similis apparuit. Non sentiebat, licet esset dolorificus. Erat carbūculus. Aluus fluebat, & id commodè. Circa vicesimum diem restitit aluus: spes salutis fuit: ad se rediit. Corpus erat arens, squalidum, velut exustum. Erat occultum incendium quod humores exusserat.

Febris erat *ἀποσπαστική*, pestilens, quæ illum interemisset, nisi alui profluuium etiam symptomaticum (quanquam omnia quæ sunt symptomaticè sunt suspecta) successisset. Iuuit quoque ætas, quam magni facit Galenus comm. in Epidemior. libros, ad sustinendam malignam vim morborum & longitudinem.

ANNOTATIONES.

1. Vide locum præclarum de malis excretionibus quæ aliquando bonæ sunt astimandæ ex fine, non ex causa, in sequentibus. & ante Consiliū III.

2. Hoc non fuit criticum, sed symptomaticum, est multa talia excreta fuissent: illi fortè melius fuisset, vt ex lib. de atra bile constat, cap. 4. Tamen vtrumque hoc naturam iuuat.

Propriè erat phygethlon, vt in explicatione aphor. de gibbis diximus.

3. De eo verus aphorismus in Coacus: Mentis emotiones taciturnæ, non quiescentes, oculis circumspectantes, spiritum extra effe-
rentes, perniciosæ sunt: sed & ita affecti ad insaniam deueniunt. Qui verò in ventris turbatione ita exacerbantur, his nigra circa indicationem prodeunt. Quod huic agro contigit. Et si vires suffe-
cissent, vix contineri potuissent.

CONSILIVM LXXXVII.

De destillatione in pulmones.

ILLVSTRIS viri filia (cuius nomini parcendum ducimus) annos nata quinque, cœpit valetudinaria esse, cum annis superioribus integrâ sanitate, prout tulit ætas, frueretur. Nata est auia gibbosa, proinde procliui ad affectus pulmonis. Hinc congenita ad tabem dispositio. Hippocrates in Epidem. meminit cuiusdam filia ad tabem propensæ, cuius dispositio ad tabem mediocris morbi, & ad necandum non sufficientis aduentum ita adiuit, vt in ista morbi lenitudine obiuerit. Et idcò Hippocrates sub finem historia adiecit, *ἢ ἡ δὲ αὐρητικὸν φθισίαν*. Quod ab Hippocrate Galenus in Commentario adiectum dixit, vt conuellatur quorundam Sophistarum opinio existimantium nullum esse congenitum affectum: vnde mirum quò fiat vt hæc puella cum olim excederet humiditatis puerilis mediocritatē, vnde *αὐρητικὸν* apparebat, vt nec articuli, nec venæ foret conspicuæ: nunc quasi mutato temperamento, præter rationē macra, *λεπτὴ*, extenuatæque appareat; vt omnes & articuli & venæ facillè sub aspectum cadant. Hoc ad vermes relatum est: sed tamen cum malum perseuerare videretur, & summa esset catarrhi & destillationis in pulmones facilitas, immò & soxorem habuisset quæ à congestione humoris frigidi cataleptica interierit, ferinam destillationem huius mali occasionem arbitramur. Accedit quod præter ætatem, præterque morem hemorrhagiam patiat, quod, sicut & genarum rubor pulmoni-

Hist. 6.
sect. 2. li.
3 Epid.

corum proprium existit. Sic de illa tria quæſita ſunt: Cur præter rationem macruerit, cur à natura & ſtatu abs re ita deſciuerit; an lacti aſinino locus ſit, & num id vermium generationi, cui obnoxia eſt, officiat. Sanitas quidem in firmitate aliquâ conſiſtit, & aſtionum bonitate: & eos dicimus ſanos quibus corpus ^{coꝛpꝛ} & ſolidum eſt: tamen vtrumque fallax. Etenim pulmonicis ſuffunditur ruborè facies ob affluxum ſanguinis & caloris vaporem, & tamen iſte rubor bonus eſt. Extenuationis cauſe ſunt penuria alimenti, exercitationes plures, vigiliæ, dolor, morbus, & præcipuè ſi colliquans fuerit, prauitas humorum, imbecillitas denique ipſa. In hac vermes fortè aliquid potuerunt², ſed deſtillatio multum poteſt: vnde videmus eos facile marceſcere quibus deſtillationes ſunt perennes, niſi inſuſſentur ac intumeſcant. Quærebatur num lac aſinum ex vſu foret; quoniam calor acer quodammodo eſt, æruginosa expektorat quæ moram in ſubſtantia pulmonis trahentia erodunt, & ideò ſputum cruentum promouent, ideò lac ex vſu foret. Nam vt ſeri exuberantia ſuperat, ita pinguedine cæteris cedit: & mel aut ſaccharum admixcendum vt ſeri acrimonia retundatur, quod in ventriculum vacuum ingeſtum facile fundum refrigeraret.

Sed obiicies; minimâ alteratione opus habet: immò Galen. videtur velle lac alterationem in ventriculo non habere. Item cum laudemus lac aſinæ, quòd facile tranſeat, mel aut ſaccharum iſtam tranſeundi facilitatem impediẽt; vtrumque enim admixtum lac ipſum increaſſat. Tamen tum vt lac ipſum ſuâ ſeroſitate fundum ventriculi non lædat, nec facile irritando diarrhœam aliquam afferat, ſaccharum admixcemus; faciet enim vt moram in ventriculo aliquam trahat, & ita coquatur, deinde coctum à natura diſtribuatur. Et vt aliis locis obſeruauimus ex Galeno, ſi aut mel, aut ſal lacti admixceatur, fieri non poteſt vt lac in ventriculo concreſcat. Immò dum ſerum præſcribit iis quibus ilia obmurmurant, & ſalem & mel remiſcet. Cæterum viſum eſt è re fore ſi loco lactis aſinini, hyeme præfertim, quo tempore butyroſum lac non ſuppedit ob herbarum penuriam, aut negligentiam eorum qui non ad auxilium, ſed ad quæſtum, aſinas alunt, vteretur iuſculo conſumpto ferè pullo & carne vitulinâ, cum paſſulis, hordeo ritè lauto, cichorio, lactuc. ſeride, acetofa, & pugillus hyſopi ſub ſinem in eo iure maſceat. Nil

Cap. 6.
lib. 6 de
placitis.

3 de ali-
mentis.

Com. in
apho. 6.
lib. 5.

430 **CONSILIORVM MEDICINALIVM**
 aliud in ientaculo dabitur. Quod si magno vsu eiusmodi iuscu-
 lorum fibræ alui laxentur, aut albicans deiectio appareat, tem-
 perandum erit: firmatâ deinde aluo redeundum erit. Cùm ca-
 tarrhus infestabit, bolus cassiæ deuorabitur: aut si aluus lique-
 scat, eiusmodi tabellæ concinnabuntur.

*℞ electuar. diuereos simplicis ʒ s. electuarij triasant. simplicis ʒj.
 rasura ebor. cornu cerui, puluer. glycyrr. an. gr. vj. cinnamomi gr. ʒ. am-
 bra grisea gr. ij. rhubarb. ʒ ij. s. cum saccharo in aqua rosar. soluto.
 Fiant tabelle ʒ ij. deaurata. Vtatur sæpe.*

Vtetur pineis & amygdalis decorticatis cum saccharo. Vel
 pineæ excipientur saccharo rosato. Sæpè syrup. de bechio,
 conferua bechij, syrupo de siccis. Liberale prandium esto, par-
 ca cœna: serò assa, elixa manè conuenient. Caput vernice suf-
 fiendum. Thorax illinendus, & panno escarlatæ contegendus.
 Hydromel hyeme conueniet. In aqua mica panis albi macera-
 bitur. Vitandus statim à cibo somnus. Coriâdrum sæpè mædet.
 Panis erit syncomistus: sin macrescere videbitur, vtetur pane
 pisto & subactò in lacte. Vitanda ciborum vârietas. Iupiter fri-
 gidus fugiendus. Hyeme aère calido moderatòque contine-
 bitur.

ANNOTATIONES.

1. Nam Aristoteles vult puellas ante statum mensruorum tempus
 nec varicosas, nec hemorrhagicas, nec mensruas esse debere.
2. Initio destillationum quidem corpus plenum est, sed post emacia-
 tur ac extenuatur, vt ex lib. 1. de morbis apparet.

CONSILIVM LXXXVIII.

*In quo queritur, Cur exiguâ puris excretionè animus facile
 deficit?*

CVM Medici vulgò in missione sanguinis liberales esse so-
 cleant, mirum sit cur in educendo pure tam restringantur.
 Tamen quæ materies in pus abit, sanguis actu erat, siue is intra
 naturæ limites contineretur, siue ab iisdem recederet. At ex-
 perientia probauit exiguo pure aut vi excreto, aut suâ sponte

mananti, maiorem virium iacturam contingere, quam si sanguis aut plenius detrahatur, aut sponte fundatur. Ideò vetabat Hippocrates ne purulentis conferta fiat euacuatio: & tamen lulentæ venæ sectiones ab eodem commendantur; immò proccedit sæpè donec sectione animus linquat, deficiatque. Quæ duo inter se pugnant. Cur si dum tumor aliquis partem occupat cum tensione & rubore, sectione ad leipothymiam celebratâ, tumorem prohibemus incremento, immò non modò materiam antecedentem auertimus, sed de coniuncta adimimus (quod liuor sanguinis docet) quæ proxima puris materia est? immò ferè pus est, cur eùm sanguis iam actu & reapse pus erit, idem non factitabitur? Sed contrâ eductio paulatim fit metu exolutionis virium & spirituum. Testamur nos dolorem lateris quatruiduanum & vehementem, cùm frustra ternam sectionem celebrauissimus, & sanguinem laudabilem detraxissimus, sectâ quartò venâ radicitus sustulisse, cùm tria insignia vascula sanguine purulento plena detracta essent. Itaque alleuatio ægri tam subita, & eductæ materiæ qualitas, coniunctam ipsam materiam decisam detractamque confirmauit, & tamen conferta est euacuatio, cur non animus deficiebat? Cur itaque conferta sanguinis excretio non eque exoluat ac puris ipsius eductio? Nam in febribus putridis cùm sanguis subviridis, aut purulentus adimitur, idque insigniter, minùs id naturæ molestum est quàm si in iisdem febribus laudabilis sanguis minore copiâ detraheretur? Declarat ægri alacritas cùm saniosus sanguis eductus est: sed num iste saniosus sanguis puri analogos est? Ideò Princeps aliter quàm quidam Medici, quorum opinionem explosit Galenus, qui post quartum diem nefas esse duceret ferire venam, in periodicis febribus tertium paroxysmum expectari voluit, vt non priùs celebretur sectio quàm à se mutatus sanguis fuerit: ac si putaret naturam alacriore fore putri excretâ materiâ, quàm sanguine laudabili. Dysenteria & hæmorrhagiæ sæpè visuntur *αυτομαροι*. In quibus *αυτομαροι* sanguis educitur, mulieres aliàs vomunt, aliàs insignes fatis per vterum effluxiones patiuntur: exiguo virium dispensio, & tantula puris excretio, tantæ virium exolutionis causa existit? Galenus explicat quidem cur à ruptione interni phymatis puris effusio leipothymiam accersat, dicitque id fieri ob spiritus vitalis dissipationem. An non etiam missio sanguinis

Aph. 27
lib. 6.Aph. 23?
lib. 1:C. 4. s.
nit. tuèdCom. in
hystor. de
Anaxio-
ne.Com. in
aphor. 8.
lib. 7:

spiritus effluunt? Cur spiritus sanguinis ac puris non æquè sunt comites? Immo pus contra naturam quid est, & sin exclusionē indicat, vt sanguis sui conseruationem. Quod si & pure & sanguine effluēte spiritus vitales inaniuntur, in phlebotomia cum sanguinis largior sit excretio, maior quoque spirituum erit euacuatio. At credo, arteriotomia sine manifesta ista exolutione fit, & tamen confertim spiritus vitales effluunt ac exiliunt.

Sunt qui ad dolorem qui in aperienda vomica infligitur, recurrunt, vt idem fiat quod in sectione venæ malleoli; quæ quoniam dolorifica est, idè deliquium affert potius quàm sectio in aliavis parte. Sic quia aperta vomica cauterio aut ferro dolor fit, pus membranas pungit dum effluit, spiritus euacuantur; neruuli necessariò feruntur, tumor aderat dolorificus (at nil æquè vires deiicit ac dolor) eoque magis quò partibus neruosis est propinquior, aut emunctoriis partium: immò in minimis furunculis tantus sæpe dolor adest, cum exigua moles sit materiæ, vt animus sæpe linquat (nisi fortè ad *τις γαλοειδης* id referatur) mirumne sit si ratione doloris qui ob tumorem & inflammationem præcedit, & eius qui aut cauterio, aut ferro infligitur, & ratione cæsiõnis neruulorum arteriolarumque, & acrimoniæ rei effluentis, & vaporis qui à mota putri materia excitari solet, tantopere vires exoluantur? Immo, quod mirum, si portiuncula aliqua sanguinis cum pure effluat, vt pus cruentum sit, maior est virium ruina. Vnde hoc est si dolor hanc leipothymiam affert ob discissionem corpusculorum illorum, in sectione venæ secantur quoque vasa & cutis: item diu sanguis effluit donec tria compleantur vasa, non tam diu pus fluit. Cur cursus sanguinis diuturnior non afferat eam leipothymiam, quàm breuissimo tempore puris effusio? Dum abscinditur sphaclatum crus, arteriæ magnæ & nerui scinduntur nullâ ferè animi defectiõne, in tormentis festuca contunduntur rumpunturque artus, & tamen nullus animo deficitur? Minima arteriolarum sectio tantæ exolutionis autor erit? Nisi fortè dicas in cruris ablatione, & artuum confractiõne violentam esse spirituum agitationem, vt natura omnes tum vires & opes explicet maiori vi non cessura. At cum pus educitur, languet natura, nec sese ita erigit.

Alii existimant idè puris educationem maiorem virium iacturam intendere, quòd natura in partem abscessu occupatam

multum

multum sanguinis & spiritus miserit tanquam suppetias suas. Quorum omnium euacuatio contingit cum pus effluit; hinc animi defectio. Natura quidē opē subsidiariam latura in affectā partem ea relegauit. At non est probabile ob euacuationem sanguinis & spiritus in subsidium missorum tantam perturbationem & defectionem euenire. Multo enim maior vtriusque fit euacuatio in phlebotomia, quam in efflutione puris: immo spiritus in parte ipsa contenti, & sanguis iam corrupti sunt, & à sua temperie deficiuerunt: dum per sectionem sanguis mittitur, spiritus limpidi & puri effluunt. At credibilius est naturam amantem esse rerum gratarum quam ingratarum, vt crises liberales testantur: quanquam concedimus in retro etiam pure spiritus laudabiles contineri, sed quæ abscessit & deposita est materia nature molesta est, cum in pus versa nonnisi sui exclusionem insinuat: secreta iam est, & ideo exclusioni parata, particularem quandam in membro affecto plethoram facit. Ideo exclusio videtur à natura fieri. At cedit, quanta solet esse nature alacritas cum id excluditur quo premebatur?

Galenus causam videtur aliqua ex parte explicasse, cur conferta aquæ aut puris exclusio non sit molienda; non quin tota excludi debeat, sed non ἀπόως. Et cum illud ἀπόως significet contrarium τῷ καὶ βεργῷ, & τῷ καὶ στυμπῶν, id est, & ad quantitatem, & ad tempus referatur: ita hoc loco sumitur, vt fiat exclusio totius puris, non in vno tempore, sed in pluribus, vt pluribus vicibus vna conferta copiosaque exclusio compensetur. Quod autem nunc aperta vomica excernitur, confertim quodammodo fieri debet, ne si pauca puris excretio longo tempore fiat, istā diuturnitate debilitet: sed vno tēpore omnis euacuatio nō est moliēda. Gal. verba sunt: *Cum quis tumor suppurat, & is magnus, equè est periculosa in aliis partibus confertim facta euacuatio, ac aque in ventre, & in thorace puris, cum illud animus linquat, vires labascāt, vt ei imbecillitati viriumque ruina remedium queratur. In his itaque ob magnam corporum diuisionem, dissidium ac distentionem oscilla corporum quorundam arteriosorum adaperiuntur, quæ prius tanquam ἐπίμυα quoddam, id est, operculum pus ipsum continebant, quo confertim euacuatio, multorum vnà spirituum effluxio contingit, & consecutio. (vtitur enim verbis στυμπῶν καὶ ἀσπυρῶν) hincque laborantibus creatur periculum. Hic meminit tumoris magni, qui necessariò diremptionem, dissidium, distentionemque magnam affert; vnde dolo-*

res, vt & distentio, & tumoris magnitudo ad inducendam istā, de qua sermo est, imbecillitatem, videantur concurrere. Tamen si diligenter locus legatur, eam virium iacturam vni spirituum euacuationi attribuit: Euacuationem ipsam infert arteriarum sectio, quæ pus ipsum continebant tanquam operculum quoddam: At iam docuimus non sufficere ad leipothymiam inducendam istam spirituum exclusionem, cùm & in arteriotomia arteriarum corpus secetur (dicitur enim *ἀπὸ τοῦ τῶ ἀρτηρίας σπύμα τ. μυσίν*) & in phlebotomia spirituum fiet euacuatio. Alio in loco autem puris exclusione *ἐκ λυσιμ* induci ob exclusionem spiritus vitalis docet. Hic generalius *το πνεύματος* exhaustum recen-
Com in set, non addit *τὸ ζῶον πνεύματος*: & hoc nō est theoremata: *Commune*
aphor. 8. *lib. 7.* *est omnibus ruptionibus vt exolutio virium defectioque animi consequatur, idque ob spiritus vitalis effluxum.* At antè quæsitum est, cur eruptione puris sequatur potius vitalis spiritus inanitio, quam sanguinis detractione? Nam non ineptè quidam interpretantur eam leipothymiam ad quam vsque ducit aliquando Hippocrates in magnis doloribus & inflammationibus, de exclusione spiritus animalis, eaque non inclusiuā, sed exclusiuā, vt desinat fluere cùm ea aduentat, non cùm actū iam est: quoniam vacuatio spiritus vitalis plus periculi intentet, quam spiritus animalis. Propterea *τὸ σπύμα* nomen vsurpant pro præcipiti omnium virium ruina, euacuato aut dissipato spiritu vitali, qui spirituum animalium est fons & scaturigo. Nomen autem Leipothymia & *λειποθυμία* ad defectionem animi referunt ob spiritus animales exhaustos; vt *τὸ σπύμα* nomen ad vtrumque referatur. Cùm tamen ait commune esse omnium ruptionum vt animi defectio contingat, non est vsus verbo syncopes, sed leipothymia: vim autem eius adauget nominè *τὸ ἐλλύσιμ*, quam ferè vocem *ἀπὸ τῶ ἐλλύσιμ*, aut *τὸ ἀδυναμία* vsurpant. Et cùm leipothymia ipsa potest virium *ἀδυναμία* esse, cùm syncope non potest esse.

Nos autem cùm parum probabiles tantæ exolutionis causis ob paucitatem effluentis puris comperiamus, alias excogitare, & breuè exponere in animo est. Paulò antè cumplum rationum adduximus ob quas ea dissolutio eueniat, quoniam (pace Galeni dicam) non est satis dicere id fieri ob spirituum effluxum. Dolor qui à ferro aut cauterio infligitur, immò & doloris opinio quā inhorrescunt cùm abscessus ruptionem subolfaciunt punctio membranarum dum pus fluit, euacuatio spirituum

fectio neruulorum, arteriolarumque & cutis, dolor qui primus aderat ob puris ebullitionem & putredinem, nec non partium tum distentionem, tum diremptum, tetra-anathymiasis ab erumpente elata pure; denique hæ omnes causæ in vnum coeuntes hanc fortè exolutionem afferunt, non autem vna atque altera causa, alioqui sanguinis detractio maiorem virium prosternendarum occasionem afferret. At nos probabiles alias causas commiscimus. Pus etsi exclusionem sui indicat, naturæ tamen opus est, immò quid elaboratius quàm sanguis: & cum in causa antecedente sanguis sit laudabilis, ex euentu aliena sit natura, quoniam tanquam onus depositum est in partem, aut in ea ipsa parte ob imbecillitatem collectus, aut vi aliquâ attractus, & quantum potest nititur natura cum partibus solidis assimilare. Porro natura est vis ipsa partium solidarum. Et si vis infertur partibus solidis, non sine querela id fit. Æqualitas, albor, læuitas declarat naturam eò processisse, vt si materies pateretur, id totum exactum excultumque tanquam cambium, vltimâ assimilatione in naturam partis conuerteret. ³ Sic & ratione qualitatis, quatenus refert ideam spermaticarum partium, & ratione spiritus tum in materia coerciti, tum ad eam perenniter affluentis, non potest artificio Medici erumpere, nisi naturâ reclamante; tum quia spiritus exiliunt, tum quod pepasum receperat, ac idem ei pene fit ac si propria foret *πεψις*. Eodem enim in pepsi & pepasmo naturæ consilium dirigitur. Hippocrates scribit *πύον & λεβός, ἡ ἀρτηρίας πύον*. *Pus vena & arteria est alimentum*: vel arteria & vena propriè nutriuntur materiâ albâ & sanguine dealbato, vel cum natura morâ conficit sanguinem in pus tanquam in familiarem materiam agit ac si ea in alimentum esset cessura. Hinc videmus si parum sanguinis cum pure effluit, exolutionem maiorem sequi, quod ex eo sanguine tanquam vltimo alimento in sinu iam partis deposito natura carere nequeat, & non, nisi cum querela, effluere sinat. Quid si puri cum spermate tantam analogiam esse dicamus, vt quemadmodum tantula seminis excretio ob materiæ ipsius naturam, quod iam ferè pars solida fit, & res naturæ benigna, & spirituum copiam, corpus breui prosternat, ita & puris eruptio? In vtroque naturæ caractere elucet; ideo Hippocrates semen partem hominis potentissimam conuincit, quod eo tantulo excreto homo imbecillimus relinquatur. ³ Pus & semen partes potentes dici possunt, quod in

Lib. de
e. vii.

436 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 vtrumque natura vires excreuerit, tanquam in rem proximè in-
 alimentum cessuram, non partium carnosarum, sed spermati-
 carum. At sanguis et si naturæ gratus, non adeò tamen gratus ac
 id quod iam characterem, ideam & naturam partis solidæ (in
 qua vis omnis hæret) suscepit. Accedit quod multus adeò in
 corpore sanguis sit, vt detractiõnis incommodū (nisi quis adeò
 imbecillus sit vt minimum non ferat in corpore tumultum) non
 facile sentiat. Addam ad superiores rationes vnam, in pure
 quid malignum continetur, vt eo agitato per sectionem facile
 per arteriolas ad cor vis deferatur. Hinc in malignis tumoribus,
 præsertim si neruis insignibus propinqui sint, vulgò eruptione
 pauci puris tanta exolutio sequatur, vt in propinquo mors esse
 videatur. Et quòd sanguis tumorem faciens extra vasa sit, mi-
 nus molesta esse deberet detractio quàm si in vasis continere-
 tur, & à natura regeretur. At quia è vasis effluxit, facilius cor-
 rumpitur, tetrumque vaporem spirat, vnde nisi tempore ex-
 cludatur, cum confectum pus est, breuè liuescit & graueolet, &
 inficit partem. Quod ab Hippocrate dictum. *Si sanguis in ven-*
treff. 20: treff. 6: trem effunditur, suppurat. Galenus ait melius esse si dicamus cor-
 rumpi. Hinc patet egressum sanguinis è cõceptaculis corruptio-
 nis causam esse. Quæ corruptio inficiens spiritus dum moue-
 tur (quia omnis materia putris quiescens minus mala esse solet
 quàm si moueatur) & excluditur, mirum ne sit si *καταρρα* aut
καταρρα consequatur.

ANNOTATIONES.

1. Immo in praxi obseruamus cum sanguis impurus educitur luculen-
 tidè, id fieri & exiguo virium dispendio, dummodò corpus sit repurgatum;
 cum sanguis purus educitur, statim exolutio sequitur: at impuro sanguini
 cum pure analogia est.
2. Et sudor, & seminis excretio licet exigua, & puris, vires conuellit.
3. Videmus chylosam euacuationem per aluum plus asserre exolationis
 virium, quàm multam aliam euacuationem.
4. Qui sit vt copiosa hemorrhagia, aut per aluam exclusio non tam
 deiciat vires quàm sudor? Quoniam cum sudore spiritus euacuantur
 multi, & rori ipsi, id est, vltimo partium alimento vis infertur. Quomo-
 do & cum pus tanquam partis vltimum alimentum, demitur, vis quæque
 parti inferri videtur.

5. Tamen aliquis obiiciat de lacte, quod cum sit ultimum alimentum, & album, tamen magna satis copia detrahatur innocuè. Alij recurrunt ad opinionem Aristotelis, qui putat mutationem tam subitam incidere cum pus, aut simile quid effluit, quod in locum euacuati puris calidi succedat aer frigidus, minimè mutatus, qui ferit membranas.

CONSILIUM LXXXIX.

De Parotidibus.

IANO Memmio dolores aurium tertio die excitantur. Quæritur an isti dolores & hæmorrhagiæ in tertium & quintum diem incidentes critica? Cur non critica essent? & tamen virūque tertio & quinto die Medicis suspectum fuit. Si sudores tertio & quinto incipientes boni, cur non & parotides, & alia id genus? Galenus in comment. ait non sudores tantum in eos dies incidentes, bonos, sed & deiectiones, & abscessus, si modò effatu digni. Scio quidem Hippocratem nolle eos dies esse decretorios; tamen *in his diebus* in eos dies possunt incidere: Ac si dicat, iudicatoria quæ non iudicant suspecta sunt: sed hoc bonum si saltem iudicatoria in dies indices & intercalares. Itaque eodem modo tertius & quintus iudicantes erunt, quatenus signa, & casus qui diebus illis apparent non sunt mala, si dies illi cum aliis malis diebus comparentur. Nec abs re ait, si sudores tertio incipiant, vt per verbum, incipere, significetur aggressio naturæ quæ ob tarditatem non potest adhuc indicare: cur non etiam quartus dies iudicatoria tantum signa habere dicatur, cum nebula quarto apparens sit iudicatoria, non iudicans. Sed alia est ratio; nam index dicitur, & nebula indicium dat futuræ criseos. Sed cum tertio aut quarto die sudores incipiunt, vt concedam eos non iudicare, quia tamen iam potentis naturæ aggressionem significant, idè in bonis sunt. Et oportet illud quod fit naturam validam ostendere, vt si riuulose his diebus fluat sanguis, licet non indicet, tamen bonum est id fieri factâ collatione cum alio naturæ conatu languidiusculo. Nec abs re addit Galenus, *deiectiones* (quod idem de ceteris excretionibus debet intelligi) *tertio & quarto die apparentes, & incipientes* (quod posterius verbum debet notari) *bono esse si modò sint æquæ & puræ.* Sed omnino parotides

non videntur criticae, sed potiùs iudicatoriae, quocumque modo & die apparuerint, quoniam sunt abscessus morbo impares, nec febrem solvunt; & quia dolorificae sunt, & propter vicinitatem cerebri: tum maximè quia omnis translatio à partibus inferis ad superas suspecta esse debet. Quae omnia plenius Galenus comm. in Prorrheth.

Com. in
part. 67.
sect. 3. li.
Prorrheth.

CONSILIUM XC.

Ad Quartanam leipothymiae implexam.

SUPERIORIBVS paginis duarum mulierum quartanâ laborantium historia commemorata est, ac praesertim eius quae Dorseti Praesidis uxorem occupabat. Nunc verò æquum est adiicere ea quae euenerint, & de quibus coacti Medici deliberarint. Cum difficultas esset summa in inuestiganda causa cuiusdam leipothymiae quae illam terrefaciebat, consilium inimum est ea de re satis celebre. Tum demum ea deliquia quae comites habent sudores frigidus, & partium extimarum, sed praesertim crurum & tibiarum rigores, cum accessiones febris quartanae desinere visa sunt, aut cum parum commemorabiles forent, complicatas diebus intercalaribus alias accessiones, ordinatis deteriores haberent: ut aut semitertianae febris suspicio esset, aut lentae, aut complicatarum accessionum, aut nouae materiae in nouo foco excitatae. Et quod mirum est, tum demum semen morbi quod sepultum visum est, excitatur ac reuiuiscit cum menses erumpunt: immò obseruauit omnia in peius ruere, tum cum fluxerunt menses, etsi copiosè satis proflexerint. Nos huius rei duas tresve causas affingere volumus: nam incertarum rerum non ita firma certaque ratio reddi potest: Prima est illa perturbatio quae euenit erumpentibus mensibus, ut quemadmodum alias menstruas mulieres ante effluxum sanguinis variè attingunt symptomata (vnde mala septimanae vulgo dicuntur) si hanc illa symptomata sequantur. Ante eruptionem enim nihil penè affligitur. Secunda est, quia cum ipsa satis superque ex obseruatione suae peculiaris naturae phlebotomiam non ferat quantulacumque sit, mirum non sit si per vterum excretionem floriduli sanguinis non ferat, tamen excretio illa sola sit

naturalis, & mirificè alias mulieres iuuet; ² quia pauco abundat sanguine, siccum habet aridumque & calens impensè hepar, vt eius minimam iacturam non patiatur. Tertia est ^{pūs yvaugēs}, quo maximè tenetur post eruptionem mensium; quasi vasa vteri ita conuieant & concidant, vt illa fœda excretio non fiat nisi vi naturæ vasa ad fluxum mensium referentur: vt materia fluxus illius fœdi quæ veluti prostat & pro foribus est, quâ data porta larga copia excernatur. Ac reuerà multò cumulatiùs & magis affatim excernitur fluxus menstruus, quàm antequàm fluxerint. Accedit quod omnis commotio materiei fœdæ & lutosæ inquinat & inficiat prauis halitibus spiracula corporis & partes maximè momentaneas afficiat, quasi commota camarina, vt aiunt. Sic quia omnes quasi partes commouentur, colluuius restagnans resesque excitatur, quæ in corpore præsertim languidiusculo magnos excitat tumultus. Si mineræ virtutum starèt non ita percelleretur. At minimis momentis corpora naturæ imbecilla, & infirmis partibus prædita, & maximè morbis afflictiora debiliora reddita, valdè turbantur ac eliduntur. Nos autem satis obseruauimus partes internas imbecillas esse: si quando autem mutatio commotiõque accidat, id fit maximè cum vteri vasa referantur, aut vterus ipse mouetur. Nam si qua pars alia toti corpori consentit, & ex Hippocrate totum corpus ^{au-} ^{Libr. de} ^{locis in} ^{hom.} commouetur, vt vnus motum altera pars facilè excipiat. Deliquia ista non ita nos terrebant quod syncoptica non viderentur; nam nec magna, nec frequentia, nec sine causa erant manifesta: quanquam successu temporis euenire posset vt ad eam naturam accederent. Mulier ista ferè hypochondriacæ est, obstructionibus mirum in modum patet; quod declarauerunt fœdi colores quibus illa per annos duodecim laborauit. Si autem exquisitus sensus ventriculi, aut natiua infirmitas deliquij causa foret, cur non aliis temporibus æquè deficeret anima? Narrauit quidem percepisse se à sinistro hypochondrio surgentem anathymiasin quæ cor petiuisset. Duo erant valdè notanda, quid causæ esset cur in accessionibus ordinatis non deficeret animus, sed in extraordinariis? vt ita dicam. Posterius, si ita obstructas habet mesenterij venas (quod solemnia alui profuuija declarant) quid causæ sit vt tantum meiat, & crassas admodum vrinas habeat. Nam & exiguus mictus esse deberet, & vrinæ tenues ac veluti percolatæ esse deberent. De vrinis ita dicen-

440 CONSILIORVM MEDICINALIVM
dum. Multæ vrinæ fiunt aut copiâ potus, aut defluxu catarrho-
so, aut per expressionem aliquam, aut per attractionem, vt in
diabete fit. In hac perennis est defluxio à capite, nitrosi sunt
humores, hepar squalens & calens, vt idem hepatis contingat,
quod renibus in diabete: immò perpetuò sentit quoddam in-
cendium in regione hepatis. Et nisi aut defluxio perennis esset,
aut metu hydropis ipsa sibi à potu temperaret, sitim haberet
inextinguibilem; immò non potest fallere sitim, nec aliorum
more qui pitissatione contenti sunt, eam explet nisi plenissimo
haustu. Probabilem *scilicet* istius muliebris causam afferebamus ex
Hippocrate, quod ex cerebro esset: *si mordet, à ventre est, ait*
Hippocrates; si non mordet, à capite. Quamquam lib. de locis in
homine, id quod ab interno capite manat, mordere asseuerat.
Summa est inappetentia, quia cum summa cura excogitatur ci-
bus, & cum offertur statim abominabilis est, summæ inappe-
tentia est argumentum, ait Galenus in historia de Euryanacti-
dis filia.

Lib. de
natura
muliebris

Hist. 6.
part. sect.
2. lib. 3.
Epidem.

Maximè verò omnium tantæ mutationis causam ad solstitiū
hibernum reduximus. Nam queniadmodum circa æquinoctiū
autumnale ea grauissimè habuit, ita instante hyberno solstitio
non mirum sit si tanta mutatio eueniat.

Verum quod maximè in ea mirandum fuit, est *ἔλασι* illa in
qua omnium quidem meminit, ratiocinatur probè, cibum ca-
pit, nec est *ἀπόστως*, & tamen ne minimum ferè corpus mouere
potest, immò ne manum quidem ad os adducere, adeò impo-
tens fit. Et id maximè euenit cum febris suscitatur: nam eodem
pene momento facies tota erubescit, calor in suris tibiaram
acerrimus percipitur, & manet tanquam *ἐκλελυμένη*. Credibile est
per cæcos meatus tetrum vaporem sese insinuare, qui si aut re-
ctâ in cor ferretur, aut in principium neruorum, terrificam magis
symptomata excitaret. Vix autem talis morbus, & quod id in-
genium habeat, vnquam à Medicis est obseruatum. Nescitur
quo id referendum sit. Et, quod mirandum magis, nulla ferè in-
pulsu mutatio percipitur etiam manentibus istis deliquis. Ad
ea symptomata corrigenda hæc sunt ordinata:

Frictiones crurum & tibiaram: Applicatio cucurbitularum
internis fœmoribus: Item maiora frustula panis tosti iisdem
fœmoribus applicata. Noduli ex rosis & caryophyllis qui ma-
cerantur in aceto vt naribus admoueantur. Item frustula panis
tosti

rofti in aceto macerata, & quæ admoucantur naribus. Grana granatorum deftillata frequentia. Et hæ tabellæ:

℞ pulueris electuar. diamb. & letit. Gal. an. ℥ j. diarrhodon abb. ℥ ſ. rafura ebo. coræu cerui, margar. elect. an. ℥ j. rafura vnicor. gr. x. cum facch. foluto in aq. rof. fiant tabellæ.

Item ℞ confect. Alkermes ℥ j. theriac. & mithridat. an. ℥ j. confer. buglof. & meliff. an. ℥ ij. pulu. diamarg. frig. ℥ j. Fiat pulvis admo- uenda cordi ſuper membranulam.

℞ ambra grif. gr. ij. rafura unicorn. gr. vj. rhabarb. gr. x. Fiant pi- lula cum vino albo.

℞. aquar. melif. card. buglof. & morfus an. ℥ j. coentur per mani- cam hippocr. cum elect. diatrag. frig. fant. rof. & pauco cinam. Capiat cum parte deſtill. reſtauratiui ſequentis.

℞. confer. buglof. nenuphar. viol. melif. flor. cichory & vngul. an. ℥ ij. iuiub. ſebeſt. an. xx. num. pinearum piſtaciaram an. ℥ ij. paſſul. mundat. quar. j. glycyt. contuſæ ℥ ij. carnem caudarum cancrorum ſtu- niatil. parat. & macerat. in lacte lib. ſ. carnem duorum aut trium tur- turum, carnem vnius capi iuuenis & duarum perdicum, ſem. bombacis, citry, melonum, an. ℥ ſ. decoct. duorum pullorum cum hor- deo, ſcariol. acetof. buglof. & borag. alteratorum, lib. vj. Miſcean- tur omnia diligenter ſecundum artem. Diſtillentur per cineres in alam- bico vitreo.

℞. præd. deſtillati lib. ſ. paſſetur per manicam hippocratis cum ſacch. cando. capiat tempore deliquij cum tertia parte aquarum ſtillatitiarum.

ANNOTATIONES.

1. Nam Hippocrates lib. 1. de morbis mulier. annotat bilioſis mu- lieribus ob menſtruam purgationem, puſilanimitem, & multa alia incommoda ſequi.

2. Si Galenus cap. 13. lib. de miſſione ſanguinis, dum loquitur de vi- riſ, ait tum liberalius vacuandum cum homines ſunt mediocriter grac- ileſ, & amplas venas habent, & minimè candidi ſunt, nec tenerâ carne præditi. At hæc mulier tenerâ carne prædita eſt, gracilis, venas anguſtas habet, &c.

3. Illam valdè exercuit immodicus ſanguinis fluor. Mirum non fuit ſi pro aſſumpti cibi ratione non roboretur, ac præſertim pedes exangues- penè ſint. Hippocrates lib. 2. de morbis mulier. ſcribit vnum valdè no- tandum: Sanguis rubicundus multus fluit ex febris, & torpor

442 CONSILIORVM MEDICINALIVM
corporis, & crurum perfrigeratio aduenit, dolor clauicularum.
*Non abs re dixit ex febribus; & hoc commentario dignum est. Nam
contrà, aliis mulieribus affectus febre in totum menses desinunt: cur ergo
aliis febres excitant?*

3. Et ei cum immoderatiùs fluere menses, visum est optimum ut pa-
raretur syrupus astringens quo medio mensium cursu vteretur ad repri-
mendum illum, & ad succum & vim recuperandam in tibiis litus ex oleo
violato comparatus est priùs lauto decocto chamem. & rosar. Forus ex deco-
cto omazorum addita vino albo.

CONSILIVM XCI.

De hepatis phlogosi.

DO. Lyssæi seruus febre acutâ corripitur. Dolor ad hypo-
chondrium dextrum. Satis colligebamus non esse pleu-
ritim. Tamen summa erat difficultas ducendæ animæ, & quæ
in horas increaseret. Spes erat eam sedatum iri vno medica-
mento. Contrà aucta est. Metus suffocationis. Reuerà phlogo-
sis erat pituitosa circum eas partes, & nisi ternâ sectione venæ
prouisum fuisset, metus erat abscessus. Hippocrates scripsit;
*Quibus dolor ad hypochondrium sine inflammatione, his febris superue-
niens, solutio.* Si morsus est, & dolor, hoc inflammationem, aut
quid simile significat. Si talis dispositio non adfuerit, & morsus
abfuerit, dolor tum fit aut propter obstructionem, aut flatum,
aut inæqualem aliquam intemperiem: quæ omnia calor febrilis
tollit. Quanquam de obstructione dubitari potest. Nam si
magna febrium putridarum pars ab obstructione est, obstruc-
tio ista febrem afferret, nedum febris eam tolleret. Sed cum
febris in isto ægro sequiret magis, nec de flatu, nec de sola ob-
structione verebatur, sed de inflammatione potiùs, aut simili
aliqua affectione. Et verò ex Galeno ita ratiocinabamur:
Carnosâ parte hepatis inflammatâ grauis fit dolor: tunica cir-
cumducta, vel valis inflammatis, acutus. Sed biliosus humor
& acutus dolorem auget: item spiritus flatusosus exitum non
habens: remittit autem pituitosus. Si mediocris dolor est, &
non pungit, vt qui in membrana succingente est, nec ad clau-
iculam aut illa pertingit: contingit ipsum dolorem fieri, carnosus

*Aph. 40.
lib. 6.*

*Cens. in
aphor. 5.
lib. 6.*

costarum partibus affectis: ideò non est periculosum, nec magno eget auxilio. Ceterùm cum hepate inflammato dolor ad iugulum peruenit, potiùs sequitur venæ cauæ aut arteriæ distensionem quàm membranæ. Nam proprius dolor venæ & arteriæ est tanquam extensæ in longum chordæ. Nil prius fuit quàm & ad anteuertendam istam inflammationem quam futuram suspicabamur, & ad febrim iugulandam quâ fortè consumptus esset, ter venam ferire, & largiter sanguinem detrahere.

ANNOTATIONES.

1. In plerisque mulieribus, præsertim quibus hepar præcalidum, & quæ in vsu vini essent liberaliores, talem affectum animaduertimus, ut in ea quæ adrosam rubram habitat. Cùm causa quæ affectum parit, præsertim calidum, extra diaphragma est, adest quidem spirandi difficultas, sed tusus non adest: nisi proximè attingat diaphragma, ut in inflammatione gibbarum hepatis contingit; in qua inanis est tusus, non propriè dicta tusus, quòd id contingat ob transfudationem quandam.

2. In febribus circa viscera dolores mali, aphor. 66. lib. 4. Galenus istos dolores non vult esse à forti obstructione, ab inflammatione, ab erysipelate, aut abscessu, alioqui quæ adesset febris ea tantùm symptomatica foret. Comment. in aphor. illum. & in aphor. 73. lib. 4.

CONSILIVM XCII.

De præcautione febris lentæ & destillationis in pulmones.

HVGONI scribæ in metu febris lentæ & destillationis in pulmones, cùm hepar in vitio videretur, maiorâque postea minarentur, hæc instituuntur.

℞. radicū cichor. acetos. gram. polyp. glyc. asparagi an. ℥j. endiuia, buglos. borag. fumar. agrimon. scariola, scolopend. ceterach, cortic. interiorum ramorum viridum tamaricis an. m. j. sem. melon. citrij. cardui benedicti & carth. an. ℥ iij. sem. anisi, papauer. alb. an. ℥ j. passul. integr. prunorum dulc. an. p. 4. corticum pomor. redolentium ℥ ij. Fiat decoct. ad lib. ij. ad consumptionem medietatis.

℞. præd. decoctionis lib. s. succipomor. dulc. fragran. quart. j. sacch. & syrup. viol. an. ℥ j. s. fiat iulep clarum aromatis. santal. citrino, &

cortice citrij succo. Capiat alternis matutinis tribus horis ante cibum.

℞. eiusdem decoct. lib. s. succi pomorum dulc. ℥ iij. vini albi debilis ℥ ij. folior. senæ ℥ s. agarici trochis. ℥ ij. rhabarb. ℥ iij. cinam. santal. citrini & ligni aloes veri an. ℥ j. Infunde per noctem. fiat express. dissol. sacch ℥ ij. syrup. viol. & de cichor. simpl. an. ℥ j. Fiat apozema, clarific. & aromatis. utatur sigillatim post singulas apozematis doses.

℞ pulu. electuarij diatrag. frig. diatrium santal. diamarg. frig. an. ℥ s. diarrhod. abb. ℥ j. arom. ros. Gabr. ℥ s. Fiat electuar. per tabell. pond. ℥ ij. cum sacchar. soluto in aqu. ros. endiviae, in quibus prius ℥ ij. glycyr. rad. infuse fuerint. Sumat vnā manē ante suum iusculum.

Bis mense supradicto syrupo purgetur, vel syrupo de cichor. compos. cum rhabarb.

Alius puluis.

℞. pulu. elect. diatrag. frig. & diaireos an. ℥ j. lign. al. ℥ s. boli arm. ℥ s. rhabarb. gr. xij. sacchari penid. ℥ s. margar. elect. gr. vj. unicorn. gr. ij. cum sacch. soluto aqu. buglos. macerat. ros. siccar. & infusion. gr. vj. cinnam. fiant tabella.

Iuuabit aliquando tempore pluuioso aloē ad ℥ ij. cum pane sacerdotali; ita vt toto die utatur in sculo refrigerante, & elixis, & capiat ℥ vj. aqua saccharata, & fiet in ingressu lecti post cœnam sobriam.

Capiat lac asinum ex saccharo prius soluto in aqua ex cochleari vt minus bareat.

Vtatur vino diluto. Vinum autem diluetur aqua in qua pomi à carti-pendolo frustra aliquor maduerint.

℞. polypod. ℥ ij. rad. cichor. glycyr. an. ℥ j. buglos. m. j. meliss. scariol. an. m. j. ceterach m. ij. sem. citon. melon. concisor. an. ℥ iij. flor. violar. rapsi barb. an. p. ij. Coqu. in lib. j. s. succi pomorum. dissol. sacchar. lib. j. utatur quotidie manē & serò, si volet.

CONSILIVM XCIII.

De Arthritide.

MORBORVM quidam cogniti sunt, incogniti alij. Ad incognitos multa remedia adhibentur analogismo quodam & epilogismo quæsitā, periculi faciendi causā: & ita infra modum confidetur, vt si non aliquod commemorabile auxiliū afferimus, saltem non obsumus. Et intereā si secundum rationē

omnia fiant, nectamen pro agentium voto res procedant, perseverandum in remediis quoad aut certum magis sit de morbo ac constituatur, aut noua occasio, nonnunquam consilium queratur. Cognitio morbi plurimum ad remedij inuentionem ualet, immò & cognitio morbi & curatio retro meant ac reciprocantur, vt quodam in loco asseuerat Hippocrates. Non tamen si morbus cognitus, omninò curationem admittit. In eo genere sunt epilepsia, febris quartana, apoplexia, cephalalgia, calculus, quorum sæpe causa & idéa sunt in propatulo, & tamen proderelictis habentur. In horum censu habenda arthritidis (quæ tum dicitur cum aut omnes partes occupantur, cumque erraticè modò pars vna, modò altera obsidetur?) Ita enim doctè admodum Galenus distinguit arthritin ab articulorum dolore generaliter dicto. Nam illo in aphorismo Hippocrates ait arthritides in squaloribus oriri; Galenus functus legitimo interpretis officio negat arthritin verè dictam in ficcis temporibus oriri posse: Ac si dicat necessariò humorem adesse debere: at qui adesse potest in ficcitatibus (quas *αυγμὸς* vocat) Itaque dolores quidem articulorum excitari possunt tali in tempore, at non arthritidis. Et citat Hippocratem in Epidem. *In Aeno legumina comedentibus infirmitas crurum, & qui orobis vescebantur genuum dolores habebant:* non arthriticos vocat, sed genua dolentes. Sic aliud est arthritidis, aliud articulorum dolor: & tandem concludit arthritin vocari non cum vnus articuli dolor est, sed cum multorum. Quanquam mancus etiam est eo loco Galenus. Et cum pars vna siue articulus laborat, tum à parte nomen fortitur morbus, diciturque aut chiragra, si manus; aut podagra, si pedes occupentur. Ac de arthritidis causa, periodis, materia, scaturigine, morbi essentia, hyparxi, motu, cur si sequantur inflammationes conuulsiones non oriantur, an vnus sit humor, an multiplex, immò & de remediis ita inter Medicos pugnatur, vt nihil dum hætenus statutum sit. Vnde Paulus: *Huius affectus variæ causæ à me explicantur, interdum verò caca ipsius origo est.* Et mirum esse possit cur qui ischiade laborant ferè de aliis articulis non cõquerantur, cum tamè morbus coxarius ad arthritin pertineat: at si vel gonagravel podagra quæpiã molestat, nõ priùshunc dolorem ad arthritin referimus, quàm viderimus aliam partem occupari ac dolere; immò, vt antè exposuimus, arthritidis essentia in hoc consistit, vt vagus, incertus, & periodicus dolor

Com. in
aphor. 16
lib. 3.

Lib. 2.
Epid. 8.
part. 13.
sect. 4. l.
6 Epid.

Cap. 78.
lib. 3.

fit articulorum cum tensione & magna acerbitate. Si in aliis speciebus arthritidis non vna pars laborat, cur non & materia quæ ischiadicū morbū facit aliò transfertur, & in aliis articulis dolorem excitat? Nam Paulus scribit coxendicem (id est coxendicis morbum) ab articulari morbo nihil differre, nisi quòd ipsius causa in sola coxarum compage articulòque concretus infideat: & tacitè diluit quæstionem istam; ac si dicat, in coxario morbo materiam contumacem esse magis & crassam, in aliis speciebus articularis morbi magis mobilem; vt mirum non sit si aliæ atque aliæ partes obsideantur. Quanquam & vidimus in quibusdam ischiadicis erraticam esse affectionem, & occupatâ summâ natium parte articulos quoque pedum influxu eiusdem materiei conflictari. Sed rarius. Gorræus arthritin definit articuli tumorem dolorificum, quem fluxio in eum decumbens excitauit. Quidam inflammationem definiunt, sed malè, quòd plus aliquando sit œdematis, quàm inflammationis. Marcellus, vt diligenter annotat Manardus, definebat inflammationem esse permanentem, malè affectis neruis dolores grauissimos excitantem. At fit sæpe sine inflammatione, nec permanens est dolor iste semper, nec in neruis fit semper, nec semper validissimos affert dolores. Ceterum ossa connectuntur tribus modis: vel enim inuicem coalescunt, modò sine materiei alicuius interuentu, vt in mollioribus & fungosis, modò intercedente aliquâ materiâ, vt in duris & siccis per symphyisin. Vel ita committuntur inter se, vt obscurum & difficilem motum habeant per synarthrosin; vel manifestum & euidentem per diarthrosin. In prima articulorum connexionione dolores non fiunt articulorum, in secunda rarò, nisi quòd tophi & œdematosi tumores fiunt, vt in articulationibus carpi & metacarpi. Tertia verò arthritidis sedes est inter membranas, tendones, & ligamenta quæ à periostio oriuntur, & proinde sensum habent; ex quibus omnibus firmatur articulus: hinc dolor vehementissimus excitatur, si qua illic materia intercipiatur: siue acrimonia humor agat, vt bilis; siue frigiditate, vt pituita; siue asperitate, vt gypsea; siue distensione membranarum & ligamentorum, aut inflammatione, quod ab omnibus humoribus fieri potest cum symptomatis tamen cuiusque humoris propriis. Ac de arthritide dicam, vt quæ causa, quæ materiæ scaturigo, an sanguis eam possit committere, an à venis & arteriis, an à capite

Cap. 77.
lib. 3.

Lib. 8.

solo, an sit inflammatio, an in acetabulo materia contineatur, an ligamenta humore imbuantur, & quæ multi varia disputant, ac inter ceteros Fernelius hac in parte *τὰ ἀδύσθητα*. Quanquam tanto viro suppeditant suæ rationes: nos quidem soluere, plenisque velis nauigare deliberaueramus, sed cùm ex recentioribus plerique multa de ea re scriptitarint, & contra Fernelium edisseruerint, contractis orationis velis pauca afferre cogitamus; ne idem quod illi cum fastidio legentium scribamus, & ne si nudati fuerimus aliorum coloribus, vt Horatiana Cornicula implumes ridiculique maneamus. Ac primum, an sanguis sit materia? Quidam asserunt sanguinem arthritin non posse committere, quòd necessum esset suppurari si in articulum incidere. At non est necesse omnem sanguinis affluxum affusionemque phlegmonem concitare, nisi in musculum, aut in carnem fiat, nec in pus abit nisi calore loci suppuratio adiuuetur. Id quod in articulo exanguis, membranoso, frigidoque contingere non potest. Sic arthritidis phlegmone propriè non dicitur, sed tumor phlegmonodes dici potest.

Dubitant an in pyxidem influat humor, an non? Fernelius negat in cauum articuli humorem descendere, aut in spatium quod inter ossium extrèma interest, sed in vincula duntaxat, atque eas membranas quæ extrinsecus ossium extrèma nectunt atque ambiunt, ac etiam in tendines eò directos. At duo argumenta affert: prius quod in chiragra tophæcea humor in calculum concretus apertâ cute ex articulis digitorum eruatur vinculo quod situm in pyxide vtrumque os colligat, intacto, ac illaeso. Posterius, si in ischiade humor noxius in coxendicis pyxidem conderetur, non tam vehementem dolorem inferret, quòd vinculum expers sensus sit, nec tam latè diffusum. Et Galenus explicans quomodo abscessus fiant in febribus laboriosis in articulos, aut subiectam materiam laborum & sponte natorum & non sponte natorum esse totum genus musculosum: & caliditatem maximè efficere quid in laboribus ex motu; vt mirum non sit si vnà cum musculis articuli laborent, & ad hos articulos abscessus fiat, quòd vtrique & musculi & articuli concaluerint: vnde tamen non patet an velit in ipsos articulos fluxionem fieri. Nec valet argumentum Fernelij de illaeso vinculo interno (nam de externo nil dicimus.) nam si fateatur in acetabulo ipso lapidem aut tophum concrefcere, fateaturque quo-

Com. sup.
apho 81.
lib. 4.

que necesse est materiam in illud inane spatium irumpere. ³ Et quoniam illud vinculum forte est & validum & insensibile, non ita ab humore afficitur. Et tamen si expers ipsius per se sit sensus, non sequitur tamen dolorem in ea parte non excitari per distensionem, & quia res aliena in loco ubi non debet, includatur. Melius Gorraeus cum explicat quid sit articulum occupare, articuli nomine non modo ossis, quod inseritur caput, nec alterius ossis cotylen intelligo, sed & ligamenta, & membranas, & tendines, & quicquid ad articuli structuram firmitatemque naturam comparauit. Nam per arthritides non modo eae partes à morbo sunt immunes, cum etiam in longius distitas partes affectionis labes perueniat. Sed non explicat in cavitatemne ipsam humor illabatur. Porro cum duplicia sint ligamenta, alia sensu sunt praedita, alia non. Quae à media ossis parte oriuntur, vt quae tibiam cum coxa coniungunt, ea sensu vacant. Quae à periostio sunt, ea sensum habent exquisitum. Atque haec sicut & tendines in arthritide maxime laborant, doloremque inferunt. Nam inter tendinem & ligamentum quod tendinem integit, colligitur materia, hinc dolores.

Maiores difficultas de materia, & de parte à qua illa defluat materia. Inter ceteros mordaciterque, non sine probabilitate tamen, defendit Fernelius, & à capite solo esse, & humorem pituitosum serosumque, non sanguinem, non bilem, aut succum melancholicum. Ac rationes quidem eius in turba valent, sed singulas facile est discutere ac dissoluere.

Ac primum, si humor frigidus est vti vult, cur non potius stuporem affert? Nam ait Galenus, *Pituita & sero eius inest vt torporem efficiat, non mordacitatem, nisi forte ita sit alienum à natura, vt aut*

Com. in *part. 38,*
sect. 2. lib. *6 Epid.* *frigidus humor autor sit arthritidos, vnde tanta doloris acerbitas surget? Et in Aphorismis dum reddit rationem cur hyeme & autumnno dolores podagrici excitentur, ait hyeme quidem id fieri, quod quantitate & qualitate humores infestent, ac peccent. ⁴ Autumnno autem solum secundum qualitatem. Hinc patet qualitatem humoris solam ad podagram sufficere, vt ea copia non requiratur pituitae, quam vult Fernelius.*

Com. in
aphor. 55
lib. 6.

Rondeletius dum agitare vult Fernelium, male illius verba citat. Nam non placet Fernelio per venas, & per spinalem medullam, & per nervos fluxionem fieri: sed per inanes maendros & aquae

aquæ ductus sub cute. Item non vult illum mucum qui per palatum deerrat arthritin committere: sed per partes capitis externas extra caluam positas vult sensim decurrere humorem.

Reuerà pro Fernelio facit locus præclarus quo Hippocrates explicat septem fluxiones è capite: & loquens de fluxione quæ retrò fit, ait; *Fiunt articularum, ac coxendicum dolores à talibus morbis (id est hydrope & suffusionibus aquæ) sanatis, cum id quod morbum efficit sanatur, & quod in carne relictum fuerit, cui non sit exitus, nec intrò, nec foras egressum fuerit, sed tuberculum efficiens, fugit in id quod cedit, actum dolores articularum efficit.*

Lib. i. de loc. aff.

Sed contra Fernelium facit id quod ab eodem Hippocrate scribitur. nam loquens de ophthalmia, duplicem mucum statuit, vnum ab interno capite, & hic falsus est, doloremque excitat, alium de foris per extremam cutim capitis, eumque compressum; & hic falsus cum non sit, dolorem non mouet in oculis: ergo pari ratione dolorem non excitabit si in articulos inciderit: credibiliusque eum humorem qui in articulis dolorem excitat, ab interno capite emanare.

Ibid.

At à pericranio, ait, humor descendit. Si à solo pericranio, cur non aliæ partes debiles humorem depositum à partibus robustis excipient? Quasi verò articuli nequeant tanquam imbecilli ab aliis partibus validis humorem superuacuum recipere. Et fit ita, magna fluxionum pars à capite fit, quod attinet nouos hos sub cute aquæductus comminisci, & non potius apertos ductus & canales consignare? Et cum auctore Hippocrate abscessus fiant per nervos, arterias, venas, membranas, ossaque ipsa, credibilius est humorem per eas partes fluere ac refluerè, per quas alimentum decurrit & defluit ad partes alendas. At coactus est ad caput confugere, quod credibile non existimet tam syncerum humorem è venis complectentibus reliquos humores secerni qui articulare dolorem fit generaturus. At facile syncerus humor fit, si vel in parte fiat congestio, vel si à cerebro humor descendat. Non quòd ea sit pituita quæ per infundibulum in ventriculum, aut pulmones deerrat, quia oporteret eam in venas resumì, quod est absurdum. Sed quæ sub cute per inania quædam laxaque musculorum spatia (vnde doloris in transitu vacuitas est) fluxionis hunc modum tenet, vt quasi inundatio aluci & eluuiæ quædam in cavitatem articularum & partes vicinas incurrat ac illabatur. At si Fernelius negat id eò

ab interno corpore in articulos humorem rapi posse, quòd & via non sit facilis, & secretionem oporteat fieri humoris à massa sanguinis: Quid primùm respondebit de abscessibus qui fiunt in crisi bus in articulos materiâ morbificâ & secretâ à massa sanguinis, aut saltem in ventre contentâ? Liber quartus Aphorismorum testatur abundè & resurgentibus à morbo, & laboriosis febribus detentis, & aliis similiter affectis in maxillas & alios articulos humorem rapi, cùm absurdum sit capitis partibus extimis eum descendere. Cùm copiosa vrina à profluens Archigenis seruū ab abscessu in articulos liberauit, an non materia illa in venis contenta erat? Alba, leuis, & æqualis materies copiosa, & quæ per vrinas fluere debet dum abscessum in articulum facit, an non à capite emanat? Hoc asserere puerile foret. Præterea dum fiunt apostemata modò syncera, modò mista, carbones, exanthemata, & alia id genus materia seposita & secreta, nunquid à venis & arteriis fluxit, & eadem potest in partes circumscitas articulis influere, & dolorem excitare? At caput in vitio non est. Sed audiamus Galenum Comment. in 6 Epidemior. dum explicat quomodo audiendum sit quod Hippocrates scribit quod excitato dolore colico quieuerit arthriticus dolor, & contra: hanc rationem reddit: *Ideo hoc fit, ait, quod humorum in artus currentium ad colon intestinum impetus conuersus est.* Quod satis apertè ab interno corpore facile per ductus tum manifestos, tum cæcos humores modò in hanc partem, modò in illam rapi posse, necnon fieri communicationem inter artus & intestina. Quanquam de hoc fortè dubitari potest.

Com. in
part. 3.
sect. 3. li.
& Epid.

Præterea quid respondeat Fernelius Hippocrati, qui ita scribit; *Dysenteria intempestiuè suppressa abscessum in costis aut visceribus, aut in articulis facit. Num igitur biliosus abscessus in articulis, sanguineus in costis aut visceribus fit?* Vbi duo aduersus Fernelium notari possunt: prius est, si humor qui dysenteriam committit, siue biliosus, siue melancholicus sit, inclinationem habet in aluum interiorem. & idem in artus potest abscedere, & rursus ab artibus in aluum. Ergo error est manifestus Fernelij comminisci à capitis tantum partibus externis humorem dimanare qui arthritin sit commissurus? Posterior est quod tacitè biliosas etiam fluxiones & synceras in articulo fieri indicat Hippocrates, quod tamen non arridet

In Coc.

Fernelio, vt qui omnem arthritin ab humore frigido esse velit: Tamen loco illi de dysenteria respondere posset Fernelius, quod nimirum fluxionum alui & dysenteriarum sæpe Hippocratis opinione caput origo fit: quod si verum est, nil hic locus contra illum facit. Nam qui humor à capite delabens dysenteriam facit, si desinat dysenteriam inducere, & aliò cursum suum inflectat, vtpote in partes externas, tum articulares affectiones potest inducere. Vt cum Hippocrates scribit in Aphorismis vomitum diuturnam diarrhœam soluere, id videtur fieri quòd à capite humor in ventrem descendat, qui aluum sollicitans & læuigans id afferat. Quod si illa materia vomitione excludatur, cessat affectus. Sic cum humor à capite delabens in extima cutis decerrat, dysenteriae finem affert. Atque hæc probabilitate nituntur. Contra Fernelium & id facit. Si lassitudines spontaneæ & articulorum quædam debilitationes & effœmationes vt gressus impotentia sit, ab humorum per corpus sparsorum, & à maligno sero quòd in corpore superfluit, oriuntur: numquid causa aucta articulorum veros dolores excitabit? & tamen caput in vitio non est. Vidimus iuuenem annos 15 natum, arthriticum, eâ maximè ratione factum, quòd in eruptione exanthematton non esset legitime repurgatus: an non humor iste à capite est? Et Hippocrates aliud videtur contra Fernelium obicere; *Quibus sanis hyeme circa lumbos frigiditas & grauitas ex leui causa, & aluus suppressa, ventriculo probe agente, his ischias, aut renum dolor, aut urine stillicidium contigerit forte.* Hic declarat ischiadem (quæ ad arthritidin refertur; quanquam Galenus ischiadicos negat proprie arthriticos à Græcis appellari) oriri non tam ab externo capite, quàm ab interno corpore. Et si suppressio mensium, aut hæmorrhoidum, aut solemnis alui cuius euacuationis potest arthritin inmittere, cur necessario caput tanquam mali autorem accusabis? Internas autem humorum *ῥοπις ἔξ ὀστέων ἔξ πάλιν ἰσχίας* in ischium aut articulos manifestissimè aliis in aphorismis Hippocrates docuit, idque contra Fernelium. Atque vtinam summus vir Fernelius eas audiisset. *Quibus de repente dum siæ febre sunt, præcordij & oris ventriculi dolor, ac circa crura ac infernas partes, & aluus in tumorem eleuatur, soluit vene sectio & alui fluxio: his febrile nocet. Longa enim febres fiunt, & tusses, & singultus, his ad solutionem tendenti-*

In Cod.

Com. in
part. 3.
sect. 4.
pidem.
& in
part. 3.
lib. 6. E.
pidem.Apho. 67.
lib. 5.

In Cod.

bus dolor fortis coxarum aut crurum, aut puris sputum, aut oculorum priuatio contingit. Item: Dolores ad hypochondria in febre, voce interceptâ, sine sudore soluti, malum; his ad coxendices dolores fiunt. Quibus ex locis patet materiani coxarum morbum effecturam in hypochondrio latere, non autem à capite deriuari.

Rationes quidem multas, easque probabiles Fernelius affert, quibus conuincere se posse putat necessarium esse humoris arthritin commissuri defluxum à capite, tum quòd non ita syncerus humor ab interno corpore ex venis & arteriis raperetur ad morbum generandum. Neque tam liber aditus foret, quàm est pituitæ, aut sero à capite prolapsò per subiectas cuti partes & occultas quasdam vias. Attamen videmur multa opposuisse Fernelio quæ eius sententiam valdè debilitant.

Non videtur parum verisimilis ea ratio quam affert de crudo succo qui in hydropicis tibiis occupat, tumoremque facit, & tamen articulare morbum non parit. Gorræus putat hoc argumento voluisse Fernelium pituitam non committere arthritin, & rationum machinâs in Fernelium struit. Sed errat toto celo Gorræus. Nec enim hoc placuit Fernelio, alioqui sui planè dissimilis foret vt qui acriter defendat omnem arthritin à pituita frigidòque humore esse aut eius sero. Sed hoc voluit Fernelius tuendo pertinaciter suam sententiam, à cerebro necessariò defluere humorem frigidum qui malum committat: Quia si humor qui ab interno corpore aut per venas, aut per arterias, aut per alios aquæ ductus in tibiis crurâque natus esse generare arthritin, maximè id fieret in copia succi crudi ac pituitosi, qui etiam redundat in tibiis & brachiis hydropicorum. At hic humor non id facit.

Sed respondeat Fernelius. Nunquid qui fluit ac refluit in tibiis hydropicorum pituitosus humor si in articulum inluit potest facere dolorem & arthritin? Si idem humor & natura & ingenio, & numero à cerebro maneret, numquid arthritin posset committere in articulum illapsus? Quid impedit quominus id faciat? An quia per venas & arterias inluit? At tu ipse fateris per alios ductus quàm per venas fluere? Numquid iidem sunt ductus occulti per quos & humor à cerebro deflueret? An quia iste humor non à cerebro est? Quasi verò humor crudus aut vitiosus ab hepate malo & malè officium

faciēte non æquè dolores excitaret ac qui à cerebro est? Quasi verò in cerebro istam idiosyncrasiā, indolem, naturam, ac propriē talem acquirat quā dolores arthriticos efficiat? Cur ergo in tumentibus tibiis virginum fædos colores patientium dolores etiam in vacuitate quadam febris quotidie obseruamus acerbiores? Numquid idem humor qui fusus dolores in tibiis excitat, si idem in articulum quempiam incideret, articulum quoque diuexaret? In ictericis quibusdam fuso ab hepate & interno corpore sero humorum acri ac maligno implacabiles dolores comperimus, nihil etiamnum hepate ad id conferente. Hippocrates autor admirabilis obscure quidem rationē videtur dedisse, cur in hydrope cum multus circum articulos humor sit qui distentionem faciat (distentio autem maximè dolorem in articulis facit, ait Galenus) dolor quoque non affit: in arthritide autem cum paucus humor sit, tanta doloris sit acerbitas. Ita autem scribit postquam de hydrope locutus est: *Si modicus fluxus fuerit (respectu magni fluxus qui in hydrope fit, unde repente innumescere & deumescere partem videmus), coxendicum & articularum dolorem facit cum fluere cessauerit. Nam et modicus & vndequaque ab omnibus partibus fortioribus depulsus ad articulos refugium facit.* Tamen non videtur hæc ratio satis. Nam si paucus humor arthritin facit, cur non multus faciet? In cachexia & hydrope multus est. Frustrà igitur & temerè Fernelius affert tumorem istum cachecticorum vt doceat necessariò à cerebro affluere humorem, quia qui ab aliis partibus emanat humor natus esset dolores arthriticos parere, id maximè fieret in copia succi crudioris. Pace tanti viri dicam, id ipsum non intellexit. Atque dicendi confutandique initium ab ipso Hippocrate sumama. Et quia mancus in hac parte est, cætera supplebo. Tria requirit loco superiùs adducto vt fiat dolor articularis, vt sit modicus fluxus, vt fluere desinat, vt refugiat ad articulum: quartum & addemus, quod vim quoque suam habet, vt à partibus omnibus fortioribus ad articulum depulsus sit. Vis in eo ponitur, quod dicit paucum esse & depulsus à partibus omnibus fortioribus. nam si multus est, æqualem quandam intemperiem facit, immò suā mole obruens indolentiam affert. Et quibus intument tibiæ, brachia, artus quoque ipsi (vt *ad ap. 2. p. 101* dicantur) ij stuporis sensum habent: sed cum paucus & effusus in neruos cum mole sua non obruat, satis quid eius possit qua-

Lib. de locis in hom.

Com. in aph. 4. 2. lib. 6.

Lib. de locis in hom.

litas ostendit. Deinde quòd à partibus pellatur satis indicat suà qualitate adeò molestum esse, vt necessarium sit aliquid virulentiaẽ habere, declarat acerbitas doloris, orgasmus. Nam nunc hic articulus obsiderur, nunc ille: & torius manus & pedis, modò hic digitus, modò ille, modò veterem sedem occupans in ea consistit & furorem exercet. Vnde videmus sæpè magnos esse cruciatus cum nil tumens & dissimile appareat, nil lacunosum, nil salebrosum. At in leucophlegmatia cum intumeat corpus totum præ copia crudi humoris, & in cachexia cum redundet humor serosus & malus, sæpè à dolore vacuitas est quædam. Secunda conditio est vt humor fluere desinat; quod bifariam audiendum, vel vt iam actu consistat fluxio, alioqui dolor non adesset, nisi fugax fortassis, vel vt per neruosum genus, non autem per venosum humor vagetur. Quod ad prius attinet, falsum est dicere non excitari dolorem nisi consistat fluxio: oportet quidem materie partem consistere, aut omninò fluxionem cessare non oportet. Sed vt dolor perseueret, humor consistat oportet. De posteriore ita dicam. Hippocrates primus docuit morbos venarum leuiòres esse, fugaces, contra neruorum obstinatos ac contumaces. Et hic locus maximè cõferet ad eorum intelligentiam, perspicentiamque quæ dicimus. Ac primùm audiatur Hippocrates: *Quicumque morbus à venis oritur debilior & leuior est quàm qui à neruis. Dissiuit enim vnà cum humore qui in venis inest, & non quiescit. Et natura venis in humore est in carnibus, Græcè ἡ ἐν τοῖς κρέμασι καὶ ἐν τῷ σπύγι. Nerui autem sicci sunt, & caritates non habent, & ad ossa consistunt, & maximè ab ossibus nutriuntur; nutriuntur autem & à carnibus, & colorem inter carnem & ossa medium habent, & humidiores sunt ac carnosiores quàm ossa, sicciores & magis ossei quàm carnes. Quicumque morbus ad neruos ipsos peruenerit, firmatur, & quiescit eodem loco, & difficile est ipsum educere. Qui locus docere potuit Fernellium quæ causa sit cur sæpè tumeant detumescantq; partes, cum tamè dolores non excitentur in articulis. Humor enim in venis continetur, non in neruis, aut saltem non consistit quiescitque in neruis. Oportet autem quietem habere antequam ibi dolorem creare possit. Et antequam vltra progredior quoniam ille locus obscurus est quo antè paulò dixit, & natura venis in humore est in carnibus: & nonnullis difficultatem*

negetiumque dedit, illum explicabo. Comparat genus venosum cum neruoso. Neruosi generis nomine & membranas & tendines, & ligamenta, & periostium intelligit, item & nervos propriè dictos qui musculos propriè dictos continent: Nam caro simplex, nervi & venæ musculus condunt. Et dum ita comparat nervos cum venis vult venarum naturam humidiorē esse duabus de causis, tum quod ratione suarum cavitatum humores contineant, qui cum dicantur, & consistentiam liquidam habeant, & humectent corpus cui insunt, & quod sæpè perfluunt & perluunt: tum quod venæ in carnibus ipsis sint quas enutriunt: Sic cum dicit, *Natura venis in humore est in carnibus*, id est, proprium est venarum, vt & humorem contineant, & in re humida sint, id est, in carne: Et nisi multiplex earum tunica impediret, facile rumpentur. Sic nervi venis dicuntur duriores, (quantquam multiplex sit tunica) quod cavitatem non habeant, quod tendines sint, quod ligamenta, membranæ, venæ molliores ob cavitatem, quia in carne molli sunt, quia continent rem fluxilem. Sic metonymicos res continens dicitur mollis & humida ratione & rei quam continet, & rei in qua continetur & foetur. Vel cum dicit, *Natura venis est in humore, in carnibus*: vt nomen illud, carnibus sit explicatio nominis, *in humore*. Caro enim res humida est, sic vena in humore est, id est in carnibus, in quibus, & sedem, & firmitatem, & augmentum, & munus habet vena. At nervi sicci sunt, quia non sunt in carnibus, & res humidas non continent vt venæ, & à rebus siccis oriuntur, id est, ab ossibus, quod ipse Hippocrates docet dum ait, *Nervi ad ossa consistunt, & maximam partem ab ossibus nutriuntur*: Quantquam sunt & alij qui à carnibus nutriuntur, vt qui musculos componunt. Et vt omissa interpretatione illius periodi quam obiter explicauimus, ad rem redeamus, ideo morbi qui in nervis sunt, firmanantur quod dura eorum consistentia sit, qui in venis, id est, à venis sunt, fluunt fugacesque sunt magis: quod hac ratione maximè demonstrat Hippocr. *Communicant omnes venæ & confluunt inter se mutuo, aliæ sibi ipsis committuntur ac coincidunt, aliæ venarum & venulas à venis extensas*. Ac de distinctione morborum nervos occupantium ac genus venosum initio illius libri de locis in homine ita scribit, *Quod siccius est morbos magis recipit,*

Lib. de
locis in
homine

Et magis dolet à natura: humidum verò minus. Morbus qui in sicco est stabilis ac consistit, qui in humido est, diffluit, & aliàs aliam partem occupat, & transmigrans quietem facit, & citius sedatur ut pote in humido non stabilitus. Quem locum de intemperie humida & sicca intelligunt, sed male: Verè enim hic locus pertinet ad alium qui sequitur de morbis neruorum ac venarum. Sed hæc relinquamus.

Tertia conditio ex his quas proposuimus, est vt ad arthritidis generationem humor in articulum, aut saltem partes proximè articulum ambientes, & exquisito præditas sensu, incurrat. Quòd miror non animaduertisse Fernelium, qui indistinctè proponit in cachexia non oboriri arthritin, cum tamen sit humor crudus: proinde necessariò à cerebri manare. Ad eòne ignarus Fernelius vt non fateatur oboriri dolorem articularem si qui redundat in cachecticis humor in articulum descendat, includatur, atque ibi interceptus interclususque corrumpatur. Nam non omnè excrementum quod in partem impingitur statim dolorem parit: sed aliàs cum sua natura efferum est & mordax primò quoque tempore dolorem infligit: aliàs non nisi temporis successu acrimoniam, aut dolorificam aliam qualitatem nanciscens eundem infert dolorem. Itaque pace Fernelij dicam nil quicquã efficit quod de humore cachecticorum obiiicit. Siquidem si pituita sit *ἀμύνη*; si tantùm sit erudus humor. Infra sanguinem, sed qui proximè in sanguinè degeneret, si calor esset melior, non est necesse à tali humore, dolorem excitari. Nullas enim molestias exhibet, vt nec sanguis.

Nam in hydropicis quoniam hepar aliqua ex parte est refrigeratum, sanguis quoque aliqua ex parte refrigeratus est, & crudus: sed incoctus non dicitur. Alibi autem ex Galeno distinximus *ἀποστύον & ἀμύνη*. Et talis sememicoctus sanguis dolorem non creat. Hinc lencophlegmaticos nõ videmus laborare: In cachecticis quibusdam & iis præsertim virginibus quas sædus deturpat color, dolores capitis, artium & surarum intolerabiles videmus. Et quemadmodum ex muccis & pituitis quæ à capite descendunt aliæ tusses excitant aliàs humidas, aliàs siccas, nonnullæ nullas tusses proritant, aliæ statim negotium dant pulmōni eumque vlcerant, vt quæ sunt efferæ & ichore præditæ, aliæ etiã ingenti copã nil incommodi afferunt, sed postquam moram aliquam in pulmōne sine vlla molestia egerunt, coctæ cras-

sefactæque facillimè extunduntur: Idem iudicium est de humoribus qui in artus dilabuntur. Nam cum tibiæ intumescunt humore, aut brachia, & articularum loci, non statim dolor fit, ne si quidem in articulum humor influxerit, sed requiritur certa quædam qualitas qua humor donatus repente concitat dolores atroces. Et in hoc disputationis cardo vertitur. Proinde docuimus antè ex Galeno in libro 6. Epid. pituitam quidem torporem inducere, sed si aut salsa sit, aut acida ea atrocissimis cum doloribus sese prodit. Quod & in doloribus colicis vsuuenit. Quot sunt enim quorû intestina multa pituita sunt oblita obstitaque, quos nullus coli dolor cruciauit? At si gypsea est pituita, salsa, acidaque, aut vitrea; ea suæ præsentia excitandis grauibus doloribus notas ac argumenta edit. Et hæc aduersus Fernelium de loco, quanquam pluribus res explicari posset: obiterque de humoris qualitate & conditione diximus, sed rem totam negotiumque de humore accuratiùs sumus iam pertractaturi.

De humore qui causa est arthritidis, ita sentit Fernelius: *Humor continens arthritidis causa tam varius non est atque traditur: nec enim sanguineus, nec biliosus, nec melancholicus est unquam, sed omnino, vel pituitosus, vel serosus.* Tam grauitè iterum peccandi, & hoc contra veteres asserendi occasionem dedit illa alia erronea opinio quàm paulò antè explosimus, de origine arthritidon omnium cerebro, quod aut pituitosum solùm humorem, aut serosum cerebrum suppeditet. Sic duas illas erroneas opiniones ita complicauit, vt alia alteram pepererit, & toti antiquitati opposuerit. Si enim humor vnus foret pituitosus tam sæui articularum hostis autor, quid veteres praticos in eam opinionem adduceret, vt pro arthritidon distinctione & causarum, remedia quoque distinguerent? At remedia instituunt ad biliosam arthritin, ad sanguineam, ad serosam. Ergo verum est tot esse species, alioqui in rem agrorum grauissimè peccaretur. Atque antè iam refutauimus argumenta eorum qui negant fluxionem vllam esse sanguineam quæ arthritin quoque sanguineam creet, quod necesse esset in pus sanguinem verti. At sanguis quidem cum dicitur suppurari cum in ventrem erumpit, verbum suppurari generalius pro corrumpi sumitur, ait Galenus. Et aliud est in ventrem, aliud in articulum irruere. Quanquam & in articulo suppurat, id est corrumpitur, malam alienamque qualita-

*Artius
teorab. 3.
sermo 4.
14 15. 16*

458 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 tem accersit; vnde in suageneratione, & in loco, à quo mitti-
 tur, laudabilis ex euentu mala qualitate insignitur. Deinde san-
 guis in carnibus corrumpitur quidem ac suppurat proprie,
 sed non in articulis. Imò cum in articulum incidit recru-
 descit quodam modo, & suam maturitatem amittit. Quod
 fortè imposuit Fernelio, quod videat inflammationes in ar-
 ticulis non nisi intra 40 dies solui, & pituitescere quodam-
 modo omnes qui in articulos fluunt humores; imò si prius
 calidi forent, ob loci naturam incrudescere. Quod mirum
 ne sit. Nam & Hippocrates in libris de morbis scribit contingere,
 vt à pulmone ipso pus in thoracem erumpat, & tamen si
 antequam eruperit maturum sit, tamen dies aliquot expe-
 ctari vult donec rursus pus ipsum maturescat: Sic mutatio-
 ne loci maturitas puris exolefcit, aut saltem diminuta retun-
 ditur tanquam materia perfrigerata.

*Lib. 3.
 de mor-
 bis cap.
 de pleu-
 ritide ex
 dorso.*

*Com. in
 part. 15.
 sect. 3.
 lib. 6.
 Epid.*

*Lib. de
 sord.*

*Co. in
 Apho. 9.
 lib. 6.
 Apho.*

Similiter in febribus materia cocta mitificataque in par-
 tem aliquam relegata recrudescit. Et in sexto Epidemiorum
 cum loquitur Hippo. de concretionem lapidis in vesica, ait
 Gal. frigiditate vesicæ, tanquam corporis exanguis lapidis
 coagmentationem iuuari. Itaque fieri potest vt frigiditate
 articuli sanguis, aut alius humor ed influens, licet sit cali-
 dus, facile suum calorem amittat. Non tamen idèo frigi-
 dus humor arthritidis causa est. Idèd Hippo. dicebat san-
 guinem esse natura frigidum, quia cum sit de genere aqueo-
 rum, facile suum calorem amittat. Sed ad huius rei de qua
 agitur demonstrationem conferet plurimum ea demonstra-
 tio quam attulit Gal. in Aphor. explicans cur inflammatio
 in podagricis intra dies quadraginta cesset; & non ante.
 Quod fortè pro Fernelio faciet. Nam inflammationem quæ
 arthritidi superuenit ex euentu tantùm contingere ait, nem-
 pè vi doloris. Ita autem scribit, *Que carnosas partes occupat in-
 flammatio morborum acutorum subiicitur termino, quoniam carnis sub-
 stantia mollior est & rarior natura ligamentorum. Vnde & tardius in-
 flammantur chordæ ac nerui si vulnerati fuerint (Græcè τὸ σῆμα, Leo-
 niconus venit, ex ictu) & longiori tempore ad consistentiam inflamma-
 tionis perueniunt & tardius sanantur. Qua enim ratione vix aliquid
 externi in se recipiant, cum duræ sint ac densæ huiusmodi partes, hæc
 ipsa ratione vix à se dimittunt. Quapropter solutionis terminus est
 dies quadagesimus, quia quum in articulationibus humores sint, & li-*

gamenta amplexantia ipsas oportet euacuari ut quod, id est, in modo vaporis. Mirum autem est cur dicat tam ægrè admitti humores à membranæ & ligamentis, & à neruis cum videamus eos qui articulari dolore tenentur facillimè modò hanc partem, modò illam laborare. At si tam ægrè admitterent humores non tam subitò dolor indè surgeret. Quinetiam facillimè & tremores, & conuulsiones in febribus videmus excitari: si neruorum ea est durities & tendinum & membranarum, quomodo tanta est aptitudo? Nam videtur æquum esse vt idem fiat, quod & in pleuritide fieri scribit Galenus: dum enim confert pulmonem cum membrana costas succingente, ait pulmonem ratione suæ mollitudinis paratum esse ad recipiendum quemuis humorem, non item membranas, quod hæ non ita facile admittant humorem quemuis, sed biliosos magis: vnde maior pleuritidon pars ab humore est bilioso. Si articularum ea comparata ratio est vt eadem horum sit natura, atque membranarum succingentium costas, oportet necessariò, aut tenuem & biliosum, aut planè serosum humorem qui arthritides faciat, aut falsum est quod in hoc atque illo articulo tam subitò dolor excitetur. Duræ sunt partes, humor est frigidus & pituita, vt vult Fernelius: immò negat, aut esse bilem, aut sanguinem, quomodo tam facile humor admittitur: æquum non videtur. Quomodo enim tam crassus humor in cavitatem & locum *διὰ τὸ στενόν*, subiret, cum lentor & pigrities id impediat? Quanquam possit quis respondere imbecillitatem partis quandam dissectionem afferre, & aptitudinem ad fluctionem facile admittendam. Accedit quod humorem in orgasmo esse oporteat: orgasmum autem adiuuat ichor quidam malignus qui animat, impellit, ciet, & mouet humorem sua natura segnem & pigrum. Atque articulares dolores etiam à valdè calida causa oboriri testatur Gal. vbi docet morbos connutritos in senectate relinquere: interpretatur de calida hemicrania, calido renum effectu & articularibus doloribus à calida causa obortis, quibus omnibus obrepens senectus tanquam frigida remedio existit. Nec dissentanea docet in Apho. dum ait dolores articularum in squaloribus à fluxione non fieri, quod cum tempus siccum sit non viderur natum ad superfluitates generandas quæ arthritin committat: Sed si caliditas immodica fuerit ab acris humoribus possunt arthritides excitari. Itaque miror quomodo

Com. in
 Aphor.
 13. lib.
 6.

Com. in
 p. 72. 6.
 / 710 5.
 lib. 6.
 epide

Com. in
 Apho. 16.
 lib. 2.

260 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Gal. ad
Apho. 2.
lib. 6.

Fernelius tam lōgè à veterum dōgmatis desciuerit, vt præiudicatam suam opinionem tam mordicùs defendat. Et si enim magna arthritidō pars, siue per defluxū id fiat, siue per congestionē, ab humore frigido est, tamen errore non vacat asserere omnes ab humore frigido esse eoque à capite emananti. In quo grauius in agrorū commoda peccatur: Nā est vbi calidis vtendū remediis, est vbi frigidis, est vbi moderatis: Quod sit omnīs à pituita esset ad calfacientia perpetuò esset recurrendū. Item aliud est agitare medicamentis caput eique consulerē, aliud aliam partem. At si solum caput autōr existeret, ad id vnum dirigendum esset omne consiliū nostrum. Itaq; magni interest ad curationē morbi, & ad agrorū salutem multò ante cōstituire an soli capiti malū acceptum sit ferendū, an sola pituita aut eius ferum in vitio sit. Quāquam vt antè dictum est fortè imposuit Fernelio quod humor qui actu in articulo cōtinetur quadamtenus frigidus, aut frigefactus sit, quod ita sit comparata ratio articulorum, vt quia multas habeant partes spermaticas & frigidas, affluentem humorem etiam natura calidum, & à calido loco deriuatum infrigident ac incrudent, vt ita loquar, quod ex Hippocrate demonstratum est. Cum itaque & experientia, & ratio, & authoritas Hippocr. 10 quam supra non meminimus afferre, quæ statuit aliquas arthritides à bile esse, dicet præter pituitam aliās esse causas arthritidis, & aliam autorem mali partem quam caput, relicto Fernelio amplecti oportet methodum medendi aliorum, ne mala rei opinione inducti malè remedia alia pro aliis vsurpemus: Ac facile mihi persuadeo, ideo sæpè articulares dolores inualescere magis, ac aegrescere medendo aegros, quod audito arthritidis nomine statim ad calida remedia deueniamus eaque impensè calfacientia & digerentia. Quod si semper materia frigida foret, non esset verisimilè, ita malum insolescere, ac furere, cum contrariorū curatio per contraria legitimè instituitur, nisi fortè dicas (quod etiam probabile est) dolorē quoq; aualescere, quod vsu rerum ita calidarum quibus statim vtimur sine iudicio & distinctione, quod morbi nullę sint induciæ, sæpè fluxiones irritētur, qua irritatione dolor quoque increfcit. Dum enim humor turget fluitque nil est deterius quā fōtib; aut emplastris ex rebus calidis vtī: Vel etiam vsu nostrorum remediōrum sæpè dolor augetur, quod materia sit vt quod remediū vni humoris parti conuenit, alteri

Hippo-
crates
lib. de
interiis
affectio-
nibus.

plurimum obfit, vt quod remedium primo loco vsurpandum duxeris, illo relicto statim ad aliud confugas. Accedit quod humor qui arthritides efficit, maxima ex parte venenati cuiusdam feri naturam respiciat redoleatque quod per se pepasimum mitificationemque non admittit: Immo vsu remediorum, nisi valdè sint anodyna, incandescit ferocitque magis. Nec mirum est si sæpè irrita sit opera nostra, morbusque iste medicorum nuncupetur opprobrium.¹¹ Cæterum contrà quàm senserit Fernelius certa sunt signa quibus dignoscas à capite humorem subtus cutim, aut per spinalem mædullam defluere, aut ab hepate & visceribus per venas & arterias deriuari. Et quæ defluxiones à capite sunt magis, sunt synceræ, quæ à visceribus minus synceræ sunt, quod humores promiscuè in vasis coereantur ac confluant¹². Quod miror Fernelium non animaduertisse. Signa ista diagnostica & Ætius & Rondeletius sunt persecuti. Nos illa omitemus & si quando vsus inciderit, ex istis venabimur, ne si illa adiiciamus in molem oratio excreseat.

Cum iniretur consilium pro Forcerij mercatoris cognato cui dolores arthritici sunt familiares, & autumno & verè repetunt maximè, creditum est serum maximè putrè à visceribus manante, causam reducis istius mali esse.¹³ Declarat curatio. Nam nulla habita capitis ratione cum primùm expurgata regio prima ventriculi & educti multi serosi humores electuario diacarthæ & syrup. rosarum solutio, præripiebatur occasio reditus: Ad quæ situm est, si humor frigidus & pituita arthritidis author, cur pituitosi non sunt podagrîci, cū peculiaris iste humor redundet?

Si à capite est cur qui charadas habent, quarum origo maximè tribuitur ab Hippocrate, non sunt podagrîci, aut alia specie arthritidis laborant? verisimile id esset si caput autor esset mali. Nil obstat obijcere tophos qui in arthritide apparent vt doceas materiam esse phlegmaticam: nam biliosus humor & alius à pituita vsu refrigerantium, aut digerētium nimium, aut à parte frigida frige factus tophos inducere potest.

Multi olim arthritici liberati sunt morbo, sed epileptici, aut apoplectici interière: repertum est cerebrum aqua plenum, sic verisimile est à cerebro malum esse.

Si semper à frigido humore esset arthritidis eoque à cerebro labente charadas efficeret, aut dolores in transitu excitaret, aut præeuntem haberet grauitatem capitis, aut nucae colli. At sæpè

462 CONSILIORVM · MEDICINALIVM
nil tale apparet, vnde colligas aliud plerumque esse.

Ad præcautionem tam sæui mali, & euacuationem feri illius
putris morbi relapsum committentis visum est vt vteretur hyc-
me decoct. foliorum fenæ cum hermodactylis, & sæpè syrup.
rosarum pallidarum cum succo mercurialis.

Vere pilulæ commendantur sine quibus, de hermodacty. &
foetidæ. Autumno & vere si quid suadeat tundatur vena, vi-
uat abstemius.

Partibus dolentibus adhibeatur vnguentum de limacibus,
aut maceant panni in mucagine limacum.

Vrgentibus doloribus folia hyoscyami cocta in lacte cum
capitibus papau. & floribus chamæmeli adhibeantur parti.

ANNOTATIONES.

¹ Hipp. lib. de dieb. Decretoriis docet Ischiadicos dolores esse à conge-
stione & concretionem humorum in acetabulis præsertim post incalfactio-
nem à sole.

² Gal. Com. ad Aphor. 49. lib. 6. ita ait, fluctionem arthritin facien-
tem primum suscipiunt loca de articulationum, deinceps circumstantia
omnia ad cutim vsque. Et quia implentur articulationes etiam que cir-
cumiacent ligamenta extenduntur. Nervi & chordæ illic non inflam-
mantur, sed tantum dolent cum de articulationes extendantur.

³* Galenus Com. in Apho 49. lib. 6. tanti doloris in arthritide cau-
sam ad distensionem reuocatur.

⁴* Fernelius hic valde ratione nitetur, quod si humor biliosus ar-
thritin committeret necessario inflammationem faceret. Cur enim mem-
brana in thorace tam facile inflammantur in pleuritide, & in arthritide
tam agrè si eadem est materia?

⁵* Et in 2. Epid. 1. sectio. 3. splenis & viscerum tumores & inflam-
mationes in articularum morbos desinere scribit: Et in sectione 7. lib. 6.
Epid. Tusses in articularum morbos desinunt per translationem, vt
credere est. Maxime verò sunt sicce tusses, quia alio materia præcipitur.
Et sub finem sectio. 8. lib. 6. Epid. in suppressione mensum dolores &
rubores articularum nascuntur: ergo, id est, ab interno corpore non à ca-
pue. Est quod maius, in ulceribus articularum & partium externarum sè-
tum res sint rubicundi, & statim euascent, dy enteria cruenta obori-
tur, vide consensum externarum cum internis, vt à capite id non fiat.

6^o Locus est præclarus cap. 12. Sermonis 4. Tetrab. 3. Acty ubi docet multas causas ob quas suppuratio in articulis non fiat.

7^o Hippocr. lib. 2. Epid. part. seu historia 3. docet quomodo raphi in arthritide generentur.

8^o Anno 1575. qui siccus & squalidus cr. et maxima fuit articulorum dolorum ubertas.

9^o. Hic locus est valde notandus: & contra Ferneliū facit, idem in cerebro visitur; nam substantia cerebri vaporem calidum & refrigerat. Quod si quis neget illum librum germanum esse librum Hippocratis, legat Aphorismum 25 lib. 5. Apho. ubi vult auro affusione aquæ frigidae articulorum tumores & dolores tollere, tum ob reuocationem caloris, tum propter inductionem torporis. Quid respondebitur Galeno qui in coxendicis dolere in malleolo arteriam secum cum affectus esset ab humore calidissimo: sub finem lib. de sanguinis missione. Quid diceret Fernel. quum plerique acerbis articulorum doloribus vexantur, cum nullos aut exiguos dolores, aut in capite, aut in collo senserint? Quasi verò tam effera materia & serum à capite manare queat, & non excitare dolores transendo? fieri id non posset. Si nitrosa & salsa fluxio à capite tantos in transitu dolores excitat, immò & in metapneuro, & quæ transit quandam inducit phthisin; an credibile materiam quæ guttam facit per passim ex se expertem, opinione Fernelij per tot partes subitus & circulosè transmitti, & nullos penè dolores excitari? Sic credendum est imbecillitatem naturalem partis, aut acquisitam, quia omnis dolor in parte digestivam facultatem & coëtricem debilitat, & propterea facilis fit proventus excrementi loco vera nutritionis, facile ad arthritin facere, ut si qua depuratio & defœcatio sit sanguinis, eam fecem facile admittat. Nisi Fernelius dicat in sua generatione non esse tam malam materiam, sed tempore & mora eam acquirere malignitatem. Quod idem dixit Gal. de tussis materia quæ in serorum descendit part. 12. lect. 1. lib. 1. Epid.

11^o. Si cruditates, crapula & similia eiusmodi arthriticos efficiunt quid causa est cur caput accuses?

12^o. Quid impedit quominus dicamus nec à capite esse materiam arthritidis, nec fortè ab interno corpore, sed eo modo per dispositionem articulare generari in habitu corporis quo elephas in aliis, & chærades in aliis. Nam in habitu ipso vitium est, & cancrosa & chæraica dispositio, & articulosa, ut sic dicam.

CONSILIVM XCII.

De Gonorrhœa virulenta.

QVENDAM fœda Gonorrhœa detinebat. Cum eam negligeret, nec medicorum consilio satis diligenter audiret, suppressa est, & ea contigère de quibus paulò antè dictum est. Imprudenter & parum sciens quid tam virulentæ materiæ suppressio vehat, vxorem suam compressit. Medio grauiditatis tempore dysentericum & serosum profluuium mulier patitur, quò vix liberatur. Ac prudenter Medici non censuerunt statim suppresso isto profluuiio, laboranti consultum iri. Audiuerant enim non nihil de mariti diuersione ad alias mulieres & & quæuis impura prostibula. Idèò in eam suspicionem venerunt, vt contractum hoc malum à portione virulenti feri crederent. Ac, opinor, ea fortè in luem veneream incidisset. Nonno mense fœtus educitur purus & incontaminatus. Quod mirum fuit cum satus esset patre adhuc semen tam diri veneni continente. Sed non diu impunè tulit innocens hæc proles impuritatis paternæ luens pœnas. Nam cum fortè matri propinatum esset pharmacum alius rei causa, & iussum esset lactari infantem etiam medio purgationis tempore: Repente multis corporis partibus argumenta certa luis & scabiei Hispanicæ paruerunt. Continuo vocari medicos & Chirurgos, iniri consilium, rem reformidari, metui matri nutrici. Ablactatur infans nondum duos menses natus. Paruo lacte pascitur ex vitreo vase collum gruï habente. Prouisum puëllo hoc remediolo:

℞. bulyr. recentis non salis lauis in aqu. saluie ℥iij. argenti vini extincti aqu. eadem saluie ℥ij. facta subactione in mortario diligenter, paretur linimentum.

Ad arcendam autem luem veneream quæ verè eam posset tandem adoriri, ita matri prouidetur:

℞. Limatura ligni sancti ℥ij. salu. beton. cham. epit. stæchados vtriusque, meliss. morsus & scabios. an. m. j. s. Absinth. cent. aurij minoris buglos. borag. an. m. j. rad. ircos florent. scordij, tormentil. tunicis & di-

Stama. an. ʒj. s. seminis cit. card. sesel. sileris mont. pæonia an. ʒs. rad. dicis pæonie & angel. an. s. gentiane ʒij. theriac. veteris & mithrid. an. ʒi. s. Opiata Fernelij ʒi. s. madeant omnia in vino albo odorifero, adde succi pomorum ʒij pul. diamarg. frig. latit. & diarr. abb. an. ʒj. aqu. nenuph. lib. s. concludantur omnia alambico, & fiat distillatio.

℞. Conf. flo. nenuph. bugl. anth. an. ʒj. conseruæ acori ʒs. cort. citrij. cond. ʒij. pul. el. diamar. coral. rub. carab. seminis angel. & rad. bistort. an. ʒj. marg. elect. ʒj. elect. diarr. abb. irrasant. an. ʒi. mithrid. ʒij. cum syrup. conseru. citrij fiat opiata, vtenda ad ʒy. hora somni.

℞. aq. theriac. scab. cardui. an. ʒij s. passentur per manicam Hipp. cum sacch. & pauco cinn. cap. cochle. duo ieiunus à sommo excitatus.

℞. Sarsaparil. q. i. meliss. stæchados radicum omn. aperit. scordij. mercur. saluie, beton. an. m. j. rad. acori, eryng. aristo. ang. an. ʒs. enul. camp. m. j. frusta pomorum redolentium, fumar. absinth. an. p. j. bipinell. m. j. poly. passul. an. m. j. seminis pæon. sesel. an. ʒs. fiat decoctio ad lib. j. infunde foliorum jena ʒij. adde express. ʒj. s. agar. trochis. infusi in aqu. beton. & sal. cum ʒy. cinnam. & ligni aloës ʒj. adde syrup. res. pallid. ʒij. & sacch. sufficiens.

℞. conseruæ stæch. sal. beton. meliss. anth. an. ʒj. s. cort. citrij conditi. ʒj. zinzib. conditi. ʒj. conser. accori ʒi. s. myrob. emblic. & confectiois alk. an. ʒij. conseruæ buglos. ʒy. theriaces ʒij. opiatæ Fernelij. ʒ. j. s. excipiantur omnia cum syrup. conseruationis citrij.

℞. Ambre griz. ʒj. pul. lat. de gemmis archonit. an. ʒs. diarr. abb. & diamarg. frig. an. ʒi. cinnam. gr. 4. pul. radicis angel. & tormentilla. an. ʒj. cum sacch. soluto. in aqua card. infusionis ʒs. ligni aloës. fiant tabella pondere ʒs. vtendæ?

℞. Theriaces, mithrid. an. ʒij. confectio Alkermes ʒ6. elect. de gemmis ʒs. limatura interioris guaiaci. ʒij. seminis pæonia & citrij. an. ʒ6. conseruæ viol. & buglos. an. ʒi s. succi pomor. odorifero. & aqu. nenuph. an. lib. s. Ponantur omnia in alambico & vtatur ea aqu. intrando in laconicum.

Item ℞. rad. enula, angel. tormentil. capparū. Eringio. apij, petro, poly. an. ʒij. meliss. scab. bipinel. plantag. an. m. ij. lupul. huglos. scolop. teterach. an. m. j. fumar. primul. veris. au. p. j. semin. bomb. dictam. citri. an. ʒy. conf. enul. camp. acori. meliss. an. ʒi s. pul. elect. de succo rosarum diamarg. frig. an. ʒs. decoct. ʒij. guaiaci, & ʒy. schina lb. ij. decocti plantag. ʒij. theriac. & mithrid. an. ʒi. s. Adde aquarum cordialium. lib. ij. Ponantur omnia in alambico.

De febre lenta Symptomatica.

CONSILIVM XCIV.

CONSVLIS Amorræi filia annos duodecim plus minúsve nata sæpè animo deficitur, immò aliàs putat sibi præcludi fauces, aliàs halitum nescio quem sentit cum cardio gmo, capitis dolore præsertim in anteriore parte. Dolor non est pertinax. Coloris est vicissitudo in facie, modò cum pallore quodã rubescit, modò pallet solùm, suffusa aliàs aliqua ex parte est facies. Argumenta sunt fœdorum colorum: destillatio tenuis est in pulmones, aliquando spirandi difficultas. Metuebatur illi ne periculoso aliquo tandem cerebri morbo tacta intereat: vt eius sorori contigit, quæ Cataleptica post febres erraticas, interiit.

² Initum consilium prophylacticum potiùs quam therapeuticum calido & sicco hepate erat, adeòque calido vt partim alimentum corrumpere, (vnde illud 6. Epid. *qui ventre sunt calido, carnes habent frigidas*) partim aliquid attraheret, reliquum media veluti via in lactibus resideret. Nam quoties repurgatur, pulti simillimam excretionem facit biliosam, olidam, vermium parentem; vnde & aliquando vermium molestiam sustinuit. Sic obstructio id ipsum iuuat. Quod autem obstructio sit eaque cruda, declarant vrinæ in calidiusculo corpore aqueæ existentes. At nec ratione corporis, nec ratione febriculæ quæ sæpè apparet, nec ætatis ratione tales apparere debent. Nam in pueris aqueæ vrinæ ab Hippocrate damnantur in prognostico. Quanquam in nostris Epidemiorum libris animaduertimus ex Hipp. *In erraticis febribus aqueas vrinas Splenicis esse.* Quòd forte in hac contingit puella. Mutationem colorum ad elationem vaporum fugacium referebamus, nec non ad animi imbecillitatem & caloris, qui facillè intro recurrat. Hippocrates huius quidem rei generalem rationem dedit, *Colorum mutationes fiunt corda constringente se, aut laxante: laxante quidem fiunt benè colorati & rubicundi, constringente verò pallidi & virides.* Et illa ²⁰ *et sic*, quæ quando apparet, in malis poni potest, aut homonymis

In Consil.
civ.

Lib. de
Cord.

bona est'. Caloris in pulmonibus maioris indiciũ esse potest. Videtur quidẽ dolor iste capitis symptomaticus esse, tum quod fugax sit (quanquam si dolor capitis per protopathiam sit, necessariò non existat stabilis) & videatur tantũ per vaporis, aut exhalationis elationem fieri. Nam punctiõnem morsumque in ventriculo præsentit. At verendum tandem ne dolor iste ita ius vindiciarum in caput habeat, vt non ampliũ per sympathiam, sed per protopathiam fiat. Nam cum partes laborant per consensum, id fit aut qui facultas non suppeditatur, aut materia vt in respiratione, aut per vapores⁺. Cum prioribus duobus modis fit id, actio quidẽ læsa est, sed pars à qua suscipitur actio illæsa est, sed cum pars aliqua per consensum laborat ob summissos vapores, actio quidẽ partis læditur, & ipsa pars laboras per sympathiam afficitur: sed ita afficitur, vt si dispositio in parte aliqua fiat, iam non ampliũ secundariò, sed primariò pars laboret ipsa. Ac probabile excitari ichores à partibus inferis. Porrò opinione Galen. ichores tribus de causis in ventriculum incidunt, aut propter mœrores, aut dolores, aut infirmitatem ventriculi: Accedit & longa abstinentia, & compassio. Ac reuera statuere oportet in hoc corpusculo caliditatem & siccitatem cum squalore, vnde magna excitandorum humorum occasio nata est. Quemadmodum enim excedens humiditas immoderato calori iuncta corpus languidum & decoctum reddit, necnon effœminatum: Ita calor acer mordaxque dum humores accendit, acuit, irritat, excitandis vaporibus magnam ansam porrigit. Post vnã atque alteram purgationem syrup. solennis est institutus ex bechicis, thoracicis, splenicis, folliculis, fena, agarico præparatis, & coctis vt decet. Item hæ tabellæ institutæ.

Cap. 6.
lib. 1. de
loc. aff.

Comp. in
apho. 50.
lib. 6.

L. Seminis pœonia gra. 8. marg. el. corall. vtriusque spod. tochiscorum è carabe. an. ʒj. eboris, cornu cerui. an. ʒs. ossis de corde cerui pulueris coriandri & diarrh. abb. an. ʒj. cum sacch. in aqu. card. soluto, fiat tabell.

R. Conseru. beton. stæchad. ros. buglos. an. ʒ. j. conserua anhos ʒij. corticis citrij conditi ʒ iij. rasura eboris, cornu cerui an. ʒj. heriaces ʒj. fiat opiata cum syrup. conseru. myrob.

L. Pulueris hiera ʒj. agar. troch. & rhab. an. ʒj. cap. ʒj. ans ʒs. huius massa.

Vtatur quotidie in sculo mane in egressu lecti: astate lacte asina.

ANNOTATIONES.

1. Febris ista lenta est & continua, & symptomatica qualem Fernelius describit libro de febris cap. de symptomaticis lentis.
2. Huc pertinet locus memorabilis lib. 2. de Dieta acutorum part. 22. Quod Hippoc. Velit concoctionem esse elixationi similem docet, tanquam coctio fiat à calido non sicco squallentique, cuiusmodi est febrilis, sed humido & vaporoso, cuiusmodi est qui in animalibus secundum naturam existit. Fernelius cap. 13. lib. de urinis istis tenuibus, & aquis abundè satis.
3. Arculanus cap. de Cephalæa, ait, qui dolores capitis sunt per sympath. sæpè cum periodis, & cum paroxysmis fiunt prout sunt causæ periodi, in membro communicante. Quamquam hoc non verum est perpetuò. Nam etiamsi in capite humor sit qui morbum per protopathiam faciat, tamen non perpetuò vexat, sed suas habet periodos: Id vt intelligatur, quoniam difficile est admodum, legendus est comment. ad Aphorif. 8. lib. 6. Aphor. Et de hoc diximus lib. 2. nostrorum consiliorum in hist. de fratre huius puella.

Nam Galenus com. in Apho. 19. lib. 2. de Chronicis morbis disputans, ait illos à crassis humoribus fieri, & paucos ex his per sympathiam fieri, & absque loco affecto, vt potè venis aequaliter humores corruptos continentibus. Sed diastasis vocòdes, vt in hemicraniis longis contingit, pef- sunt esse sine humoribus illis crassis. Sic aliud est, & est non vocòdes, aliud diastasis vocòdes. Caterum cum dolor est per propriam affectionem est magis continuus quam cum est per sympathiam. Et vis ponenda in verbo, magis, id autem fit, ait Arculanus, aut quia membrum, longo dolore debilitatum facile aliarum partium excrementa excipit: aut quia per dolorem spiritibus resolutis digestiua & expulsiva facultas, languet unde non probè conficit alimentum, nec superfluitates qua in qualibet digestionem resecantur, debite expellit, &c.

De Pleuritide notha.

CONSILIVM XCVI.

IOANNES LE MIRE, mercator, cum meloduno Parisicos lintre deuectus petit rigente admodum hyeme, vi frigoris ita calor intrò cogitur, vt indè horruerit valdè, deindè calorem ingentem cõceperit. Media nocte cœpit quæri de dolore fixo ac pungente ad nothas costas. Magna nothæ pleuritidis suspicio est. Is narrabat sepè se ea in parte dolores quos colicos vocabat, solitum esse sentire, qui fomentorum vsu non ita multò post leuantur. Ac primùm ei credidimus cum tamen apud nos potiùs valeret opinio ac suspicio pleuritidis per congestionem aliquam excitatæ, quam narratio de vetere dolore, coegimus vt alius enemate sublueretur. Ac dolore perseverante, vt vrgeretur occasio, tertia pomeridiana bolum cassiæ addita confectionis de dactylis portiuncula ne medicamentulum ignauum maneret, exhibuimus: huius vsu multa corrupta admodum edueta sunt. Sequenti die relicta sede priorè, dolor ad orificium ventriculi pertinebat. Tunc nos pœnituit, quod non die præcedente venam secuiffemus, vt ne inflammatio ad aliam nobilem partem, vti contigit, serperet, ac oberraret. Valdèque timuimus ne in ventriculo malum figeretur, grauiorâque omnia nascerentur. Quod aliquandò à nobis obseruatum est in vitriarij filio: Qui cum per tres dies de dolore lateris quæstus esset, & neglecta iterùm esset phlebotomia, repentè malum regionem ventriculi ad xiphoidem chartilagineum obsedit. vomendi desiderium, febris ^{acuta} lypyria, mors repentina. Per tres dies continuos venam ter secuimus: purulentus sanguis detractus est, ne guttula quidem puri sanguinis: viribus metuebatur ob ætatem ingrauescentem. Dolor non erat fixus. Thoracem dilatare omnino non poterat. Respiratio alioqui erat facilis, nisi cum magnum respirare cogereamus. At tum narrabat se aliquid imis costis inhærens sentire quod respirationem elideret. Sitis & febris erat ingens, omnia cruda. Nam nec alius nisi sollicitata ferebatur, nec quicquam ex facili

è pulmone educebatur. Dubitabamus an diaphragmatis esset inflammatio præsertim in parte concaua, præsertim quâ attingit nothas costas, si inflammatio foret illius partis cur non deliraret, quærebamus. Suspiciabamur collectam ibi illam materiã & præsertim serosam (quod dolores vagi apparerent) quæ olim colicos dolores excitarat. Idque euenisse arbitrabamur ob ambientem impensè frigidum, vnde suppressio nata foret. Ad id cogitandum situs partis dolentis incitabat. Tamen quærebatur, si ea in parte inflammatio esset cur non ad clauiculas dolor pertineret? Sed sectio corporis post mortem omnia de quibus dubitabamus aperuit. Ergo cum circa finem diei quarti dubitaremus an quartò secanda vena esset in tanta siccitate morbi, febre, difficultate spirandi, dolore: Ecce primarius medicus videns nostras sectiones inutiles, ratus collectionem esse quandam (vtiantè monuimus) ad catharticum confugit idque vehemens admodum, vt vi deturbaretur humor qui infrà diaphragma cõsisteret. At cum humor nullus esset infrà diaphragma morbi autor irritum medicamentũ fuit, & duabus post horis hypercatharsin induxit, perturbationem tantam vt breui ægro intereundum fuerit. At vt Hippocrates scripsit: *Tarpis est calamitas dato medicamento eodem die agrum interire.* Erat infrà subsistendum.

*Lib. de
medicam
mentis.*

Quamquam hic difficultas magna est. Nam nouimus mulierem cui post phlebotomiam cum datum esset medicamentum sequenti die, quia inane fuit medicamentum & non potens satis, statim delira facta est. Vehementia febris à tam valido medicamento debebat dehortari, item virium infirmitas, tum ratione ætatis, tum multa venæ sectione inducta. Potius sequendum erat Gal. cõsilium cuius verba ad vnguem tenenda sunt. *Vbi non solum acutus morbus fuerit, cuiusmodi est pleuritis, verum & cum febre vehementissima, multò magis vitanda purgatio, atque per sectionem venæ vacuandum magis etiam si ad hypochondrium dolor finiatur. Nempe & si minus quidè auxilium quàm per purgationem venæ sequatur, securius tamen multò existit. Immo nullum periculum impendet ex eo quod fit per sectionem venæ, eo discrimen maximũ subeunte quod per purgationem tentatur, maximè si laborantis naturam non fueris expertus. Si enim naturã non noueris, metus est ne plus inuolues, aut nullo pacto naturã moueas, aut si moueris, non sufficienter va-*

*Com. ad
parr. 11.
lib. 2. de
Diatã
cent.*

enes. Quæ omnia magnis in morbis offensas pariunt: quod non facile ut in iis qui non febricitant, emendatur. Cum igitur febris non fuerit vehemens, & naturam laborantis expertus fueris, ad medicamentum purgans te conferes, iis quæ ab Hippocrate dicta sunt vsus. Atque hoc in loco tria, animaduertere oportet dum sectionem venæ antefert purgationi: primum est cum meminit febris vehementissimæ, vt vehementia febris dehortari debeat purgationem, præsertim & cum adsit inflammatio: febris autem vehemens & inflammatio purgationem dehortatur, quod medicamentum calorem sit adaucturum: Secundum quod minus auxilium à sectione venæ sequatur, quam à purgatione: Tertium, quod securitas sit magna in sectione venæ, non item in purgatione.

Quæ tria sunt diligenter animaduertenda, ne fortè sententia Galeni malè intellecta nos valdè munitos putemus, cum alioqui grauissimè erremus. Quid enim obest illud quod obiicitur de febre ardentissima, nam in pleuritide ea præsertim quæ occupat hypochondrium: (de ea enim illo loco agit, quanquam & generaliter illud intelligi potest) non est tanta febris: si non tanta febris, & si minùs auxilium affert sectio venæ quam catharsis, vt idem faretur Galenus, omni ratione amplexanda est purgatio, non autem purgationi præferenda sectio vt securius consilium, & remedium.

Quorsum enim ista securitas, si non proffit remedium? Præterea si febris vehemens, possumus dare medicamentum non ita eradicans, non calfaciens, non agitans. Item quod ad eum calorem quem præbitum medicamentum afferet, iam respondit Galenus in Apho. medicamentum quidem calfacere, sed maius sequi commodum ex euacuatione humorum morbificorum, quam incommodum ex ea calfactione & febris auctio-
ne. Denique si purgatio in vehementia febris nocet, cur non & sectio venæ? Relinquamus Arabas qui in biliosis morbis phlebotomiâ reformidant, sequamur ipsum Galen. Is Com. in part. 6. Prorrh. ait resiccatos, nec rigore, nec vacuationem insignè, nec simile quid ferrè². Ac exiccatorum nomine & biliosos audiemus, & eos qui biliosissimis & siccis morbis tenebuntur. Pleuritides maxima ex parte biliosæ sunt ex Gal. Cum ergo siccus sit morbus bifariam, & ratione *conditas*, & quia sæpè nil excernitur præsertim initio, & febris iuncta est, affectus & siccus, & siccans, an locus erit vacuationi per phlebotomiam?

*Apho.
24. lib. 1.*

*Com. in
part. 6.
sectio. 2.*

*Com. in
Apho.
12. lib. 3.*

472 CONSILIORVM MEDICINALIVM
Præterea si ex Hippo. in mulieribus biliosis etiam naturalis mensium eruptio formidabilia affert symptomata, ut ipse eo loco docet, frequens sectio venæ conferet? Quanquam in Cōment. in Aphorif. 23. lib. 1. in biliosis & ardentibus febribus nō reformidat sectionem venæ, etiam ad leipothymiam vsq; Galenus³, Ad superiora vno verbo respondebimus. Omnis inflāmatio facile iuuatur & tollitur sectione venæ. Nil enim est quod tā facile refrigeret corpus, & inflammationis occasionem tollat. At pleuritis inflāmatio est. Quod autem medicamentum daretur, illud suo calore febrem & augebit & corpus siccabit, & vix de inflāmato loco quicquam educet. Cum dicit minus auxilium à sectione afferri, sed securius illud intelliges de inferiorum costarum inflāmatione. Nam si de inflāmatione superiorum intelligeret, hoc falsum esset.⁴ Non enim liber est exitus ad excretionem materiæ per partes infernas. At cum pleuritis inferior est, cum fiat à congestione potius, & quæ infrà diaphragma sunt purgatione per inferiora potius exigi debeant quam alia arte, libero etiam existente exitu, potius ad catharsin accedendum est. Sed ignoratione naturæ eius qui purgatur, & metu incrementi febris vult nos impediri ne tam audacter purgemus, ac venam secemus. Iam verò hoc loco statuendum est purgationi potius intendendum esse in pleuride & dolore occupātenothas costas, si tria illa animo comprehenderes: Si medicamentum nō sit perturbans & calfaciens multum, si febris non sit intensa: si inflāmatio non sit magna, sed potius dolor à congestione quadam humoris. Vndè grauitèr hodie peccatur ab iis qui festinanter nimis audito nomine doloris ad latus (vbicumque is dolor sit) statim ad sectionem venæ confugiunt. Immò etiam si nulla ad sit febris, aut exigua, etiam audacter venam secant, persuasi illa sentētia Galeni superius adducta, quòd securius sit remedium phlebotomia, minus tamen auxilium. At nosse debent illas conditiones quas attulimus, & quas nisi nouerint, non sunt digni medicorum nomine. Itaque quemadmodum tardos nimium esse non oportet in sectione venæ celebranda, ita festinatio probro est. Multi enim dolores pleuritici mentiuntur, in quibus aut solum fomentum, aut leuiuscula purgatio abundè erit: ut ita in humano sanguine funden-

fundendo liberaliores non simus. Nec nos ad sectionem venæ iteratò immò pluries faciundâ incitabit impuri sanguinis effluxus: Quod plerisque occasionem porrexit celebrandæ phlebotomiæ sæpius, & virium frangendarum non sine magno vitæ periculo.

Aperto cadauere ægri nostri ren sinister planè putris & corruptus repertus est. Inuenti duo in vesica calculi, qui suppressioni urinæ in progressu morbi occasionem dederant. Morbi mortisque causa erat hæc: Pulmo erat admodum amplus, thorax angustus. Semiputris erat pulmo: Et ita contumaciter ad latus dextrum adhærescebat, vt vix auelli potuerit. Abscessus in ea parte erat. Et sua mole & magnitudine ad nothas ferè costas descēderat. Erat inflammatio mediæ partis pulmonis, præsertim eius quæ abscessum fouebat. Adactò cultello chirurgico putris & fœtens sanies manauit, cuius portio dum decurreret per membranarum continuitatem, dolorem excitabat: & cum esuebat, dolor cessabat. Vt mirum non esset, si modò pars doleret, modò non doleret. Et quoniam osculum alui medium diaphragma transcurrit & secatur, dum per gibbas diaphragmatis serum decurreret à parte putrefacta manans attingerètque osculum ventriculi, non mirum si dolorem in ventriculo sentiret, ac si in capacitate eius malum foret. Quanquam non erat inflammatio in ventriculo; tametsi adesse videretur. Hippocrates in libris de morbis falsæ, e mentitæque illius pleuritis descriptionem facit: *Fiunt suppurati si à capite delapsa pituita adlaris agglutinata fuerit & puruerit. Tunc enim latus vt plurimum inflammatur & patitur eadem quæ & ex pleuritis de suppuratus.* Et quòd de pituita à capite delapsa, dicit Hippocr. Idem potest audiri de pituita cui localis est in pulmone generatio, maximè verò in senibus, aut quibus pulmones non benè perspirant ob crassitiem, vt in quibusdâ, visum est, quorum pulmonis substantia caseo duriusculo erat assimilis. Aut propter immoderatam vitæ rationem. Quod huic ægro nostro contigerat. Nam maiorè suæ vitæ partem in venando occupabat, in cibo & potu, cum nulla vitæ ratio eius animû aliò reuocaret. Inter cætera hepar erat maximè vitiatum, & præsertim pars eius superior erat friabilis, & *non aduersa.* Actum Calend. Febr. 1575.

Lib. 7.
de Morb.

ANNOTATIONES.

1 Hippo. lib. 2. de morbis mulierum, ait saluum fluorem mulieri euenire cum exhaustus per alium fluorem sanguis, biliosus sit: unde patet euacuationem sanguinis bilefacere humores, & reliquū quod adest. Sic in biliosis pleuritidibus frequens sectio non confert. Et ut dicam conferre nunc ad malum urgens, dum biliosior est factus sanguis maior est in pleuritide incidendi occasio.

2 Si Arabum opinio valeret minus tūto in pleuritidibus vena secaretur quod omnes ferè sint biliosa declarat periodus. Immo Hippo. lib. de locis in homine nomine bilis pleuritide intelligit.

3 Hippo. part. 74. lib. 4. Acuto. In pleuritide sanguinem ad leipthymiam mittit, si dolor acutus fuerit. At acutiè morbi bilis facit. Ergo presente bile leipthymia sectione induci potest. Gal. non probat omnino illud Hippocratis, aut quidem plus sanguinis vacuari debere quod dolor sit acutus, sed quod liberius sinamus fluere non ab acutis sumitur indicatio, sed si vires valent, si atas floruerit, sanguis abundavit, laborantis natura densior, & minus perspirabilis si consentit tempus anni.

4 Manardus ea de re disputauit copiosè satis Epist. 5. lib. 12. Sed & locus est apud Galenum in arte parua ubi scribit, ubi corpus plenum est, vniuersum per partem affectam vacuandum non est: quo ex loco positis reprehendere sectionem vena que sit in pleuritide corpore vniuerso pleno, aut cum pleuritis per regurgitationem sanguinis sit ab hepate. Tunc enim in necessaria foret hunc locum adduxit Scaliger in com. de insomniis docens sectionem qua sit in parte opposita necessariam esse. Vide Com. Akakia in locum predict. Idem Akakia com. in lib. 2. ad glaucom. difficultates istas proponit constanter defendens opinionem de sectione vena ex eodem latere. Sed mihi videtur falsum attexere, quod inflammato utero sit potius demendus sanguis ex malleolo.

De Ischiade.

CONSILIVM XCXV.

Duos exercuere dolores ischiadici, alij quidem oborti per humoris amorem, sub finem febris longa: alteri verò media

hyeme per decubitus materiae in musculos natium. Atque ad
vtriusque dolores compescendos, tum ad causam morbi amo-
uendam multa remedia sunt instituta inter quae nonnulla huc
transtulimus.

℞. Massa pilul. de agar. cocciarum, & sine quibus an. ℞j. mala-
xentur cum infusion. ℞j. turbit. gummosi an fusi in hydromel. cum zir-
gib. fiant pilulae.

Item ℞. pulueris diacarib. ℞ij. pul. aromat. rosati, & triasantal.
an. ℞ss. cum sacch. soluto in aqua cuscuta infusionis. ℞ij. foliorum sena
mundatorum. fiat elect. per lozangas.

℞. Summitatum faenicul. aneth. & centaur. minoris. an. p. j.
baccarum lauri. ℞s. seminis anisi & cumini. an. ℞s. yua arthrit. hyperici.
an. m. f. salviae majora. an. m. j. rad. capp. ireos, eryng. an. ℞j.
fiat decoct. infundendo agar. optimi, & turbit. gummosi. an. ℞j.
ol. aneth. dissolu. ad ℞ij. & mel anthosatum cum diaphorico: fiat clyst.

Aliquando bulliant. in decoct. clysteris folia sena: hermodactyl. pul-
uerisat.

Apozemata ex salvia, hyssop. stachade folliculis & agar. conferunt.

℞. Rasure ligni guajaci ℞j. passul. ℞s. gly. ℞s. coriand. ℞ij. infun-
de per horas sex in libris sex aquae: fiet decoct. ad medias: Coletur cum
cinnam. capp. ℞s. mane ad sudores prouocandos.

℞. Mal. bis mal. pariet. flor. chamemeli summitatum aneth. an. m. j. f.
seminis anisi & faenicul. an. ℞j. fiat decoct. in sacculis in aqua & vino
pro fotu locorum dolentium.

Sunt qui ceroneum applicauerunt ex emplastr. philagr. de melilo.
ceroneo, & oxycro. diachylo. alb. gummi elemj. puluer. hermoda-
ctylo. ereos & baccis lauri.

℞. Rad. alth. cucum. agrest. cyp. calam. arom. an. ℞s. f. folio. ebul-
yua arthr. & herbe paraly. an. m. j. chama. m. j. semi. anisi. faenic. se-
seleos. an. ℞ij. absinth. rof. an. p. j. fiat sacculi. bulliant ad forum.

Linatur pars oleo lilio. lumbricorum cum aliqua parte olei de salvia.

℞. Rad. comp. bryoniae, sigil. beatae Mariae an. ℞j. mal. bis. pariet.
yua, hyper. selu. beto. meliss. maio. an. m. j. chama. p. j. rad. cyp. cala-
mi arom. schœnuanth. an. ℞s. f. seminis lini. alth. & fenig. an. ℞s. fiat
decoct. pro fotu.

℞. Eadem materialia pistentur. adde facis vini ℞ij. pone in
stuppis conabibus macerantibus in aqua vite.

℞. Rad. lilio. coctae cum vino alb. ℞ij. axung. huma. & suill. an.
℞j. ol. chama. ℞j. fiat litus.

℞. Empl. de melilo. & cerati philag. an. ℥ iij. pul. rad. ireos floren. & cyp. an. ℥ s. ol. lumbrico. ℥ ij. cera noua, quod suff.

℞. Picis nigra ℥ 6. terebinth. Veneta ℥ ij. cera noua ℥ iij. sulphuris vini. ℥ s. rad. ireos pulu. ℥ ij. fiat emplastr.

Post usum causticorum hæc sunt admota.

℞. Vnguenti mariati & comitissa an. ℥ ij. emplastr. palmei ℥ j. de melilo, & muccag. an. ℥ s. ol. myrr. & irini. quod suff.

Ad confirmationem ventriculi hoc electuarium præscriptum est.

℞. Pul. elect. triasant. ℥ ij. rasura eb. cornu cerui margarit. electarum coral. rub. an. ℥ j. rhub. ℥ ij. sacch. dissolut. ℥ ij. fiat elect. per tabell.

℞. Cassia ℥ ij. catholici & manna. an. ℥ j. pulpa sebesth. ℥ s. foliorum sena puluer. ℥ j. cum syrup. violato. fiat optata.

Pro carcinomate vteri.

CONSILIVM XCVI.

MVLIER. Xantonensis carcinomate in vtero laborabat: Ita consultum est à medicis.

Purgatio sit blanda corporis per interualla, clysteres anodyn. fetus, infessus ex anodynis, iniectiones in vterum ex lacte asinino, vaccino tum perse, tum ex succis plantag. solatri, hyoscyami si dolores vrgeant addito etiam momento Philonij.

Post iniectiones insuffletur puluis lithargy. pompholigos, myrrhæ, aristoloch. lotæ in aqua solatri & siccatæ, fiant pessi ex vnguento diapompholigos inducto super linteam, & immisso in vterum per specillum vt proximè contingat tumorem filo appenso, vt extrahi queat. Vitentur calidiora. Ratio victus euchyma. Vtatur vino rubello subastringente. Prouideatur robori partium principum elect. conditis, epith. His remedijs non curationem quæ sperari possit, sed paulò longiorem vitam & dolorum leuationem speramus. Id apud Io. Gorraum. foelicem & primarium medicum fuit decretum.

Ad destillationem in pulmones.

CONSILIVM XCVII.

QUIDAM difficultate spirandi detinebatur : necnon catarrhus in pulmones eum infestabat. Consultum illi est castia & catholico in boli forma, hordeatis, syrupis promouentibus sputum & suspendentibus catarrhum.

℞. Rad. gram. poly. passul. gly. an. ℥ss. agrimo. beton. hyssopi semini frigid. an. ℥ij. iniub. sebesth. an. m. 6. ficus pingues & dactyl. num. 4. florum. p. j. fiat decoct. ad lib. j.

℞. Prædictæ decoct. medium infunde foliorum senæ ℥j. infunde in col. agarici trochisc. ℥ss. dissolu. syrup. viol. & capil. ven. an. ℥ij. sacch. candi. ℥ss. fiat ut syrup. coctus, in reliquo dissolue diatrag. frig. ℥j. diatr. simpl. ℥. j. syrup. capill. ven. ℥ij. fiat syrup. utend. loco lohot.

℞. Salvia major. flor. nenuph. an. m. j. rosarum. p. j. cinn. ligni aloescaryo. an. ℥j. ponantur simul pro cucupha.

℞. Succibros. rub. ℥ij. sacch. candi. ℥j. oxymel. ℥j. fiat lohot.

℞. Rad. acur. pæonia, aristolo. rotun. poly. petro. aspa. an. ℥ss. foliorum beton. samb. agrimo. meliss. scolop. an. m. j. flor. stæch. roris. sal. an. p. j. passul. glycy. thamar. an. ℥ij. scylle præparate ℥ss. fiat decoct. in qua infunde folio. senæ. ℥ij. s. agar. ℥j. santal. citr. ℥ij. rhub. ℥ss. diss. sacch. lib. j. syrup. de præstio, & de stæchade. an. ℥ij.

De febre continua.

CONSILIVM XCVIII.

QUIDAM annos natus 20. Delphinus à multo labore in febrem incidit. Tempus erat æstiuum & australe, febris insignis, corpus squalidum & macilentum. Tertio die secta vena. Sexto fluxit sanguis è naribus liberaliter, perseverat toto die ac nocte. Fit tum symptomatica. Nulla arte compesci

pruriebat. Retulit tum demum se prima huius mali rudimenta
 sensisse cum criticè post ardentem febrem multa vrina fluxis-
 set. Et cum ille indulgisset veneri multum, non mirum si partes
 illæ debiles facilè vlceratæ fuerint profluio vrinæ criticae.
 Quæ autem causa effecit plurimum, est quod diureticis sæpè
 vsus fuerit, falsò persuasus calculum esse: vsu eorum prouoca-
 tæ vrinæ & partes calfactæ vlcerari potuère, verisimile quoque
 parastatas suo glutinoso humore destitutos, vt facilè vim tran-
 seuntis & feminis & vrinæ non sustineant. Res ad catheteris fi-
 dem reuocatur. Nullus lapis deprehenditur: immisso cathe-
 tere purulenta ferè vrina profluxit. Sic suspicio erat vlceris.
 Asperitates quædam in collo vesicæ deprehenduntur. Ac illud
 non omittendum perennem fuisse defluxionem falsæ pituitæ
 à capite. Quod facilè irritationem in vesica excitabat.. Nam
 facilè ventriculus laxabatur: alius irritabatur, & eodem filo in
 vesica stranguria excitabatur. Narrabat se nocturna feminis
 excretionem intolerabilem dolorem sentire, anodynis fomentis
 perinæi somnus conciliatus est: vsu hydromelitis aquosi initio
 passus & intermissione vini prouisum est. Ventriculo consultū.

*℞. Mastiches. ℥. s. cort. citr. maior. absinth. cyp. an. ʒi. s. nucis
 moscata. caryoph. galang. an. ℥j. Cum oleo de absinth. fiat scutum.*

Item vsus tabellis roborantibus stomachum vt artis est.

Magna erant argumenta vlceris aliqua in parte latentis.

Tamen dicebat se nunquam renes laborauisse. Imperata sunt
 ea quæ humores mitigarent. Aliquando excernebatur per vri-
 nas materia pituitosa lenta, ductilis & longa instar filamentū.
 Dominus magnus dicebat duo esse in eo incommoda, exulce-
 rationem orificij vesicæ, & contractionem. Hæc facit vt ferè
 indefinenter vrina ad excretionem tendat, immò & inuolun-
 taria aliquando feminis sit excretio. Illa verò vt dolorem vrina
 transitu ipso inferat. Sic censuit vtendum decocto falsepar.
 aliàs, aliàs lacte asinino. Ad vigilias assiduas & dolores et
 prouisum est vsu philonij rom.

De mola & fluore vterino.

CONSILIVM C.

NOBILIS mulier querebatur de mola, & vterino profluuio, vt nulla esset conceptus spes, hæc sunt præscripta. Molæ & vterini effluuij tam frequentis causa videtur nimia sanguinis humidioris copia, qua semen & eius vis prolifica obruitur, indicio sunt menstrua copiosiora, & à molæ excretionē tanquam puerperia per mensem integrum, eoque amplius fluentia. Itaque corpus siccabitur victus ratione, medicamentis, & iis quæ prouocant yrinas & sudores, corporis exercitatione, fame, pauciore victu, & iusculorum abstinentia. Particulatim verò siccandus vterus, tum foru, tum ceratis quæ eam vim habent, nec menses mouendi. Vere & autumnō vteris decoctio. rad. schinæ. Aliquādo è basilica sanguis parcius adimetur. Si verò humidiorē temperamēto videbitur, semēnq; habere humidius, eadem ratione victus vtetur. Parcior sit vterus, qua tamen commodè vtetur tribus aut quatuor diebus à mensium eruptione.

Ad animi defectionem.

CONSILIVM CI.

IOANNI RIVIERE, sine febre frequentes animi defectiones, præsertim si animo moueretur: Erat enim oxythymus, frigidiusculo temperamento præditus. Ei consultum est infuso rhei ad corroborationē ventriculi, & sequentibus pilulis.

℞. Aloes lotæ in aqu. endiu. ʒ ij. rhub. ʒ i. s. specier. aromat. ros. ʒ ss. cum syrup. de absinth. fiat massa.

℞. Rad. cichor. ʒ i. s. fiat decoct. in qua infunde absin. pont. p. i. in col. ad unc. ij. dissolu. vini alb. unc. s. fiat potio arom. cinn. & dulcorata.

Data opiata ex confectione Alkermes & conseruis.

Forus est ventriculus decoct. solenn. herbarum stomachicarum.

Ad facilem vteri gestationem.

CONSILIVM CII.

MVLIER ægrè ferebat quod vterum gestare non posset, Mei post purgationem totius corporis iis remediis consulitur.

℞. Galioipseos. matricar. calamenti, puleg. an. m. j. majdr. p. j. cyp. calam. aromati. an. ℥j. fiat decoct. pro fotu, vel semicupio.

℞. Picis cedrina ℥ij. ladani, stircis calamithea, benjoing. artemis. & florum melilo. an. ℥j. cum ol. & cera fiat empl. pro ventre & osse sacro.

Contineat se in lecto, & vtatur syrup. capil. vener. cum decoct. artemisæ & galiopseos aromati.

℞. Galanga & ammo. an. ℥j. inuoluatur baculus crassus ad longitudinem sinus vteri: ex iis solutis cum cera & puluere majorana fiat pessarium.

Pro vlcere in regione pubis.

CONSILIVM CIII.

NOBILIS mulier Xantonensis annos nata 40. laborabat vlcere in regione pubis. Aliquando foetens materia instar facis excernebatur illac. Cum hic tumor & vlcus multis de causis oriri possit, vel in ipsis inguinum glandulis, vel ab intestini, aut omenti prolapsu, vel ab vtero in eam incumbente partem, vix resciri potest vnde hoc sit, cum non rescriptum fuerit an antè tormina præcefferint, an menses suppressi fuerint. Itaque nullis apparentibus signis, aut malè affecti vteri, aut intestini maioris, aut ilei, verisimile est in inguen prolapsam esse cæci intestini apophysin, quæ tandem computruit & sinum

CONSILIVM CV.

Ad visus imbecillitatem.

CVIDAM annos vnde viginti nato non ita acutus erat visus, sed in rem intuenti acrius imminuebatur, sentiebátq; tenebricosum quid ob oculos obuersari: Quod potius ad vitium ventriculi cruditate laborantis relatum est. Itaque his remediis prouidetur.

℞. Specierum hiera picra dupl. aloë, massa pilul. sine quibus. an. ℥j. fiant pilula cum aqu. euprag. utatur sapè drageta communi à pastu.

℞. Aqu. fœnicul. chelid. ruta. an. ℥6. aqu. ros. & berb. an. ℥j. misce pro ablutione oculorum.

℞. Seminis fœnicul. aceto macerati & exiccati. ℥j. pulu. euprag. cortandri prepar. an. ℥ss. cinnam. & mast. an. ℥j. seminis end. mel. & citrij mundati. an. ℥y. diarrh. abb. & diamarg. frig. an. ℥j. sacch. ros. quod suff. fiat puluis utend. à pastu.

Frictiones capitis, cucurbitula, iussus mandere caryophyl. zedoariam, fœniculum dulce.

℞. Specierum aromat. ros. ℥j. seminis fœnic. dul. pulueris euph. an. ℥j. cinnam. ℥j. macis gra. 4. sacch. ℥ij. fiat. pulu.

CONSILIVM CVI.

Pro quodam qui iam per tres menses integros laborârat, vt tante diuturnitatis causa in medicos tacitè referretur.

DVO maximè hoc loco quæruntur, quæ tam diuturni huius mali causa esse videatur: & an ars nostra tantum possit, vt qui morbus, tum ratione sui, tum ex euentu fortè protractus est, is breuior artificio nostro reddatur. Nam hoc videmus in tacitis eorum qui huc venêre, & qui ægro assunt, aut amicitia gratia eum inuisunt, eo maximè animo vt si aut re, aut alia ratione iuuare possent, id ipsum lubentissimè præstarent ne amici

deessent officio: tacitis, inquam, animis, & mirum & latens esse, vt frequentiore & crebriore medicorum, & coitione & consilio promptius aliquod diuturni languoris praesidium expectent. Quasi factum sit, aut incuria medici qui quotidianam diligentiam praestitit, aut artis defectu, ac impotentia, vt qui morbus & specie, & natura longus futurus erat, talis forte redderetur. Ac primum & veterum autoritas, & ratio ipsa, & medici vsus iam confirmauit necessariò morbos existere chronicos, in quibus potius aegrotantis miseri patientia tolerantia. que leniendum est desiderium, quam vt se finat flagrantiore sanitatis (cuius absentia extabuit penè ac afflicus est) cupiditate languescere ac consumi. Vt iis contingit qui rem aliquam voluptate impulsu depereunt, tantoque magis affliguntur ac languent, quanto id ipsum quod tantopere expetunt, longius abesse opinantur. At iis minuenda leuandaque opinio. Cum Hippo. scribit, *Naturæ morborum Medici*. Duo maxime proponit, & in morbis plerisque naturam cum arte concurrere ad oppugnationem morbi, & etiam sine arte, id est, sine artis manifesto ministerio, naturam morbos tandem euincere ac superare. Non quod hoc de natura elogio Hippocrates artis medicæ dignitatè offendar, aut tollat, sed vt & naturæ & arti, duobus morborum oppugnatoribus, quæ debetur in euictione morborum gratia referatur. Nam si sola hæc natura morbis mederetur, cur tot se fregisset laboribus in arte excolenda que multis profuit. An tanquam quid fortuitum, & in fortunæ inani conatu positum? Scio enim id quod à celfo scribitur, *Cum in morbis multum & fortuna conferat, eademque sæpè salutaria, sæpè vana sint, dubitari potest secunda valetudo medicina, an corporis beneficio contigerit. In his quoque in quibus medicamentis maxime utimur, quamuis profectus euidentior est tamen & sanitatem, & per hæc frustra queri, & sine his reddi manifestum est. Sicut in oculis quoque deprehendi potest, qui à medicis diu exati, sine his interdum sanescunt. At in ea parte, quam manu curat, euidentis est omnem profectum (vt aliquid ab aliis adiungetur) huic tamen plurimum trahere. Et Aetius disputans de melancholiæ hypochondriacæ curatione & essentia, monet, vt sæpè desistamus instituto, vt potè operam ludentes & temerè validis medicamentis nullum operæ pretium afferentibus miseros aegros fatigantes & vexantes. Vt iam infinitorum morborum cura*

6. Epid.
part. 1.
sect. 5.

Cap. 1.
lib. 7.

relinquatur, magno medicorum dedecore: Immo & plerique contumaces morbi magna cum eorum vituperatione, medicorum vocentur opprobrium: vt iam in iis tantum morbis sese iactent venditentque medici, qui sua sponte soloque naturæ adminiculo facilè sanarentur. Sed quorum morborum abstrusior est cognitio, & paulum ardua curatio, eos pro derelictis & conclamatis habent: in quibus tamen (si quis artis medicæ, & honos, & vsus, & profectus esset) suam industriam & acere & explicare deberent.

Atque idem ferè medicis contingit quod & nauium gubernatoribus. *Qui nauem regunt in tranquillitate, si fortè aut deficiant, aut delinquant, non sunt manifesti: cum verò deprehenderit ipsos ventus & tempestas, palàm iam conspicui sunt omnibus hominibus quod & ignorantia & culpa erroris sui nauem perdidierint. Sic sanè & multi mali medici cum curant homines nil graue patientes: in quos etiam si quis grauius delinquat, nil graue faciat. Sunt autem multi tales morbi, & multò sepius quàm graues hominibus accidunt. In talibus sanè delinquentes non sunt manifesti hominibus idiotis: vbi verò obtigerit magnus, & fortis & periculosus morbus, tum ipsorum delicta, & ars omnibus in conspicuo sunt. Nec enim longè absunt singulorum pœnae ac cruces, sed breuè adsunt.* Hæc Hippocrates. Atque his docet & artis vim, & medici industriam maximè elucere in magnis morbis, cum & leues morbi facilè per se ipsi sanescant, & si quid in iis fatagat medicus nullum tamen operæ pretium faciat, cum nulla hîc artis vis vigeat. Atque Aetium loco prædicto audiamus: *Multi melancholici ex efficacioribus vomitoriis malè habuerunt. At proinde operæ pretium est nosse, quod multi sic egrotantes in tempore curationis parum commodi perceperunt. Dimissa verò curatione restituti sunt, natura ante curationem prævalente contra morbos debiles ex medela factos. Quapropter nature remissionem dare oportet. Videtur enim vnà cum curationibus affligi: in quiete verò inualescere & superare morbos iam attenuatos. Cum itaque morbi, aut breues, aut longi sint, & in breuium curatione nil habeat quod ostendet medicus præsertim si leues sint, cum etiam solus sudor extemporaneam afferat medelam, longi autem solo nature adminiculo tollantur: immò plus sepe ars ipsa officiat quàm profit: videndum an non casu & fortuna sanitas contingat. Ac primum: idem olim in artem medicam omnium præstantissimam & apprimè ad humani generis salutem*

Hippocrates
lib. de
veteri
medicina.

Aetius
cap. 10.
Tetrab.
2. sermo.

486 CONSILIORVM MEDICINALIVM
facientem conuiciebatur quod & nunc. Nam primùm quod
desperatis salus artis ope restitui nequeat, id vitio arti tradunt:
quod autem restituantur aliqui, id à fortuna pendere contem-
dunt. Ac si cæcus & temerarius fortunæ conatus in hac maxi-
mè arte spectetur: Hippo. à talibus conuitiis artem, vt potè in-

Hipp. li.
de Artic.

nocentem quibus olim illam verberabant vindicauit. Ego, ait,
non priuabo fortunam tanquam nihil opere pretij afferat. Puto enim
morbis qui malè curantur infortunium accedere, qui verò benè, eos bo-
nam fortunam nancisci. At eo loco multam commendationem
arti attribuit, quàm ipsi fortunæ detrahit. Alioqui ægris labo-
rantibus erat ad fortunam confugiendum, non ad artem. Con-
trà tamen faciunt: ac sic orationi factum dissonat. Idem Hippo.

Ibidem.

superius dictum amplius confirmat: Non est quod amplius aliquis
eorum qui sine medico conualuerunt casum spontaneum vero sermone
vehere possit tanquam sanationis causam. Spontaneum quidem nihil
apparet ac deprehenditur. Omne enim quod fit propter aliquid fieri com-
peritur: atque etiam in singulis adeo propter aliquid fieri videtur, spon-
taneum autem nullam essentiam habet, sed nudum nomen est. Medicina
& essentiam habet, & de industria aliquid agit. Et alio in loco præ-
clarius multò docet: Medicina tota inuenta esse dicitur qua sic ha-
bet & docet singulas consuetudines & occasiones. Qui sic medici-
nam nouit, minimè fortunam respicit, aut expectat, sed & citra for-
tunam, & cum fortuna rectè facit. Constans enim ac firma est medicina,
& doctrina in ea optimè composita minimè fortuna egent. Nam for-
tuna sui iuris est, & nullius imperio subest, nec optantis est ad eam perue-
nire. Si enim morborum medicamenta clara sunt, non expectant sanè
fortunam ad sanandos morbos.

Lib. de
locis in
homine.

Sed est vbi medicus fortuna vti videtur, est vbi non vide-
tur. Vt si cum dat pharmacum ad vnum finem tendens, & duo
sequantur fœlices exitus, fortunatus dicitur: Contrà si dum
datur medicamentum iustè & legitimè, & loco & tempore præ-
scriptum, & in purgatione ipsa casu fortèque vena rumpitur,
aut abscessus, cum hoc minimè medicamenti viribus tribui
debeat, tamen *decoxia*, dicitur infœlixque euentus. Quæ omnia
plenissimè ab Hippo. Describuntur in libris de morbis, & sub
finem libri de locis in homine.

Lib. I.

Cap. vii.
lib. 5. de
locis in
homine.

An fortuna partes aliquas in arte medica teneat disputatum
est eo modo quo Galenus dicit fortunam: Sæpè medico non con-
temnendam acquirere laudis occasionem porrigere, qua tamen ob im-

peritiam vulgus medicorum vti nescit: Nunc duo breuiter explicanda sunt, prius an artis defectus sit aliquis quod deploratis morbis nil opis adhiberi possit, posterius est vt quæramus de morborum longitudine, & cur ars ipsa non possit sæpè cursum tam diuturni morbi intercipere, quin aliquando annui, aliquãdo septennes morbi reperiantur. De priore Hippocrates abundè egit contra artis medicæ iuratos capitalésque hostes, qui illius artis, quæ tot antè seculis exculta, salutarè hominibus opè adiunxit, laudes obtinere ac labefactare etiam Hippocratis ætate conabantur. At ^{ἐπιφωνήσας} Hippocrates in eos inuehitur dum ait, *Qui idco reuiciunt artem medicam quod ea victis à morbo suppetias non ferat, si medicis indignarentur quod ipsorum talia dicentium, vt delirantium curam non habeant, magis herclè merito succensere debeant, quam iustam artis reprehendende occasionem habeant. Si quis enim ab arte potentiam in ea que non profitetur, requirat, aut à natura facultatem in ea ad que nata non est exigat, is ignorat insaniam potius demencia quam ignorantia conuenire. Quare artis vim magis ex merito admiremur, si quem ex clandestino morbo agrum restituat, quam si impossibilibus & desperatis opem aliquam ferre studeat.* De priore satis hæc sunt. Nunc ad posterius.

Lib. de
drio.

Hippocrates mirus breuitatis autor, sed magnarum & sublimium rerum & adumbrator, & scrutator, passim duos humores constituit bilem & pituitam, & eos, τὰ συζηροῦντα vocat: huius hæc sunt verba, ἢ μιν χλὴν ἢ τὸ γὰρ ἴμα ἢ νεφροῖσι πὺ σφύραται, ἢ ἔστι ἐν τῷ σπύματι ἢ πλεον ἢ ἔλαττον: id est, nascentibus nobis & bilis, & pituita congenerantur, suntque in corpore plus minusve. Eosdem humores solos duos statuit aliis quoque in locis. Libro quartò de morbis quatuor τὰ συζηροῦντα, constituit bilem, pituitam, sanguinem, hydropem, siue aquam. Galenus com. in Aphorismos dictum illud Hippocratis de duobus humoribus interpretatur: immò nomine τῆς χλῆος, omnes ferè humores laconicè intelligi docet. Eandem sententiam libri de morbis adumbrare videtur in epidemiis dum ait: *Si hominem calor corripiat, non à bile aut à pituita, sed à lassitudine, aut aliàs febricit, aqua multa irrigato, &c.* Ac si Hippo. omnè morbum humoralem, aut à bile, aut à pituita nasci doceat. Sed non abs re hoc scripsit Hippocrates. Nam cum videret morbos omnes aut breues esse, aut longos, duo statuendi sunt humores qui illorum morborum causæ ac principia existunt. Non quod ad eò coniunxerit Hippocr. vt præter duos illos nullum alium

Lib. 1. de
mor. is.

Lib. de
morbo
sacro:
Initio
libri m.
ei π.
9ar.

Com. in
Aph. 42.
l. b. 7.
Sub sic
lib. 2.
Epid.

483 CONSILIORVM MEDICINALIVM
subesse docuerit. Verùm vt experientia manifestum facit
omnis mos, indoles & ingenium morborum, aut pituitam, aut
bilem facile resipit.

Nam sanguis facilè in bilem degenerat, immò & videtur
Galenus dicere pituitam, per putrefactionem bilis naturam
redolere: succus autem melancholicus & pituita aliquid ha-
bent *συμμιξίς*, vt Galenus demonstrat in Aphor. com. Itaque qui
duos humores constituit, aliorum vim quodãmodo adumbrat,
& satis indicat duo summa morborum genera, vnum acutorum,
alterum longorum. Atque illorum *αἰτίας*, est & repentina muta-
tio litisque contestatæ diremptio, horum *ἕρῶ* *αἰτίας*, vt in libris
de crisibus demonstrat Gal. Itaque ex humorum natura qui in-
terna sunt insitãque nostræ generationis principia necessariò
statuere oportet morbos longos, alios breues. Vt omnem vim
naturæ generationisque primordia adimere conentur, qui om-
nes longos morbos, aut breues omnes esse posse credant. Sic
humorum vis ipsa & natura pro morborum varietate pugnat.

Atque Galenus & Hippocrates ex humorum varietate duo ista
summa morborum genera duxerunt: *Morbi acuti sunt*, ait,
quorum natura in humoribus calidis consistit, qui vel aequaliter per
omnes partes animalis fusi sunt, vel aliquam partem obsederunt. Morbi
verò longi ob lentos, crassos ac frigidos humores fiunt qui non facile con-
coqui possunt, & in partibus patientibus impacti sunt. Ita vt eorum
dispositiones magis præduris tumoribus quàm inflammationibus similes
existant. Deinde subdit, morbos istos longos, aut atra bilis, aut pitui-
tæ naturam habere. Porro illud verum, quòd scribit Galenus
omnes morbos diuturnos frigidos esse: quanquã in Epidemiis
quosdam affectus calidos diuturnos esse docet, & qui successu
temporis conuiescant, ac præsertim ætate senili. Atque hos
affectus, *ῥέτες αὐτοῦ ὄντος* vocat, nomine *ῥέτις*, generalius sumpto;
quemadmodum & ab ipso Hippocrate fames morbus appella-
tur. Immo generaliter, quicquid homini molestiam ac tristitiam affert,
id morbus vocatur. Affectus autem isti diuturni & calidi tamen
sunt renum passionibus calidæ & hemicrania calidæ. Quanquam
maxima ex parte succus frigidus morbos longos facit, calidus
breues. Quod & Galenus explicat, dum docet quid Hippoc.
nomine veteris doloris aut recentis cranone oborti velit.
Itaque iam apparet quomodo ex parte humorum qui morbo-
rum sunt parentes & causa materialis, alij morbi sint longi, alij
breues,

Com. in
Aphor.
4. li. 7.
Aphor.

Com. in
Aph. 50.
lib. 6.
& 40
lib. 7.

Com. in
Aph. 19.
lib. 2.
Hipp.
li. 1. de
morbis.

Com. in
Aph. 39.
lib. 2.

Part. 6.
sc. 5.
lib. 6.
Epid.

breues. Eodem pertinet ætas, tempus, regio. Nam hyeme etiam omnes humores pituitescunt. Immò ex Hippocrate si medicamentum etiam quoduis hyeme dederis, pituitam multam eliciet, tametsi cholagogon sit, ob dominatum humoris illa tempestate, hinc qui in eam incidunt morbi, longi sunt, tum quia materia est contumax, tum quia vires ad tantam diurnitatem ferendam sufficiunt. Sed præter humores qui causæ sunt aut breuitatis, aut diurnitatis morborum, est & alia causa potentissima, nempe *diadema*, quædam in partibus, quam efficere potissimum vult Galenus relapsum, & circuitionem morborum. Vnde tametsi omni arte curaque effeceris, vt humores pellantur, nihil tamen præstiteris nisi dispositio ipsa penitus sublata fuerit. Vt mirum sit cur post diurnum profluuium quo omnis corporis sentina exhausta est, febres etiamnum maneat æquæ pertinaces ac antè. Adeò magna vis ipsius *diadema*, ad alendum fouendumque morborum fœmen. Ac propterea plerisque visum est tantæ in febre quartana diurnitatis causam non aliundè petendam quam ex cancrosa dispositione in corpore lienis. Nam quas quartanas solus humor melancholicus accendit, eæ non sunt ita diurnæ: Sed cum lienis ipsius temperies est mutata, citra inflammationem, aut scirrhum, aut obstructionem (quod de hepatis *varice egria*, docet Galen.) mirum quam protrahantur affectus ipsi. At cum nõ sit in manu medici, situm, istam aut partis *diadema egri*, aut *diadema*, aut notam quæ elui nõ potest, & quæ lanis assyrio colore tinctis similis est tollere (vt de alterato cerebro loquitur Gal.) non est quoque in potestate illius vt morbos inde natos, fautos, productos & altos tollat. Immò ne impediatur sæpè quominus, aut septennis, aut septemstris morbus fiat. Itaque non humori hæc morborum tædiosa prolixitas, non naturæ, non artis impotentia tribuatur, sed isti partium *diadema*, quæ fomitis instar & alit, & fouet & renouat morbos ferè extinctos.

Lib. de Natu. humana.

Apho. 25. lib. 2.

In fine lib. 2. differ. febr.

Cap. 2. lib. 5. De loc. aff.

Com. in part. vlt. timam lib. 1. Prorrh.

ANNOTATIONES.

Ideo Hippo. lib. 2. Apho. monebat omnia secundum rationem agenti &c. Et Galen. apud ad hunc locum, vt cum gutta lapidem ferit, vix est in lapide sensibilis passio: sic in crudis coctisque difficilibus dispositionibus, in quibus cum aliquid fit cum ratione, non desistendum.

Id fortassis mirum fuerit, sed Gal. idem demonstrauit, com. ad part. 17. sect. 2. lib. 1. Prorrh. Vbi docet non proficere quicquam humorum euacuationem, cum iam morbus inductus est.

CONSILIVM CVII.

De Febre quartana arthritide & variis affectibus.

IOANNES FORMAGEVS dum iuuenis effet valdè famelicus erat & ciborum appetens. Vix famen satiabat. Obseruarunt primarij medici eos quibus, aut imbecillus est liens, vt potè non satis officiosè expurgās hepar, aut putris, voraces esse ac veluti vouldmo quodam generaliter dicto occupari. Ac reuera hic de quo nunc agimus splenicus erat, corpore & habitu melancholicus per adustionem, sed tamen moribus & animo satis festiuis & hilaris. Sed literæ illæ interiores, quibus vitiosissima etiam natura potest emendari (exemplo Socratis,) illū ad istam æquitatem & hilaritatem traducere potuerant. At febris quartana longa quā detentus fuerat, & dolor fixus ad hypochondrium sinistrum, & apertio cadaueris satis testantur quale in liene vitium fuerit. Vix enim quis diuturna febre quartana, & nulla arte medicinali detinetur quin vitium sit in liene, & antecedens, & consequens. Antecedens verò vitium infirmitatem, aut in substantia ipsa aliquid latens & contra naturam quod congenerem affinemque morbum accersat, pariat, alat, foueat, & in multos dies ac annos etiam deducat. Si enim quādam congestionem, humoris melancholici sustuleris, quæ autumnalis, aut hyemalis quartanæ febris author esse potest, ferè fit, vt diuturnæ quartanæ focum habeat in liene, sed tanto diuturniores fiant, quanto vitium est interiūs, vt totius substantiæ esse dicatur morbus, & *καταρραξία*, contingat in parte ipsa. Cōsequens autem vitium voco, illud quod sequitur ex longa obsidione & occupatione ipsius partis. Nam non potest fieri vt morbus aliquis in parte diutius stabuletur, quin partem ipsam in qua residet infirmet officiātque, immò deteriorem faciat quā antequam morbus ipse eam occuparit. Dolor autem qui illum sæpè affligebat in sinistro hypochondrio, satis indicabat

subesse quippiam contra naturam. Si verum illud quod scribit Hippo. *Vbi dolor & calor ibi morbus.* Et cum cibum ingesserat, cōquiescebat dolor. Sic enim credeatur esse ab inanitione, quod ingestio cibo mitesceret. At palliativa & fictitia ista erat doloris sedatio. Atque eo modo multa fiunt & adhibentur quæ dolorem leniunt, cum tamen ea non sint legitima illius doloris sedandi remedia. Sed id fit *κατὰ τὸ συμβεβηκός.* Aperto autem cadavere putris & semilacer inuentus lien, & in magnam molem excreuerat, sed corruptione propriæ substantiæ in partes veluti minimas concisus & femirosus videbatur. Præter autem naturale & insitum ipsi lieni vitium, quod corpusculum istud in tantam corruptionem adducere non poterat, sed iuuare tantum, causa erat *περικαρικὴ*, quæ noxam magnam intulerat ipsi lieni. Nam cum fortè in equum conscendisset, vt cum fingeret & moderaretur, artis equestris parum peritus tanta vi ab equo depressus ac decussus est in solum, vt mirum fuerit cur repètè oppressus non sit. Inciderat in latus sinistrum, & pulmo & lien vitium ceperant. Nam lobi pulmonis sinistri adhæferant costis, & in liene sanguis concretus erat qui è propriis vasis effusus, tandem ruptis tunicis quibus concludebatur inopinatam mortem eo quo dicemus modo, intulit.

Ad medium mensis Martij dolere cœpit pedem dextrum, reuera arthritis erat, cæque residua ex febre illa quartana de qua paulò antè dictum est. Nam narrabat se diurnitatis suæ febris quartanæ tædio affectum omnia remedia vndique quasiuissè quibus posset citò (sed non tutò) febre ista defungi. Consultum est vt hauriret cyathum vnum aceti destillati aqua diluti. Reuerà febris visa est extingui. Sed vice illius totū corpus scabie est infectum, nec non ab eo tempore in magnis temporum mutationibus articularibus doloribus est impeditus. Cum ergo duos integros dies magno pedis articulo laborasset, & ad anodyna more solito confugisset, dum cessat dolor iste, paulò post de doloribus hypochondriorum, & præsertim sinistri conqueritur, in neutrum decumbere poterat. Erecta ceruice spirare cogebatur. Murmur erat magum & flatuum Ilias, dolores istos à flatibus esse putabamus, alij verò ab illius refluxu materiæ, & orgasmo materiæ antecedentis, quæ eiusdem erat nature cum ea quæ dolores articulares committebat. Reuerà autem, vt multis colligebatur argumentis, contra para-

doxon Fernelij dolores. isti articulares non à capite erant, sed ab interno corpore. Etenim antè docuimus quomodo cessans quartana febris in arthritin cessèrit. Credibile esse putabamus quod Hippo. in Epid. scripsisset: *Cui intestinū in dextra parte dolebat & articularū morbo laborauit, erat quietior, postquā hic curat⁹ fuit, erat dolētior*: Huius in com. Duas causas Gal. reddit: Priorē, quod duobus doloribus unā non eundem locū infestantibus, maior obscurat minorem: Posteriorē, quod humorum in artus currentium impetus ad colon intestinum conuersus est. Allegabatur illud Hippo. De eo cui pollex in pede affectus tam repentinam mortem intentauit. Et de Caluo cui femur doluit & desinente femoris dolore mentis alienatio subinde est consecuta, & quarto die mors. Actam subita spiritus interceptio, tam subitus dolor, & impotentia decumbendi in alterutrum latus, magnam translationis symptomaticæ à parte affecta, ad ventrem suspicionem afferebat. Et reuerà adiuuans causa esse potuit, datum medicamentum ex Catholicone: totus dies quo datum medicamentum plenus fuit molestiarum & leipothymiarum. Quæ excernebantur erant virulenta: & istas animi defectiones, à motu istius virosæ materiei esse putabamus. Vox faucibus penè hærebat, facies ferè hippocratica reddita est repète. Quod omnib⁹ terrificum fuit. Accusabatur medicamentum innocēs, quod satius fuisset secare venam quam purgare. Duabus tribusue de causis abstinendum fuisse à medicamento contendebant: prima est in generali illo proloquio firmata, quoties duorum solennium remediorum purgationis, & venæ sectionis vsus incidit necessarius, à phlebotomia est auspicandum: quod cum aliàs ex vsu esset, tum maximè in isto casu erat vsurpandum. Nam inflammatio, & dolor qui aderat, & orgasmus maximè phlebotomiam postulabant. Sed inter cæteras causas orgasmus. Nil est enim quod efferos, & tumultuariè agitados humores compescat æquè cito ac phlebotomia. Quod non citò, nec tam facile facit purgatio. Immò purgatio sæpè turbat humores, & motu ipso deteriores reddit. Omnis enim humor prauus motus, deterior seipso fit dum quiescit. Ac præsertim ad sectionē venæ festinandum est, cum per vasa fluxus, refluxusque esse videtur. Quod si in ventre humor est ac veluti à massa secretus, tum per aluum, aut aliā commodam viam, aptè repurgatur. ² Alia ratio quæ nos ad sectionē venæ adducere debuerat, est illud quod vulgò obseruatur, in articularibus doloribus, & vo-

Part. 3.
sect. 4.
lib. 6.
Epid.

Histo. 9.
sect. 3.
lib. 1.
Epid.

Com. 3.
partic.
6. sect. 1.
lib. 6.
Epid.

mitionibus, & cholera morbo, dum humor est in motu, agita-
 tūrque huc & illuc, à medicamentis purgantibus magna infer-
 tur noxa, si tum vsurpantur, cum humores efferi sunt, ac tumul-
 tuosè euagantur. Nam rursus agitati à medicamento effe-
 rantur magis, & naturæ vis inferitur, vt quæ lædatur valdè ob
 dolores varios quos modo in hac parte, in quàm repit humor,
 perferunt, modo in illa in quam suam tyrannidem humor illa-
 bens exeret. Immò fatiscit sæpè natura in eiusmodi purga-
 tionibus repente factis dum humor ⁱⁿ, nisi expectes sedatio-
 nem aliquam & quietem ipsius humoris. Quod si tibi certò
 constaret medicamenti vsu humorem vagantem variâsq; in
 partes deductum, in ventrem liberumque spatium impulsum
 iri, quo natura sese illo facillè expediat, tunc tutò purgabis. Sed
 quia sæpè dum tu intendis auocare humorem, & in alium
 intestinâque tanquam idonea & conferentia ad euacuandum
 loca, intruditur humor in partes inanes & membranarum in-
 terstitia, vnde crudelissimi oboriuntur dolores, præclare con-
 sulunt, vt coquatur humor: id est mitigetur, reprimatur, mo-
 dificetur; (nam coctio propriè dicta humorum est crassorum,
 non autem, tenuium & efferorum,) ne impellatur, quò non
 oportet, & maiores in ea parte excitet turbas quàm antè, & vis
 naturæ inferatur. Propterea ita audire oportet sententiâ istam.
 Alioqui facillè quis persuaderi possit, tum maxime purgationi
 locum esse cum turbatur & vagabundè incitatur humor. Ideò
 dum in arthritide dolores implacabiles excitantur; mo-
 do in hac, modo in illa parte, propter raptum humorum,
 conferret (dicet aliquis) humorem purgare: non expecta-
 re donec quiescat, quia fortè serò nimis id fieret, & metus
 est ne dum ita fuerit effrænis humor, nobilem partem obsideat,
 antèque illam suo virore contamineat quam opè subsidiūq;
 præsens afferre possis. Ratio autem ista versatur in Aphorismo
 Hipp. *Concocta medicari oportet, non cruda, neque in principiis, modo*
non turgeant. Dum addit, *modo non turgeant,* videtur insinuare oc-
 casionem purgandi maxime dum iactatur humor, nec consistit. 22. li. 2.
 Ac si dicat Hippo. tum maxime purgationi locū esse cū impetū
 humores faciunt, & dolores suo motu excitant: Nā motus iste
 quodammodo adiuvabit & attractionem & exclusionem. Cō-
 tra si figi humorem fuerimus, & tempore ad eum exigendum
 opus erit, & maiore vi amolendi humorem, iam consistentem.

& fixum. Cui opinioni Galenus subscribit nos admonens, vt primo quoque tempore accingamur ad amouendos vacuandosque humores qui insolenti motu & tumultuario huc atque illuc feruntur: verba Galeni hæc sunt: *Tales humores euacuare conuenit, hoc est, qui agitantur, & de loco ad locum mouentur, ac transfuunt. Eos verò qui sunt aliqua in parte firmati, nec alio auxilio mouere oportet, nec medicari ante coctionem. Tunc enim naturam habemus euacuationi adminiculantem, &c.*

Atque ex hoc loco adduci facilè possumus, vt in clamofis ipsis arthritidis doloribus corpus repurgemus. Tamen cauendum id est valde: alioqui dum commouebis humores, verendū est ne eos inflammes, & in partem affectam incites & impellas, & consistendum in eo quod diximus antè: Si dum purgans medicamentum damus, nobis constaret mitificatum esse & quodammodo repressum humorem qui tantas in corpore excitat tragædias, & liberos esse exitus, tutò id quidem fieret. Sed cum in artus, aut per vasa, aut per inanitates feratur, metus est ne augeatur fluxus: Ideò videndum, vt dolores placentur (quibus infirmum corpus redditur) quos excitat materia coniuncta, & è vasis elapsa, at tutò tum ad antecedentem concurret. Quanquam concedimus clysmata, aut eccoprotica, non ea quæ calore suo, & vi incitent magis humores & commoueant. Ac præsertim cunctari oportet, & à valido medicamento abstinere cum materia est valdè effera nullumque pepasmū admittit. Contemperanda est potius, deinde contemperata mitificataque impuniùs euacuabitur. Materia autem arthritin faciens ferè illius modi est. Et eo fortè in sensu Hippoc. eos qui prauo vtuntur cibo ægrè medicamenta ferre scribit, nomine eorum qui prauo vtuntur cibo, iis intellectis, & qui prauos assumunt cibos, & quibus intus tanquam diarium reconditi sunt humores prauis, qui nomine *τῆς τροφῆς*, maximè comprehenduntur Hippoc. libro *περὶ τροφῆς*. Sed ista relinquamus.

Aph. 36.
lib. 2.

Mors quæ repente ingruit non fuit (quemadmodum putabamus) recursus illius materiæ quæ in pede dolores excitaue-
rat, aut suppressæ materici virulentæ & antecedentis cōmotio, sed ruptâ veluti vomicâ interiit. Etenim pulsatio erat in hypochondrio sinistro adeo potens, vt quæcunque ei hypochondrio superessent ea subsultarent: & pulsatio talis percipiebatur, qualis in abscessibus ad suppuratū tendentibus. Sed quæstio vnde

collectio ista sanguinis. Eam ad casum prædictum referemus, vt idem ei contigerit quod & Barnabæ Pantho confarcinatori, (de quo ante) qui apostema annum ferè fouit ac aluit intus à casu inflictum, quo repente interiit. Et reuerà casus iste iuuare potuit, & infirmitas lieni innata quæ tam diurnam febrem quartanam fouerat. Quanquam audio illum solitū esse queri de sinistro hypochondrio ante casum istum. Sed infirmitas & debilitatio partis & mala diathesis maximè effecit, vt res admodum leuis, & occasio exigua tam formidandum malum aduexerit. Nunquam memoria nostra tam altè palpitans pulsansque hypochondrium contigeramus. Vt mirum non fuerit si ei pars hæc doluerit semper, & si ita repentinæ cladis interitusque causam intus fouerit. Ac initio quidem tanti momenti rem esse nō putabamus.

Sed quemadmodum Galenus annotat, *In doloribus ita obortis nec precipitanter timidum, nec temerè securum esse oportet.* Ac nos

Com. in
historiā
5. sect. 3.
lib. 3.
Epid.

fateri oportet mali essentiam ignorasse deceptosque similitudine tantum. Idem de se confessus est Hippocrates, ait Celsus, more magnorum virorum & rerum magnarum fiduciam habentium, quibus nimirum conuenit simplex erroris veri confessio præsertim in eo ministerio quod vtilitatis publicæ causa memoriæ traditur. Quod si cuiusmodi euentus rei foret animaduertissemus, nec rem in certa desperatione positam antè nouissemus prognostico (quod aiunt) reliquissemus. Nec illud euenisset, magnā artis nostræ quæ multis est auxilio, calumniā, quod contigit: Nam tribus à venæ sectione horis, de repente arteria vasisque aliis, vt credibile est, in lienis regione ruptis interiit. *Turpis autem est calamitas*

Cap. 4.
lib. 8.

dato medicamento eodem die agrum interire, ait Hippocra.

Lib. de
medica.
purgantibus.

Idem de phlebotomia solenni remedio dici potest. Et quemadmodum præclare scribit Celsus: *Prudentis est hominis primum eum qui seruari non potest non attingere, nec subire suspicionem eius vt occisi, quem fors ipsius peremit.* Aliaque commemorabilia illic

Cap. 26.
lib. 5.

scribuntur: Sed mirum quod contigit: Natura conabatur per vas venosum in capacitatem reiectare eum sanguinē qui sua copia & quantitate molestus erat: vnde adeo intumuit induruitque ventriculus, vt faxeus lapideusque esse videretur: Sed, credo, libera non erat via qua id præstaretur. Ac plerique erustatione viscerum in ventriculum aut san-

guinis, aut humoris à subita repentinâque morte sunt vindicati.

Cap. 1.
lib. 6.
loco. aff.

Atque eum in sensum ita scribit Galenus de euacuatione sanguinis ex corpore lienis, eâque naturali: Lien, ait, hepatis exemplo excrementa ex se reuult, ita ut & vomitione melancholicum sanguinem aliquando excernat, qui interdum per inferiora quoque decedit. Et alio loco ita scribit, Sunt qui putent nequaquam fieri posse ut sanguis vel ab hepate, vel à liene effluens per ipsum euacuetur: similiter de pure ab ipsis erumpente existimant: Verum per artis exercitationem utramque opinionem contempnanti mihi, visa est per ipsum ventriculum fieri euacuatio ex dictis visceribus. Non dicit an id commodè fiat, an non. Sed generaliter de his dictum in aphorismis:

Cap. 6.
lib. 5.
De loco.
aff.

Aph. 25.
lib. 4.

Sanguis quidem supra, qualis unque fuerit malus, infra bonus. Tamen aliquando videmus excerni. Et iuuari ægros plurimum tali excretionè, si modo sint ferendo: Item si non sit perennis generatio, sed tantùm congestio. Quomodo & Galenus docet prauas etiam vrinas tum colore, tum substantia, tum cõtentis laudabiles esse ob eam commoditatem quæ inde consequitur. Nam, ut ait, tales vrinæ excernuntur viscere aliquo ac præcipuè iecore sese repurgante facultate sua expultrice.

Cap. ultimo l. 5.
loco. aff.

Videc. 3.
lib. quod
animi
mores.

At verò in dextro hypochondrio *πλευρῆς*, erat iste & pulsus qui aneurisma subesse declarabat. Itaque ne quis decipiatur eadem ratione qua nos decepti sumus de aneurismate, palmo & pulsatione valida in parte aliqua, paucis est expediendum. Hippocratem dicunt aut nunquam, aut rarò in libris qui extant meminisse, τὸ σφυγμῶν, eo modo quem accipimus, & Galenus ipse accepit in longa enarratione de pulsibus:

Hac Gal.
cap. 9.
lib. 6.

De Decretis
Hippo
Sectio. 5.
lib. 2.
Epid.

Lib. 2.
de Dia.
ta acut.

Cap. 9.
lib. 6.
De Decretis.

Sed quoties nomen τὸ σφυγμῶν, reperitur in germanis libris Hippocr. pro manifesta & sensibus conspicua arteriarum pulsatione sumitur. Sic in Ep. scribit, Cui vena in cubito pulsarit, insanus & iracundus est, Græcè, ἡ φλέψ σφύζει: Utitur verbo σφύζει. Et in libro acutorum loquens de vsu vini meracioris, ait, hoc autem meracius sumptum *πλευρῶν τῆς φλεβῶς*, id est, *λευκῶν σαφῶς* facit: Et alio loco dum loquitur de iis qui plus solito comedunt, οἱ κρόταροι πάλλονται, id est, αἱ ἀρτηρίαι ἐν τῆς κροτάροις κινῶνται καὶ σφύζονται, arteriæ temporum micant & pulsant manifestò nomine τῆς φλεβῶς ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας, vetustè sumpto. Et Hippocrates τὸ σφυγμῶν, nomine, generaliter *πλευρῶν* continet καὶ *πλευρῶν δὴ κίρσων*, ut vocat Galenus

Galenus

Galenus in Aphorismis (vt paulò post dicemus) omnémque motum cordis & arteriarum, siue is naturalis sit, siue contra naturam. Quamquam vt propriè accipiatur nil nomen *σφυγμῶς*, homonymon habet vt contra Agathinum disputat Galenus. Agathinus enim nomine *σφυγμῶς*, & pulsus propriè dictum, & palpitationem, & vehementem istum motum qui in furiosorum hypochondriis percipitur comprehendebat. Et tamen ea in re Hippocratem fortè secutus est Agathinus. Sed debuerat nosse Hippocratem nondum de proprietate τῶν σφυγμῶν statuuisse. Galenus verò diligens scrutator doctrinæ de pulsibus, rerum distinctiones diligentius persecutus est.

Sed de pulsante hypochondrio, seu palpitante, nunc plenius dicamus, huius meminit plerisque in locis Hippocrates. Propriè autem palpitans hypochondrium, vel cum pulsus percipitur à medico, aut ab ægro eo modo quo dum contingitur arteria in carpo, vel cum tumultuariè palpitat hypochondrium, vt idem percipiatur quod in corde dum palpitatorio motu agitur vitio vel existente in corde ipso, eiusque ambiente membrana, vel aliundè elata materia subiecta que in cor. Ac primum de Sileno; *Hypochondrij contentio submollis utrinque promissa ad umbilicum.* Gal. in comm. de contentione illa Hypochon. & de palpitatione assidua eiusdem Hypochondrij loquens, (nam Hippoc. addit sub finem historiæ, *Hypochondrij perpetua palpitationis fuit,*) Ita scribit: *Palpitationis illa perturbationis, vel delirij signum fuit, videtur & aliqua inflammatio fuisse in septo transverso.* Dum enim, ait Hippo. *Submollis contentio Græcè τῶν ἀνωτέρων, id est, τῶν ὀφθαλμῶν, subuacua, id est, citra tumorem qui tumor adest cum hypochondria inflammantur. Sed ubi inflammatione septi transversi hypochondrium per continuitatem sursum trahitur, contenditur absque tumore.* Atque illo loco apparet hypochondrij palpitationem perturbationis signum esse aut delirij. Et hoc in acutis morbis verum est. Hinc Hippocrates in prognosticis ita scribit: *Si pulsus insit hypochondrio, Græcè, ἢ σφυγμῶς ἐν τῷ ἐπιγαστρικῷ, perturbationem significat, aut delirium, Græcè δόρυλον ἢ μαεφροσύνη:* pulsus intelligit perceptionem motus arteriarum, aut à medico, aut ægro sine admotione manus. Quidam legunt non pulsus, sed palpitationem, vt legatur eodem modo quo & in historia de Sileno cui erat palpitationis in hypochondrio assidua, eaque aut perturbationis, aut delirij erat velut antesignanus & prænuntia, quan-

Com. in
Apho.
s. lib. 4.

Cap. xi.
lib. 4.
De Diff.
ferentia
puls.

Hist. 2.
sectio. 2.
lib. 1.
Epid. 4.

Paris.
ant. 31.
lib. 1.
pr. gnosis.

quam de vera palpitatione hoc non potest audiri: hæc enim à spiritu crasso & flatulento fit. Sed pulsus & palpitationis nomine audienda vehemens & pèceptibilis quædam motio arteriarum, aut magnæ arteriæ dorso incumbentis, eo modo quo in magnis inflammationibus, ac præcipuè cum ad suppuratum tendunt, contingit. Nec enim omni inflammationi pulsus adest, sed si ea sit ingens, & suppurato proxima, vt ait Gal. Atque apud Galenum locus est præclarus quo docet palpitantem motum in magnis inflammationibus contingere: cõsentit enim iis qui istum Aphorismum ita interpretantur: *In fibribus circa ventriculum, & fortis æstus, & cordis morsus, vel dolor, malum: nomine vñ ut dicitur, audiunt quidam (ait Galenus) crebrum & velocem cordis motum & præcipuè palpitationi similem. Ac tum extremum malum significatur, vim scilicet vitalem maximo incendio laborare.* Ergo pulsus seu palpitatio, seu perceptibilis motus arteriarum in hypochondrio delirium faciliè declarat & perturbationem: delirium quidem si cætera consenserint. Ideo subiunxit Hippoc. Sed oculos inspicere oportet, &c. Sed maximè delirium significatur, si inflàmatio sit, aut in ventriculo, aut in septo tràsverso, eaque quæ in ventriculo satis insignis, vt in cõmentario scribit Galenus. Iecur & lien, & magna arteria partes sunt in corpore quæ mométaneæ sunt, & maximè magna arteria, ait Galenus, quæ si inflàmata fuerint fortè non illud deliriũ quod aut vètricus, aut diaphragma inflàmata afferunt, inducet, sed perturbationé. Quanquã si insignis inflàmatio fuerit, perniciosum & lethale est. Et nomine perturbationis Galen. *Vult intelligi cõmune accidens periculosarũ omnium affectionum ex quibus non modò ægri, sed & medici perturbantur: Vt delirium & insania sit quid maius quam perturbatio: sed ipsa perturbatio adest proximè ad delirium accedens. Volunt quidam perturbationem significare timorem quendam de periculo mortis, & ipsius ægri perturbationem, nempe corporis ipsius. Atque duo hinc notare oportet, prius cur Galenus dixit perturbationem dici relatiuè, & ad ægros, & ad medicos. Hoc enim ridiculum videtur: Posterius quid sit intelligendum, per verbum vñ. De priore dicam. Miror cur Gal. dicat pulsus significare perturbationem, id est, vt perturbetur & æger tum animo, tum corpore, & medicus videns ipsum pulsus hypochondrij. Nam idem Galenus, Ridet similem interpretationé dicti Hippocra. in Prorrh. &c. Faciet colicæ*

Cap. 1.
lib. 3.
Method.

Part. 14.
lib. 4.
Prorrh.

bonus, & mœstitia multa, malum. Subsannat enim interpretes Hippoc. qui referebant nomen mœstitiæ ad medicos, & ad ægros: ad ægros quod qui colore rubro saturati sunt faciliè in melancholiam incidant, dum corpus perspiratione caret, vt docet Galenus *mœs. de Epist. Spar.*: & ad medicos, vt qui doleant & terreantur, cum viderint bonum colorem in ægro præter rationem Posteriùs est de verbo *intra*. Vtitur enim verbo isto cum magna energia & significationis vi: Significat enim vel pulsus, vel palpitationem profundam, vt excludatur pulsus & palpitatione musculorum abdominis, qui aut pulsantes, aut palpitantes, nec delirij, nec perturbationis signum dant vllum. Prætercà in tertio Epid. dum loquitur de Philista ait, dextrum hypochondrium, intrò contractum est ac inclinans: & in Com. Gale. ait, Hypochondrij contentiõnem fieri cum septum transuersum alias partes conuellit: tenditur autem septum per idiopathiam & sympathiam. Per sympathiam ratione pleuritiidis ob inflammationis magnitudinem, & ob neruorum ipsius tensionem. Per idiopathiam ob ipsius inflammationem. Denique inflammatio lienis, hepatis, & septi transuersi eam contentiõnem hypochondriorum afferre solet Galeni opinione. Denique vt generaliter dicamus quoties apud Hippocratem legitur, Hypochondrium hoc vel illo modo contentum esse, in eo febrilis affectionis sedem esse oportet, ait Galenus. Comment. in histor. de Hermocrate, hist. 2. sectio. 1. lib. 3. Epid.

Atque sunt plerique alij loci, in quibus palpitantis Hypochondrij meminit Hippo. vt in historia eius qui in dealcis hortu iacebat, lib. 3. Epid. scribit, *Ad umbilicum perpetua erat palpitatione. Et in Coacis, iuxta ventrem in febre palpitationes, mentis emotiones inducunt, Sanguinis autem fluxio horrorem efficit. Item, dolores circa umbilicum palpitatorij habent, & aliquid mentis emotorium, &c.* Ac de ægro nostro hoc verum fuit quod & in Coacis Hippo. scribit: *Quibus præcordiorum dolores, oris ventriculi, hepatis, parium circa umbilicum hi sanguine per aluum egesto seruantur, non egesto moriuntur.* Quis enim dubitat quin si per venam aliene in ventriculum tendentem, aut per aluum fluxisset, sanguinis copia seruatus fuisset? Atque ad perpetuam memoriam hoc est menti insigendum, quoties quis etiam dum rectus agit de dolore hypochondriorum præsertim profundo conqueritur, oportet non temerè securum esse, sed verendum est de reali-

Hist. 13.
sect. 3.
lib. 3.
Epid.

qualatentē. Declarat hic noster æger, & Apollonius in Epidemiiis cui consuctus dolor erat ad dextrum Hypochondrium, & hic mortis causa tandem fuit, cum leui alia de causa laborasset. Nam mirantur aliqui sæpè nos leui de causa in morbos incidere: at hæc perse non est causa sufficiens: Etenim, ait Galen. *Sunt quedam quæ per se ipsa comittere morbum nequeunt, quæ si ad corpus, morbo opportunum accesserint, totius causam morbi creduntur sustinere.*

Com. in
part. 15.
sect. 1.
lib. 3.
Epid. &
Et com.
ad Hi-
storiã
de Sile-
no lib. 1.
Epid.

Duo nunc restant breuiter explicanda, prius de sanguine cur non conuersus in pus fuerit tanti temporis diuturnitate: posteriorius de aneurysmate. De Priore dicam, Hippocrates ita scribit: *Si in ventrem sanguis præter naturam effunditur, necesse est suppurari* Græcè *ἐκσπύραι*, id est, *ἐξασπύραι*, corrumpi & in pus verti. Ac primum nosse oportet id quod placet Hippo. Si vnquam sanguis à propria cavitare in aliam quamcunque peruenit, omnino est impossibile vt sanguis permaneat. Sed an necesse suppurari? Non placet Galeno, cum suppurari nomen sit vnus mutationis in sanguine factæ. Itaque generalius referunt ad *τὸ ἐξασπύραι*, id est, vitiari. Sed tribus modis vitiatur sanguis, aut enim in pus vertitur, aut liuescit, aut grumescit; grumescit autem præsertim si in magnam cavitatem ceciderit. Atque non mirum si in ægro nostro non suppuratus fuerit sanguis, sed nigrefactus, & in grumos versus: erat enim magna pars eius in amplam cavitatem elapsa. Nec necesse fuit in grumos verti quod quibusdam placere visum est. Et Galenus ait, dolor pulsans inflammationis est comes, suppuratio autem magnarum tantum inflammationum comes est. Sic sanguis in ventrem illapsus non propriè suppurat, nisi adsit inflammatio magna. Cæterum in magnis inflammationibus, & phlegmonis sanguis per minimas partes dispergitur in eas cavitates quæ sunt in musculis quas sola ratione contemplantur: sed in ecchymosi in spatia quæ vasis circumiacent effunditur, vt ait Galenus. Ac obiter ne quis dissimilitudine vocum decipiatur aliud est, *ἐκχυμωσις*, aliud, *ἐξχυμωσις*. Nam *ἐκχυμωσις*, significat suffusionem humoris non egressi è propriis conceptaculis, (vnde *τὸ ἐκχυμωσις* vocat) *ἐκχυμωσις* autem significat effusionem humoris è propriis conceptaculis eo modo qui dictus est. Et Galenus vocat *τὸ ἐκχυμωσις*, ex vasculis effusiones & inanitiones. Sic quando diu sanguis à natura regitur ac præsertim si in magnam capacitatem effusus fuerit, non vertitur in pus, aut aliquid simile,

Apb. 20.
lib. 6.

Gal. in
Com.
Aphorism.
lib. 1.
lib. 1.

Cap. 3.
lib. 2.
De locis
diff.

Com. in
Apb. 20.
lib. 6.
Et com.
in part.
9. sect. 2.
lib. 6.
Epid.
Lib. de
hamori-
bus.

præsertim si inflammatio, aut ingens fuerit febris, quæ sanguini vt & humori omni facile malam qualitatem accersat, sed manet in grumos versus. Ac in ægro nostro multus erat effusus, deinde rursus aneurismatis ruptio repentinam mortem attulit. Sic iste magnus & apparens pulsus non delirium significabat, sed contineri aliquid contra naturam in capacitate ista, & arteriam dilatatam valde. Ac fortè de isto egro audiri potest

Aphorismus lib. 4. *Quibuscunque ex morbis acutis, aut diuturnis, siue quouis alio modo extenuatis nigrabilis, siue vti sanguis niger desubter exierit, postridie moriuntur.* Sed inter cæteros locos vnus est commemorabilis libro primo de morbis: *Sæpè quibus venarum aliqua rupta est à laboribus, aut exercitiis, cum coaluerit alio tempore iterum rumpitur: Vbi verò iterum rupta est sanguinem fundit, & statim pereunt sanguinem multum fundentes, pus autem per totum diem excernentes, cõsimili modo pereunt, Vtenti in aliis morbis dictum est.* Hæc Hippocrates. Ceterum de aneurysmate,

aut aneurymate cum litera, y, dicendum puto, quod ad tumorum genus relatum sæpè videtur, & tamen de eius vera essentia nondum planè constat. Galenus de aneurysmate, ita agit: *Cum quis secare venam ratus arteriam vulnerarit, agrè confestim sanguis compefcitur. Tamen si res optimè cadat perducta nimirum ad cicatricem diuisione, tamen aneurysma fit.* Sic ea essentia est aneurismatis, vt dilatatio vulnusque etiamnum ipsius arteriæ adsit, cutè ad cicatricem perducta. Magna porro quæstio est, an in aneurysmate sit dilatatio solùm, potè vena, aut arteria, ob sanguinis impetum valde ampliata, ac dilatata, an reipsa sanguis è vase sensim profiuat profiliatque. Et id pertinet ad ea de quibus iam à nobis actum est, dū quæreremus an necesse sit sanguinè è proprio vase elapsum, sed tamen aliqua ratione in capacitate retentum ac cohibitum, putrescere. Si enim in aneurysmate sanguis & spiritus è vase effluxit, si corrumpitur, cur nõ abscessum facit, & pus fit? Quæ ratio impulit Fernelium, vt credat id non fieri: *Credi vix potest, ait, per varicem & aneurysma ruptam aperiamque esse venam aut arteriam. Si enim sanguis è vena aut arteria persiliens, non amplius illis contineretur mox corruptus putresceret, tumoraue fieret generis diuersi.* In quo à Galeno in duobus dissentit. Eam esse aneurysmatis naturam statuit, vt sectæ arteriæ vulnus maneat, arteria nimirum, nec coëunte, nec glutinata, nec carne obturata: Si vulnus manet, ergo vt sanguis, & spiritus de,

Aph. 2. lib. 4.

Cap. 22. lib. de sang. miss.

Cap. 9. lib. 7. Patho.

Lib. 2. de tumo- ribus contra naturam

filiat necesse est. Tamen hoc absurdum esse Fernelius contendit. Posterius in quo dissentit est, quod si sanguis efflueret, putresceret, & abscessum diuersi generis faceret. At iam superius ex Galeno docuimus non esse necesse, vt sanguis è vasis suis elapsus putrescat ac suppuret. Alias enim mutationes subire posse sanguinem à pure demonstrauit. Tamen probabilitate quadam nititur opinio Fernelij. Si enim maneret arteria aperta, intra dies aliquot, aut intumesceret valde pars, aut si præ conformatione obsequi ampliùsque dilatari non posset, creparet diffringereturque media. At aneurysma diutiùs etiam durasse oculata testatur fides. Aut igitur ita vulneratum vas conuiuet, vt parum admodum transfiliat ac exudet, aut si vas apertum hiànque supponitur, breue intrà tempus abrumpitur tumor: vnde Galenus lib. de sanguinis missione asserit se aduocatum esse vt arteriæ vulneratæ mederetur in malleolo, quod sanguinis cursus non posset cohiberi, credibile est aneurysma fieri non potuisse, quòd aperto nimis arteriæ corpore sanguis & spiritus largiùs coffunderetur. An verò necessario è vasis propriis effusus sanguis putrescat, alius fortè est loci atque temporis. Cæterùm aneurysma à varice seiungunt, quòd varix ad venæ dilationem referatur, eamque à sanguine, aneurysma autem ad arteriam dilatatam idque copia spiritus & sanguinis tenuioris. At varix in cruribus propriè intelligitur, quanquam & ad alias partes potest pertinere. Hippocrates dilatationem venarum in pulmonibus veluti varicosam astruit, idque *αραιωσις*, vocat *αραιωσις* *αραιωσις*, quòd præ dilatatione diuellantur membranæ præ sanguinis copia ibi inundantis. Et sic in omnibus corporis partibus ob violentum aliquè conatum ille *αραιωσις*, seu, *αραιωσις*, potest contingere. Et eodem modo sese res habet in aliis partibus ac in cruribus. Acetius de aneurysmate abundè differit, & eius interpretes communiter vasorum dilatationem vocat: vel quòd omnis vasorum dilatio aneurysmatis nomine præhendi possit, vel quòd aneurysma æqualiter, & ad arterias, & ad venas pertineat, vel quòd cum aneurysmatis naturam constituat arteriæ sectio, alia simul vasorum sit dilatio & explicatio. Atque in omnibus corporis partibus aneurysma fieri posse docet, sed in quibusdam peculiariter. Deinde subdit: *Oritur autem omnino vasorum dilatio, aut dum sanguis & spiritus ex arteriis*

Com. ad
Aph: 10.
lib. 6.

In libris
de mor-
bis.

Cap. 10.
sermo. 3.
Tertab.

*perfulsant, aut dum oscula earum rumpuntur, aut aperiuntur. Sanguis autem & spiritus paulatim excreti sub cute colliguntur. Et tunc signa sunt certa eius rei, (de quibus eo loco) ut tumor parvus aut magnus, concolor, indolens, ad tactum mollis & spongiosam laxitatem præ se ferens. Digitorum pressui cedit, ut ferè euāescat, sed amotis digitis statim reuertitur: Id quod in aneurysmatis quæ sine vulnere sunt apparet. Sed cum arteriæ vulnus præcessit, & deinde coalescente cute vasorum dilatatio contingit, tumor non similiter mollis percipitur. Sanguis enim copiosior spiritu est, qui in grumos coit, & tumorem attollit. Sic explicat clarissimè aneurysmatis naturam, & paucos animaduertisse credo illius morbi veras notas. Et ex eius doctrina licet aneurysmatis omnis duplex genus statuere, ut aliàs fit cum vulnere arteriæ, atque tunc plus sanguinis quam spiritus est, coefferuntur enim ratione vulneris: vel sine vlcere est, quod fit, ait, ob conatum, aut causam externam, aut internam. Internam ut in melancholicis in quibus malignitas est sanguinis. Atque fit vera dilatatio, & effluxio spiritus & spirituosi sanguinis per quandam *διεσπασμένην*, quandam speciem *αυατομυρίας*. Quamquam in quibusdam sine apertione manifesta, aut ruptione potest fieri dilatatio eo modo quo in varicosis venis. Quis enim dicat effluere è vasis ruptis, aut erosis, aut apertis sanguinem? Quæ opinio impulit Fernesium, ut crederet non exilire è vasis sanguinem in aneurysmate. Sed errat Fernesius, & quicumque credit, aut in omni aneurysmate esse effluxionem reipsa factam, aut nunquam effluxionem esse. Vtèrque enim grauitèr errat rerum ignoratione & neglecta autorum auctoritate. Cum Hippoc. ut paulò antè memini & docet in pulmonibus *αυατομυρία*, fieri & vasorum *αυατομυρία*, (vulsuram ad verbum Cornarius vertit) ut in vasis sit tanquam quædam varix (Græcè *υρίδις*) si ea in parte magna dilatatio fiat, quis tandem non opinetur verum aneurysma fieri? Atque cum arteria dilatata est valdè tum in signis pulsatio adest. De aneurysmate, quod *ἀνοήτου κύστεως*; ducitur quod ampliare, & dilatare significat, ut potius per *τὸ υ*, quàm per *ρ*, scribi oporteat, abundè clarissimus Gorraeus in definitionibus medicis pertractauit. Atque inter cetera bellè explicuit quomodo differant aneurysmata in quibus iam cõclusus sanguis est, & in quibus sensim*

influit ac effluit spiritus in capacitatē coalescēte iā carne.

Quod ad partes aneurysmata pertinet, cū alia externas corporis occupent, alia internas, cum in omnibus difficilis admodū curatio sit, maxime verò in partiū internarum aneurysmatis. Quæ in caput & guttur incidunt ea medentis manum non admittunt. Quæ ad internas partes spectant, ea derepentē & minime opinantibus medicis ægros ad exitium præcipitant.

Quæri hoc loco potest, an si in sinistro hypochondrio lateat, tutò sectio fieri possit. Hippocrates in libris de affectionibus vrit sæpè regionem hepatis, renum, & lienis: sed in earum partium aneurysmate minime, hoc tutum non est.

Remedia ægro instituta, cum tamen non ei latenti & incurabili aneurysmati occurreretur, hæc sequuntur.

Iniecta enemata carminatiua quæ ob dissipationem flatuum quibus ille abundabat, aliquam allucationem attulerunt.

Dolenti lienis regioni fotus ex anodynis ex rad. bryoniæ, scolopendrij, florum chamæmel, baccarum lauri, iuniperi, semin. rutæ adhibentur.

Applicantur frequenter cucurbitulæ: & iis remed. alleuatur.

Opiata hæc instituta:

L. Myrobalanum emblicam unam minutim concisam, conseruatum buglos. viol. menuph. & anthos. an. ʒ ij. corticis citrij conditi ʒ ij. rasura eboris, cornu cerui, margarit. elect. an. ʒj. ossis e corde cerui. ʒ ss. pulueris diarrhodonis abb. & leitiæ. an. gran. ʒ. ambra griseæ gran. ʒ. cum syrup. conseruationis citrij, fiat opiata.

Mirum hoc est, cum remedia à nobis instituta directè non oppugnarent morbum, cum ille medicis incognitus foret, vt euentus probauit, quomodo tamen fotuū vsu se leuari diceret. Caue ne nimium credas ægro, & non interim diligenter animi neruos intendas ad inuestigationem morbi, vt non cesses quandiu certis notis morbum deprehendas. Sunt enim plerique qui malum lenientes quibusdam remediis fatis ægro factum credunt: atque interea miserrimè ægri opprimuntur mortèque rapiuntur. At hoc non satis. Et hac vna re multi sunt decepti, qui applicito vno remedio videntes dolorem leniri, ab inuestigatione ideæ morborum desistunt. Quod multos in vitæ discrimen adduxit.

Ethæc Historia à nobis adducta cautiore nos & diligentio-

res debet reddere, ne cum ignoratione nostra iuncta sit agrorum calamitas magno cum artis vituperio, quam tanta hominum coluit celebritas.

Atque ad historiam morbi hoc quoque addi potest, forte usu cucurbitularum & fotuum, & cataplasmaton ex radice Bryoniæ (quæ omnia confusè administrata sunt vt nihil non agere videremur) attractionem maiorem factam fuisse, & mortem acceleratam. Quod in primis Aëtius commemorat, & hoc loco sicè non est prætereundum, ne sinamus longius manare errores qui quotidie committuntur: *Vidisti tu eodem tempore cum fomentum cuidam adhiberetur eum difficulter spirasse omni superfluitate ad præcordia per calorem attracta. - Hic itaque mortuus est cum cataplasmata instar cucurbitæ superfluitates ad partem attrahant. Quidam etiam ipsa cucurbita usi sunt in præcordiis, hoc vnum ipsi cogitantes vt aliquid circa agros agere viderentur.* Aëtium die 12. May 1575.

ANNOTATIONES.

¹ Hipp. sectio. 3. lib. 2. Epid. Narrat quartanam quoque febrem longam facta impetu in vniuersum corpus, & tumore qui ad lienem eras euanescente desisse.

Idem contigit Ioanni Meresse, cuius totum corpus lassitudine *δυστορία*, laborabat facta translatione à centro ad totum corpus. Et 4. Epid. notat. De quodam seruo quartanario cui febris conqueuit cum factus esset *νυκώδης*, aut *νυκώδης*: id est stupidus, vel in totum corpus translata materia, vel in caput. Vnde comatosam & catalepticam induxit affectionem.

² Hinc disces in metn arthritidis, non nisi cum cautione purgandum quoniam irritatur sæpè materia: Vide librum 2. meorum Epidemiorum.

³ Hoc aduerbio, impunius vititur Cicero. 2. de Diuinatione.

⁴ In Coacis dum de lethargo disputat vititur nomine *απολυς*, propriè accepto.

⁵ De palmo summo & admirabili ad umbilicum & os pectinis narrat, sed rationem non reddit Hippo. 7. Epid. initio in historia de filio Eraioli dysenterico.

⁶ Et Hipp. notat 5. Epid. Vxori Gorgiæ pulsum in utero existisse, id est, motum arteriarum manifestum post menses suppressos. In vxore Philini historia 4. sectio. 3. lib. 1. Epid. die 14. palpitationes fuerunt, sed eas ad crassos & crudos succos in Com. Galenus refert.

⁷ Magna arteria pars est principalis, com. in part. 31. lib. 1. *προγνωστ.*

⁸ In Collegio Rhemensi cuidam sacerdoti aneurysma erat in cruribus. Aperto cadauere reperta est magna dilatatio arteria, & sanguis in ea arteria concreuerat indurueratque: Indurationis causa tribuebatur immo-derato rerum refrigerantium vsui.

⁹ Multi falluntur in principio aneurysmatis à sectione arteria non orti. Credunt enim non esse aneurysma, sed tumorem tantum aliquem præter naturam. Si enim à sectione arteria non incipit non est necesse ut sit ea pulsatio quæ adesse solet arteria vulnerata.

¹⁰ Questio est an in omni aneurysmate necessaria sit pulsatio, sine hac enim ne aneurysmatis quidem rudimentum esse posse contendunt.

CONSILIVM CVIII.

De febre maligna.

Nobilis vir D. de Cernenay, ad insigne crucis viridis cū accubisset vxori suæ exanthemata patienti in febrem degenerem incidit. Erat continua, sed exacerbationes habes noctu. Dolores quidam erant circum nothas costas, sed ij adeo parum erant molesti, vt medicos non adduxerint vt eis mederentur. Corpus erat planè bile ac ictero infectum: Præcalida habebat viscera, & ante quartana annua laborarat. Pulsus erat parum elatus, non feбри, ac calori, ac linguæ respondens. Qui sanguis detractus est biliosa sanie plenus erat & corruptus, deiectiones planè biliosæ. Et quod nos terruit quinto aut sexto die inopinato sputum reddidit permixtum sanguine & bile, & parum nigricans. Pleuritin esse dicebant quod febris esset, & tussis: At ista tussis erat à collecta corrupta ista materia in pulmone. Reuera si pulmonia aut vera pleuritis cum adorta fuisset in tanta materiei in pulmone collectæ corruptione, intra paucos dies interiuisset, accedente maximè pulmonis imbecillitate. Sed quoniam nondum aderat occasio, vt aut costæ aut pulmones laborarent, febris tantum continua occupauit vera & essentialis. Dicat quis, quid illa sputa tam praua & horrenda designabant? Si sputum album esse debet, & omnis expertinctura, si vomitiones humorum qui colores alienos habent, aut graueolent male sunt, cur non & excretio alieno colore

inbuta? reuera si ista colorum prauitas inflammationis comes fuisset, aut si actu inflammatio pulmonemprehendisset (vt antè dictum est) vix vlla vitæ salus sperabilis fuisset. Sic erat excrementum collectionis, non subitæ generationis, aut inflammationis consequens. Atque in hoc maximè ægro, vt & in filio Noëi fabri lignarij verum comperimus quod scripsit Hippocrates, *mei anto; giv; eor: In febris que non intermittunt excretiones sanguinolenta, liuentes, graueolentes, biliosa, omnes male sunt. Si benè procedant, bona: eadè que ineunda ratio in iis qua per aluum & vrinas feruntur: Quid? fieri ne potest, vt quantumuis facillè cedant sputa cruenta, biliosa, graueolentia, liuentia, ea ad salutem pertineant? Sunt enim malæ vt signum, quod partium à quibus manant vitium & corruptionem significant. Nam non modo videndum quàm benè procedant ista, sed vt in qualitate tantoperè non peccent. Galenus in com. Ait Hippo. debuisse potius dicere omnes malas excretiones, si facillè fiant, bonas esse excretionis modo, non qualitate, non loco, non materia, non causa. Nam omnes mala excretionis prauarum signa sunt dispositionum, & fiunt eo modo quo in vlceribus putridis quibus ichores saniosi destuunt, nil dispositioni conferentes. Nonnumquam verò ita sicuti pus ex abscessu disrupto benè expurgans partem laborantem. Indicia verò quòd benè excernatur, maxima sunt, & coctio & ægri tolerantia, item morbi species, tempus ni, regio, etas, naturaque ægotantis.*

ap. 47.
lib. 4.

At sæpè coctionis argumenta non apparent, cum ea materia quæ excernitur non sit morbi vllius, sed tantùm congesta sit in parte, vt de instituto in ea mitiganda regendaque Natura non fuerit occupata. De excretionem è pulmonibus multa Hippocr. In prognosticis, sed tū de apparentibus pulmonū morbis, vt de pleuritide aut peripneumonia loquitur. *Inter cetera, ait, permixta appareat flaua bilis admodum screatione oportet. Screatione flaua si syncera est, cum periculo est, cãdida verò, glutinosa & rotunda, inutilis est. Si viridis & spumans admodum est, mala est.* Numquid hîc alienos colores, alienamque qualitatem in ptyalismis vituperat: & tamen docuimus & ex quarto Aphorismorum, & ex historia quæ hoc loco narrauimus excretionem è pulmone prauas aliquando bonas esse propter eam vtilitatem quæ consequitur ex tali excretionem, quod interea partes liberantur ea corrupta materia quæ præpediebantur. Tametsi enim materia mala sit, per accidens tamen ratione finis & boni qui inde secutus est euentus,

part. 44
lib. 2.
progn.

bona dicitur esse. Sic tamen Natura fluxum sanguinis per hæmorrhoides non instituerit, tamen quia inde commoditates ad sanitatis & custodiam & morborum repulsam consequitur, fluxus iste opus naturæ ex instituto paratum dicitur è Galeno.

Ac duo sunt celebres loci, & omni memoria digni apud Galenum, ut iubeamus valere & exulare imprudentem quorundam temeritatem & crassam ignorantiam cum vident pravas aliquas excretionés: Prior est in lib. de locis affectis:

Sub finem lib. 1.
s.

Sapè, inquit, hepate robustiore aliqua ex parte effecto pessima detectiones & colore & consistèntia apparent, item & urina. Unde decepti medici putant gravissimum morbi periculum subesse. Sed errant. Nam quibus sine ratiocinatione rudis duntaxat experientia suffragatur, de iis que raro accidunt, experimenta habere nequeunt, veluti eorum que sæpè accidunt, facile meminerunt. Alter locus quo explicat illum Hippocri. locum.

Part. 51.
lib. 2.
prog.

Omnis secretio mala que non sedat dolorem, que verò sedat dolorem, omnis melior est. Sæpè valuit natura, (ait Gal.) pravam vincens affectionem expurgare corpus: & in hoc terrentur multi afficientes secreta vitium materia, nequaquam cognoscentes verum id symptomatis fiat ratione, an quia natura pravam materiam foras expellat. Atque excretionis bonæ & utilis notas assignat levationem doloris (quanquam id non sufficit Galeno) & in primo

Comp. in
Apho. 2.
lib. 1.

Aphorismorum, ἐπιφοιτῶν. Atque ut id terminemus de quo dictum est: Notanda duo sunt, prius cur Hippo. vsus sit nomine ἀποκρίσεως, non πύκτου, ut in progn. aut πύκτου: posterius, cur dixit, in febribus non intermittentibus. Quasi verò in febribus essentialibus (nam nomen πύκτου, absolute positum febre essentialia notat) excreatio alicuius sit momèti, propriumque sit excrementum febris, cum eius materia sit in maioribus vasibus clausa non in pulmone. Nam quemadmodum in morbis thoracicis parui penditur vinarum inspectio, quod non sint proprium pulmonis excrementum: Ita in febribus ipsis veris non valet sputorum inspectio, nisi auctoris vice. Quia si ad bonitatem actionis ipsius materici febrilis sputorum appareat adiungaturque bonitas & faciliseductio, bonum id signum. Ego verò coniecturas aliquas afferam quibus adductus fortè fuit Hippocri. ut ἀποκρίσεως, meminerit. Ac primum id docere voluit ut iis occurrat qui præproperè ac præcipitèter de morbis iudicant, & cum vident aliquid alienius è parte, ac præsertim è pulmone excerni, quod non viderint, statim malè de morbo ominan-

tur, ac finistrum euentum prædicunt. Immò putres esse pulmones dicunt, vt si contingat ægris mori suam inscitiam (cum fortè malè curauerint febrim ipsam essentialem) excusatione ista tegant. Aut dixit hoc, ne relicta febre ad excreationes istas malas conuertant se, cum tamen malè id fiat. Collectio tantùm erat per transudationem ichoris à cacochymia traducti in pulmonem. Aut monet hoc Hippo. ne territi medici inspectione eorum malorum sputorum ægros deserant tanquam conclamatos. At, tametsi materia ista mala sit, bona tamen est si excretionis modus assit legitimus, quod vis naturæ paruerit in deficcanda materia quæ ob moram talem corruptelam contraxerat. Nonne etiam videmus integra fruente sanitate mungètes sub iride saniosum, *δυσώδης*. Et tamen cū mala sit materia, bonum est quod virtus expultrix valeat in excernenda ista materia, quæ alioquin maiore mora partem labefecisset. Quod si pleuritis adesset, aut morbus proprius pulmonis, & tale iputū appareret, fortè non tam securum esset, quam si in essentiali febre appareret. Quare? Quoniam si vigeret morbus pulmonis cum tali sputo, generationis perennis talis sputi suspicio foret, quod malum est. Sed cum inopinato in febre essentiali talis mala *ἀποχέυσις* apparet, non tam generatio est, quam veteris excrementi collectio, vt ista mala qualitas & coloratio non tam nata sit ob alienum calorem, quam moram longam in pulmone. Quamquam non dubium est quin si illa putresceret inflammationemque accerferet in pulmone, malum deterius inueheret, quam si alius esset coloris & consistentiæ. Vnde in prognosticis spumantem & viridem ex pulmone excretionem vituperat & maximè si sincera sit excretio. Præterea duo notari debent cur dixerit *ἀποχέυσις*, & febres non intermittentes, quod vtrumque (si potest coniectura aliquid) non citra rationem adiectum est. Nam cum nomine *τῆς ἀποχέυσις*, vtitur non autem nomine *τῆς πύλης*, videtur significanter notare non tam esse materiam thoracis morbificam quæ excernitur, quam excrementum aliarum partium, quod in pulmonem influxit, & ob moram aliquam alienū colorem accersit. Cū autem significatur vera excretio è pulmone, si quis affectus instrumenta respirationi deuota tenuerit, vtitur voce *ἀπόσις*, aut, *πύλη*. Ideo dixit, *in febribus, non intermittentibus: vt declaret ratione præsentis cacochymiae & vi caloris humores*

fundentis, & per modum attractionis ipsius pulmonis à partibus inferis, aut per modum transsumptionis & transsudationis colligi in pulmone materiam alienam, quæ aut tussi, aut alio modo expectoratur. Et sic de pulmone malè affecto non oportet nos malè ominari. Per quandam anastomosin, aut similem passionem cruentæ possunt fieri excretiones è pulmone agitatibus humoribus, & ob suam acrimoniam vasa referantibus. Si enim facile in febribus continuis autore Hippocrate, & inflammationes cerebri, & pulmonis facile possunt succedere; nunquid pars materiæ febrilis à pulmone potest attrahi iam per se maligna, & *αἰματώδης*, & alieno colore imbuta, quæ sputa ordinaria potest tingere, vt inde excreatio derepente immutetur? Vnde dubium esse non debet, quin, si materia illa diutius moretur ibi, pulmones inficiat, ac labefactet. Itaque peropportunè excernitur, bonoque est si eius facilis fiat eductio, & sola fiat *ἀπορροή*, id est, per simplicem excreationem sine vi, sine tussi, sine violento motu aliquo *ὑπερτίσας*, vt loquitur in libro *περὶ πνεύμων*, eductio fiat. Sic nomen *ἡ ἀπορροή*, facilitatem excretionis declarat, ac si materia ipsa in os occurrat eo modo quo cum à capite *πέφυκα*, descēdit sine tussi, sed solo linguæ motu expuat & excreatur id ipsum quod occurrit. Et non mirum si *ἀπορροή*, fuerit biliosa, nam totum corpus erat biliosum, cacochymun, & *ἰκτερίως*. Et cum Hippo. ait ex signis mox apparentibus de morbo iudicandum esse, vt in qua pleuritide mox sputū apparet, ea breuior & securior dicatur, hoc debet intelligi de morbi excremento, non autem de illa materia extraordinaria. Nam multos pulmonicos & pleuriticos vidimus qui primo die morbi è pulmone reiecerint quibus & protractus morbus & mors ingruit. Quoniam educebatur non id quod morbum faciebat.

ANNOTATIONES.

¹ Error medicorum qui cum sputum, aut cruentum, aut subcruentum, vident, putant esse, aut pleuritid, aut peripneumoniam. Quæ opinio etsi opinione Gal. & Hippo. paulo post confusata est, quod ex pulmone sæpe prauæ fiunt excretiones, vt floridæ (id est cruentæ) nigricantes, pallidæ, cum tamē nec sit inflammatio, nec pleuritis, nec peripneumonia. Inter cætera locus est cōmemorabilis in hystoria de Pythione, lib. 3. Epid. part. 4. sectio. 1. ubi docet sexto die varia Pythioni, & cruenta sputa appa-

1. de
morbis.

lib. 12.
lib. 1.

uisse, cum nec peripneumonicus, nec pleuriticus foret, nec à capite malum esset, sed à defluxu tantum materiae quae non erat tanta, ut inflammationē pareret, aut fortè in pulmone congesta, sed quae incendium non conceperat.

² Huc pertinet locus praclarus, lib. 2. Epid. sectio. 2. ubi loquitur de eruptione Terminthorum in febre continua, & ait, eger autem erat subsplenicus, ac si dicat istam eruptionem non fuisse propriam morbo, sed corpori.

³ Ad hunc locum pertinet historia, lib. 5. Epid. de Hippoblene: is ceciderat luctans: cruentum ^{ἔρριψε}, ait Hippo. & addit, ^{καὶ ἦν σιαιλοῦ}. Non erat sputum: quod notandum, erat quidem ^{ἀπὸ γαστρῆς}, sed non erat ^{πυλαῖον}, seu ^{σιαιλοῦ}. Ideo dixit, Videbatur medicis esse peripneumonia, sed non erat. Sic caue ne quid in his erres. Et puto nomen ^{σιαιλοῦ}, pro ^{πυλαῖον} sumpsisse. Quanquam ^{σιαιλοῦ}, significat tantum saluam non sputum.

CONSILIUM CIX.

De cordis palpitatione.

VXOR LYSSAEI annos 22. nata palpitationes cordis persentiscit quas formidinē appellant, alij tremorē & improprie quidē. Quidam ex veteribus imperitē confundūt cū cardiogmo & cardialgia, malēque tremorē vocant. Etenim facultatis animalis imbecillae symptoma nō est, nec morus est mixtus naturae & morbi, & pars loco non dimouetur: quod trementi partī contingit. At tantum eleuatur & deprimitur pars. Tamen quod aegri putant cor è loco moueri, ideo tremoris nomine improprie donatur, quo modo & singulorum ventriculi conuulsionem dici demonstrauimus. Conatur enim cor excutere id quod ei molestum est: & cordis eleuatio depressioque definitur subinde praeter naturam facta. Cardiogmos autem, & ^{παλμῆς}, iidem affectus non sunt quanquam aliquid affine habent. Ante exposuimus Aphorismi illius particulam, *In febribus circa ventriculum & fortis aestus, & cordis morsus vel dolor, malum.* Miror cur Gal. in com. his assentiat qui nomine ^{τῆ καρδίας}, intelligant crebrum, velocem & palpitationi similem motum ipsius cordis ob incendium ingens in corde ipso: ex qua Galeni opinione con-

ciūt incendiū ac phlegmonē in corde τὸ παλιῦς causam esse posse. Quòd à ratione alienum videtur cum Galenus ipse alio loco (sed nondum occurrit locum istum legere) à causa frigida repetat palpitationem. Declarant frigida remedia quæ ad hunc affectum instituta videntur. Ac primùm magna est absurditas statuere idem esse καρδιασμός τὸ παλιῦς, cum cardiogmos ad os ventriculi pertineat maximè palpitatio autem cordis affectio est, quanquam per aliarum partium, & maximè ventriculi confectionem nasci potest. Item καρδιασμός, in cholera morbo & febribus continuis ob morsum ventriculi à flava bile frequēs esse solet, vt propterea non debeat numerari inter alia symptomata mala. Quid verò est dicere cardiogmon significare vehementem quandam motum palpitationi similem? dicam quod sentio. Nomine τὸ καρδιασμός, non intelligit affectionem ventriculi ob morsum, sed symptoma quoddam consequens suum æstum in febre, siue æstus sit simplex, siue ob ebullientem flavam bilem in tunicis ventriculi: vt vult in com. Galenus, vt δ καρδιασμός, indicet cordis ipsius affectionem cuius affinis est motus quidam palpitatorius, vt quasi vnum ex alio consequatur. Et ideo illi veteres καρδιασμών, non palpitationem significare dixerunt, sed motum vehementem palpitationi similem. Vnde ægri dicunt sibi palpitare cor & quasi ardere præ ingenti æstu quo conflagent. Hoc quod diximus ne confingere videamur, confirmabimus autoritate Hippoc. qui admirabili quadam explicandi vi docet quænam symptomata consequantur erysipelas pulmonis. Atque inter cætera sunt vomitus bilis & pituitæ, nec non deliquia animi. Quod mirum esse potest, cum erysipelas pulmonis propria sit affectio. Sed admirabilius est id quod dicit de causa cur deliquia animi sequantur pulmonis inflammationem, propter *sanguinis transmutationem de repente contingentem*. Id est, cum inflammatus est pulmo duo sequuntur horrenda, nam spiritus cordis inflammantur: immò & ær attractus dum pulmonem transmittit ita incalescit, vt nullum solatium refrigeri afferat, sic cor languere, & languidè moveri contingit, & dum crebriore & frequentiore motu cieturaliquid τὸ παλιῦς contingit: Item attractio fit sanguinis & spiritus maior ob ardorem, nam incendium attrahit, ait Hippo. Et ob istam attractionē subita fit transmutatio sanguinis quæ palpitationis aliquam speciem affert. Sic vides. In magno æstu & deliquia

Liquia euenire & palpitationi aliquid simile, vt & deliquium & eleuatio depressioque pulsus, & crebra mutatio coniungantur. Immo & in morbo, & per sanitatem cum euariat pulsus, vt è magno in paruum, è frequenti in rarum, è veloci in tardum. mutatio fiat, palpitationis magna sunt argumenta. At dū æstus ingens in corde est, præsertim si de repente magna fiat attractio spiritus & sanguinis, & mutatio pulsus & palpitandi occasio facile incidit. Ergo cum ingens aliquod incendium est, & aliquid est palpitans, ob similitudinem quandam cū palpitatione, motus iste *παλυσμός*, dicitur. Cæterum, vt antè dictum est, volunt ex Galeno veræ palpitationis causam esse frigidam. Quod si verum est cur veteres practici alia remedia instituunt calida, & phlebotomiam præscribunt. Nam in causa frigida venam secare tutum non est⁴. Galenus omnem palpitationem iuuari venæ sectione author est. Et qui Galenum interpretantur ideo locum sectioni venæ dant etiam posito quod causa frigida palpitationem inducat, quoniam aut minuatur plethora, aut obstructio sectione venæ liberetur, aut reuellatur cursus materiei flatuosæ. Supponit enim Galenus à crasso vapore palpitationem ferè omnem oriri, idè non est dubium quin & ad diuertendum reuellendūque cursum phlebotomia, & ad attenuandum attenuans victus conferat. Mesuæus de sectione venæ loquens in palpitatione ex hypothesi loquitur, Arculanus etiam ad syncopen vsque exclusiue in palpitante sanguinem mittit. An propterea imitando istorum senum consiliū audacter sanguis mittetur? Nequaquam. Nam eorum qui palpitationi sunt obnoxij ita comparata ratio est, vt *βραχυέρον* sint, ac sæpè in phlebotomiis ipsis & purgationibus opprimantur & moriantur: Quod cum calamitosum sit, prudētis est medici diligenter inspicere ne suspicionem subeat eius, vt occisi quem sua sors peremerit. Mesuæus ita de phlebotomia in palpitatione scribit: Si cum cordis tremore fuerit pulsus velocitas & febris, æger ex basilica minuendus est. Ex dextra quidem, ait Arculanus, ad minuendam plethoram, ex sinistra ad remouendum repletionem vaporosam. Melius enim Arculanus sentit, meo iudicio, de sectione ista venæ partim ex sinistra, partim ex dextra quam Auicennas & Arabes, qui ideo dextras secant, quod palpitationem a sanguine esse credant, sinistras, quod cum à vapore orietur, commodè id fiat. Vix

Lib. 5.
loc. aff.

enim euēnit vt sanguis hunc morbum pariat, sed à vapore est potius, aut à causa consimili. Quanquam sunt qui venam in cruribus, aut poplite secant, si præsertim ab hypochondriis malum est, vt per arteriam cœliacam à parte sinistra, præsertim verò è lienis regione vapor crassus, quem in cor elatum facultas ipsius partis tanquã subsultantem hostem nititur expellere. At erroneum hoc est. Siquidem si hoc valeret, cum palpitationum pars maior ab hypochondriis sit, venas poplitis, aut maleoli vtique aperire conueniret. At hoc non fit. Sed exclusã istã ratione tanquã parũ probabili, duabus de causis inferiorum venarũ referatio ex vsu futura est, prior est si suppressio, aut mensũ, aut hæmorrhoidon in causa sit, posterior autẽ si reuellẽdi studiũ est: alioqui brachiorũ sectio profutura est poti⁹.

Quod autem attinet ad sectionem venæ ad leipothymiam vsque, videtur ea nocens esse, præsertim cum, vt antè dictum est, palpitationi obnoxij ferẽ dum euacuantur, inopinata præcipitque morte eripiuntur. Accedit quod palpitatio cordis, vt annotat quidam in Arculanum, dispositio quædam media fit inter pulsum & debilitatem & syncopen. Quod si verum est, & ideo metuatur iste morbus quod cõnatam in se debilitatem, & quasi annexam syncopen habeat (quæ quidẽ syncope morti finitima est cum nomen inuenerit ἀπὸ τοῦ συκώπτην, quod vitæ nostræ filum concidat ac defecet) quid attinet nostrã largã sanguinis euacuatione, in qua spirituum magna fit dissipatio, accersere syncopen, & ita mortis periculum creare? Sed Arculanus vt acutus & optimus autor, vnam tantum rationẽ affert, quæ nos inducere possit ad tam luculentam & copiosam in palpitatione sanguinis effusionem, vt potẽ cum in sanguinis copia & orgasmo, & ad cordis arcem raptu metuitur, ne derепente in corde apostema concipiatur, & mors proinde subita inrentetur. Aut etiam si inflammationis subitæ sint argumenta quæ ipsius palpitationis causa sit. In isto enim casu, quoniã insignis & subita refrigeratio requiritur, ne breui tota ipsa regia inflammetur ac conflagret, nullum præsentius auxiliũ venæ sectione eaque conferta & copiosa. In ceteris à largis istis euacuationibus temperandum est. Ac de causis illius morbi, qui per se terrificus est, dum cætera sedulo lectori legenda relinquimus, breuiter percurremus. Aliquando in corde ipso affectionis causa est, & tum periculosior existit: aliquando

partibus vicinis est, aliquando à remotioribus, vt ab vtero, à maligno tibiaram vlcere. Tuberculum in corde, abscessus item affectionis causa esse potest, multus sanguis obstructionem faciens, intemperies calida, vermes cor vellicantes, subita euacuatio, imprægnatio. Quemadmodum enim mulieres quædam veteribus affectionibus præhendi solitæ, cum vtero conceperunt iis liberantur & miraculo absoluuntur, edito verò foetu repetunt, ita quoque prægnantes mulieres, insolentes morbi possunt inuadere, vt palpitationes & Epilepsiæ, dentium dolores implacabiles, & capitis grauitates. Præter causas commemoratas inflammatio, aqua tunica cordis inclusa, item si tunica, aut humorem putrem ac malè olentem in se contineat, aut lapillos, palmum inducit. Item venenata qualitas, spirituosus, aut crassus halitus, vel ab arteriis, vel à corpore cordis, aut à pulmone, aut à liene aliâve parte, aut propinquiore, aut remotiore elatus: Constrictio maior, decubitus in renes & dorsum, præsertim si magna arteria perreptans spinam prematur, à succensis putribus lignis elatus vapor, ductus & attractio spiritus auræque pestilentis. Adhæsiō pericardij corpori ipsius cordis, quod in duobus hydropicis obseruatum est⁹. Mucus per quandam colliquationem in cor illabens, (vndè dicunt vulgò quosdam repente interire quod adeps colliquatus in cor influxerit,) ac tum cùm colliquationis modo mucus iste in cor labitur falsò asthmatici creduntur ægri. Si palpitationem aut inflammatio aut erysipelas committit febris ingens est, pulsus durus & veluti ferrans. Si à venenata aura infernè in cor surgente, fugax est malum. Cùm à venenata aura in pestilente statu, præceps virium omnium lapsus est. Cum à muco per modum colliquationis in cor fuso, æger fit anhelosus, parua & densa spiratio est. Vidimus palpitantem affectum ob aneurisma in liene, quod si in corde ipso aneurisma sit, lethalis est affectus. Quæ palpitatio syncopen veram iunctam habet, insanabilis est. Quæ ab adhæsiō pericardij est, lethalis est. Quæ à colliquatione est, insanabilis quoque est: Item & ea quæ à venenata aura est. Atque inter ceteras palpitationis causas vna & communis & vulgaris est, intemperis frigida ventriculi, & iccoris calida. Dum enim ventriculus non benè suum facit officium, & secundam coctionem tanquam correctionem & emendatricem sui prima

non agnoscit, iecur calidius rapit erudius alimentum, hinc anathymiafeon prouentus multus, obstructionum ilias, & ab istis obstructionibus palpitandi occasio. 10. Quod hypochondriacis solenne est, cachecticis, & virginibus fœditate coloris infectis vsu-uenit. Galenus horum demonstrationem videtur afferre tanquam aliud agens com. in istum Aphorismum, *Quis regio morbo laborant, non multum ventosi sunt*: Nam ventorum flatuumque generationem à duabus causis repetit, vna est materies ipsa, altera est partium corporis earum præsertim quæ ad ventrem attinent, debilitas. Materia est crudus, pituitosus ac frigidus humor qui faciliè in flatum soluitur. Atque cum regio morbo laborantes calorem habeant acrem, necnon bile potius abundant quam phlegmate, credibilius est flatuosos non fieri cum desit materia. Sed debilitas ventriculi & primarum venarum status potest esse parens ob cruditatem. Cruditas autem ipsa idem ferè præstat, quod ad generationem ventorum spectat, quod & pituitosus humor. Quamquam diuerso quodammodo id fit. Sic icterici, & qui calore abundant acri ferè in tympanitem incidunt, speciem hydropis à flatuum copia nati, non ratione phlegmatis in flatu soluti, sed ob debilitatem ventriculi, & cruditatem & corruptionem alimenti ob dominatum caloris acris omnia corrumpentis, & tetros halitus flatuq; in chylo corrupto & intercepto mediis viis excitantis. Vt mirum sit cur dicat Gal. *Non admodum contingere, ut in ictericis, partium ad ventrem attinentium habeant imbecillitatem*. Nam tales icterici sæpè corrumpunt alimentum, coquunt quidem sed malè. Cùm enim Hipp. ait, *ἡ ψευδὴς κίβητος*, carnes frigidas habere, nunquid *ἡ ψευδὴς κίβητος*, & *τὸν ἰκτερίδην* confundere possumus? Quamquam ita Galeni auctoritatem audire possumus, vt dicamus ictericos rarò habere imbecillitatem partium ad ventrem attinentium præsertim quod ad munus coctionis attinet: coquunt enim faciliè etiam *διὰ τὴν ἰσχυρίαν*. Non quin dicamus malè coquere, id est, inducere prauitatem quandam in cibum, vnde eos videmus subuiridia, & biliosa faciliè & vomitu, & per alium excludere, sed non est ea debilitas, vt malè coquat, id est, imminutè. Ac si dicamus, icterici, & *οἱ ἀσθενέστεροι*, cum calore multo, sed eo quodammodo alieno abundant, suprâ chylum coquunt, & plus biliosi humoris, in massa sanguinis generant: quibus debilitas est ventriculi infra chylum coquunt, & imminutè. Hic est quædam *ἡ ἀσθενεία*, & *chylus dicitur ὀμὸς*, *ἢ ἡ ἀσθενεία*, ob ex-

Apho.
ultimus
lib. 5.

Cor. in
sybor.
visum
lib.

6. Epid.

cessum qualitatis, & chylus ^{ἀμύμων} dicitur: id est, eò modo affectus ob qualitatem, vt in laudabilem succum non vertatur. Atque ex iis facìle est demonstrare valdè credibile esse eos palpitationibus obnoxios esse quibus ventriculus, & hepar contrariis ferè prædita sunt temperamentis, ratione cruditatum quæ hinc oriuntur.

Ergo cum palpitatione motus sit cordis præter naturam, medio veluti situs inter-pulsus, debilitatem & syncopen, quò referri debeat, videndum¹¹. Quatuor omnino motus contra naturam genera statuuntur, conuulsius, tremulus, concussius & palpitans. Tremulus & palpitans causam morbosam sequitur: quandiu quis palpat, tandiu se iocunditati tradere non potest. Si quid incidat impediens vicissitudinem systoles & diastoles, attractionem & exclusionem spiritus, id causa esse potest palpitationis. Porro cum quæritur, an quia cor dilatatur, impleatur, an verò contra, respondendum est, cum eor bene affectum est, quia dilatatur, impletur, at cum malè habet, quia impletur, dilatatur, quod cum maximè in palmo contingat, & causa solum morbifica palpitatione pendeat, necessum est.

Ac de palpitatione plura non scribemus, cum operosum hoc foret, & plenam opinionibus ex aliorum scriptis desumptam tractationem conscribere ridiculum esset, tantum aliquot remedia huic Danisellæ, cuius ergò hæc Commentatio suscepta est, inscripta ascribemus. In ea maximè duas causas palpitationis agnoscimus, vnam latentem quandam arteriæ dilatationem in corpore ipsius lienis, quod verisimile, cum in regione ipsius lienis palpitans pulsatio percipiatur. Ac id contingere potuit ob diurnitatem quartanæ febris quæ est conflictata. Quartana autem aliquid semper residui facit. Alteram, ventriculi imbecillitatem ob caloris imbecillitatem, & iecoris calidam temperiem: quod ex excrementis, & colore, & actionibus facìle collegimus.

℞. Melissa, buglos. foliorum cardui, scabios. calendula. an. m. j. scolopend. caterach. chamadry. an. m. j. agrimo. scariol. an. m. ij. seminis endiuie melonum, citri, card. an. ʒ. ij. fumiter. absinth. pont. an. p. j. seminis angelica & pæonia. an. ʒ. j. fiat dec. ad lib. j. s. Infunde in col. foliorum sena. ʒ. ij. seta in Kermes tinctæ ʒ. s. granorum Kermes. ʒ. ij. bulliant ad lib. j. In col. dissolue sacch. ros. lib. j. expressio. ʒ. ij. rheib. & ʒ. s. agar. in nodulo positi, cum ʒ. i. s. cinna. infusorum in

℞. Meliss. foliorum lauri, calamenti, chamem. anethi & melilo.
 an. p. j. seminis cum. baccarum lauri contusa. an. ℥ss. rad. bryoniae ta-
 leolatum secta capp. an. ℥j. sabin. p. ij. fiat sacculus bulliat in aqu. cha-
 lyb. cum vino rub. pro fotu lienis cum spongiis: adde santala.

Adhibeatur cucurbitula magna, post fotum ante sequentem li-
 tum.

℞. Ladani soluti in aceto, benioing. & stiracis solutorum in succo
 amygdal. dulcium. an. zj. express. nucis moscata: z ij. pul. nucis cupress.
 santatorum, rosarum & cyperi. an. ℥j. cere noua, & ol. de capparib.
 quod suff. fiat litus ad regionem lienis.

℞. Conserua meliss. buglos. nenuph. an. ℥j. elect. diamarg. frig. ℥iij.
 confectionis alkermes. zj. theriaces & mithrid. an. ℥j. cum syrup. de
 pomis: fiat opiata.

Institutus syrupus ex succis in quo madet seta in kermes tineta.

ANNOTATIONES.

¹ Galen. aliquando sumpsit nomen τὸ τρέψου ἀπὸ τοῦ πάλμῳ. Que causa fuit
 nonnullis cur existimarent tremorem & palpitationem idem esse. At
 differunt longè & ipsa definitione, & aliis multis: Nam palpitatio mo-
 tus est momentaneus, tremor diu affligit. Is porò nascitur ex diuersis
 causis que facultatem possunt labefactare: & pro varietate causarum,
 varie curatur. Palpitationis vna causa est, vna curatio, nempe status dis-
 cussio, hac Iosephus Strusihus in arte sphygmica. An sint vera conside-
 rato. Aristotelis interpres πάλμῳ, pro tremore accipit. cap. 4. lib. de re-
 spiratione, vide lib. 2. Epid. meorum.

² Sauaronola tremorem cordis & palpitationem confundit cum car-
 diaca passione. Aliud tamen longè est. Et id desumpsit ex com. Apho-
 rismi de quo hac in pagina, in quo Galenus videtur τὸ τρέψου, confunde-
 re cum ea affectione cordis in qua crebra & vehemens est pulsatio pal-
 pitationi similis? Quòd se ita est, nomen καρδιακῶν, cum cardiaca affe-
 ctione confundit.

³ Istud languide moueri non est accipiendum quin sit vehementior
 cordis agitatio; sed ea agitatio est cum crebritate quãdam, & quã-
 cum extremo conatu cordis. Immo cum est iste aestus in pulmonibus &
 erysipelatos dispositio, dum pulmo vehementer atrahit, sese sanguine
 implet, & egri obruuntur conculcato in pulmone sanguine: & est ea affe-
 ctio qua à Gordonio sanguisugum dicitur, egerque sanguisugosus nomi-

natur. Quoniam proprie sanguisugum dicitur cum non potest pra obstructione, aut densatione aërem foris attrahere, intus è partibus propinquis sanguinem & spiritum attrahit & sanguinem pro aëre veluti sugit & eo impletur, vnde praesens suffocationis est periculum.

⁴ Pulsus palpitantes aliquando in senibus obseruantur: sed id nihil fieri debet. Si enim per totum corpus alia arteria palpitent, deterius multo est. Atque huc pertinet quaestio, an cor palpitare potest, & arteriae naturaliter moueantur? Struuius enim obseruat contingere, vt cor ex irritatione edat maiorem pulsum, celeritorem & vehementiorem quam qui in arteriis appareat. Et qui agrotant de pulsu, aut saltu cordis conqueruntur. Hoc autem contingit in febribus continuis phlegmaticis cum vena & arteria crudis & frigidis referuntur humoribus: Interea tamen cor contentis suis calidum est, arteria frigida. Et caliditas cordis, frigiditasque arteriarum dum concurrunt moderatum quendam pulsum (saltem quod ad sensum pertinet) efficiunt: Et tamen cor ipsum aliter multo afficitur & mouetur quam arteria ipsa. Vnde medici hinc decepti putant tales egrotos non febricitare cum tamen periculosè febricitent.

⁵ Si natura ad motum palpitatorum concurreret, palpitatio ipsa esset affectio non à solo pendens morbo, sed à natura. Tremor quidem & morbi est & natura, at palpitatio solius morbi effectus, si hoc verum est, quare vaporem palpitationis causam tanquam hostem natura nitetur expellere?

⁶ Si enim ratione etiam cuiusdam doloris irriteretur fluxio in partem aliquam, & metu maioris raptus commode vena percutiatur, cur non id fiat, in metu raptus & sanguinis, & spiritus ad cor?

⁷ In omni palpitatione cordis est flatulentum quid & aeris. At ad hoc valet maximè phlebotomia, vt sectio. 5. lib. 2. Epid. Hippo. Contra multorum opinionem facit. Horum praecleara est demonstratio, lib. de flatibus. Et quodam in loco scribit, Hippocr. *ἐπιυπασθῆναι δὴ τὴν ἐν τῷ πνεύματι ἀπὸ τῆς ὕλης τοῦ ἀεὸς ἐπιβουρῆσαι.*

⁸ Vt in iuuenibus excedentibus ex ephebis quibus debet esse frequens haemorrhagia, si ea desit, palpitatio potest contingere. Idem & non menstruis virginibus potest contingere remeante ad superiores partes sanguine.

⁹ Causa potentissima palpitationis est metus. Vnde etiam dum quis metuit, ei videtur cor palpitare. Et vidimus quendam baiulum qui forte in grassantium manus incidere, cui praemetu tanta immutatio in pulsum incidit, vt per longum tempus pulsus palpitans esse videretur.

¹⁰ Omnes Hypochondriaci specie cruditatis laborant: Vnde non mirum si graniter conflictentur, & si facile in palmum cordis incidant.

11. In iis qui palmo cordis sunt obnoxij manifestus arteriarum motus percipitur & micatio: & huius micationis manifeste causam dicunt plenitudinem humoris: quanquam in iis qui fædos colores habent, & in melancholicis, status melancholici resolutio potest facile istam micationem & pulsationem venarum inducere. Aristo. cap. 4. lib. de respiratione, de palpitatione, suo modo Philosophatur. Legendus iste locus si fortè de eo dicendum sit.

12. Rhabbarbarum hic in palpitationibus cordis ratione morbi non quadrat, sed ob ventriculum qui cordi maximè consentit, & ad vehementiam morbi augendam facit.

De febre continua cum multis & grauissimis
Symptomatis.

CONSILIVM CX.

SANGERMANVS annos 50. natus plethoricus tum quia desiderem maximè vitam ageret, tum quia auide & multum comederet, vt potè magnis præditus visceribus, in febre incidit. I. Ea primis quidem diebus blanda visa est, vt propterea eam negligeret, & à consuetis & muniis, & cibis non abstineret. At satis ex historia quadam Hippo. in Epid. patet quantum periculi attulerit intempestiua cœna, cum alioqui febris subobscura tantum foret.

Historia
m. sect.
3. Epid.
lib. 1.

Quantò verò magis isti viro prauis & multis pleno humoribus nocuit quatríduana morbi tolerantia, & cœna satis liberalis cum noctes febriles forent? Vt non mirum sit, si inde mortis periculum aduentarit. Morbi hæc fuit historia. Cum quatuor iam dies morbum tulisset, de repente suffocatorius dolor oboritur, & peripnemoniæ, necnon cuiusdam hepatidis magna adsunt argumenta, frequens erat respiratio, pulsus ferrans, vibrans, & durus, lateris dextri & scapularum dolores erant, & sensus ponderis in sternò: non poterat thoracem dilatare falsò putabant esse pleuritim, cum, vt antè monitum est, peripnemoniæ & sterni, & laterum, & scapularum dolores habeant

habeant familiares, immò tanquam quid *παθεγαμοσικόν*. Poterat quidem & esse fluxio à partibus superis. Huius rei fidem faciebat, & quòd superioribus temporibus grauissimis doloribus ob fluxionem à capite præhensus esset, item quòd ne minimum quidem manus appulsum ferret, in partibus metaphreni. Quanquam & inflammatio ista interna facere poterat. Sed maximè suasisit hoc quòd eo tempore vagarentur morbi similes, quos partim à descensu latentis materiei efferae & nitrosæ, & pepasmi incapace oriri credebamus, partim à resudante sero tenui & maligno à genere venoso in neruofum, vnde vlcerofus fuit sensus in multis, & *δυσκόπος* adeò incredibilis, vt blandæ manus appulsum ægri non ferrent. Sic in ægro crudelis huius affectionis causas & à descensu materiæ repetebamus, & à genere venoso pleno feri maligni (quod ex phlebotomiis illius temporis maximè intelligere potuimus) transcolationem, & raptum à visceribus. Nam pulmo inflammatus attrahit, & incendium quod inerat abdomini valdè inflato orgasmum facit materiæ. Et illud est quod Hipp. scribit, *Venulas arefactas ichores à partibus attrahere*. Febris erat assidua, alius non reddebat nisi *ὑδατέχρα*, licèt alius aliqua ratione medicamentis irritata flueret, non leuius habebat, nec subsidebat abdomen, inæqualitates multæ erant, mox manus temperatæ erant, mox æstuebant, morbus erat planè siccus, vrinæ non satis tinctæ, nec morbo, nec redundantium humori analogæ, difficilis spiratio manebat, non aderat dolor capitis. Septimò die sudor diaphoreticus. At quartus tantum dies erat decubitus & apparentis exacerbationis: aliis enim diebus se narrabat *ἀπυρετὸ εἶναι*: manus refrigerantur & pedes: vesperi mors. Noctes erant inquietiores & insomnes: vix loco consistebat. Reduplications vesperi fiebant, pulsus durus, vibrans & ferrans manebat: detractus sanguis perfectè corruptus erat & *χλωρός*.

Hoc verò loco tria aut quatuor quæri possunt, quorum cognitio plurimi sit momenti. Primum quid significarent istæ inæqualitates, an purulentum quid, an materiæ *ἀσωμαλλαν ἢ τὸ ἰσθμῶδες*, an caloris naturalis paupertatem, dominatum verò caloris contra naturam, an aliud præterea. Secundum an in febribus continuis *παρέρχεται* esse possint, an non potius *τὸ παρέρχεται*, nomen *ἢ ἀπὸ διπλάσιος*, ad febres interpolatas referatur. Tertium, cum tanta humorum saburra foret eaque tum medicamentis,

tum clysmatis agitata, cur alius non fuerit soluta biliofis excrementis, aut planè astricta ob phlogosin. Quartum accedet, an non ad inflammationem lactium & ventris contulerit frequēs & quotidianus vsus hydromelitis cum esset *μεσανδροναις*. Quod non abs re in quæstionem vocatur ne temerè iis assentiamur, qui quoniam hoc vel illo potu delectantur, promiscuè omnibus ægris illud propinandum putant quod illis in deliciis est. At vt concedam vinum, aquam, hydromeli, oxymeli, absinthites & sexcenta alia, magnas habere opportunitates, habent quoque & sua incommoda. Sic in vsu, in artèque medendi alium cibum poculumque pro alio substituere ignorantia, & inscitia plenum est, vt & indistinctè hunc ea re interdicerè, alium verò ad eandem inuitare temeritatem redolet. Vt non abs re quosdam ætatis suæ medicos redarguerit Hippo. qui absolute pronuntiabant vinum bonum esse, caseum malum, & id genus alia, quorum aliquis vsus foret, & incommoditas quædam, prout vel locò, vel iurè, vel tempori in vsum aptarentur.

*Libro de
vetero
medici-
na.*

Ac de inæqualitatibus, de quibus primò duximus agendum, iam supra aliquatenus satis esse factum puto, non abs re fuerit tamen nonnihil attingere. Multis modis videmus in febribus etiam dum æstus adest horrores leues incidere, ac si noui paroxyfmi noua foret occasio: Item & manus videmus aliàs moderato calore perfusas, aliàs veluti incendio confragrasse. Quæ duo aliquando simul incidunt aliquando seorsim visuntur. Visuntur simul in ingenti cacochymia, cum non modo in mesenterio, quod est totius corporis sentina, verum etiam in genere venoso corruptio est humorum & sanguinis, & qui detrahitur sanguis purulentus est: Hinc & vulgares dicunt se malum sanguinis cursum sentire. Quod non abs re dictum, Etenim sectâ illis bis aut ter venâ, eductoque sanioso sanguine & subuiridi, sensum punctionis quem habebant, & horrores illos paruos ampliùs non habent. Domina à Chalmontio hoc docuit satis: Nam per totum cursum morbi perpetui fuerunt horrores (quòd fortè nunquam visum est) & sanguis omnis in massa sanguinis contentus putruerat atque exalbuerat. Aperto corpore quicunque è venis effluebat sanguis merum pus erat. Quod ob dominatum caloris contra naturam omnia corruptentis contigerat, nec non corporis interioris intestinâ cacochymia toti sanguinis massæ ita communi, quæ de toti s corporis corruptio infecta fuerit. In

Vicario sancti Geruasi sensus deambulationis formicarū quem in brachiis & metaphreno percipiebat, & quædam inæqualitatis sensio, nō aliundè erat quàm à sanguinis corruptela per venas fusi. Declarauit curatio. Nam ista cessarunt misso ter aut quater sanguine satis cumulatè.

Horum demonstratio peti potest, ex lib. 6. Epid. Vbi Galenus scribit, *Omnes cacochymos, cum repente incallescunt, inhorrescere.* Testatur & quotidiana experientia. Nam si quis prauis scatens excrementis in sole versetur, statim inde redibit inhorrescens. Sic calor febrilis dum agitat humores putres idem præstat quod & solis calor. Inducit enim rigores & horrores; nam humores corrupti incalefacti seipsis acriores fiunt, mouentur & ita lancinant atque feriunt membranas, item & ichor excitatur à calore agitante qui sensum horroris, morsus, & inæqualitatem iniehit. Atque eorum qui in febribus ex facili horrescunt multa genera reperio à variis causis nata, vt non sit temerè pronuntiandum, de hac aut illa causa si quis inæqualiter horreat. Nam quidam cum vident istos horrores & inæqualitates sæpè incidentes de suppurato verentur, ac sæpè eò recurrunt, at falsò. Inter cætera videmus istos rigores & horrores (nam rigores parui de quibus sæpè in Epid. Hippo. non differunt ab horribus, vt doctè explicauit Galenus) initio paroxysmorum contingere, de iis non loquimur. Aliquando per totam febrem adsunt, quod de semitertiana intelligit Gal. in qua horrores per omne tēpus & particulare, & generale febris percipiuntur, siue intenso (Græcè *ἐν τῷ πυρετῷ*) faciat reduplicationē, siue ascensus fiat inæqualis, ideo *περὶ τῆς* dicitur καὶ *ἰσορροπίας*: Hoc efficit materiæ diuersitas in qua febris acceditur. Etenim ex duobus humoribus cōtrariis simul mixtis fit, bilioso & pituitoso, atque dū biliosus incanduit, calfit pituitosus, & sic ascensus inæqualis fit, idē quæ contingit quod & initio paroxysmorum, quo præsertim tempore vrgent horrores. Quia enim inæqualiter & calfit & mouetur humor vnus: ideo inæqualitas contingit & horror. Cum totus humor æqualiter affectus est, desinunt horrores, & tum incrementum & vigor adest. Quod si in vno humore interpolatam febrem committente fit, multo magis in duobus confusis fieri potest. Immo & febris *περὶ τῆς* de qua sicuti & de hemitritæo amplissimè diximus in nostris definitionibus medicis, ab humore bilioso fit maioribus vasibus cōcluso, eoque,

Com. in
part. 23.
sectio. 2.
lib. 1.
Epid.

Com. ad
part. 5.
sectio. 3.
lib. 1.
Epid.

Loco su-
pra alle-
gato.

Part. 25
sectio. 2.
Lib. 1.
Epid.
Vide
Hipp.
lib. 1.
Epid. in
Historia
Sileni.

vt ait Gal. & pigriore ad motum, & coctionis difficillioris, & quia à sua natura ita bilis degenerauit, horrores quoque iunctos habet: Immò & ea ratione *venâ* appellare possemus. Nam de ea loquens ita disputat, febres erant continuæ, vno die remperatioris, altero acerbiores, rigores parui (id est horrores, ait Gal.) erant omnibus sine ordine, & erraticè, ac minimi in his febribus fuerunt. Quod dixit vt non confundatur *751 τριουβής*, cum hemitriteo: cum in hemitriteo sint horrores magni & velut cum ordiæ. Quod mirum quomodo febris *752 τριουβής*, si vnũ humorem habet, nempe biliosum motum pigriorem habetẽ, id est biliosum quodammodo pituitosum ita continenter horrores inducat. De hemitriteo quidem minũs mirum esse debet, cum hic agnoscat autorem sui duplicem humorem biliosum & pituitosum simul confusum. Ac dicere oportet duplicem esse *753 τριουβής* febrem, vna est quæ duplicem habet quoque humorem, sed non paribus gradibus affectum, vt est in hemitriteo, altera vnum habet tantum nempe biliosum pituitosiore. Quæ duplicem habet humorem ea ferè confunditur cum hemitriteo, quæ vnum habet, ea longiũs ab hemitriteo differt. Quo in sensu audienda sunt quæ ab Hippo. & Gal. dicuntur. Nam cum vterque vult distinctionem duarum illarum febrium asserere, vtramque confundit, & in causa, & in specie, & in more. Nam quodam in loco tu leges *754 τριουβής*, febrem agnoscere vnum humorem, alio duos, quod difficile est ad cognoscendum, cum ista ex aduerso pugnent. At dicemus (vt rerum distinctio audiatur:) ideo in triteophyea febre, tamen si humor vnus statuatur, horrores contingere posse quod & multus sit humor circum maiora vasa cõclusus, & cum sit vnus, habet in se partes quasdam *755 irregularis*, quarum ratione horrores inducitur sensus, ac præsertim dum calor extraneus sese insinuat in materiam istam. Quod dum æquabiliter in omnes materiae partes non præstat, ideo inæqualitatis sensus adest. Sic tres causas istas animo concipies; vt distinctionis notas comprehendas. Prima est de multitudine humoris ad concipiendum incendium & putredinem parati. Secunda, quod vnus humor diuersas partes contineat. Tertia est de calore. Quod ad multitudinem humoris spectat, id verisimile: Nam in febribus interpolatis pauca est materia, & longe à magno foco semota, ideo tota digeritur in accessione, dum manet inte-

reà empyreuma, quod concurrentibus aliis causis, nouæ accessionis author existit. In triteophycæ multus est humor, maioribus vasis contentus, cuius cum pars digesta est & euicta, dum continenter calor agitat, fit anadiplosis, & nouus veluti paroxysmus, vt quod semel fit in febre intermittente fit ob paucam materiam eamque sub finem paroxysmi dissipatam, id fiat sæpius confusione quâdam paroxysmorum. Nam pars euauit, & exhalauit, pars putredini obnoxia, affecta, mota, irritata, nouam affert exacerbationem. Quanquam remissio aliqua præcesserit remissis ac temperatis partibus materiæ quæ vigorē & incrementum suum materiæ suę proportionatum habuerāt. Galenus enim vni humori duplicem inesse posse substantiam statuit, vnam crassiorem, tenuiorem alteram. Quis enim dubitat à materia putrente in maioribus vasis non eripi ac surgere tenuem aliquam & halituosam partem quæ dolores in capite & partibus propinquis excitet, cum alia pars crassior in intestinis deses sui generis alia pariat symptomata? Sic tenuior pars materiæ biliosæ multæ, pituitæ factæ quodammodo, pigrioris, coctū mitificatūque difficilioris quæ ^{ἡσυχία} facit accessiones, facit momentaneas, dissipabiles, quia materia ista tenuis exhalat facilè ac digeritur, alia crudior pars & crassior continuitatem facit, & per calorem pars alia attenuata similes prioribus accessiones inducit. Sed in semitertiana cum duplex sit materia confusa (quanquam duos focos statuūt quidam) mali moris dum calidior febrem acutam accendit statimque discutitur, & dum corpus tenetur istâ acutâ febre contingit intereà frigidioribus corrumpi ac putrescere, & sic accendi ex illa remissione, quod est veluti requie & imminutione febris. Quod & Galenus de triteophycis dixit, sed vt antè dictum est, tales ^{ἡσυχία} proximè ad semiterrianas accedunt & in motu, ingenio, specie, causa & consimilibus affectionibus. Ergo inæqualitatis vna & maximè præcipua causa est humorum varietas, ac præsertim eorum qui genere & naturâ dissident, vt sunt pituita & bilis, vt quoties inæqualitates, varios insultus, rigores paruos & horrores audias, toties de varietate ista materia non dubites, tantò que magis metuere oportet, quanto in febribus continuis frequentius id euenire conspexeris. Addam & illud, frequentia ista horrorem & reduplicacionum mala est, vt signum & causa, vt signum quidem, quoniam declarat va-

Comp. in
part. 4. 8.
scilicet lib. 3.
Epid.

rietatem materiæ putredinem concipientis. At quò plures humores vitium contraxère, eò multò plus metuendum: & quò plures humores negotium dant, diuersisque temporibus, eò natura plus habet negotij, & malo victa potius succumbit: Vt causa, quoniam naturam dum proritat ad pugnam plus illi molestiarum infert, & cum natura post vnam atque alteram pugnam vires colligere vult, id non facile potest, quoniam noua est in procinctu materia, quæ naturam rursus ad conferendas manus prouocat iam iam fractam debilitatamque priore discrimine. Interea cum alternâ requie & induciis, quibus sese paululum colligat ac erigat, cærere videatur, non mirum si langueat ac victa succumbat. Ideo Hippo. dicebat, *Quoquomodo febres intermiserint, periculum abesse significans.* Et quod Galenus dixit de febribus quas vocat *ἡσυχαστικαί*, more malignorum morborum, diebus criticis deteriores fieri, id est, deterior status & conditio est. Signa cruditatis repræsentantur, quo loco signa coctionis adesse deberent. Atque eo modo possumus id interpretari, quod meo iudicio est difficillimum, & à nullo, quod sciam, animaduersum, nimirum, quare propriū sit febrium *ἡσυχαστικῶν*, quemadmodum & malignarum, vt diebus criticis deteriores fiant, possumus (inquam) interpretari eo modo quo & Gal. explicat, *Circa, initia & fines omnia esse imbecilliora, cum verò consistunt, fortiora: symptomata quidem & accessiones in vigore fortiora esse multò, quam aut in fine, aut initio, sed dispositio morbi in iis qui saluari debent, melior est multò quam initio:* Id est, symptomata grauiora, quoniã iudicium instat, & in procinctu res est, sed si morbus funestus non sit, quoniam cruditatis signa non ad-sunt, dispositio morbi melior est. Vt, dum in apostemate febris augetur ob suppuratum quod actu iam fit, symptoma quidem augetur, & ratione symptomatis in vigore omnia fiunt fortiora, nempe & dolores, & febres, sed morbi dispositio melior est, quia euicta putredine & cruditate, læuitas, æqualitas, & albor in pus inducitur, qui sunt legitimi characteres bonæ materiæ, & melioris factæ per naturæ victoriã. Sic in febribus continuis, iis præsertim in quibus naturæ multum negotij datum est ob varietatem materiæ, ob continuitatem, ob malignitatem morbi, cum diebus criticis symptomata quidem sauiora esse debeant, & ob materiæ coctionem

Ad A-
pho. 29.
Es 30.
lib. 2.

Quid sit
deterio-
rem fieri
morbum
diebus
criticis.

dispositio febrilis & morbifica melior esse debeat, tūc dicuntur omnia esse diebus criticis deteriora, id est, dispositio morbi deterior est, cum alioqui melior esse deberet ob signa coctionis apparentia. Dicā id quod ego obseruauī in plerisque laborantibus febre continuā quā ipsi interierint, septimo & nono & vndecimo die febris videbatur remissior, vrina, quæ notas coctionis paulò antè habebat, crudior erat ac turbata magis: sic omnia fiunt *ὕστερ ὀστρεῶν*. Quandoquidem febris & alia symptomata vehementiora esse debebant, vrinæ coctiores esse quoque debebant: Sic dispositio morbi deterior est, symptomata remissiora sunt & imbecilliora. Atque meo quidem iudicio, hoc est, in febribus *πρωτογενῶν* & malignis, deteriora esse criticis diebus morbos, id est morbi *διαδύοις*. Quod valdè notari debet, quoniam puto id neminem vnquam pro rei dignitate, animaduertisse.

Vnam verò maximè causam inæqualitatis & horroris in febribus explicuimus exemplo hemitritæon, & *πρωτογενῶν*, vt hoc posito exemplo de similibus iudicare liceat. In quo longiores de instituto fuimus, vt id innotesceret maximè quod obscurum est, & vt temerè non pronuntiemus huuc vel illum ideo suppurato teneri quod in febribus inordinatè horreat. Tale enim iudicium puerile est, & ineruditum, cum sedulò magis causæ huius rei vestigandæ sint ac perlustrandæ. Atque cæteras causas istorum horrorū sigillatim persequi accommodatè ad id quod quærimus, deliberaueramus, sed longitudine sermonis territi, & quod passim alibi & cursim, & abundè ea de re attigerimus, superfluum & *πυρροῦσις*, plenum existeret, tractatione ista sumus superfessuri. Nunc verò tria persequi breuiter in animo est. Primum, quæ causa fuerit in nostro ægro Sangermano inæqualitatis istius: secundum, si humorum varietas causa est tam frequentis insultus cur non idem in omnibus & interpolatis, & continuis febribus eueniat, cum vbique saltem & duo, & tres humores in vitio sint, & ferè semper & bilis & pituita in mesenterio confusa sint, quorum vnus sine altero vix attingitur, saltem vix *i. de diff.* calit vnus sine altero. Nam quod de humoribus & spiritibus *febr.* dixit Gal. exemplo lebetis, nimirum dum incaluerunt spiritus, humores quoque partem caloris concipere, & dum humores incaluerunt, in solidis partibus calorem quoque con-

528 CONSILIORVM MEDICINALIVM
cipi, id hoc loco maximè considerandum. Quasi verò siue
humores sint confusi, siue separati sint, fieri queat vt intacto
alio, alius ardeat. Quod si fit, cur non in omnibus febribus
inæqualitates & horrores fiunt. Tertium à nobis propositum,
est vt Arculani doctissimi opinionem proponamus necnon
Hollerij artis nostræ scientissimi de febribus horrificis, & hor-
roribus qui in febres incidunt.

De causis inæqualitatis in ægro ita statuo. Phlogosis erat in-
terna maxima, maxima saburra humorū ita conclusa, vt nil eua-
cuari arte posset, credo proximè hepar putrefactos humores ita
fuisse conclusos, vt proximè eius parenchyma afficerent, vrinæ
nihil biliosi humoris in tāto æstu continebant: pulsus durus &
vibrans ita totam massam & sanguinis per omnes humores pro-
miscuè confusos arsisse, ac putruisse significabat, vt non possent
non multi horrores & inæqualitates surgere. Nam cum vapor à
putrentibus humoribus calidus efferebatur, sensum caloris
proximum inducebat, qui cum exhalauerat, tepor partium re-
manebat. Atque ita factum est, vt septimo die de repente
ferè interierit, calore naturali victo à calore contra naturam,
qui vnà quoque extinctus est vt denuo reac cendi non potuerit.
Quod sciri ampliùs potest ex his quæ à Galeno dicuntur in hi-
storia de Pythione, vt antè explicuimus. Recurre ad lo-
cum istum. Item Galenus, *In morbis summè malignis par-
tium extimarum permutatio vnà horâ ad contraria efficitur* (ideo
Hippo. in textu dixit,) *Si celeriter partes commutentur. Inter-
dum quidem vt hyeme fit, perfrigescant, interdum, vt æstate fit, vt in-
calescant. Id autem contingit cum propriam caliditatem non habuerint,
atque à febrili calestant. Que à corporis medio incipiens, flammisq;ue
similis totum corpus depascens, extrema concalfacit, quæ & cum transpi-
rauerit, statim & ea refrigescent, extinctâ nimirum nativâ caliditate.*
Est enim magnum argumentum calamitatis cū ne sufficit qui-
dem calor minimus ad conseruandum mediocrem caliditatem
in manibus & pedibus. Immò & extinguitur ipse calor contra
naturam. Nam in quibus multus inest & expansus, saltem ma-
nus sua caliditate acri perfundit. Maximè verò sensus horro-
ris & inæqualitatis adest, cum non modo contenti in mesente-
rio & præcordiis humores sunt affecti & putrefacti, sed cum in
venosum genus labe ipsa serpsit ac dimanauit. Quod huic ma-
ximè viro contigerat.

Part. 8.
lib. 2.
Proth.

Quod

Quod ad quæstionem secundo loco positam, nimirum cum in corpore rarò vnus humor peccet, vt declarant euacuationes quotidianæ, & quòd quotidie dantur cathartica non vnum humorem euacuantia, sed multos simul, quare non omnes sunt febres horrificæ! Dicendum alios quidem humores ob communicationem incalescere, sed vnus maximè incalescit per putredinem, alij nondum putredinem contraxère. Vel, dicemus multitudinem materiæ *περὶ τῆς*, in semitertianis, & aliis febribus horrificis inæqualitatem inducere, quæ si similis esset in interpolatis febribus, & conclusa in vasis maioribus & confusa, pares rigores induceret. At illa cum initio paroxyfmi horrorem induceret, quod diuersiformis quodammodo foret, accedente incremento fit vniufmodi. Et quod in corpore multi sunt humores qui à medicamentis educuntur, sunt potius fœces quàm humores, qui cum abstrusi sunt, si putredinaliter accenderentur, facerēt febrem. Si coniuncti, febrem sui generis, si diuersi & distincti, erraticas febres. In febre tertiana vna pars humoris putret, & alia imputris manet: Item in Epiala, & tamen caloris & frigoris sensus simul non inducitur in vtraque febre. Quod notandum, vt scias quid materiæ varia dispositio, & varietas efficiat.

Tertium de quo diximus nos dicturos explicando quid his de rebus sentiat Arculanus, pertinet quoque secundum vniuersale propositum, quod quæsieramus an in febribus continuis paroxyfmi sint. Et an non nomen *παροξυσμῶν* commodiùs ad intermittentes febres referatur.

Arculanus ita de istis rebus statuit vt doceat, & quomodo febres intermittentes sine rigore, horrore, & frigore incipiant, aut eo saltem leui: item quomodo febres continuæ reduplicaciones habeant cum horrore, rigore (nam non intelligimus hoc loco nomen rigoris qui præcedit crisin aut sudorem in continuis) ac si periodicus esset & typicus. Verba sunt eius, initio phlegmaticæ febris continuæ, ait Auicennas, quod idem de febribus aliis audiri potest, exacerbaciones incipiunt à frigore, aut horrore non quia materia eius spargatur per membra sensilia, sed quia materia mouetur propter copiam sui ad venas minores naturalè calorem suffocantes: Id est, dum putrens materia à loco in quo coerceretur in venas minores & aliquas angustias mouetur, sensus quidè aut rigoris, aut frigoris percipitur.

Cap. 4.
de febribus.

Item quòd febres periodicæ & intermittentes possint incidere in quempiam nullo præeunte typico, aut frigore aut rigore, causa hæc est ait Arculanus, fieri potest vt materia quæ per membra sensilia spargitur eo modo sit disposita quo est post rigorem in incremento alicuius paroxysmi. Atqui in augmento rigorem non infert: quia potis est benigniorem illam materiam effectâ esse, & ideo tardè moueri ad membra sensilia, & sicut mouetur, ita calescit, & acquirit dispositionem similem ei quæ est in augmento. Et tunc non suboritur rigor^s. Immo (ait) in paroxysmis febrium interpolatarum videmus subintrare alium paroxysmum sine rigore, aut frigore. Porro quomodo in febribus continuis paroxysmus fieri dicatur, explicatum est hoc in lib^o. Et in definitionibus meis medicis¹. Ex his quatuor quæ à nobis proposita sunt, duo restant breuiter explicanda: prius cur alius nil reddiderit de materia morbifica, cum tamen liquida redderet, sed nil proficientia: posterius de hydromelitte. Quod ad prius attinet. Cum in febribus ardentibus, qualis erat ea quæ Sangermanum affligebat, calor multus sit cur non excrementa sunt *αυξηδόνια*? An in febribus istis continuis liquidior alius esse potest? Ita fanè & tunc malum est vt signum & causa. Vt signum quia vel colliquationē significant, vel tantam phlogosin, vt omnia intrò reuocet, & auidè retineat, vt potius sequatur colliquatio, quàm quicquam è materia extrahas, vel significat vi caloris contra naturam labefactatas esse partes naturales, vnde sæpè chylosa excernuntur, vel declarat tantùm decedere aliquid liquidiusculum ob copiam potus quo immoderatiùs vtuntur ij quibus interiora æstuant. Vt causa verò, quoniâ vires intereà labuntur, cum non excernantur qualia excerni debent, cum defraudetur sæpè naturæ genius debilitato ventre, & quod non est amplius locus medicamētis solutiuis educturis materiam morbificam. Eorum enim vis eluditur ab ista qualicumque versa superfluitate quæ aluo egreditur ac effluit. Et multos sic interire vidimus excretis quibusdam liquidioribus, & retentis partibus crassioribus quæ morbum fouēt^v. Et in talibus quòd plus effluit de ista superflua humiditate, cò magis à calore còtra naturam subigente venter intumescit.

Medici plerique delectantur tali vacuatione nos contra Hippocrates in Prognosticis, & in libro Acutorum docet quomodo inflammatis venis lactium alui fluor symptomaticus cò-

tingat, tum ob *ανάδοση*, prohibitam vi inflammationis, tum ob generationem ichoris & saniei vi eiusdem inflammationis. Atque in acutis febribus liquidiorum sæpè esse aluum docet, ratio est, ait Gal. quoniam tales humores sunt crudi ac serosi, & tenues, quia omnis coctio crassificat. Et in Epid. In febribus continuis obseruat excretionem multarum superfluitatum aquosarum quæ nihil ferè iuuant. Et quod notandum eodem libro ait, duabus de causis profusorem aluum fieri in acutis, ob colligationem & phlegmonem. Sic diuersa ratione in acutis aluus astringitur & effluit. Mallemastringi, quoniam humectando solueretur, & purgatio sequeretur: sed cum effluit liquidis excrementis ferè rarò proficit, & non purgatio est, sed euacuatio tantum eaque symptomatica. Immo effluunt sæpè ea quæ retineri debent. Vide de iis plura capite de fluoribus alui antè, & in nostris definitionibus medicis in voce *σπυγγώδης*.

Nunc ad hydromeli conuertatur oratio. Quærebamus an cum *μεγαλόσπυγγος* esset (interpretatur viscerosus) non læsus fuerit vsu hydromelitis quotidiano. Ac primum quid *τὸ μέγα-σπυγγός*, nomen significet videndum. ^{12.} Reperio apud Hippocratem *τὸ μέγαλόσπυγγος*, & actiue & passiuè sumi. Actiue quidem vt cum dictum est vinum dulce esse *μεγαλόσπυγγον ἢ ἀπληθὲς ἢ ὑπὲρ τὸς*, id est, dulci vino inesse vim tumefaciendi, & in molem efferendi splenem & hepar, propter eam quàm paulò post explicabimus rationem. Passiuè autem cum dicitur *ὁ ἀσθρῶπος μέγαλόσπυγγος*, cui hepar & lien, aut alterutrum intumuit, vel ob scirrhum, vel ob phlegmonem, vel œdema aliquod, aut affectum aliquem confimilem, quomodo affectis melicratum nocet, ait Galenus in comm. Tertium venarilicèt ex Galeno Commentario in eandem particulam significatum, vt *ὁ μέγαλόσπυγγος*, dicatur is cui ex naturæ prima conformatione viscus illud duplex magnum est ac elatum. Atque eo insensu æger noster dum integra sanitate frueretur dici potuit *μεγαλόσπυγγός*, erat enim vt sic loquar, iecorarius, id est amplo iecore, feruente, æstuoso, & idèò rerum dulcium vsu valdè eum offendi par erat. Immo quod tam sæpè ægrotaret, & tam grauibus indomitisque morbis sæpè teneretur, non aliundè causa quàm ab vno hepate quærenda fuit. Vt etiam cum lubrica sua sanitate vteretur secundum vocis illius *μεγαλόσπυγγός*, significatum attribuere non fuerit alienum. Non enim dubium fuit quin latens obstructio, aut ali-

Part. 4.
lib. 4.
de diata
acut.

Part. 30.
sect. 2.
lib. 1.

Epid.
P. r. 40.
lib. 4.
acuto-
rum.

Partic.
a. sect. 3.
lib. acuto-
rum.

Partic.
cul. 9.
eiusdem
lib.

quid simile fuerit. Atque melicratum illi obfuit per se & ex euentu. Ex euentu quidem, quoniam cum melicratum aluum soluat bifariam, aut generando bilem, quia mel, bilescit, aut acquirendo acrimoniam, quia in biliosis æstuosisque aluis mel faciliè acrimoniam acquirit, proptereaque aluū sollicitat, contingit vt iste æger alui libertate donatus neglexerit ea solemnia remedia quibus propter plethoram & cacochymiam sapiùs in annò utebatur. Satis enim sibi suæque plethoræ factum putabat, quod liquidiusculè aluus ferretur. Immò initio pastuum cum primum hausisset iusculum ad desidendum desurgebat, & id in lucro deponebat in bonis que ducebat. At ista alui subductio non erat naturalis, sed potiùs erat veluti quædam σπαρτή, id est, humida quædam excretio, ita enim verto, non quomodo interpres qui nomen τῆς σπαρτῆς, reddidit nomine lienteria. At aliud longè est. Nam si quis præter consuetudinem nondum mitificato, aut diuiso cibo edat bibatue, laxatur aluus liquidioze excremento, immò sæpè deiiciuntur ea quæ assumpta sunt parum mitificata, an lienteria dicetur? Nequaquam, sed propriè σπαρτή vocabitur. Quod notandum, vt teneantur rerum distinctiones, quas negligit otiosa hominum sciolorum ignorantia.

Ac dum solennes purgationes neglexit, ita congesti sunt prauis humores, ita sanguinis massa infecta, vt ad oriente graui morbo, ei necessario fuerit intereundum. Norandumque vnum est. Solebat colicis doloribus diuexari. Non cum per annum integrum insolitò exercuerunt: sed ea praua materia istorum dolorum parens aliquo tempore feriata infœlicioze euentu suam frequentiam compensauit. *At quicumque olim grauibz morbis occupari soliti sunt, tamen si dent inducias, immò planè extincti videantur, de iis securos esse non oportet, cum sæpè alij morbi pro aliis succedant. Quod multos fecerit, quos incautos, aut reuiescentes morbi, aut noui & insolentes, aut oppreserunt, aut funditus è medio sustulerunt.* Porro de hydromelite hoc dici potest, quod de vino dulci dicit Galenus, docens quomodo & ratione dulcedinis, & crassitie offendar. Dulcedinis quidem quia omne dulce dum impense coquitur amarum fit, ratione crassitie, quia cum dulce fit, & ideò faciliè attrahatur ab hepate tanquam ferè crudum & incoctum faciliè obstruit hepar & lienem. Subit enim minutissimas venas, in quarum anfractibus mel, & aliud dulce contentum dum efferuescit, & incrassatur sibi ipsi viam obstruit, &

Vide
partic.
12. lib. 3.
acutorij.

Par. 22.
lib. 2.
Acuto-
rum.

Com. in
lib. 3.
acuto.

præcludit. Et notanda sunt ea valdè de distinctione facilitatis obstructionis in pulmone, hepate, & liene. *Pulmo non ita leditur usu vini dulci, ut hepar & liem, cum bronchia crassum habent humorem. Nam in hepate ex amplis venæ portæ vasibus ad angusta vasorum tum gibba, tum sima progreditur extrema, per qua eorum omnium quæ in corpus totum digeruntur transmeatio fit. At in pulmone contrario euenit modo. Nam per venas multas digestum confectumque in amplam bronchorum, & primo minorum irruit capacitatem, atque ab ipsis ad maiora excipitur, secum & crassos tollens humores, quibus non calidius solum, verum quoque & tenuius existit, &c.* Neque quæ de vino crasso dicuntur, ea de melle omninò dici debent. Si quidem non est ea partium crassitudo, quæ inest vino dulci. Ut ne quis omnino ea ratione hydromelite aquoso carendum putet. Sed si inflammata sint viscera magnas mel incommoditates affert. Quod non modo de vera inflammatione audiendum est, sed etiam si quis naturâ hepar habeat præcalidum, & aluum durum habeat ob ventris caliditatem. At noster eger calidissimo erat temperamento, ut ferè longè à medio discederet. Declarabat suffusa rubore facies quàm magno esset hepate, & calido. Et minimo vini usu offendebatur, quod declarabat vim caloris alieni, & vaporum ab hepate calido excitorum copiam. Ergo cum visceribus natiua quædam esset *διερεσις*, hydromeli nocuum fuit. Nam viscera rapiunt mel avidissimè, & eo impensè delectantur. Quæ omnia à Galeno præclarè demonstrantur. Et longum esset ea referre.

Aliam quoque incommoditatem affert mulsa, quàm in hoc ægro nouimus, biliosa deiicit, aliquando bona, aliquando mala. Bona biliosa non dicuntur, quod quæ excernantur bona sint, sed quia serum suum habent, mala biliosa dicuntur ea quæ syn-cera sunt, & natiuo suo sero ob colliquationem & ardorem destituta, ut hoc loco & in Aphorismis dixit, hinc ignea bilis est, flaua, crassâque quæ mala est ut signum & causa, ut signum, quoniam ardorem immoderatum & phlegmonem inducat, ut causa quoniâ nil, dum excernitur, iuuat, ardorem nõ extinguit, sed fermè augèt: *ἄσπευ, πυμασπυδὲς ἢ δισποείας* infert, ut ait Hippo. quod mirum est, immò & intestina exulcerat¹³. Quæritur hoc loco potest an mulsa per se ista biliosa bona, aut malefica malignaque (ut Galenus loquitur insolito loquendi more, dum vocat, biliosum malignum & maleficum ab effectu, & generatio-

Ibid.

Com. ad
part. 11.
lib. 3.
acuro.Duplex
bilio-
sum.Com. ad
Aph. 6.
lib. 7.Gal.
com. ad
particu-
lar. 23.
14. lib. 3.
acnifor.

534 CONSILIORVM MEDICINALIVM
nis modo) efficiat, an excernat per se, an ad generationem fa-
ciat, an eatenus mala, aut bona. Reuerâ facilitatem excretio-
nis potest afferre, sed dum auget incendium, & promptissimè
bilescit in vitio viscerum & *διεσπασίᾳ*, multis modis potest dici
afferre *αἷμα ἢ ἐκβάσις*, læsiones & offensas: multa ad eam rem af-
ferri possunt, at verendum fuit ne satietas fastidiùmque tantâ
orationis prolixitate pariat. De melle legi aliqua possunt eo
loco vbi de lacte disputamus.

ANNOTATIONES.

- 1 *Hic nunquam salubrius vixerat, nunquam omni ex parte magis sanus, quàm cum eo morbo funesto captus est. At κοῤῥοία, & sanitas ista suspecta erat: verumque comperimus illud. Circa faciem coloris suauitas & sudores sine febre, aut vetus stercus subesse significant aut dietæ ἀταξίαν. Vide locum præclarum cap. 2. lib. 2. Celsi.*
- 2 *Vir iste quindecim ante mensibus laborauerat, quâdam specie arthritidis in omnibus articulis, in collo à corruptione humorum & serò maligno. Talem speciem morbi vnus Hippo. animaduertit in fine lib. 2. Prorrheticon. Quin dicit eos quibus viscera magna sunt, & quibus primis annis hæmorrhagia frequentes fuerunt, doloribus articularum esse opportunos. Quæ conditiones in isto viro apparuerunt. Præterea de eo illud fuit verum quod ait Gal. ad part. 70. sect. 3. lib. 3. Epid. quod quibus multus sanguis generatur isque calidus ij faciliè melancholici fiunt.*
- 3 *Ad Hist. 2. sect. 3. lib. 1. Epid. de Sileno locus est præclarus. Vbi docet quomodo & biliosi humores & crudi simul generentur: vnde (ait) morbi grauißimi generantur. Id quod ad semitertianas extendi potest.*
- 4 *Verè illius inæqualitatis huius horrifficæ causam ad phlogosin retulimus. Nam Gal. com. ad part. 42. sect. 2. lib. 1. Prorrh. docet horrores frequentes circum dorsum, & cum iactatione significare phlegmonem harum partium.*
- 5 *Inæqualitas materie maximè facit febres per totum tempus inæquales vt sunt horrifficæ. In multis morbis & corporibus vnus humor in vitio est, & facit orgasmum. Vt in biliosis ferè sunt febres vnißmodi, vt tertiana, aut continua. In melancholicis similiter. At in quibus temperamentum ad biliosum tendit, & hepata sunt calidiora, vita verò institutum est pituitosum, aut alia ratione pituita generatur, in iis inæ-*

quales, erraticæ sunt febres. Quemadmodum tum cholera morbus pesti-
ma & flatuosa & sicca generatur, cum calidis & frigidis simul quis
usus est. Quia contrarietas materiae impedit uniformem motum. Ita
cum simul putrent & mouentur, & concipiunt calorem, sed inaequaliter
duæ materiae, tum duplex natura datur negotium. Declarat uxor Do-
mini Courtilier, & uxor Ioannis Debures. Id quod Gal. ad hist. De
Sileno lib. 1. Epid. sect. 3. explicauit. Docet enim grauissimos tunc
morbos generari cum est bilis prouentus & crudorum simul humorum.
Quomodo autem uterque humor succrescat abundè docet.

6. Hoc saeculo magna pars ardentium febrium à rigore incipit. Tamen
Gal. ad part. 7 5. sect. 2. lib. 1. Epid. ait rigorem statim initio proprium
esse malignitatis. Et hoc anno 1580. quotquot ferè correpti sunt peste,
iis præcurrit rigor. Et rigor prodromus fuit pestis adorientis.

7. In febribus paroxysmi sæpè sunt apparentes aliquando non. Et
in continuis annotationes sunt, seu *παροξυσμοί*, seu, *ἐπινοήσεις*, aliquando
diurna, aliquando nocturna, sine rigore, aut manifesta molestia. Has
ἐπινοήσεις ἀδύνατος, Græci vocant, ut Gal. docet cap. 9. lib. 1. de different.
februm. Interpres vertit incompressas, sed ineptè. Alius, æquales.
Minus ineptè, ineptè tamen. Et quamuis cap. 7. eiusdem lib. *ἀδύνατος*,
nomen pro compressione ad pulsum refertur, tamen τὸ ἀδύνατος, pro incom-
pressa sumi non debet. Ergo ἡ ἐπινοήσις ἀδύνατος, dicitur, quod careat
iis angustiis & molestiis quibus premuntur alij per accessionum initia.
Et doctè Galenus explicat, & quomodo illud τὸ ἀδύνατος, in hæcticis, & in
quibusdam aliis febribus obseruandum.

8. Vnde, qui tertianarij se lecto continent, sæpè rigorem: aut cum exi-
guum, non sentiunt.

9. In febribus continuis præsertim ubi multa inaequalitas materiae
& motus; si corpus debile, & minimè obsequens materia, horrores ap-
parent, & deinde incandescencia, sed isti horrores aggressiõis tantum
sunt inanis, vide 7. Epid. de muliere quadam.

10. Hippo. lib. 4. Acuto. part. 13. In causo febre non legitimo alium
solui docet, non de materia morbifica parte excreta aliqua, sed corruptio-
ne alimenti quod sumptum est. Et quod valdè notandum docet quo-
modo foco febris ardentis existente in hepate aliàs alius soluat, aliàs
astriçta (si particula 17. lib. 4. acuto.

11. De his verus Aphorismus & quem in multis depræhendimus:
Ventriculi circumtentio ad necessitatem liquida deiciens, citò intumescens
conuulsuum quippiam habet. Apho. 7. lib. 3. Præth-

12. Et fundati sumus opinione ipsius Hippo. nam dum facit mentionem de inflammatione lactium & ieiuni nam inflammationem necessario sequitur alui fluor (& hic fluor non debet dehortari venæ sectionem) sed talis fluor, nec dolorem soluit, nec ventrem mollit: Inflammatio autem & morsus intestinorum & doloris causa est, & fouet istum tumorem.

13. Ideo lib. 2. Epid. & in Prorrh. fines morborum in deiectiones synceras desinentes damnat, quia sunt male, ut signum & ut causa.

CONSILIVM CXI.

De febre continua & destillatione ferina.

Filius Domini Chaluzæi equitis torquati, annos natus decem in febrem continuam incidit cum ferina destillatione coniunctam. Et quemadmodum omnes morbi qui vehementer hominem adoriuntur, facere solent, hic morbus statim terrificam attulit symptomata. Leienterica fuit fluxio, deinde aluus planè astricta est. Tussicula erat inanis, arida, effera, tenuis. Metus erat febris hecticæ, cum videretur calor arens, ficcus, squallidus, genarum rubores fugaces, calor summus in pectore, lingua fuliginosa, fitis, dolores in latere dextro fugaces. Denique morbus erat *κακός*. Nam in quavis febre præter rationem collabi, malum. Quod quomodo intelligi debeat, & tamen ad artem faciat plurimum abundè explicuimus antè. Et omnes morbi maligni, quorum aut in acrimonia caloris colligantis natura posita est, aut in ferina destillatione, aut in translatione maligni humoris, hoc habent peculiare, vt subitâ consumptionem, & collapsum afferant citra vllam insignem euacuationem. Ac reuera si is morbus fuisset neglectus, aut si temerè de eo medici securi fuissent, inopinatò repentè fuisset ereptus sideratis veluti pulmonibus à ferino. Obseruarunt enim primates quidam medici rerū diligentes indagatores in paribus destillationibus sideratis pulmonibus & lateribus redditis *κατὰ τὸ ἐμπειρικόν*, repentè interiisse. Adeo magna est vis *τῶν δυνάμεων ἐπιεικῶν*. Vide quod sit *τῶν δυνάμεων*, apud Hippo. lib. 6. Epidemiorum. Atque non tam in metu febris erat, quam destillatio, quæ speciem siccæ pleuriti-

pleuritis, aut peripneumonia fecisset, tum per translationē à capite, tum per raptum à partibus inferis. Nam pulmo accensus vndelibet trahit magno impetu, & vnam speciem peripneumoniae facit eo modo, vt explicuimus ante. Et obseruauimus in eo valdè magnam cacochymiam (nunquam enim ægrotauerat) euentusque probauit iuuiffe plurimum ad dolorem lateris & accersendam inflammationem colluuiem humorum, vt contra vulgarem opinionem sæpius melius fit in doloribus laterum præsertim cum opinio est de translatione tenuiū ichorum à partibus inferis, purgare quam fecare venam. Ideo dicebat Gal. minus auxilium ex sectione venæ quam ex purgatione sequi, sed securius: quia medicamenta augent febrem. Nunc verò cum alia habeamus lenientia, & maius, & promptius & æquè securum præsidium in purgatione locabitur.

Sicca erat pleuritis, non eo modo quo dicitur morbus siccus, id est, crudus, sed sicca, sine sputo dicitur. Quod ne mirum sit, hanc appellationē Hippocrates primus inuenit. Vocat enim quandā pleuresin, Pleuritidē *αίον πύδρα*. Rubor est genarū fugax, & quædā *αίχμοι*, quæ in malis ducitur. Et reuera rubor genarum inflammatorum pulmonum, aut inflammationi proximorum est indicium. Quidam aliquando, vt hoc probaret citauit prognosticon Hippo. At reuera de rubore genarum illo loci, ait Hippo. sed de purulentis sermo est: præter ruborem est indolentia, iactatio, dormiendi impotentia, caloris acris, sed fugacis sensio, tussis inanis, scabra lingua, sitis ingens, summi caloris in thorace perceptio, sputum eludit spiritum, vt paulò post ex Galeno dicemus. Actussium inanium & aridarum duo sunt cum materia tenui quidem, sed quæ tandem aliquam crassitudinem acquirit in pulmone, cuiusmodi est pleuriticorū tussis initio. Alia est tussis inanis, quæ nil postea relinquit, est autem eius causa spiritus ichorosus, aut ichor spirituofus omnis expers pepasini. De priore agit Hippo. infestabantur arida tussi, nil excreabant, quibusdam testiculus inflammabatur. Qui factus fuisset abscessus illius materiei, nisi moram ea traxisset, & satis eius fuisset ab abscessum commemorabilem? De posteriore potest intelligi ex eo quod Hippo. scribit cum ait in inflammatione hepatis ob serum resudans fieri *αίχμα & θυμὸν*. Tussim & tussiendi inaniter desiderium. Tussis, si magis materiale est serum, *θυμὸν*, conatus tussiendi si magis efferum, tenue,

3. de morbis
Et lib. 1.
Et part.
21. lib.
4. acuto
Memento
nit or-
thopneum
sicca ob
spiritu
interce-
ptionem

Part. 12.
sectio. 1.
lib. 1.
Epid.

2. Præ-
nost.

Par. 28.
sectio. I.
lib. I.
Epid.

spirituosum. De ea materia mala, cacoethe, pepasmi incapace cum passim alibi Hippo. tum maximè in Epid. agit, fauces dolebant, ruborem habebant, rheumata parua, tenuia, acria, statim extenuatæ, & malè affectæ fuerunt. Et de filia Euryanactidis, huic fauces initio dolebant, gurgulio retractus, destillationes multæ, acres, tenues, & addit sub finem *συσπυκτων φθισιδες*. Plura nos explicuimus in voce *ἐνεσ*. Cæterum non dicam plura de hoc ægro cum idea huius morbi explicata ferè sit, & ad vnum expressa in duobus pueris Ioanne de Heruille, & Melchior du Fresnoy. Tantum de duobus monere oportet, quod video nullos apud Hippocratem legisse duplices esse pleuritides, alias cum sputo, quæ & siccæ & humidæ dici possunt: siccæ, initio, cum nondum procedit sputum. Aliàs sine sputo, vt quales sæpè hyeme grassantur, & quæ à calore fundente & colliquefaciente sunt, item quæ à ferino oriuntur, quæ omnium deterrimæ cum sensim cuniculos agant. Alterû est quod omniratione in siccis pleuritidibus humectare conuenit, tum ad retundendam humoris acrimoniam, tum vt tranquillior redditus cedat Naturæ, nec ita per colliquationem pestilentem hominem *λασπαιος*, offendat ac necet. Et Hippocrates visus est huius morbum pueri & descripsisse, & præfensisse. quid futurum fuisset nisi arte cautum fuisset: *Resiccatum id quod insluit, & in gutture compactum, vt pote quod non eluitur, sed paulatim insluit ac detinetur, tussim excitat, & quod defluit in aortis detentum angustum spiritui locum exhibet, & talem spiritum habere facit, qui veluti defectus semper respirare concupiscit (id est quædam *βραχύπνοια* & *σπυρα* fit) & in pulmone veluti non vehementer humido existente pruritus contingit: Cum multum è capite fluxerit, pruritus in pulmone non fit. Locus præclarus. Et reuera ista inanis tussis erat à pruritu, & qui tenuis & paucus humor pruriturum faciebat, idem dolores fugaces in thorace faciebat. Reuera obseruauimus quod dixit nêpe ob pruriturum istum difficultate spirandi laborasse: Immò si moueretur minimum, dicebat sibi spiritum deficere. Quomodo autem omni ratione in sicca pleuritide humectandum sit Hippocrates docuit, & nos hunc secuti id præstitimus in hoc puero, in Damisella in hospitiò Briennæ. Item & ea quæ omni ratione inspissarent exhibuimus. Sic enim consuluit Gal. *Scis, ait, pulmonem ipsum ab humoribus crassis & viscosis per tusses expurgari. Nam qui sunt aquosi & extremè tenues, ærem qui tussiendo emitti-**

Lib. de
locis in
hominè.

Pruritus
in pul-
mone.

Lib. de
locis in
hominè.

tur, circumfluunt. Aer enim tanquam manus quedam existit, quæ sursum crassos humores ferat. Quod si crassi fuerint, non humiditate tantum opus est, sed & deterfione quæ ab acidis fiat succis. Itaque puer, de quo agitur, alio soluta leniendo, temperato calore, sectione venæ, anodynis, & omni humectationis formâ breui restitutus fuit, & suo pulmonis pruritu liberatus. Cæterum vnum annotare oportet qui fiat, vt in multis morbis acutis somnus laborem faciat, conuulsiones & timores afferat, cum contra iuuare debeat. Ac primum quatenus in somno reuocantur intro spiritus, calor vnâque humores, ea ratione nocet maximè in febribus & inflammationibus internis, nisi ratione coctionis quæ sit per reuocationem istam maius commodum sequatur, quàm sit id incommodum quod ex reuocatis intro humoribus insequatur. Nisi quis dicat parum etiam prodesse somnum in febribus ratione primæ & secundæ digestionis, quòd per vigilias vrgeat, vtrâque, vt tertia digestio per somnum vigeat. Vt declarat inuoluntaria feminis excretio quæ nobis dormientibus fit. Ac de somno, causis, vigiliis, vtrorumque formis antè à nobis dictum est. Nunc explicemus qua ratione fiat, vt somnus aliquando obfit in febribus, & quomodò id fiat. Ac primum de somno mirabile est quod ab Hippocrate scribitur: dum enim nititur demonstrare in sanguine magnam vim inesse ad prudentiam & intelligentiam, docet ex contrariis effectis tum in somno, tum in morbis acutis. Atque in somno quidem quoniam refrigeratur sanguis, ideò vacuitatem quandam prudentiæ contingere docet. Nam (ait Hippo.) cum corpus somnus inuaserit sanguis frigesit. Infrigiditate autem sanguine languidiores fiunt meatus, hinc constat, quoniam somno ad grauata corpora reclinantur, & oculi ardent, & prudentia permutatur, opinionones peregrina mentem occupant, quæ in somnia appellantur. In acutis morbis quoque apparet quantum sanguis ad prudentiam conferat, quoniam cum primum in sanguinem mutatio aliqua euenerit, tum demum mutatur & deterior fit prudentia. Sanguis (ait Hippo.) qui est in homine, maximam partem ad prudentiam facit, quidam dicunt totum. Cum bilis commota ad venas & ad sanguinem ingressa fuerit sanguinem ex consueta compage ac motione dimouet, & serosum facit ac calfacit. Calfactus autem etiam totum corpus calfacit, & desipit homo, & non sibi constat, pre febris copia, & sanguinis ad serositatem transmutatione, & motione non solita contingente. Quæ quatuor

Com. in
parr. 2.
lib 3.
acuto-
rum.

Lib. de
flatibus.

Sab. f.
nem lib.
I. de
morbis.

notanda sunt vt generetur phrenitis, nimirum vt bilis commo-
ueatur, & sanguinem conturbet, vt dimoueat sanguinem ex
compage, ^{αἰμασις} Græcè κίρνωσις: tum vt serofus fiat sanguis, Græ-
cè δισυερίν, (cuius verbi magna vis est) & calfiat. Sed hæc
sint ^{παύσηρα} præclara tamen. Ergo somnus refrigerat, interiora
tamen calfacit ex euentu, corpus reddit grauius & stupefacit.
Sed in febribus ob dominatum caloris contra naturam grauia
sæpè inducit symptomata. *Ideo, (ait Gal.) in somno & labores,*

Com. ad *& tremores, & conuulsiones fiunt cum in somno humor infestus ad so-*
Apbo. *mmum peruenerit, tunc magis intra, quam extra natura mota². Et vt*
67. li. 4. *somni à cibo replent caput, sic in plethoricis dispositionibus, somni ipsum*
replentes ag grauant cerebrum. Et in somnis aceruati mali humores
magis euaporant, cum iuncti permaneant, sicuti actiones utiles somnos
conciliant. Et notandum quod in comm. isto addit Galenus, in
morbis exitialibus ista terrificæ ex somno euenire symptomata
obseruauit. Ac si dicat, non semper euenire, vt somnus noceat,
sed cum victor penè est calor extraneus, & humorum indomi-
ta est ^{καταρρα}. Alia autem signa lædentis somni ex eodem Gal.

Com. in *sunt, quoniam per somnum non soluuntur febres, immò ex-*
Apbo. *tenduntur dolores augentur, fluxiones multiplicatur, crescunt*
1. lib. 2. *inflammationes, hæc contingunt ob humorum prauitatem,*
quos calor innatus fortior euincit, & coquit. Cum debilior,
succumbit, & ab his viscera ag grauat: Ac cum iuuat, bonum;
Non quod omnino verum sit propterea saluari ægrum. Non
desinit enim aliquando etiam mori, præsertim si qua dispositio
fit funesta, vt abscessus internus. Et Gal. citat Hippoc. in
Epid. inter hos multi erant graui somno oppressi & delirantes,
nonnulli verò ex somno. Nam illo loco Hippo. meminit phre-
niticorum & febre ardente laborantium, queis altus sopor
obortus est. Phreniticis quidem ratione accumulati in cerebro
humoris, & ratione affectionis ipsius cerebri, in febribus autem
ob copiam vaporum à calore extraneo summissorum, & exci-
tatorum.

Sec. 10.
3. lib. 3.
Epid.

ANNOTATIONES.

His consentiunt multa præclara lib. de vetere medicina scripta. Vbi
2. x. professo docet quid sit coquere in catarrhis, & quomodo à vehemen-
eibus medicinis sit cauendum.

Et com. ad particul. 34. sectio. 3. lib. 3. Epid. Notat Gal. crinata in febrem ardentem incidere, & quæ ratione id feret. Quod nostro Sangermano contigit.

CONSILIVM CXII.

De Hypochondriorum phlogosi.

NICOLEA LE BE, annos nata quatuordecim nondum menstrua, calidis & squallentibus visceribus prædita, post multam insolationem in ripa sequanæ, & potum tum aquæ immoderatiorem, tum etiam vini (quod tamen ei nocentissimum est) cepit grauitè dolere totum ventrem & hypochondria. Aluus substitit. Minimum pressum digitorum non fert in vtroque Hypochondrio, nec in pube ipsa, immò nulla non in parte totius abdominis inflammatio erat, & multa colluuius humorum, cuius pars tenuior, & ichorosior, & malignior speciem inflammationis fecerat ac si de hydrope subito oborto metus effer. Et reuera siccus hydrops facilè ortus fuisset per lactium inflammationem. Nullam in partem moueri poterat quin quereretur de dolore. Alij ad instans menstruum tempus hoc referebant, quo tempore sæpè orgasmus & impetus fit sanguinis in omnes partes. Hoc quidem iuuare potuit. Nam constat ex libro de virginibus Hippo. quæ & qualia accidant virginibus instante tempore menstruæ purgationis. Tandem neglectis multis quæ vtramque in partem afferri possent, tentato medicamento ad venæ sectionem accessimus ter aut quater repetitam, etiam ex vtroque brachio. Magna erant argumenta latentis inflammationis, & quæ vires maiores acquiuisset, nisi tempestiuè puellæ occursum fuisset. Ideò autem cunctantiùs medicamentum tentauimus, quod frustra nos aliquid agere putaremus. Moniti quoque eramus iis quæ ad hunc ferè scopum ab Hippocrate scripta sunt dum loquitur de Hypochondriis inflammationis phlogosi quadam sine tumore, siue sint *συσφοδαι*, vt ibidem loquitur, id est, vt in partibus ipsis intumescētia sint aliqua: *συσφοδαι*, enim dicitur, *ἀπὸ τῶν σπέρματων*, quòd congeratur, concluda-

Part. 11.
lib. 4.
de Acu.

tur, ac colligatur in parte humor aliquis. Verba Hippocratis hæc sunt. *Hepatis dolores & splenis grauitates, & alie inflammationes, ac morborum collectiones (id est, ait Galenus) cum vitiosi aliqui humores in partem quampiam confluunt, & in ea coacervantur, quod à sine πυροδὴ dicitur, solui non possunt, si quis prius medicamentis purgantibus purgare aggrediatur. Nam venæ sectio in talibus principalis est, deinde infusa per dysteres. Et post venæ sectionem, purgans medicamentum securitate ac moderatione opus habet. Quicumque ea quæ inflammata sunt, statim in principio morborum medicamento soluere volunt, ij non solum ab intensa & inflammata parte nil adimunt, cum non cedat quæ cruda est affectio, verum & quæ morbo resistunt, & sana sunt, absumunt colligantque. Ductioque ad imbecillitatem corpore morbus superior euadit, qui vbi corpus vicerit, remedium non habes. Idē in Aphorismis scripsit. Quicumque, ait Galenus, multa cruditate laborant, vel qui tenaces ac crassos cibos assumpserunt, quibus in idem Hypochondria intumida atque inflata sunt, aut supra modum calida atque ignea sunt, (quanquam in quibusdam codicibus legitur) ἔχουσι πυροδὴα ἔχουσι, sed malè, cum locus desumptus sit ex 4. acutorum vbi legitur ἔχουσι ἰδὲ ἐκ ἐλεμῶντων, non autem τὰ ἔχουσι ἐλεμῶντων) & si hoc ipso loco aliqua inflammatio est, omnes hi haudquaquam ad purgationes apti sunt.*

Com. in
part. 12.
lib. 1.
Et in
Apho-
rism. 24.
lib. 1.

Sed dicet aliquis: si hæc adsunt, præsertim inflammatio Illium, si adest πυροδὴ præsertim calida; morbus acutus est: Si acutus initio agendum aliquid, nec valet tum aphorismus οὐ ποὶ αὐτὰρ μακρὴν, quid facias? si nec ægrum sine vlllo remedio interire? In omni febre ardente numquid phlogosis est, si phlogosis, non valet agitatio: Et tamen si quid in ardente febre agendum, maximè initio morbi dum materia turget. Reuera aliud est materiam ὄργον, aliud ἐλεμῶντων ἔχουσι δεινὸν ἔχουσι πυροδὴ, aliquam esse. Et vt patet ex com. in Aphor. 22. lib. 1. Hinc sumitur omnis distinctio & definitio tantæ difficultatis. Nisi dicas sæpè inflammationē esse & πυροδὴ; & orgasmū esse ob serosos & acres humores attractos à venulis arefactis: Si purgas consulēs orgasmo, sed augebis inflammationē & contra Galenum peccabis. Et reuera si habetur ratio ipsius materiei impactæ, & quæ velut radices in parte egerit, à valido medicamento abstinere: quomodo intelligi debet illud Hippo. supra citatum, quod à parte inflāmata nil conaberis auellere: Sed si iunctus sit orgasmus, ob serosos ichores à par-

tibus inflammatis manantes & grauia symptomata excitantes, aut ob materiam aliquam non ita sequestratam & *συσποφλι* facientem, sed per mesenterium sparsam, & quæ facillè arte nostra educi queat, non erit alienum tunc moliri euacuationem. Nunc ad Galenum reuertamur. Cum humores, air, de loco ad locum mouentur, nec consistunt tunc primo quoque tempore euacuandi veniunt, sin parte aliqua hærent ac confidunt & impinguntur, expectanda coctio, atque tunc naturam, habituri fumus adminiculantem. plura supra.

Cæterum cum pleròsque videamus derepente suspensa intentaque habere hypochondria, nec non satis liquidam habere aluum, aut statim, aut ad sectionem venæ veniendum est, quod existimemus distentionem istam ab inflammatione esse, an verò ille fluor alui nos à sectione venæ debet reuocare: quod videmus omnes in eam venire opinionem, vt credant nusquam locum esse venæ sectioni dum aluus lubrica est. De his ergo breuiter quæramus, quanquam & in nostris definitionibus medicis in voce *συσποφλι*, dictum est, & in historia de Sangermano. Audiamus Hippocratem, *Part. 2. l. 4. acuto.*
Obsessa, inflammatione Hypochondria non spirituum interceptione, septi transuersi intentione, vel spirituum protensiones, sed à spirituum interceptione pathemata hec superueniunt. Hec inquam sectione vena soluuntur. Vbi notandum est hæc prima periodo tres affectus indigere venæ sectione, Hypochondrij inflammatione non spirituum interceptione, id est, si modo quæ iuncta est tumefactio & inflatio inflammationi non sit à flatu, quamquam habere potest flatu coniunctos: Secundò diaphragmatis intentio, Græcè *ἐπιπλοή*: Tertio spirituum protensiones, Græcè *ἔπνοια τῶν περὶ τὸ σπλῆν*. Sed cum venam secat in Hypochondrij inflammatione, excipit, si non sit *ἐκ τῆς ἀποκρίσεως πνοιαίων*, si non sit ex spirituum interceptione, cum autem in septi transuersi intentione, & spirituum protensionibus venam secat, ait hæc, id est, & transuersi septi intentionem, & spirituum protensiones ex spirituum interceptionibus esse. Si ergo cum sint à spirituum interceptione, quemadmodum & inflammata Hypochondria cum spirituum interceptione esse possunt, cur hæc circumstantia, Spirituum interceptio: Indicat non secandam venam in inflammatione hypochon-

driorum, in diaphragmatis intentione, & spiritus protensione eadem conditio suadet sectionem venæ? Ait enim Galenus: Qui à spiritus interceptione patiuntur difficultatem spirandi, ij sectâ venaiuuantur. Cauct autem ne venam secemus in Hypochondriis inflammatis si spirituum interceptio sit. Sed quod dixit Hippocrates hunc habet sensum. Primum cum dicit, Obsessa Hypochondria inflammatione, non spirituum interceptione, hoc ambiguum est. Non enim spiritus interceptio inflammationem infert. Quare ergo dicit, hypochondria inflammata non spirituum interceptione, quasi verò ἀπιλοψις, spirituum inflammationem accersat? Nequaquam. Etenim Galenus ita scribit, Numquam spiritus interceptio flagrantem Hypochondrio diathesin infert. Sed flagrans diathesis potest prouentum flatuum facere, vt de iſtericis antè abundè demonstratum est. Atque Gal. vt doceat cur Hippocrates hæc verba addat, *Non spirituum interceptione*, quoniam nulla est coherentia cum his, *Hypochondria inflammata*, scribit nihil aliud hoc loco esse apud Hippo. τὰ ὑποχόνδρια φλεγμαίνοντα, quam ὑποχόνδρια εἰς τὸ ἔσκειν ἠρμένα, id est, Hypochondria in tumorem elata: Sic valet consecutio, Hypochondria in tumorem eleuata, non spirituum interceptione, id est, vt ista eleuatio non sit à spiritu, sed ab inflammatione. Nam inflatio vel fit à flatibus, vel à mucore, aut thrombo, aut ab inflammatione. Et talis sensus est Hippoer. Si Hypochondria eleuentur, (cum enim φλογώσεως, meminit tacitè audit tumorem aliquem excitari) sectio confert venæ, sed hoc verum si eleuatio sit inflammatoria non πνέοματόδης, id est à flatu excitata. Non quin non eadem sit ratio medendi, si inflammatio Hypochōdrij sit cum flatu aut sine flatu, sed oportet signis syllogisticis assequi an flatus interceptio non causetur istam eleuationem. Hic in verbo φλεγμαίνοντα, audit tacitè aliquā eleuationem. Et Gal. citans ferè hunc Apho. in lib. 1. Apho. docens quibus non conueniat medicamentum, ait: *Non conuenit medicamentum*, οἷσι τὰ ὑποχόνδρια διατεταμένα πύσονται, ἢ ὑπεξαιρόντων ὄσιν διεμαζῆν πνεύματος; vt τὸ διατεταμένον, ad caliditatem tanquam ad causam referatur. Nam si alia de causa distendatur venter quis dubitat quin sit locus medicamento calido. At cum Hypochondria sunt eleuata & calefacta ob phlegmonem, non conuenit purgatio metu συνηξέως. Cæterùm si spirituum interceptio difficultatem spirandi & orthopnoeam inducat sectio confert, præ-

Com. in
part. 21.
lib. 4.
acutis.

fertim si aliqua sit phlogosis. Et quæ spirituum interceptio per se non postulat phlebotomiam in ventre inferiore, eadem postulat in ventre superiore. Nam cum spirituum interceptio est, aperiendo secta vena iuuat. Quanquam dubitari potest, nisi suspicio sit de phlegmone, quod Galenus videtur indicasse, com. in illam particulam 21. lib. 4. acutorum.

Duo restant explicanda, prius quomodo isti puellæ inflato toto ventre per inflammationem putrefacto quodam sero istam faciente phlogosin aliuus etiamnum liquida deiecerit: secundum quomodo audacter liquidiore, & veluti diarrhœicâ fluxione tentatâ alio missus fuerit sanguis: duo alia addentur præter rem quidem, sed non omittenda, cur in ista phlogosi non fuerit insignis febris, & an causa procatartica aliquid efficiat ad morborum generationem. Primum explicuimus antè, & ad hoc intelligendum valent ea quæ Hippo. scripsit in 2. prognostic. Vbi Galenus explicat, quomodo hydrops ab inflammatione lactium & ieiuni nascatur, & multis de causis iunctus sit alui fluor. Quod non idem contingit in hepatis inflammatione. Sed talis fluor, ait Hipp. nec mollit deprimítque ventrem, nec doloris leuatorius est.

Secundum, an fluente aluo potest tutò vena secari, quod in ista puella fecimus. Nam contra docet Hippo. *Si cui sanguinem auferre consert, veniorem confirmabis.* Gal. in Com. *Si post detractio- nem perseveras fluor, virtutem prosterne.* Sed cum phlogosis est, aut calor adurens & colliquans non alienum est demere sanguinem, vt ardorem extinguas.

Cæterum valdè notandum est illud tertiũ quod querebamus quomodo non erat magna febris cum æstuant Hypochondria. Videtur enim æquum esse vt febris insignis internas inflammationes consequatur. Tamen id non placet Galeno, is enim etiam de inflammatione hepatis & diaphragmatis loquens ait: *Si in iecore, septo, ventriculo phlegmone oriatur acuta febris forsã fuerit, quanquam ne hoc quidem perpetuò verum, nondum verò maligna est.* Et in Apho. vult magnas esse inflammationes in partibus internis vt acuta febris sequatur: Non simpliciter dixit, inflammationes, sed magnas. Et de vtero loquens vult etiam magnas esse inflammationes vt febris consequatur acuta. Sic si sit phlegmone, aut phlogosis mediocris, ad manum mordax febris non insequitur.

Part. 2.
lib. 2.
Progn.

Part. 216.
lib. 4.
acuto.

Com. in
part. 21.
lib. 2.

Protrrh. 1

Com. in
Apho. 1.
lib. 7.

Part. 27.
lib. 3.
Protrrh:

De causis procatarteticis ita statuendum. Placet quibusdam earum non esse habendam rationem in morborum curatione. Quamquam earum magna vis existit. Et in Epid. narraturus de febribus continuis, sæpè comestationis meminit, irarum, insolationis, intempestivæ cœnæ, laborum & consimilium causarum procatarteticarum. Et notandum est quod de his scripsit Gal.

Com. in
par. 115.
lib. 4.
acuto.

Corpore nostro ad morbosam dispositionem nonnumquam parato, ita ut propè completa sit, externum quippiam obueniens eam manifestavit, febrem videlicet accendens, vel capitis dolorem, vel catarrhum excitans. Deinde ex eo continenter ad morbosa affectionis præparationem non sine periculo languent. Item & alia multa præclara illo loco scribuntur.

⁴ Cum ter puellæ venam aperuissémus omni ratione dolorem sedare & mitigare conati sumus, phlogosin istam metu abscessus: ferè in maleolo vena secta est ad reuellendum ad partes inferiores.

℞. Malva totius, acetose, violaria, florum chama: melilo. an. m. j. senecionis & cretionis. an. m. s. seminis melonum cucurr. lact. an. m. ij. seminis lactuca. ℥ij. senum psyllij & fœnig. an. ℥i. s. fiat decoct. in sero lactis pro fotu: Deinde extrahatur muccag. cum qua ponantur ol. rosati. ℥ij. Aceti ℥i. s.

℞. Ceroti santal. macerati in oxyrhodino lib. s. fiat litus ad totum ventrem.

Item ℞. ol. de nymph. & rosati. an. ℥ij. aceti. ℥i. s. caphura parum pro lita.

*Cotto madeat in ol. viol. & butyro recenti & applicetur & repetatur sæpè: Item vesica suilla impleta lacte admoneantur.*⁶

℞. Decoctionis ormazorum libr. s. in quibus coque folia vitis, salicis, acetos. lactucam, caput papaveris & flores nymph. & semina frigid. maior. Addatur serum lactis ad lib. i. s. dissolu. ol. rosati. ℥i. s. castiam & similia. Item syrupum de nenuph. succum lactuce pro clysmatis.

Data potiones ex syrup. nenupharino, decoct. lactucar. & cap. papaver. Item hordeata.

Immissa in balneum aqua dulcis. Sic reseratis viis, materia temperata, sedato estu facillimè ea alius lata est quæ aquosis tantum ferebatur.

ANNOTATIONES.

1. Nam in quibusdam vi ipsius inflammationis circa aliquas abdominis partes videtur colligi quippiam. Et id *συσφοδή*, propriè nuncupatur.
2. Quanquam Hippo. sectio. 5. lib. 2. Epid. ventositatem flatuosam quam vocat *ἀερίδιον*, vena sectione soluit.
3. Ad curationem huius mali, vt & ad tympanem ortum ob phlogosin lactium valet illud Hippo. 2. Epid. sect. 5. Ventositatem flatuosam, (Græcè *ἀερίδιον*,) phlebotomia soluit. Nam præ calore spiritus multus excitatur qui distendit & vexat.
4. De hac verum illud erat. Dolores Hypochondriorum hepatis, vmbilici sanguinis missione leuantur. In coacis.
5. In Hypochondriorum tumoribus, nec molliencia nimis, nec siccantia valent.
6. Enemata ex pinguibus præscripsimus secuti consilium Hippo. li. 4. acutorum, cum loquitur de Cholera arida, in qua status seditionem faciunt estque calor acer & mordax.

CONSILIVM CXIII.

Ad febrem continuam horrificam & destillationem.

DE Tonfore Caroli successore superius dictum est. Idem eodem tempore quo & Sangermanus febre assidua horridica laboravit. Ingens erat cacochymia, & destillatio à sero nitroso omnes neruorum propagines quæ à cervicis vertebis, & principio vertebrarum dorsi oriuntur, imbuente, quo tantoperè diuexabatur, vt ne minimum tactum ferret, eo modo quo & ij qui vlcerosa lassitudine detinentur¹. Nec non ingens renum dolor erat, & cum nephriticus sit & lapidosus, metuebamus de renis inflammatione aut consimili affectu: Et herclè multa erant argumenta. Quoties is laborat putrida febre maximè laborat, cum hepate sit præditus calidissimo & cibos corruptente, vt deiectiones, & alia satis detexerunt. Et cum vena caua plena prauo sanguine incubas spinæ dorsi tota ardet & æstuat, non mirum si doloribus lumborū valdè diuexatur si

548 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 ia&atur perpetuò, & magnam scabritiem habet, nec nò ^{avopéctau.}
 Et reuera peculiaris quædam erat affectio in renum regione,
 peculiaris in dorso, vnde vix spirare poterat: & aderat febris
 partim essentialis, partim symptomatica ob eos affectus com-
 memoratos. Renis affectum cum esse dicebantus quem Hip-
 pocrates explicat, & reuera magna erat affinitas, verba Hipp.
 hæc sunt. *Quartus renum morbus à bile fit & pituita maximè estate.*
Dolores vrgent in laterum mollitudine, & in lumbis & lumborum
musculis, & patitur qualia solet mulier ex partu laborans, & non po-
test in sanam partem decumbere, sed valdè dolet, & ex lateris mollitu-
dine quadam pendere videntur velut abrupta. Vrina vix prodit pro-
sua pituitositate & visciditate. Pari morbo nutrix Domini Roysæi
 laboravit, & iste piscator qui decūbebat in vico de la Mortelle-
 rie, è regione vretôris. Quod attinet ad dolores sūmos quos cir-
 cū dorsū, & præsertim omoplatas sentiebat, vt nec libere spira-
 re, nec moueri, nec decumbere posset; immò blandæ manus
 appulsum non ferret, etfi ob consensum aliarum partium infer-
 narum poterat laborare, omnino tamen id erat à diffusione ni-
 trofi feri, efferi, & pepasmi expertis qui dum imbueret quartā,
 quintam & sextam coniugationem neruorum à vertebra collis
 nascentium, difficultatem spirandi summam afferebat ob dia-
 phragmatis consensum². Nam, vt anatomici scribunt, sextæ
 coniugationis pars diaphragmatis neruo inserta non modicè
 eum auget. Et qui diaphragma moturi sunt nerui, è cervicis
 medulla omnes prodeunt, in partem diaphragmatis mediam
 sese inserunt, in ipsaque via fulciuntur interfepiente membra-
 na thoracis. Duo alij per initia his copulantur nerui, qui ta-
 men mox inde intrò sub os pectoris euecti, tandem in dia-
 phragmatis sinum & ad mali punici sedem contendunt, vt mirū
 non sit, si initio istorum morborum affecto, aut imbuto humore
 prauo & maligno difficultas sit respirandi, vt istius difficultatis
 causa non sit reuocanda ad propriam affectionem diaphragma-
 tis, sed ad neruorum principium ita laborans. Et reuera eo
 tempore quo iste laboravit, vulgò grassabantur istæ malignæ
 fluctiones in omoplatas, & partes posticas thoracis. Agróque
 nostro omni ratione occurrimus fotibus, & cataplasmatibus, tan-
 dem erumpente sudore: die iudice planè dolores isti conque-
 uerunt effluente isto sero quod villos & stamina, neruorum ita
 obliuerat imbueratque, atque dicto citius facilitas ducendi spi-

Fern-
 luis ca.
 10. li. 1.
 p. 77. sic.

ritus est restituta. Hoc notatum volumus quia sæpè difficultates respirandi adsunt aut propter istorum neruorum à spinali medulla ortorum affectionem, aut propter affectum renalem⁴, aut hepar tumens, aut hypochondriacam affectionem, & temerè inscienterque multi recurrunt ad pulmones & thoracem, putantque affectionis causam illic latere, falluntur autem plurimum, & sæpè deterius esse putant quam sit. Et ita interpretandus Aphorismus Hippo. *In febre assidua difficultas spirandi & delirium si acciderit lethale.*

ANNOTATIONES.

1. *Reuera in eo erat ulcerosa lassitudo & ostocopos quæ in causon solet incidere. Nam, ut Gal. docet part. 2. lib. 4. acutorum totum corpus laborat lassitudine ulcerosa propter tenuium humiditatum acrimoniam declarauit morbi exitus. Nam cum nulla ratione cessaret dolor iste & lassitudo ossæaria, copioso manante sudore omnino sanus euasit. Quidam cum hæc uideri ad catarrhum hos dolores reuocant. Male. Quæquam & destillationes à capite idem causantur præsertim quæ à sero sunt malo. Et credibile, & serum per corpus sparsum cum eo quod à capite est concurrere.*
2. *Et in historia de Pythione docet com. in part. 4. Quomodo occupatio neruorum qui à primis Spondylis cervicis ducuntur, difficultatem motus in manibus afferat immò & tremorem. Et lib. 6. Epid. par. 4. sect. 4. de filia Agesiæ docet quomodo imbibitio primorum colli spondylorum noxam communicet manibus.*
3. *Si quando id contigit in paruo Petro euenit à destillatione serî crudi in partes subiectas, ac si κατάψυξις, esset νυγώδης.*
4. *Difficilis inflexio spine, & ad lumbos dolores sunt lapidis iudicia.*

CONSILIVM CXIV.

De capitis dolore.

MARIA BERTHIER, iam annos aliquot capitis anteriora dolet, frigus se sentire in futura coronaria narrat. Sed vno ab hinc anno manifesto sentit fluxionem à capite in scoptula aperta per collum, in metaphrenum & lumbos. Et eo humore fluente dolores sentit vehementes, & sensus caloris & acrimoniæ adest. Si hic humor subeat artus & membrorum articulationes illam arthriticam reddet. Sed dum subtus cutim fluit, nec in interiores capacitates sese insinuat ac infert, nondum profundos dolores & arthriticos infert. Atque hæ sunt rationes quibus aduersus Fernelium contendimus in eo commentatio quem de arthritide conscripsimus. Etenim; si omnis dolor articulorum materiam & causam sui repetit à cerebro, cum tantos dolores in articulis excitet, cum in sua prima origine sit humor venenatus, acer, nitrosus, & *nitrosus* (quam non negamus quin etiam maiorem tractu temporis malitiam acquirat) an esset verisimile à capite subtus cutim defluere, & nullum dolorem excitare? Nequaquam. At videmus multos arthriticos derepente conquerentes de dolore pedis aut genuum, nullo prægresso dolore in metaphreno & partibus superioribus, quibus acuties est sensus, per quas tamen partes decurrere humorem à capite labentem Fernel. contendit. Sic quæritur hoc loco quomodo generetur iste humor in capite & inde effluat, qualis sit, an ratione caloris, an ratione frigoris, & si acer, nitrosusque est, cur tam facilè horreant. Hippo. duplicem mucum facit à capite orientem & dolorem excitantem vnum ab interno cerebri corpore per infundibulum defluentem, alterum à transudatione sub pericranio in partes externas sese proripientem. Si ab interno capite est mordet & dolorem facit, si ab externa parte non mordet. Hoc tantum probabile est: sicut & illud quod scribit si fluxus mulieris mordet à corpore est, id est, ventre ipso in quo prauus humor latitet, si non mordet à capite est. Nam in hac muliere, de qua agimus do-

*Lib de
locis in
homine.*

*Lib de
natura
mulie-
bri.*

LIBER PRIMVS.

lōres capitis & vicinitas locorum qui primū dolent, deinde transfundunt eundem dolorem in partes contingentes, & significant à capite humorem manare, qui nitrosus est, malus, efferrus, & qui quancumque in partem irruerit, suæ malitiæ virus expandet. Tabem enim inferet & ea omnia quæ ab Hippo. explicantur. Huiusmodi humoris & generationem, & fontem, & effectus Hipp. explicat, & sæpè experientia patent. Si enim constat partes omnes internas sæpè labeficri ob nitrosū salsumque humorem à capite manantem, cur humor qui in partes externas refunditur, aut liquatus subit, aut expellitur vi pellen- te naturæ, & qui cum eo qui interiora subit habet & affinitatē, & vt verbo Hippo. accommodato vtar, *ὁμοειδέτω*, similia sym- ptomata non progignet?

Lib. de Glandulis.

Audiamus Hippo. *Tabes ex fluxione retrorsum, qui hac affectus est, caput ei purgabitur debili pharmaco*: Deinde ait paulò ante, *cum retrò in carnem iuxta vertebra fluxus illapsus hydropem fecerit, sic medeberis. Caro in collo inter venas crustis uratur, cicatrices quam tenuissimæ inducantur, & quam pituitosissimis uratur.* Quod est intelligendum, quoniam abhorret in omni specie hydropis (si tympanitem exceperis) vti pituitosa & humida diæta: sed primū nomine hydropis intelligit quandam speciem hydropis dorsalis à ferina destillatione à capite manante per posticas partes, quæ destillatio dum calori & humori natiuo bellum indicit, & tacitam, latentem furtiuamque depastionem & consumptionem partium solidarum & spermaticarum, quæ plurimæ sunt in metaphreno: vnde ab his horrores incipiunt facillè, inducit, & dum inducit naturalis humoris inopia marcorem quandam, aduentitium tumorem infert per excrementi cumulum & veri nutrimenti corruptionem, sic pituitosos cibos consulit, ad *αστάτην*, istarum partium, quia partim tument tumore aduentitio, siccantur paupertate humidi natiui corrupti. Quod nos explicuimus in Histo. Petri Guerard. Et idem Hippo. copiosius explicat eodem lib. *Cum in medullam fluxio contigerit, tabes occulta oritur, cum autem retrò ad vertebra, & in carnes fluxerit, fit hydrops. Sicca sunt partes anteriores caput videlicet & nares, oculis hebetudo accedit, sunt cum virore pallidi, & reliquum corpus. &c.*

Lib. de locis in homine.

De locis in homine.

Quod notandum valdè. Nam & in hac muliere, & in plerisque in quibus istæ fluctiones fiunt, videris oculos cauos, genas contractas, alias pendulas, & nitorem viriditatemque ocu-

552 CONSILIORVM MEDICINALIVM
lis deesse. Superioribus paginis docuimus quanta sit vis sal-
sarium, acrium & nitrosarum fluctionum ad afferendam consum-
ptionem corpori toti, quoquo se humor proripuerit ac subierit
in vico Sandionysiano ab acri sero dolores excitati sūt in omo-
platis, ardoris & acrimonię sensus erat, & nil iuuabant remedia,
immò ne opiū. Talis dolor viginti menses perseueravit Ioa-
ni Beauchant, qui laqueo vitam finiuit calamitoso supplicio
infinatam (vt verbo Tulliano vtar) suorum scelerum expia-
turus, in omoplatis dolores erant incredibiles qui ex interual-
lis repetebant. Aperto cadauere repertum est pingue & effe-
rum serum quod omnia ligamenta & neruos obliuerat imbibe-
rātque.

Generatur autem peculiariter tale serum in quibusdam, & eò
facilius generatur quò magis tempus & aër est idoneus ad tale
generationem, vt austrina constitutione per corruptionem ac-
quisita faldine & nitrositate. Et ad id facit si calor corporis
est acer, corrumpens, squallidus: talis enim calor non actionem
facit, sed corrumpit potius, vt pluribus explicuimus antè. At-
que primùm eius malignitatis prima labes ab hepate est: alimè-
tum enim, id est, sanguis, aliquando acrior est & serosior, & tra-
ctu temporis dum maiorem malitiam acquirit, tum virulentus
fit quodammodo. Id obseruauimus in ea muliere, & in vxore
Domini du Bourglabe, quæ vtraque doloribus capitis est ob-
noxia & vxor Lodoici Michaëlis, & in iis quibus corpora sunt
macilentia, & *depressione*, iuxta illud, *Qui ventre sunt casto car-
nes habent frigidat.* Cuius Aphorismi magna vis, magna intelli-
gentia, vt nos in libris nostris de morbis mulierum conscri-
ptis docuimus. Et inter omnes locos commemorabilis est,
vbi docet Hippo. duo, prius cur partes superiores vitium po-
rius capiāt à fluctione, vnde caput etiam ipsum à quo fluxio est,
siccatur, extabescit, ac squalescit quòd paulò antè diximus ex
Hippocrate: posteriùs cur biliosi, sicci, arescentes fluctionibus
opportuni & eas faciliè corpus excipiat quasi lucrum aliquod
faciat, sed frustra. Omitto textum quoniam longiore inter-
pretatione opus haberet.

Ac præter vitium in sanguine, potest esse peculiaris disposi-
tio in capite, quæ efficiat vt alimentum in capite ipso corrup-
patur: Et cum non videamus vllum fluxionibus malignis op-
portunum (nisi fortè per totum corporis habitum diffusus sit
calor

Etat
domina
du Pic-
fir.

Lib. de
loc. in
hom.

calor acer & corrumpens) qui non doloribus capitis frequenter exerceatur, fit vt propter impressionem à dolore & vim factam parti facultas partis debilitetur, calor infirmetur, & pronatio extraneus inducatur, immò & febris quædam capitalis inducatur, id est, calor extraneus, siccus, malus, corruptor acimenti deprauator. Et sic perennis fit generatio humoris, fit & perenne effluuium, & tum cum extra caput ille humor non educitur, tum vertigines, Epilepsia, apoplexia quoque fiunt ipsæ. Vide quæ ex Arculano supra annotauimus, & illa est verè *diff. feb.*, quam morborum stata ratâque periodo reducunt *2. sub finem.* causam *causam*, constituit Galenus.

Et quod notandum istæ mulieres tres de quibus antè dixi, & quæ erunt veluti regulæ aliarum, cum calorem habeant acré, mordacem, multum, & tali humore abundant, tamen se ne minimû frigus posse ferre dicunt, & sibi perpetuò in rhachitide, & in occipite, quòd parte anteriore est frigidius, sensum quendam frigoris & catarrhi fontem perennitatémque constitutam dicunt: ac si ab ea parte desuat humor tantas in partibus remotis molestias excitaturus. Causam huius rei euoluemus. Cum cerebrum peculiari morbo laborans, & veluti quadam febris sibi propria impeditum, non capiat eum fructum ex alimento quem capere debet, illud corrumpit, vnde pars aliqua iam sequestrata est quæ continuos dolores aut parum intermittentes, committat, pars alia à cerebro valente pellitur foras. Si nitrosum salsumque quid habet *essentia* per putredinem, sensum caloris, & acrimoniæ infert, & sic putant sibi partes deuri, si qua pars mixta frigidior & crassior dum confunditur massæ sanguinis, dum neruosum genus ferit & imbuit, sensum quoque frigoris infert, sic paret & surgit ea inæqualitas, & vicissitudo caloris & frigoris quam innumeris locis in hoc volumine explicauimus. Immò si initio paræxysmorum minimus appulsus externi aëris frigidi, aut sparsio humoris etiam calidi & biliosi sensum horroris & rigoris infert, quantò magis id præstabit humor à capite labens, qui tametsi & falsedinem & nitrositatem habens, caliditatem intrinsecam habet, tamen quia omne excrementum retinet aliquid de ea parte cuius est excrementum, cum cerebrum sit natura frigidum, non mirum si in isto humore sit aliquid *essentia*. Ac de rigoribus & horroribus locus est apud Hippo. *Rigor, ait, in morbis fit ab externis, ventis, aqua, serenitate,*

sub dio degentibus, fit & ab ingestis cibis & potu. Maximè verò fit cum bilis & pituita remissa fuerit sanguini, aut altera ex his, aut utraque. Magis si pituita sola fuerit, nam est frigidissima: calidissimus sanguis. Bilis verò aliquantò frigidior sanguine, Cum autem ambo humores, aut ex his alter, ad sanguinem mixti fuerint, congelant: id est sensum frigoris, aut rigoris, aut horroris inducunt. Vt mirum non sit si catarrhosi sæpè horreant aut rigeant, & in febribus, & extra febres, vt non necesse sit ad istas horripilationes febrem sequi, quod temporibus Hippocratis eveniebat? Nam horrorem rigoremque proximè febris sequebatur. Præter autem aliàs rationes quas aliis in locis, si quid meminimus, explicuimus; hæc fortè probabilis est. Quod si rigoris & horroris primus impetus, & in internis partibus & ab internis fit, præsertim si materia præparata est, maxima ex parte febris suscitatur: sin autè potius de foris est, & ab externa causa, & manifesta occasione, non est ita necesse accenso calore & humoribus febrem consequi.

Porrò quæ causa sit cur humor refundatur ita breui expedio. Superiùs vnâ ex causis diffusionis pituitæ in capite, quam Hippoc. *διὰ τὸν* vocat, non *ὀσμῆν*, diximus esse & calorem & frigus, quoque modo id fieret explicatum est. Nam instar spongiarum madefactarum quæ manu premuntur, cerebrum oppletum ab ambiète aëre exprimitur aliàs atque aliàs in has aut illas partes. Alia causa diffusionis est vis facultis expultricis quam irritat humor, aut sua qualitate, aut quantitate peccans. Accedit quod omne ferum, & humor nitrosus sua mala qualitate præditus facillè sibi viam quærat atque parat.

Porrò tum ex Celso, tum Hippocrate eruenda est harum fluctionum medela. Primùm quantum spectat ad vsum rerum humidarum (quoniam vulgò dicunt liquidiora non quadrare catarrhis) conuellenda est ista opinio. Quanquam ex Hippocrate quo plus humidi sumitur, plus quoque pituitæ videtur in cerebro (quod plegmatis fontem facit) accumulari, & sic occasio fluctionum suppeditari. Sic hoc expediemus: Deinde an locus sit validis & attrahentibus medicamentis, quod placere Galeno visum est in methodo medendi, vt antè explicuimus, quod est valdè notandum⁸. Tertiò quid sibi velit Hippo. & Celsus qui recurrunt ad ignem & cauteria in his affectibus. Pituitosis & præpinguibus frequens rerum liquidarum vsum non

quadrat, vt nec iis in quibus humiditas multa præsertim excrementitia: Ideo Hippo. in Apho. scribit famem conuenire iis qui humiditas carnes habent, quia fames exiccat ex euentu, ait Galenus in commêto. Et quod dicitur nutritionem per similia faciendam esse, hoc verum quidem est quod ad optimam temperaturam spectat quæ cæterarum sit regula: sed quoniam facile fit ex illa egressio, iuuat mediocris rerum contrariarum vsus. Sic intelligendum putat Galenus naturarum aliam ad hoc vel illud tempus meliùs habere. Sic quoque explicat Galenus de iis qui humido victu vti consueuere. At catarrhosi maximam partem humiditate multa abundant: Immò cum catarrhus nullius morbi peculiare nomen sit, sed morbidam excretionem significet quæ prout in has aut illas partes procumbit ita varias morbus qui inde sequitur appellationes sortitur, si excessus sit humiditatis quis dubitat quin siccandum sit? At contra aliter faciendum est. Si excessus sit multus humiditatis, si cerebrum sit humidius nemo dubitat quin siccare non sit bonum, contrario contrarium opponendo, At quoniam nitrosæ, acres, salis subtiles quoque sunt defluxiones & catarrhi, vel quia qui à partibus inferis surgunt vapores in cerebrum talem naturam habebant, vel quia ob peculiarem in cerebro constitutionem, & malam diathesin talem nanciscatur naturam, vel quia hepar calidius prouentum facit istius humiditatis per modum effumationis & sublimationis, in hoc casu ab humectantibus (etiam si corpus videatur humidiusculum) & ἀποτὸν στυγερακιῶν, abstinere non oportet. Plura ea de re aliàs. De rumpendis crustis ferro candente Hippocratis locus est præclarus antè à nobis expressus, vt repetitioni non sit locus. Hoc autem fit vt fiant emissaria per quæ educatur serum nitrosum quod perreptando corpus totum, & sese sensim insinuando dolores intolerabiles facit, immò & maiciem toti corpori conciliat.

Vnum porro obliti fueramus, quod attexendum erat isti disputationi quam habuimus paulò antè de vsu rerum liquidarum & humidarum, an in fluxionibus istis & ῥευματισμοῖς, nitrosis turò balnea præscribantur vniuersalia, hoc non caret difficultate. Balnea præscribuntur ad contemperandum non ad euacuandum: nam cum balnea euacuent autore Gal. si tantum in aquâ egelidam æger mittitur, nec elicitur sudor, temperatur quo-

dammodo humor nitrosus per cutim fusus, saltem sub cutim diffuens & dolores excitans partesque labefactans. Quod consilium est Hippocratis dum loquitur *μελίσσιον γυναικείον*, ab humoribus falsis & acribus & nitrosis: si ea quæ effluunt bilis fuerint & falsago, & non solum internas partes, sed & externas exulcerent diætam transmütabis & humectabis vt fluctiones quam aquosissimæ fiant, & minimè mordaces balneis multis calidis vtèris, & cæt. Et quodam in loco Aëtius in fluctionibus & congestionibus humorum acrium & mordacium vtitur *μελίσιμον νεγσικόν*, id est iis quæ affusa, aut circumfusa, aut applicita vim habent mitificandi & moderandi humoris, & eius impetum sistendi: Sic huic nostræ ægræ valère ac conducere credidimus vsum balneorum ¹⁰.

Atque omnia hæc ad vnguem tenenda sunt, ne temerè, quòd aliàs magno ægrorū incommodo factitatum vidimus, quoties quis de defluxionibus conqueritur, ad hidrotica recurramus præsertim valentia, vt est lignum indicum. Nam eius vsu sæpè eam adaugemus intemperiem, quæ tam prauarum fluctionum author existit. Et vt concedam elicitis sudoribus adiumenti aliquid afferri, plus tamen incommodi affertur augendo intemperie omnium malorū causam. Si simplex esset & absoluta humiditas, quæque solum sua quantitate molesta foret, discussione eiusmodi humoris sanitas compararetur huic mulieri Hypochondriacæ syrupus ordinatus sequens in hanc formam.

℞. Cort. pomor. redol. ℥. v. rad. lapath. acut. cichor. acetos. an. ℥. ij. iniyb. vtriusque ad m. j. bugloss. m. ij. beton. meliss. an. m. j. s. polypod. cum draget. communi cont. ℥. i. s. mercur. p. ij. rad. alth. secta enul. campan. an. m. j. passul. iuinò. sebesth. an. num. 20. prun. quart. flor. cordial. an. p. ij. sem. papau. albi. ℥. iij. sem. frigid. ℥. i. s. pæon. angel. sesel. an. ℥. i. s. fiat decoct. ad lib. ij. adde folior. fen. vino albo laut. ℥. iij. fiat ebullitio longa ad lib. in colatur. dissol. express. ℥. i. s. agar. trochisc. in aqua meliss. cum ℥. ij. cinnam. & serici crudi in nodulo posit. ℥. ij. & cum sacch. quart. iij. oxymelit. simpl. ℥. iij. succi pomor. quari. l. fiat syrupus. vtiendus ex decreto medici.

ANNOTATIONES.

1. Nos tandem deteximus illud totum de quo illa queritur esse hypochondriacum, & non tam caput per se affectum esse quam propter flatulentam & malignam naturam flatus melancholici & atrabilarij. Olim excretioni sanguinis per nares erat obnoxia, quod fortè fecit reddidit que humores synceriores, & veluti suo priuatos sero naturali. Et quod modo de vna parte conqueratur, modo de alia: idque in superficie corporis quid impediēt quominus dicamus affectum esse ipsius habitus corporis eo modo quo illam auram qua à pede efferebatur ad conuulsionem non esse ab interno corpore, sed ab externo, ita placet Auicenna, est enim ubi quidam morbi in habitu sunt alij non, & si extuberaret aliquid in cute omnino istis punctiōibus liberaretur.
2. Hippo. in Tabescentibus & phreniticis oculos *emixus*, puluerulentos possis dicere, obseruauit, part. 17. lib. 1. Prorrh.
3. Tandem cum interiiisset reperta est collectio putris & olida materiee in thorace, cuius serum eos dolores faciebat in partibus vicinis, & id pulmonicis est familiare.
4. Caterum videmus plerisque saliuam dulcem & veluti insulsam esse, aliis salsam nitrosam, aut alius uehementioris qualitatis, ita quoque de fluctiōibus dici potest. Talis autem generatio peculiarem naturam corporis cuiusque sequitur. Vnde Hippocrates lib. 2. Epid. sub finem sectionis primæ vocat corpus *nitrosus*, quod humore nitroso & salso abundat, & à cuius capite maximè fluit talis humor præsertim cum à pulmone caput calefactum fuerit. Quod notandum.
5. Accedit quod mulieres qua calidiore & arente calore sunt præditæ, & corrumpunt alimentum, & prauis vtuntur cibis, ut inde augeatur cacochymia.
6. Immo idem rheuma in coryzis urit & refrigerat, cum in cerebro est calor extraneus, & calor naturalis paucus est dum vi caloris non naturalis excitatur in solum ambitum cerebri, & præsertim in occipitis & syncipitis partem aliquam humor tenuis qui sudoris instar exudat, dum ille humor refrigescit ob membranas sensus adest frigoris: sic calent aliquando, & se gelu sentire dicunt in capite: Causa verò potissima propter quam dum ab interno corpore cerebri exprimitur humor in membranas, aut in pericranium sensum frigoris in ipsis membranis inducit, tamen si & à loco calido efferatur, & fortè ipse sit nitrosus &

salsus causa inquam, est quoniam iste humor de natura cerebri retinet, ac cerebrum frigidum est, quia spermaticum: Deinde quatenus ille humor de natura aquea retinet, tamen si sui interiore principio calidus sit, quia nitrosus, quia salsus, tamen quia retinet de natura aquea, facile frigiditatem inducit & accipit: sic sanguis ab Hippoc. frigidus dicitur, & humor melancholicus dicitur siccus, cum tamen humidus consistentia sit. Maximè verò puto sensum frigoris inducere ex euentu eo modo quo videmus humorem calidum, à calido loco per sudores profectum inducere sensum frigoris, quia in habitu refrigeratur, & non regitur à calore suo, sed is calor evanuit sic, credo, in membranas, roris modo, inutilis humor exprimitur, qui restitans ibi & ob densitatem ossis non transpirans refrigeratur. Et sic à nitroso humore sensus frigoris inducitur.

7. An rigorem febris sequatur. Vide Gal. cap. 5. lib. 2. de diff. feb. libro de inæquali intemperie: com. 3. in lib. 1. Epidemion. Et in nostro lib. de Epiala febre.

8. Praclara est decisio de ea re apud Arculanum cap. de phthisi ubi docet quomodo in phthisi sit euacuandum, & quomodo non euacuandum.

9. Et Hippo. lib. de veteri medicina, abundè docet in salsis & acutis fluxionibus mitisandum esse, non autem euacuandum.

10. Inter ceteros locos, ad hanc maximè mulierem pertinet locus lib. 2. Prorrh. in quem Gal. non scripsit ubi graphicè morbus illius describi videtur.

11. Atque hee mulier si tussiret, corpus internum subiret catarrhus, nunc verò cum non tussiat, sed externam capacitatem fluctio appetat, non mirum si tot dolores perferentiscat. Et duo sunt commemorabiles loci huc pertinentes, prior est ex lib. 2. Epid. sect. 2. ubi docet cuidam virgini manum, & crus syderata esse cum nil commemorabile tussiret, quae verò suppressio materie quae tussim excitare deberet, eam syderationem attulerit. Ita Herclè: Nam & Hippo. in Coacis, ait, Quibus saluginosa, spua & tussis supprimuntur: His corpus velut à pustulis rubescit. Vide Com. in part. 4. lib. 6. Epid. sectione 4.

13. Ad hanc historiam valet locus praclarus ex sectio 3. lib. 2. Epid. ubi agit de asperitatibus cutis, &c. Et inter cetera Langij Epist. 15. lib. 2. De puncticula. Et lib. nostram Ephemeridon. Et de exanthematis quae ut culicum morsus erant: Et Hippo. rationem generationis horum proponit. Quod ad institutum valdè pertinet, lib. 5. Epid. Et Aetius cap. 129. Tetrah. 2. sermonis 1. Febres in quibus puncticulae apparent sumi adurentes, & facile ad manum calor remittit fortè de iis audiendus

locus lib. 6. Epid. sectio. 8. de febribus quas *μελαίαι* vocat. Et lib. 7. Epid. locus præclarus de eruptione exanthematon *μελαύσων*.

CONSILIVM CXV.

De febre semitertiana.

VXOR proscribæ nomine Guillemine, cum & catarrhosa foret, & colicis doloribus obnoxia, tamen feruidiore hepate in febrem incidit continuam mense Iunio. Vagabantur tunc febres ardentes satis mali moris. Statim initio horrenda fuerunt omnia, dolor ingens capitis, & veluti cuiusdam *παροργασ*, & perturbationis mentis argumentum, vomitiones frequētes, ardor summus, erat reuera aliquid hemitritæon. Nam humores ita erant *πυκνωθείς*, & bilis pituitæque adeoque crudi succi, tum qui à capite descendens per quandam colliquationem, aut diffusionem potius in venas, & habitum corporis irruerat horro- ris sensum inferens, tum peculiariter in eius corpore & redun- dabat, & ob diurnitatem constitutionis humidæ & austrinæ, in qua congeritur humor, nec diffilatur, præsertim in mulieribus quarum corpora sunt *σπλάγγη & ροάδρα*, succrescebat, copia (in- quam) tanta fuit, vt mirum non sit, si inæqualitas summa fuerit, curandi difficultas, & periculum mortis, quam nos certò expe- ctabamus. Varietas enim ista humorum partim confusorum, partim diuerso loco positorum, & putrescentinum, nullum non dat negotium naturæ, febris ad 14. diem perseuerauit. Pri- mis diebus multa iudicatoria non iudicantia apparue- runt. Et cum vrinæ initio valdè confusæ existerent, flam- mæ, tenuiores factæ sunt. Sed id non placebat. Reduplicatio- nes erant nocturnæ, & perfrigeratio quædam leuis præcedebat, ac si nouus esset paroxysmus. Sed id motu fiebat nõ periodico, sed à venis in venas, & à loco in locum, non in habitum corpo- ris, quomodo fit in febribus intermittētibz periodicis, vt nos in historia de Sangermano explicuimus. Sed tria valdè ter- rifica fuerunt: Primum quod erat comatosa, sed *κώμα*, erat po- tius *ἀργυπτον*, & somnus tædebat, nam cum primùm in somnum se componeret, statim delirabat. Secundum perfrigeratio ti-

biarum & pedum sæpè erat, vt recalfieri ferè non posset. Vnde in lipyriæ febris suspicionem veniebamus: Tertium pulsus imminutus valdè erat, & nescio quid *διαφορικόν*. Quartum, metus erat, inflammationis pulmonis, vt pleuritis latentis. Perpetuò enim ferè de latere dextro ad manus regionem quæstæ est, vt propterea consultum fuerit ei tanquam pleuriticæ, neglecto reliquo morbo'. Et de dolore isto lateris valdè laborabamus, an verè esset pleuritis, an congestio ibi esset (erant enim magna congestionis arguméta, vnde excreuit è pulmone multa satis horrenda) an fluxio à capite, an translatio à ventre inferiore: Vnde fit vt (quod Hippo. libris de morbis annotavit) faciliè febris ardens peripneumoniam & lethargicam quandam dispositionem, non à capite ipso primò affecto, sed pulmone & affecto, & obstructo, vt liber non sit exitus spirituum, & ob copiam vaporum à pulmone incandescente elatorum, & malignè ferientium: Quod notandum. Ac valdè decipiuntur medici. Hac de re Hippo. Caput præclarum scripsit de Lethargo, vbi lethargum ait oriri per quandam peripneumonix affinitatem, & in isto lethargo potius pulmone quam capiti consulit. Hoc morbo laboravit Domina le Boindre. Et aliquid simile fuit in vidua Domini Garnier, vt nos in lib. 2. Epid. nostrorum scripsimus. Ac primum consimilem huic historix quandam historiam scripsit Hipp. lib. 2. Epid. *In perinthum circa solstitium venimus, &c. Æstate febres ardentes populariter grassate sunt multæ.* Et cætera consequuntur quæ longum esset recensere.

Quod ad primum pertinet, quomodo nimirum obfuerit somnus tum ob malignitatem materiei reuocata à superficie ad centrum, tum ob dominatum caloris, dictum iam antè est abundè, quod ad infinitos propè ægros pertinere potest. Nam cum calor contra naturam superat naturalem, ferè turbati sunt somni. Ac reuera terrificæ omnia fuerunt, vt antè dictum est, tum ob corruptorum humorum *κακοθειας*, quæ communem corruptionem superat, tum ob caloris febrilis dominatum. Vnde in Epid. notatum est terrificæ sæpè accidentia initio morborum euenire, ob summam humorum intus latentium corruptionem vt Gal. annotat. Et inter cætera commemorabilis locus in lib. 2. Prorrh. in quem Gal. non commentus est: *In principiis febrili sive delirium accesserit, sive alicuius membri syderatio, periturum hominem scito, si non ex optimis signis aliquod accedat, aut corporis*

Hippo.
lib. 1.
de morb.
& lib.
3 cap. de
febre ar-
dente, 2.
& lib. 2.
Epid.
meoris.
Quid sit
lethar-
apud
Hippo:
Lib. 3. de
morbis.

vis vires adsunt. At hæc mulier tantoperè initio animo concussa est, & perturbata, vt ea omnino deliratura putaretur.

Valdè perturbabat quòd non poterat *αιαδες, μαινειν*, & quòd frigus erat pedum summū nō periodicū, sed velut iudicatoriū, non iudicans tamen. Multis locis docuimus malum esse in febribus modò calferi modò incalēscere, peius verò esse ce-
rem in vtrumque mutationem: Quòd cur fiat non dicendum, cum & ex antecedentibus, & ex lib. nostro Epid. satis patere possit cūm distinxerimus frigus positum & priuatium. Reuera putabamus frigus esse priuatium, sed potiùs ad positium accedebat, cum & catarrhosa esset, & colicis doloribus à crudo succo obnoxia, quò fit vt ob humorum varietatem hoc facilè euenerit. Accedit quòd cum frigus istud apparet, natura aliquando idem vult conari quòd & in rigoribus, sed cum materia parata non sit illud totum quòd apparet iudicatorium est non iudicans. Et reuera nisi in florenti ætate fuisset, interiisset. Numquam enim tot iudicatoria vidimus. At hæc mala sunt.

Siquidem verum quòd aut mortem intentent, aut malum denuntient. Sed ex lib. 2. Epid. & alio loco patet duo genera esse

κρίσιμων, quædam enim simpliciter iudicatoria dicuntur, quæ quoniam absolutè non iudicant, aut ob indispositionē materiæ, aut quia omnino natura valida non est, ideo *δυσκεια* dicuntur, & iudicarent si nil impediret. Alia iudicatoria præterquã quòd vim iudicandi non habent, aut omnimodam materiæ prauitatem significant, aut *παλινδερμιω* ad partes nobiles, aut naturam labentem, vt vires protritæ omnino fathiscant, vt ad *τα κρινογα*, nullus ampliùs sit gradus. Et hæc omnino praua sunt.

Et verè in morbis malignis apparent in quibus morbi status solet deterior multò apparere die critico, quo tempore aut perfectæ coctionis, aut saltem incipientis nota aliqua deberet apparere. Quò in sensu accipere oportet illud Gal. quòd in morbis malignis proprium fit, vt diebus criticis deteriores fiant. De quo amplius dictum est antè, & tamen sine hac disputatione ea quæ ante dicta sunt nullo modo intelligi possunt. Sed si quando occurrat disputare *πειρ κρισιμων*, amplissimus est locus in com. in Prorrheticon. In quo plenis velis ea explicat quæ pertinent ad

τα κρισιμα, quorum duo genera explicantur, vnum eorum quæ *δυσκεια* vocantur, & ea *τας ακρισιαις* faciunt, alia ad deterius vergunt, & omnino mala sunt, vt cuiusmodi sunt ea quæ in pestilentibus

Lib. 2.
Epid. 1.
sec. 1.
Iudica-
torias
duplicia

Part. 351
lib. 3.
Prorrh.

562 CONSILIORVM MEDICINALIVM
morbis spectantur, vt sudor diaphoreticus, nigrarum deiectionum excretio, & sexcenta alia.

Atque Galenus in comm. in illam particulam maximè inter iudicatotia mala numerat partium, aut totius corporis perfrigerationem quæ caleferi non potest. Quòd maximè agræ nostræ contigit.

Pulsus erat valdè imminutus, quòd cum præter vacationem aliquam insignem euenit, malum est vt signum & vt causa. Etenim *καλονδίας* sæpè signum existit. Videatur Gal. in Prorrh.

Com. in
part. 5.
lib. 2.

Prorrh.
& in
partic.
17. lib. 3.
Prorrh.

Porrò ad huius tractationis finem nonnulla adiiciemus quorum intelligentia ad medendum apprimè pertinet. Nam cum vrinæ huius mulieris crassas & turbidas videremus, annuentibus cæteris, libentiùs secandi venam, & purgandi consiliù capiebamus. Sed omiſsa venæ sectione, videndum quid statuat Galenus & Hipp. de indicatione purgandi sumenda ex vrinis,

Part. 43.
lib. 4.
acuto.

ita ait: *Quibus initio vrinæ crasse ac nebulosa fuerint, hos annuentibus cæteris, purgare conuenit. Quod si vrinæ inter initia tenues fuerint, tales non purgabis.* Nomine crassarum vrinarum Gal. coctionem & mitigationem quandam materiei audit, contra tenuium nomine, cruditatem. Et hæc verba Hippo. magni sunt ad medendum momenti. Nam cum incidimus in morbos sæpè sunt vrinæ tenues aliquando sunt grumosa & crassa. Priores à medicamento eradicante dehortantur. Posteriores nonnumquam suadent, at cum perturbatae sunt, & crasse cum aliqua equalitate, tunc audaciùs purgandi occasio capiatur. Et quòd proprius ad sanitatem accedimus, eò suam quandam tenuitatem cum bonitate caloris repetunt ac recipiunt. Inter cætera de duobus monere oportet, quorum prius aliqua ex parte explicatum est, sed propter rei difficultatem & dignitatem maiore explicatione opus habet, posterius verò est de quibusdã vertiginibus & perturbationibus capitis quæ initio morborum præhendunt. Prius est de partium quarundam perfrigeratione quæ in morbo acuto, & febre continua valdè periculosa est. De hoc antè & in hoc capite, & infinitis locis dictum est cum explicarem quid differret priuans frigus à positiuo. Galenus autem noua quadam explicatione illustrauit rem totam de perfrigeratione partium in causo. Ac primum explicat duplicem *καύσην*, apud Hippo. 4. acutorum, vnum à tenui & seroso ichore cum terrificis symptomatis, alium autem ab alia quadam causa ortum.

Part. 137
lib. 4.
non. oru.

Nam caufus exactus à flaua bile est, non exactus à pituita quadam falsa aut acida, vnde eorum qui tali causo tenentur lingua falsa seu falsuginosa existit, non autem amarulenta, vt in exquisito causo. Non adeò vrens calor percipitur, vt in verò causo, lingua nigra non est, sunt tamen multa communia symptomata, vt iactationes, vigilię, &c. Et inter cætera notandum est vnum de alui constitutione in vtroque causo, nam dum loquitur de vero causo ait, *deiectiones sunt liquida & pallida*: Est enim consentaneum, vt quoniam humor est tenuis, quoniam facillè mouetur, & febris ob perennem generationem ichoris reaccenditur facillè, vt aluus soluatur pallida excretionem, quę est morbo analogam: At in non vero causo dixit simpliciter, aluus soluta, non addit, talibus vel talibus excrementis, quoniam humor pituitosus qui febrem facit nõ tam facilem habet exitum, ac humor biliosus & pallidus. Et ideo Galenus in eo comm. ita ait: *Pituitosus humor nec facillè excernitur, nec febrem auget, nec sitim ardentem habet, nec in spiritum vertitur. Ideòque de febre à tali humore nata ita ait Hipp. Aluus soluta, quatenus ea excernat quę excernere ipsi non aduersatur. Soluitur enim venter non tamen secundum humoris cuiuspiam formam & speciem, sed iis quę in alimentum sunt ministrata, corruptis.* Id est, in vero causo ob tenuitatem materici facillè laxatur aluus, eaque redduntur quę morbo sunt analogam ob sequacitatem materici: at in alio non exquisito causo cum materia sit crassior viscosior, si fortè aluus soluitur, non tam ea materia excernitur morbifica, quam cruditas quadam ob ea quę assumpta sunt. Quod nos in Domini Bironij, nepote Domino du Pleffis obseruauimus: Nam cum laboraret febre continua ad causon non legitimum accedente, & esset habitu pituitoso aliquantum, non excernebantur biliosa, ichorosa, qualia excerni potuissent in verò causo, sed quadam glutinosa, ac si chyli magna pars in gluten & corruptam similem materiam versa fuisset. Et si quando aliàs, in hoc ægro verum comperi quod Hippocrates, & Galenus illo loco conscripserunt.

Nunc vt ad rem reditus fiat, cum duplex iste sit *causa*, vnus verus à bilioso humore, alter nõ verus ab humore pituitescente magis: Hippocrates dum secundi *causę* mentionem fecit, meminit refrigerationis extremorum. An verò partium refrigeratio extimarum non æquè ad verum causon ac ad non legitimũ

referetur? Galenus meo quidem iudicio non satis distinctè rem explicauit. Ait enim non in causo omninò verum esse vt eueniat partium extimarum refrigeratio, sed si malignus sit. At quis dubitat nò potius in vero causo euenire istam refrigerationem quam in non vero? Nam in vero causo phlogosis est summa in partibus internis cuius occasione reuocatur facilè calor foris intrò, vnde sensus frigoris summus in extimis adest. Et tamen etiam in vero causo non adest ista refrigeratio extimorum, nisi etiam per se malignus sit. Omnino autem in febre omni partium extimarum refrigeratio euenit (ait Gal.) aut propter phlegmonem internam, aut summam naturæ imbecillitatem, addo, caloris naturalis paupertatem ex com. in part. 8. lib. 2. Prorrh. Et fieri potest vt secundus causus nascatur ob phlegmonè à crassis & viscosis humoribus natam (nam secundi causi originem & causam à crassis & pituitosis repetiuimus,) & tunc quis dubitat quin ob talem phlegmonem reuocetur intrò calor, & sic partium extimarum refrigeratio contingat. Et tunc malignus est vt voluit antè Galenus. Sed non video cur potius attribuerit istam extimarum partium refrigerationem posteriori & illegitimo causo quam priori & legitimo? Ego verò aliam probabiliorem rationem afferam. Cum Hippocrates ex symptomatis propriis secundi causi numerat extimorum refrigerationem, non tam intelligit de ea refrigeratione quæ aut paupertatem caloris sequitur, aut phlegmonem internam, aut summam naturæ imbecillitatem, quæ quæ ob crudos, frigidos, pituitosos, & viscidos succos fit. Prior refrigeratio in veros cauos incidit, & priuatum frigus est. Posterior pituitosiores morbos potius comitatur, & positium frigus est. Quomodo catarrhosos, & pituitosos, & erudis abundantes succis videmus refrigerescere in partibus extimis. Sic cum secundus causus agnoscat crudum succum causam sui non mirum si partium quædam refrigeratio contingat non perniciofa. Nisi fortè (vt excusemus Galenū) dicamus istam refrigerationem in secundo causo euenire ob speciem quandam phlogoseos quam fouet crudus humor conculcatus & congestus in parte aliqua, vt in mesenterio & pancreate, ac si interna quædam phlegmone foret.

Quod verò notandum est. & quod pertinet ad historiam de Domina à Chalmontio, vrentis caloris & flammei perceptio nò solum est in biliosis corporibus, & biliosis febribus, sed sæpè

Com. in
part. 16
lib. 4.
acuio.
Et in
part. 47.
eiusdem
libri.

in pituitosis præsertim si pituita sit falsa. Ne quis decipiatur ratus igneum calorem à bile tantum esse, audiatur ea de re Galenus: *In pituitosis febribus fumosa est caliditatis substantia, cum scilicet, vel in ventre, vel hepate, vel pulmone salsus humor putruerit, ob quam fumosam substantiam caliditas ignea redditur.* Quod declarant peripneumoniæ à pituita falsa, in quibus calor extingui bilis non est, & inexhausta fitis. Nam multò faciliùs temperatur ardor & fitis excitata ob materiam biliosam, quam ob phlegma putre & falsum. Et ex duobus quæ ad explicandum, proposita fuerunt vnum iam à nobis expositum est. Restat alterum de illis grauibus, vertiginibus quibus plerique vexantur in magnas febres causuri. Deinde vnum addemus de alui facilitate, vt leienteria metueretur, tamen contulit valdè qualiscumque fuerit ista solutio alui, Aphorismus est Hippocratis: *Quibus in febribus vertiginēs ab initio & capitis pulsus sunt, & vrina tenuis, his ad indicationes vsque febris accessionem expectare oportet, quod si quoque delirent nihil mirum.* Quæ omnia huic agræ conueniunt. Et quoniam multa præclare dicuntur à Galeno in eo Comment. de causa vertiginum, de vi caloris contra naturam in effundendis & dissipandis, & prouocandis humoribus, quorum intelligentia ad ea quæ hoc loco dicuntur valdè pertinet, Lectorem ad eiusmodi Commentarium relegabimus.

Com. in
part. 16.
lib. 4.
acuto.

Par. 42.
lib. 4.
acutorū.

Aluus in ea facilis & liquida fuit, quod nos paulò antè docuimus euenire in causo non legitimo, & quomodo fieret, aperuimus: Item & in tractatu de Sangermani morbo, nunc addemus locum præclarum à Galeno conscriptum, dum reddit rationem cur in febribus *καυσώδεις*, quarum focus est in pulmone aluus astricta est, maximè verò cum hepar est inflammatum. Hoc enim inflammatò aliàs excrementa sunt *αυροειδῶδες*, aliàs liquida, atque ita ait: *Quibus in iecore causi radix subest, & qui ob iecur causo laborant, iis quæ excernuntur aliàs sunt liquida, interdum sicca sunt, combustis scilicet à visceris phlegmone, & in nucleum formatis excrementis. Cum igitur viscus hoc phlegmone solum tentatur, indurabuntur excrementa: Verum si cum phlegmone fuerit & imbecillitas, liquida deiciuntur, viscere scilicet alimentum ad se attrahere nequeunte. Sed deiectiones eiusmodi ab iis quæ ventre affecto sunt chylositate distinguuntur: Græcè τὸ ἐχρησθῆναι, melius chylosificatione, aut chylosicos actione interpretaberis. Nam si chylus non attrahitur chylosa ferè sunt excrementa,*

Par. 17.
lib. 4.
acuto.

ANNOTATIO.

1. Quaecunque mulieres, idem & de viris, dum sanae sunt dolent de latere aliquo, cum febricitant, aequè dolent ac si pleuritica essent verè. Et reuera cum iis, ut cum pleuriticis agendum.

CONSILIVM CXVI.

Ad febrem & dentium dolorem.

Par. 29.
sectio. 1.
lib. 6.
Epid.
Cap. 9.
Tetrab.
1. ser. 4.
Cap. 5.
Tetrab.
1. ser. 4.
Consulis Scaronis pufio sedecimestris, iam per menses, sex aut quinque contabescit ac emaciatur. Magnum argumentum est cutis laxitas. Nam omnis extenuatio primùm laxat, deinde distendit, contra refectio distendit, deinde laxat, laxitate quadam laudabili, non qualis ab euacuatione insequi solet. Depræhendimus illum febrientem, dentientem erumpentibus dentibus molaribus: Quæ omnia febres, vigilias, alui profluuia consecutione quadam afferunt. Notandum enim quod demonstrat Aëtius turbari ventrem dentientibus pueris propter exolutionem, & inflammationem ventriculo communicatam. Nam inflammatis gingivis peculiaris in ore febris esse videtur: facile autem ventriculus in illius partis ob continuitatem membranarum trahi solet. Sic putant pleuritidi succedere fluorem alui, inflammationis communicatione cum hepate & partibus nutritioni consecratis. Sed quoniam extenuationis macieique rudimenta aliqua, non ita pridem paruerunt, illius causa altiùs repetenda, vel à pueri habitu, & *ἰδιουσις*, vel à nutrimento. Puer natus est, & fatus parentibus biliosis, hepate ficiore & calidiore præditis: Nutrix emaciata est, sicca, æstuat corpore & squallido, & ob perpetuas pueri vigilias somno blando non indulget: ut non mirum sit si in symptomaton maiorumque communione & pueri & nutricis neuter proficiat. Lac nec colore, nec odore, nec sapore laudabile est. Album esse debet & æquale, gustu dulce & velut mellitum, olfatu gratum, ut pluribus definit Aëtius. Itaque prouidendum nutrici, puero, tum ratione febris, tum ratione dentitionis, tum iaue-
teratæ iam emaciationis.

Adiungenda nutritrix alteri ne si altera ablegetur continuo ob insolentiam alterius nutritricis puer ægrius ferat, & noui casus occasio adfit. Sic interponent operas, & altera alteri vicariam supponet manum. Nutritrix præsertim dentitionis tempore vino abstineat Actij consilio: hordeata aqua vtatur, & iusculis multis alterantibus. Puer nutriatur pane in iusculis infriato: Decocto pullorum: & ad facilitatem exertionis dentium ginginæ melle anacardino aut communi narbonensi illinantur, aut lacte canino, & conferet cerebrum leporinum consilio Actij: Item circumlinetur oleum dulce partibus vicinis: Item radix colocynthidis in cånula aurea aut argentea inclusa & gestata confert. Aut iaspis viridis. Nil mandat duriusculum: & omnino non est prohibendus alui fluor, alioqui metus est translationis ad partes superiores. Consultus est litus ex oleo rosato in toto corpore, ad caloris contemperationem. Sed cum perseuerasset alui fluor, & oborta esset febris continua cū vigilis iactationibus, vt inde *ἀσώδης* foret, necnon interiora arderent, partibus externis parum refrigerantibus: Denique vomituriendi finis non esset, & magna esset suspicio febris lipyriæ, & breuis mortis, hæc quæ sequuntur imperantur.

Primum, Epithemata ad regionem cordis & hepatis additis trochiscis de caphura.

Litus ex rosacero tum in ventre, tum in rachitide.

Item eodem confert litus ad totum ventrē ex mucaginibus feminis altheæ psyll. cydoniorū addito succo lactucæ, & oleo rosato cum mastichino. Et cum præter puerorum morem digitum in os immitteret ad ciendum vomatum, hoc suspicionem attulit aut vermis in os ventriculi reptantis (idem enim paulo antè in puellula euenerat, & excretus vermis est) aut oris ventriculi *κακὰ σενε*, quod *βριπασμὸς ἢ ἀλωσιὸς*, causa est inter cæteras autore Galeno, in primum prognosticon: Ideo visum est medicis vtile fore si grana aliquot theriaces aqua cardui dissoluerentur, & potui darentur, ad vermem, si quis sit, sopiendum, & *κακὰ σενε*, si qua sit, domandam. Non longè post data infusio ex rhæo, & granis vnicornis. Et quoniam ingens erat fitis, & febris, vnâque nutritrix vix esset, maximè quoniam calor igneus ex ore pueri manans lac extinguit, aut minuit, nutritrix iubetur vino abstineret, iusculis nullis vti, maximè verò decocto auenæ vbera perfundere: immò & eo decocto in potu vti, bracteolas seu fo-

568. CONSILIORVM MEDICINALIVM
lia auri in mammarum papillis applicare, ad lactis conseruandam
temperiem. Pueri somnus conciliatur litu temporum ex
oxyrho. applicitis foliis lacticæ: In iusculo pulli incoquantur
tres dragmæ sem. papauer. alb. cum lactuca in taleolas se-
cta. Miraculo hoc profuit somnum conciliando, & ardorem
mortis, aut marcoris autorem futurum. Non parcitur potui.
Immò ætatula vsus lymonum frustatim incisorum non dissua-
det. Lactæ asinæ dentium acetabula linuntur, conualuit.

CONSILIVM CXVII.

*Seu Enchiridion sanitatis D. Henrico Heruillæo,
in militiam profatino præscriptum.*

SI necessitas vrget infundetur clystma ex hydrom. aut iuscu-
lo domest. aut aqua falsa dissoluendo catholicon.

Pilulis ex rheo ad ʒj. vtetur si fortè grauior sibi videatur, aut
antè cœnam tres pilul. sine quibus deglutiet.

Si nec febris adest, nec dolor capitis in vino alb. rheum ad
ʒij. f. infundet, sin minus, in ptisana dissoluendo ʒj. syrup.
ros. pallid. aut cath ʒ6. diaphœn. ʒj.

Non nisi vrgente necessitate demendus sanguis, nam cum sit
αετησιος, non facilè feret phlebotomiã, nisi aut affuerit febris
αξιδιος, aut difficultas spirandi, bechicis vtetur si fortè tussis
vrgeat.

Vtetur bolo aut cassiæ, aut catholiconis dupl. Ad vitan-
dum aërem corruptum pomum odoriferum gestabit, aut nodu-
lum ex caryophyllis & cinnam.

Vtetur mithridatio ex vino alb. aut conserua rosarum.

Si vulneratus fuerit puluere rhei cum mumia vtetur, addito
mithridatio.

Si fortè oppressus fuerit, aut pessundatus inuoluetur panno
in vino madefacto. Item mithridatio ad proliciendũ sudorem.

Si dolor colicus vrgeat, fofus ex chamæmelo, & seminibus
lini, & fœnig. vtetur: Valet quoque equinum stercus?

CONSILIVM CXVIII.

De febre continua.

Vicarius Sanctorum Geruas. & Prot. ad Natalitium Domini, cum caput doluisset (sed id ad vsum noui vini referebat) in febrem incidit. Ea erat lenta, & in viscerum latente phlogosi posita. Siquidem fauces erant velut inflāmata & erysipelatosaphlogositentata. Quod aut exhalationis vi fiebat, aut flammea quadam anathymiasi. Immò nō tam de febre querebatur, quam de amarore quodam oris, & dentium luriditate scabritiēque & squalore, nec non de faucium ardore isto. Alij ad destillationem ferinam referebant, alij ad pulmonum quoddam latens incendium, alij ad viscerum calorem & dyscrasiam, alij quoque ad cordis calorem impensē auctum, & hepatis quandam siccitatem. D. Magnus carbunculosam quandam dispositionem dicebat subesse, vt habitu corporis existente *δυσκράσια*, & ichore saniēque diffatione prohibitis, & calore effumationem diffationēque non habente, tum ob corporis constitutionem, nam densus est habitu, & quodammodo citrinus, tum tempus ipsum quod austrium fuerat, & post proximē hyems successit quæ omnia suppresserat, sic corpore minimē existente diffabili suppressum est excrementum quod circum periostia dolores excitat, & dū tumultuariē sanguini admisceri vult rigoris cuiusdam sensum exhibet, & veluti formicarij morsus & deambulationis. Ita enim veteres symptoma hoc velut formicarum deambulationi comparauerunt. Et tale symptoma reuera paralyses aliquando est velut prænuntius & præambulo: aliquando catarrhi est comes, aliquando est cacochymii sanguinis consequens. Vndē videmus cacochymos si in sole apricētur horrere, & sensum punctiōnis formicationis que circum partes sentientes habere: fit enim vt morborum principis sanguis purus existat, vt non calfactus & alteratus à calore febrili qui omnia corrumpit & immutat, item nō mutatus mixtione rei alienæ, vt potest fieri à cacochymia contenta in mesenterio per transumptionem in vasa communicati. Quod in li.

bris de morbis Hippo. appellat accommodato verbo *τὸ αἴμα διὰ
 φύσιν*: id est serosam naturam acquirere, relicta temperie, & quali-
 tate, & propria sanguinis natura, aut ea valdè immutata. Reue-
 ra in hoc viro, si quo in alio peculiaris excrementi est sup-
 pressio ad hanc fecit peculiaris natura, habitus corporis,
 tempus, & prætermiffa occasio sanitati suæ studendi. Nam cum
 diligentius suum munus ecclesiasticum prosequitur, ei non va-
 cat esse ægroto, & non expectat illud tempus in quo natura
 post coctionem tandem secretionem facta victrix ac domitrix
 morborum existit. Nullus enim vnquam morbus diuturnus
 vnquam superatus est, nisi cum ingenti & longo renum *ἰνέσπυρις*,
 profluuiio, aut sudoribus diu emanantibus præsertim à somno
 coctis humoribus & domita cacoehymia. Quod in plerisque
 à nobis obseruatum est, qui diu laborantes vltro citroque pur-
 gati, non cessarunt de aduersa valetudine queri, donec per 20.
 aut 30. dies copiosus sudor toto corpore emanarit. Sic in hoc
 ægro nostro puto exactam quidem portionem materiæ, sed
τὸ ἐπιπόρευμα, & anima morbi intus relicta est. Sed & dolor ingens
 capitis cum constrictionis sensu, & punctione, & lancinatione
 declarat eum dolorem qui olim per sympathiam erat, factum
 esse per protopathiam. Vt ea effumatio magna facta ob diffu-
 sionis cutis prohibitionem caput obsederit, & in venis, arteriisq;
 cerebri, & iam in quibusdam inanitatibus (alioqui malum non
 tam foret rebelle & obstinatum) sedem firmauerit, melancho-
 lici humoris iam deterioris, quam antea esset, facti, naturam
 adipiscens. Quomodo audiendum illud Hipp. Cavitates cor-
 poris nostri dum sani sumus spiritu plene sunt, dum ægotamus,
 ichore & sanie. Sic qui diu ægotant, alterato ferè omnino
 sanguine & reliquis quæ fluunt & ressuunt, modò in hac parte,
 modò in illa dolorem sentiunt. Immodò & veluti impetu quodã
 facto impetiginosi, aut leprosi, aut scabiosi fiunt, relicto in cu-
 te vitio, & perpurgato corporis centro, vt Simoni contigit.
 Sic quibus hoc beneficium naturæ negatum est, nisi alia via &
 ratione sese natura expediuerit, dum semem morbi & fermentum
 ipsum fouet, non est mirum si aut in novos morbos incidant,
 aut si priores alant. In hoc ægro & totius corporis, & capitis ratio
 habenda. Et antequam hyems accedat, præsertim dum au-
 tumnales morbi sunt in procinctu, bonum est eum arte iuuare.
 Itaque ea methodo progrediendum erit in oppugnatione mali

Lib. de
 arte.

6. Epid.

obstinato animo ægrum impetentis.

Primum parantur clysteres ex decocto melissæ, bugl. borag. & herbarum splenicarum.

Purgabitur decocto radicum aperi. & rerum splenicarum additis hepaticis humidis, vt hepatica, intybo vtroque, scariol. chondrilla, portulac. cichorio omni viol. pomis redolentibus, cardiacis frigidis vt rosa, viol. nymph. ebore, santalis, oxalide, serico crudo; itē splenicis refrigerantibus: Cortice rad. tamari. asplenio, adianto, seride, feminibus frig. foliis vitis, in decoct. agar. folia fenæ & turbith. (pauca id quantitate) addentur.

Post duas doses supradictas vtetur apoz. ex his herbis ad ditis succis & serico crudo.

Aperietur vena basilica sinistra.

Dabitur tertia dosis apozematis solutiui.

Balneo vtetur vniuersali ad tres dies.

Caput abluetur lixiuio ex sarmentorum cineribus additis folliculis & agarico.

Si dolor perseveret aperietur vena pulsatis in temporibus.

Apophlegmatismis vtetur.

Tandem si non conquieuerit dolor arteriotome fiet.

ANNOTATIONES.

1. *Morbis istius Vicarij erat febris lenta continua, essentialis & cuius ideam, speciem, ingenium & essentiam Fernelius explicauit libello de febris.*

2. *Affectio ista redolet aliquid Hypochondriacum. Et admirabilis est successus ætatum in quibus alias per quaterniones alias per septenarios magnæ mutationes eueniunt. Et tunc incredibili quodam modo de valetudinis bonæ statu deceditur, & donec tempus istius mutationis transierit, non cessat animans malè habere, & queri de valetudine. Nam & in libris de Dieta Hippocrates docet, quibusdam qui diu sani vixerant circum 40 annum mutationes euenire & eas perniciosas: cur non etiam eodem modo in ætatibus nostris eueniat, quod & in magnis temporum mutationibus Hipp. lib. de aère, & locis euenire obseruauit? Quid illud quod Hippocrates vitam nostram septem dierum esse ait?*

3. *Cum sæpius detractus esset, sanguis quod impurus videretur, tandem vitificatis humoribus, laudabilis apparuit. Nam fallebantur medici existimantes superficiem pituitosam esse sanguinem corruptum.*

Gal. enim docet & aquam, & pituitam sepe in superficie sanguinis apparere. Et medici decipiuntur. Cap. 2. lib. de Atrabile.

4. Sensum hunc de ambulantium fornicarum nunquam legi nisi semel apud Hippocratem dum disputat de tabe dorsali. Et apud Holle-
rium cum agit de catarrho dorsali com. in coac.

CONSILIVM CXIX.

Ad vermes.


Domino de la Bournaliere, à vermibus afflicto hæc sunt præscripta quibus vere & autumno appetente vsus est.

℞. Absinth. vulg. agrimo. centaurij minoris. an. m. s. lupul. semin. nis contra. an. ℥ s. florum chama. stæch. an. p. i. fiat decoct. in aqua hordei in col. ad lib. s. dissolu. confectionis hieræ & ij. fiat clyster.

℞. Pul. hieræ dupl. aloë ℥ j. rheib. ℥ ij. mass. pilul. assaieret & cort. myrob. citrin. an. ℥ j. cum syrup. de absinth. fiat massa vtenda ad ℥ j. ante passus.

℞. Conserua florum anibos & cichorij beton. an. ℥ s. cortic. ciurij conditi. ℥ j. coriandr. præpar. ℥ s. cornu cerui, & rasura eb. an. gr. vj. mithrid. & theri. an. ℥ s. confectionis Alkermes. ℥ i. cum syrup. de pomis & stæchade: fiat opiata vtenda sepe.

FINIS.



INDEX RERVM ET VOCVM MEMORIA

scitūque dignarum quę hoc toto opere
continentur. Numerus pagi-
nam designat.

A.



A NIMALIS fa-
cultatis infirmitas
quid. faciat in
n. orbis. & an sit
astimanda. 375

Aqua molles alio ardenti danda.
377.
*Aloe etiam calidis corporibus con-
fert.* 2
Arthritidis biliosa curatio. 14
*& an sit biliosa arthritidis ibi-
dem, & cap. de ea de re scripto.*
Asthmatis curatio. 40
*Aphosum quid in orificio ventri-
culi.* 58
*Arabum opinio de phlebotomia in
feb. serua.* 299
Arteria venosa &c. examen. 190,
& sequ.
*Actio cur multiplex cum tempera-
vnum.* 214.

Arcul. de doloribus capitis. 467
*Aluus fluens non dehortatur phle-
botomiam.* 531. & 545
Arabum error in phlebotomia. 456
*Articularium dolorum paroxysmo-
non danda medicamenta.* 492
Aqua potus perpericiosus cuidam.
310
Antipatri hist. ex Gal. 322
Angina sicca remedium. 292
Apoplex. causa Galeno. 309
Aneurysma. 477
Athletarum habitus. 363
Aristotelis de palpit. opinio. 374
Arthritidis cura. 493
*Apoplexia laedit actiones v. cere-
bro.* 144

B

B iliosa corpora ut sunt me-
lancholica. 3

I N D E X.

evacuaciones Hippocrati.	556	Capitis dolor per sympathiam simplicem.	307
Cal. frig. mutatio in extremis partibus mala in toto corpore non.	325, 528	Cordis & arteriarum non idem omnino motus aliquando.	513
Clysteres validi in initio colicae non dandi.	304	Cordis salus quid.	ibid.
Coma febrium comes cur.	540	Cordis vehemens aestus quos motus creat.	510. & sequ.
Catholicon cur datur si humor unus peccat.	530	Cordis aestus Cardiomon facit. ibi.	
Corpora sicca etiam catarrhis obnoxia.	552	Catarrhis potulenta conferunt.	555
Capitis dolores contumaces.	493	Caesarum procacareticarum consideratio.	546
Colica mortalis secundum Avaldum.	303	Corporis moles non ubique bona.	363
Colica in Iliacam degenerans. ibid.		Capitis dolor repentinus quos morbos facit.	466
Corpus ^{in uisus} .	552	Catarrhosi saepe rigent & horrent.	553
Catarrhi maligni quid agant.	537	Cerebrum leditur puncto nervo.	306
Carcinomatis uteri cura.	477	Coloris mutatio unde.	364
Catarrhi ut curandi.	539	Convulsionis cause queruntur.	305
Cerebri catarrhoja dispositio explicatur abunde.	553	Convulsio statim in morbum incidens quid significet.	138
Catarrhosis caetera conveniunt.	555	Cerebrum hydropis autor.	125
Cordis tremor.	510	Cari & apoplexia differentia.	144
Convulsionis curanda noua ratio.	308	Convulsionis & melancholie cerebri an eadem causa.	144
Causus an habet iunctam partium extimarum refrigeratione.	564	Critico die nil molendum.	129
Cerebri oppressio an delirij causa.	312	Criticorum dierum & periodorum examen.	138
Coma & Carus in vigore morborum.	421	In crisi bus sicca corpora non vacuantur.	332
Cœliaca celfo.	321		
Catarrhosis balnea quadranti & quando.	556		
Cholera sicca balneum.	287		
Cacochymi incallescetes rigent.	326		

D

Diectiones mali coloris non ubique male.

INDEX.

<i>item pag.</i>	508	<i>monis.</i>	512
<i>Dolores ventris post febres ut curandi.</i>	9	<i>Desipientia an ab inanitione.</i>	311
<i>Dolores hypochondriorum sanguine fluente cessant.</i>	10	<i>Diatheſis in morbis manet humoribus eductis.</i>	488
<i>Dysenteria remedia.</i>	38	<i>Defectionis animi examen.</i>	439,
<i>Dentium ſætoris remedia.</i>	41		443
<i>Dolores non cedentes remediis, ſuſpecti ſunt.</i>	71	<i>Dolores vagi ſunt Hypochondriaci.</i>	142
<i>Dysenteria caput cauſa.</i>	63	<i>Deiectiones cruenta non ſunt hydropica.</i>	149, & 153
<i>Dysent. aquarum quid.</i>	270	<i>Deiectiones ſyncere qua.</i>	132
<i>Dysent. ut ſplenicis confert.</i>	267	<i>Deiectiones colliquatiua non ſætent aliquid.</i>	132
<i>Dysenteria ut inappetentia ſuccedit.</i>	268	<i>Dioclis explicata ſententia de Hypochondriacis.</i>	144
<i>Dysent. an astringentia conferunt.</i>	274		
<i>Dysenteria remedia.</i>	<i>ibid.</i>	E	
<i>Dysent. explicatio ex 2. Pror.</i>	277	<i>Eryſipelas pulmonis ut ſit.</i>	512,
<i>Dysent. examen.</i>	270		67
<i>Dysent. ſuppreſſa quid inde.</i>	267	<i>Exanthematon explicatio in hiſt.</i>	
<i>Dyſpnœa an vitio renum.</i>	221	<i>D. Garnier.</i>	330
<i>Dolore ceſſante an cauſa tollitur.</i>	156	<i>Epilepſia remedia.</i>	330
		<i>Epilep. quid. an periculosa & que ſoluatur, qua non.</i>	153
<i>Dieta qua in pleurit. & perip.</i>	175	<i>Extenuationis cauſa explicatur.</i>	173, & 205
<i>Dorsi dolores unde.</i>	548	<i>Epilepſia prægnantibus familiaris.</i>	331
<i>Dysenteria mulieri grauida an mala.</i>	304	<i>Epilepſia cauſa Galeno.</i>	309
<i>Dysenteria duplex Hipp.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Epilepſie examen longum.</i>	330
<i>Deſluxionũ cauſa diſputatur.</i>	558,	<i>Exanthematon examen.</i>	327
<i>& antè.</i>		<i>Eryſipelatis pulmonis cauſa.</i>	70,
<i>Diarrhœa in cauſo cur.</i>	330		312
<i>Diatheſis morborum parens.</i>	553	<i>Epilepticis cur ratiocinatio leditur.</i>	144
<i>Dyſpnœa remedia.</i>	477	<i>Epilepſia cur maniam ſoluat.</i>	122
<i>Delirium an ab oppreſſione cerebri.</i>	312	<i>Eraſiſt. de hydrope opinio.</i>	150
<i>Dolores lumborum unde.</i>	548		
<i>Diabetes in ſuppreſſo ſuccedit.</i>	300		
<i>Deliquia animi in Eryſipelate pul-</i>			

I N D E X.

F

Febriticantes multi caleſcunt
 & rigent ſeſè ſimul. 378
 Febres intermittentes deſinunt in
 dolores colicis ſimiles. 10
 Febres hectica peſtilens ut oria-
 tur. 12
 Febris hectica an perpetuo refri-
 geſcat à cibo. 12
 Febres lenta & ut oriantur. 13. & 29
 Fluor alui vnde, multiplex, 18,
 & 19
 Fluor longus alui non citra caput.
 19, & 166
 Fluor nocturnus quid indicet. 19
 Fluoris alui remedia. 38
 Fluoris in tabidis curatio. 47
 Factoris à dentibus remedia. 41
 Fluor dyſentericus an in grauida
 ſiſtendus. 27
 Febres an ſint magna in interna
 inflammatione. 29, 345, 145
 Febris an hypofarcidion viacere
 debet. 54
 Febres deſinunt in ſoporofos affe-
 ctus. 54, 312
 Febres maligna aliquando non
 ſitim magnam habent. 35
 Febrium malignarum typus. iſid.
 Febris an voluulum ſedar. 80
 Fluor alui hydropico malus. 54
 Febres catarrhoſæ quid afferat. 57
 Febris ſinguliciens que. 58
 Febre hydropi iuncta quid agen-
 dum. 55
 Febris quotidiana ut tractanda

cum aliud febris, aliud materia
 ſuadet. 55
 Febris ſemel anno. 228
 Febris cur quosdam non adoritur.
 227
 Fluor ἀπεραγέτος cur malus. 218
 Febris tertiana an phlebotomiam
 citò requirit. 199
 Febris hectica putris examen. 173
 Febribus in putrid. cur os non fæ-
 tet. 164
 Fluor alui non tollens tumorem
 malus. 218
 Febrium eſſentialium & ſympto-
 maticarum cauſe. 422
 Fluorum alui examen. 258
 Fluor à meſent. & ab inflam. me-
 ſent. 264
 Fluoris meſenterici & hepatici
 diſtinctio. 165
 Factor oris. 160
 de Facultatibus examen. 213
 Febre quartana ceſſante homo ſit
 πικρός. 312
 Febribus continuis cur fluor alui
 iunctus. 530
 Febrium initio terrifica ſymptoma-
 ta. 561
 Febriū epialarum natura. 322, 326
 Febres ſomno aliquando augentur.
 540
 Febris ardens in peripneumo. abit.
 561
 Fluori alui ſyrupus conueniens. 328
 Fluor muliebris. 299, & 351
 Febri quando coma iungitur. 540
 Febres cur non omnes epialæ aut
 horrificæ. 328

INDEX.

- Febres continua habent rigorem & rigorem intermittentes non, & cur.* 530
Facultatis animalis an ratio habenda in acutis. 375
Febres horrida quae. 523
Febris semitertiana. 523
Febris tertiana. 524
Febrium quartanarum focus, causa 364
Febris quartana cum primò præhendit, quid significet. *ibid.*
Feb. quart. quotid. & tertianæ longa disputatio, 361, & sequent.
Felrum à pituita consideratio. 565
Febres cum vertigine. 566
Flatus choleram morbum facit. 288
Febres quæ in vigore coma habent 422
Febris Hypochondrii inflammatis quæ. 545
Febris an sequitur rigorem. 553
Fames quos inuenit. 555
Frigus priuatiuū & positum. 324
Frigus partium extimarum fugax quid. *ibid.*
Fortuna potest in medicina. 477
Febribus in phlegmaticis cor & arteria non habent eundem motum semper. 523
Febrium essentialium & symptomaticarū consideratio. 422, 357
Febribus quibus somnus non proficit. 513
Febrium periodi explicantur. 138
Febris hæctice pulsus. 131
Fernelij opinio de hydropse explosa. 149
In febribus tertianis an paroxysmus euanescent tutus. 138
Febris an est in hypochondriacis. 144
Febrium an periodi ad criticos dies benè comparantur. 138
Febres sine ratione desinentes suspectæ. 139
Febres quartana blandè tractanda. 130
- ## G
- Guajaci decoctum valet etiam in lapidis curatione.* 127
Guajaci decoctum contulit in dolore capitis diuturno etiam à lue non orto. 73
Galenij opinio de morb. complicatis. 163
Galenij opinio de phlebotomia in tertiana, malè intellecta. 199
Gnidiorum reprehensio. 308
Galen. reprehendit Erasistratum qui omnem morbum vlcus & tumorem posuit & non reprehendit Hippocratem. 152
Galenus sui oblitus in causa hydropis. 152
- ## H
- Hysterica affectionis remedium.* 596
Hypochondrij tumoris examen. 24

INDEX.

<i>Hypochondrium quale debet esse.</i>	— dia.	482
<i>ibid.</i>		
<i>Hypochondrij tumores arte curandi.</i>		516, & 517
<i>Hypochondrij dextri dolor quid notet.</i>		25
<i>Hypochondrij dolorem mentitur dolor stomachi.</i>		27
<i>Hydrops succedens aliis morbis malus.</i>		29
<i>Hypochondriaci quid.</i>	142, 62	54
<i>Hydrope febris iuncto quid agendum.</i>		55
<i>Hepar non desinit male habere, etsi nil foris apparet.</i>		51
<i>Hydropis aliis morbis succedentis descriptio.</i>		54
<i>Hydrops corporibus impurgatis succedit.</i>		54
<i>Hydropicus fluente aluo interit,</i>	146, 54	
<i>de Hydrope commentarius.</i>	145	
<i>Hyposaricidios morbus est interimens Hippocrati.</i>	149	
<i>Hydropicis non sunt cruenta deiectiones.</i>	150, & 154	
<i>Hypochond. morbi ut detegendi.</i>	261	
<i>Hypochondrij sani nota.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Hypochondria frustra tentantur.</i>		
<i>ibid.</i>		
<i>Hepatis intemperati nota.</i>	202	
<i>Horror & rigor etiam in febribus continuis, in intermittentibus non.</i>	530	
<i>Hydromel non convenit melancholicis & μελαγχολικῶν.</i>	531	
<i>Hypochondriacæ melanch. reme-</i>		
<i>Hypochondriaci facile palpitant & cur.</i>		516, & 517
<i>Humores falsi & nitrosi qui.</i>	552	
<i>Hysterica affectionis remedia.</i>	381	
<i>Hepar tenditur dulci vino.</i>	533	
<i>de Hypochondriis observationes.</i>	542	
<i>Hippocrates veteres reprehendit de qualitatibus.</i>	308	
<i>Hypochondrij intentio ratio.</i>	541	
<i>Humoribus penè omnibus euacuatis non tollitur morbus.</i>	488	
<i>Hypochondrij dolor curatur.</i>	441	
<i>Hepatis regionis dolor curatur.</i>	<i>ib.</i>	
<i>Horrorum frequentium causa in febribus continuis.</i>	78	
<i>Hypochondrium palpitans quid.</i>	477	
<i>Hypochondr. inflammatis que febres.</i>	545	
<i>Hypochondrij inflammati remedium.</i>	546	
<i>Hypochondriis inflammatis quid agendum.</i>	541	
<i>Hydromelitis vires.</i>	526	
<i>Hydrops à suppressis hæmorrhoidibus.</i>	152	
<i>Hepatis gibbum inter partes superiores.</i>	131	
<i>Humores veneni vim acquirunt.</i>	137	
<i>Hypochondriaca an à phlogosè.</i>	146, 142	
<i>Hepatis remedium opt.</i>	136	
<i>Hydrops à cerebro.</i>	125	
<i>Hypochondriacis vagi dolores.</i>	142	
<i>Hypochondriaci an febricitant.</i>	143	

INDEX.

Hydropici an nullam cruentam evacuationem habent. 152
Hydrops omnis an à scirrho. 149
Hypostaphis quomodo fiat initio febrium acutarum docet Gal. 378

I

I*ntestinatorum dolor situ non percipitur.* 172
Inappetentia dysenteriae succedens. 268
Intestinatorum dolor an maior aut minor prout, vel crassa, vel tenuia laborant. 273
Inappetentiae examen. 267
Intemperies calida appetentiam deicit. *ibid.*
Ischiadis remedia. 474
Ictericum an abundant flatibus & cur. 359, & 516
Icterus duplex. *ibid.*
Iliaca succedit colica. 303
Inequalitatis in febribus causa. 527
Inedia exacta cur singultum non affert. 314
Inflammatiō Hypochondrii ut est tractanda. 541
Inappetentia summa quid. 440

L

L*ixinium pro capite.* 14
Lac asininum calculosis confert. 7
Lacte asinino tuto utimur. 29
Lochiorum suppressio hydropis auctor. 30

Leipethymia an in peripneumoniis frequens. 68, & 512
Lochiorum suppressio quid. 54
Lactis examen. 236
Luna ad epilep. facit. 156
Leienteria an intestinis aut ventriculo fit laeso. 268
Lienose ut dysenteria iuuantur. 267

Leipothymiae examen. 439, & 443
Lateris dolor non negligendus licet non sit pleuritis. 323
Leihargus à pulmone. 322
Lateris doloris ante morbos ratio est habenda in morbis. 323
Lateris dolores pleuritici mentientes. 473
Luis venerea remedia. 464
Lapidem in rene arguit spina inflexio difficilis & lumborum dolor. 548
Lumborum dolores explicantur. *ibid.*
Lastitudinum consideratio. 326, & 546
Leipothymia quae purgationem postulat, quae non. 443
Lateris dolores aliquando Hypochondriaci. 142

M

M*elancholica corpora non valide purganda.* 16
Macilentia corpora non sunt medicamentis agitanda. 29, 4, 377
Macilentia corpora ut sunt purganda. *ibid.*

I N D E X.

<i>Medicamenta valida in iis morborum non danda.</i>	378	<i>Morborum cognoscendorum examen.</i>	162, & 166
<i>Medicamenta leuia sub finem morborum efficacia.</i>	ibid.	<i>Morbi compositi explicatio proposito oculo.</i>	169
<i>Menstruum prouocans.</i>	381	<i>Mulieres cur capite dolent magis.</i>	154
<i>Medicamentis assuescere malum.</i>	230, & 2	<i>Morbus ficcus quid.</i>	175
<i>Medicamenta valida tabescentibus nocua.</i>	4	<i>Mulieres quaedam pregnantibus melius habent.</i>	155
<i>Medicamenta valida diaurosin habentibus valent.</i>	410	<i>Menses mouentia.</i>	381
<i>Morbus longus aut breuis unde.</i>	8	<i>Mulsa dotium obseruatio, vide, Hydromel.</i>	
<i>Melancholia Hypochondriaca.</i>	15	<i>Medicamenta in paroxysmo arthritico nocent.</i>	492
<i>Mulieres grauide à cholera morbo pereunt.</i>	26	<i>Mulierì grauide an fluor alui nocet.</i>	305
<i>Mulierì enixæ siflatus doleat an secanda vena cum eunt lochia?</i>	30	<i>Medicamentorum exhibendorum ratio.</i>	377
<i>Morborum generatio, non est vt adortio.</i>	33	<i>Medicamenta valida non danda iis quibus aluus astricta & ambusta.</i>	ibid.
<i>Morbus à suppressione solemnì vt tractandi.</i>	55	<i>Medicamenta hypnotica queis Janda.</i>	372
<i>Morbus alteri succedens malus.</i>	54	<i>Morbi maligni fiunt deteriores diebus criticis.</i>	540
<i>Mulieres pariendo epilepticantur.</i>	154	<i>Morbi maligni habent potius rxi- cua quam rxiuua.</i>	ibid.
<i>Melancholicis vt pblebotomia ad- ministranda.</i>	203	<i>Metus causa palpitationis.</i>	515
<i>Morbi initio si terrifica symptoma- ta vt curanda.</i>	231, & ante.	<i>Morbis malignis somnus nocet.</i>	540
<i>Morbi connutriti qui.</i>	263	<i>Medicamenta valida non conue- niunt catarrhosis.</i>	539
<i>Mesenterij morbofa affectio qua, 264, &c.</i>		<i>Mulieres decipiuntur in sensu fri- goris in capite.</i>	553
<i>Mens qui egrotet.</i>	216	<i>Morbi qui fiunt deteriores diebus criticis.</i>	527, 525, 324
<i>Morborum implicitorum examen.</i>	166	<i>Morbi si ab vno humore cur datur medicamentum varios humo-</i>	
<i>Morborum simpl. composit. & com- plex. differentia.</i>	171, & 167		
<i>Mesenterij inflammatio alui fluo- ris causa.</i>	265		

I N D E X.

- res purgans.* 528 *Morbi in orgasmo ut curandi.* 129
Morbosi desinunt esse morbofi non
est tutum. 532 *Morbi coctio & preparatio qua. ib.*
Melancholia hypochondrica. 327 *Medicorum error qui & diebus*
Mulier grauide an dysenteria
mala. 302 *criticis, & incoctis humores pur-*
Melancholici qui fiant. 230 *gant,* *ibid.*
Morborum initio cur terrifica sym-
ptomata. 323 *Morbi melancholici an fortiter agi-*
Mola cura. 480 *tandi.* *ibid.*
Mel ut nocet. 535 *Morbus an in ulcere & tumore con-*
Medica ars à calumniis vindica-
tur. 475 *sistit secundum Erasist.* 128
Medicamentū inutile malū affert.
 312 *Mador an conferat.* 189
Morbi cur necessariò aliqui longi.
 476 *Morbi quando blandè tractandi.*
Morbi acuti cum aluo lubrica. 530 129
Motus contra naturam 4. species.
 517 *Medici nil falso debent supponere.*
Morbus generaliter dictus. 478 131
Morbi acuti unde, longi unde. ibi.
Morbi non possunt breuiari licet
velit medicus. 474 *Melancholici & epileptici cur deli-*
Mulierum distinctiones ex Hipp.
 399 *rant.* 144
Morbi manent humoribus etiam
vacuatis. 479 *Mania syrupus conueniens.* 146
Morbis incognitis ut medicamen-
menta adhibenda. 364 *Morbi eadem hora repetentes vali-*
Mulieres biliosa non ferunt phle-
botomiam. 439 *dè tractandi.* 129
Melancholia cereb. & epilep. an
causa eadem. 144
Morbi incipientes cum terrificis
symptomatis unde. 140, 137
Morbus omnis an vlcus. 151
Mania epilepsiam soluit. 125

N

Nephritica remedia. 6, 19,
 120, 121, 255, 256

O

Obstructio ne multum refri-
 geremus impedit. 8, & 14.
Oculorum remedia in metu cæci-
tatis. 39, & 40
Oris fætoris examen. 160, & seq.
Omoplatarum dolores unde, non
enim à catarrho ut creditur. 548
Oculorum morbi per se ipsi sanes-
cunt licet fuerint immedicabi-
les. 474
Oculus puluerulentus quid sit. 552

I N D E X.

Obstractio uehemens febrium symptomaticarum causa. 422

P

Pulmonū inflammatorum nota, curatio. 11

Pulmo febris heëlice sedes non est. 12

Phlegmone interna ne refrigeremus prohibet. *ibid.*

Pulsus intermittens, & deficiens quid. 22

Pulmonum remedia multa. 44

Pituita crassa replens rugas ventriculi aluum fluidam facit. 14

Pulsus grauidarum qualis. 28

Peripneumonia an dextra an sinistra. 69

Pleuritis falsa à cruditate. 60

Peripneumonia pleuritidi succedens an deterior. 80

Paroxysmi symptomata terrificam habent initio. 58

In peripneumonia ut phlebotomia celebranda. 69

Pulmonum affectus an genarum rubore deprehenditur. 66

Phlebotomia ex brachio sinistro in peripneumonia. 80

de Peripneumonia multa. 68

Peripneumonia an à bile, an à phlegmate. *ibid.*

Peripneumonia an exactam querit dietam. 175

Pleuritis an exactam dietam querit. *ibid.*

Phlebotomia an celebranda in ter-

tiana. 199

Phlebotomia an celebranda sanguine insigniter mutato. 202

Phthisicis an lac conferat. 238

Procataërticarum causarum bis. 206, & 546

Pustularum eruptio quid significet. 220

Palmonis natura, nutritio, victus ratio in eius morbis tenenda. 145, & 176

Phlebotomia in magnis doloribus statim usurpanda. 493

Phlebotomia ad leiporby. in palpitatione cordis quando. 515

Phlebotomia ad ventositatē quando. *ibid.*

Phlebotomia etiam aluo fluente. 531, & 545

Phlebotomia quando purgationi praferenda. 492

Pleuritin mētitur lateris dolor. 560

Pleuritis sine sputo. 537, &c.

Pleuritidis consideratio & methodus curandi. 455, &c.

Pleuritidis falsa consideratio. 477

Palpitationis remedia. 518.

Palpitationis status nescio quis causa. 514

Palpitiatio cōtingit loco hemorrhagie in iuuenibus, & menstruorum in virginibus. 514.

Palpitationis cause vere explicantur. 516, & 510.

Partium extimarum mutationes ad cal. & frig. periculosa. 529.

Perepneumonia lethargi speciem inferens. 560.

I N D E X.

- Pulmo innatur dulci vino.* 532
- Pulmonis pruritus.* 538
- Palpitationis causa metus.* 515
- Pulmonis morbos quando rubor genarum comitatur.* 537
- Phlebotomia ratio expenditur.* 455
- Phlebotomia ex opposito latere an facienda.* 456
- Puris excretio cur debilitat.* 430
- Pulsus in Hypochondrio sinistro.* 477
- Pulmonis inflammationis quæ signa.* 512
- Palpitationi cordis an phlebotomia conveniat ad leipothy.* 293
- Palpitationi obnoxij & exorbii, & inter medendum moriuntur ibi.*
- In palpitatione cordis prudenter agendum.* *ibid.*
- Pulsus palpitantis causa.* *ibid.*
- Pulsuum intermissio an mala.* 320
- de Pulsibus disputatio.* *ibid.*
- Phlogmatis nomen bifariam.* 360
- Phlogosis causa diarrhæe in febre.* 530
- Phibitici an evacuatione egeant.* 555
- Pituitosis an potulenta quadrent.* *ibid.*
- Pulsa intermittente etiam vena secta.* 323
- Pulsus in viro.* 498
- Pulsus senum terrificus aliquando, sed frustra.* 322
- Pulsus intermissio senibus & pueris minus formidabilis.* *ibid.*
- Pulsus inequalitas ob affectum stomachi.* 323
- Pulsus inequalitas unde.* 328, 323
- Pulsus non idem aliquando cordis & arteriarum.* 513
- Palpitationi confert Phlebotomia dextra aliquando sinistra aliàs & cur.* *ibid.*
- Puerorum nutriendorum ratio.* 567
- Phlebotomia quibusdam sanguineis facilis, aliis non.* 363
- Pulsus consideratio in febris,* 366, & 363
- Pleuritis humida falso dicta phrenitidis generatio.* 540, & 287
- Pulsuum differentia.* 324
- Phreniticorum oculus pulverulentus.* 552
- Phreniticus primo die factus.* 137
- Partes corporis quæ superiores quæ inferiores.* 130
- Purgatio instituenda diebus paribus.* 129
- Purgatio resiccatis incommoda.* 132
- Paroxysmi frustra abeuntes suspecti.* 136

Q

Quartanis in febris sudor inutilis. 52

Quartana ab adusto humore qualis. *ibid.*

Quartana cura. 73

Quartana desinens citò fecit hominem catalepticum. 491

Quartana desinit factò in totum corpus abscessu. *ibid.*

Quartana cur longe. *ibid.*

Qualitates primæ an sanitatis cause. 308

INDEX.

R

Rigores frequentes vnde. 378
 Renum affectus hereditarij. 5
 Respiratio difficilis quibuscor aret.
 II
 Ractuosus morbus quid. 62
 Rondeletij error de phlebotomia in
 tertiana. 199
 Renibus affectis cur dispnœa. 221
 Rubri fiunt melancholici. 360
 Rhenna idem vrit & refrigerat.
 553
 Rigorem an sequatur febris. *ibid.*
 Rigoris frequens sensio quid signi-
 ficet. 317
 Renum morbi ex Hippocrate. 546
 Respiratio magna desinens ad *Re-*
rumar. 303, & 325
 Rigoris frequentis in continuis fe-
 bribus causa. 521, & 525
 Rubri facie fiunt melancholici. 145
 Rondeletius de febre in Hypochon-
 driaces. *ibid.*
 Rigor initio febrium malignitatis
 est signum in continuis preser-
 tim. 530

S

Somnus immodicus quid fa-
 ciat. 375
 Soporifera an in febribus ardenti-
 bus, & calidis affect. cerebri
 conferunt, & quando. 395, 364
 Siccitas facultatem retentricem
 firmat. 377, & 214

Sectio vena & purgatio non acce-
leranda in morbis autumnii &
hyemis. 377, 378
Sectio vena citò celebrata vires
frangit. 379
Somnus an à sola refrigeratione.
 372
 Saluatio multa Hypochondriacis
 adest. 2, & 142
 Suffitus in catarrhis non proban-
 tur. 3
 Siccitas cordis dyspnœam facit. 15
 Sputum sanguinis curatur. 46
 Soporosi affectus vsu cassia & simi-
 lium. 26
 Sudor in quartanariis succis quare.
 51
 Stranguria cur voluulum affert. 99
 Singultus in febribus senum her-
 nia laborantium. 59, & 306
 Singultus in febre qualis. 57
 Singultiens febris qua. *ibid.*
 Singultus à pressu costæ. 58
 Sputatio multa quid significet. 63,
 & 142
 Suppressio sanguinis inueterata, &
 recens an idem indicet ad phle-
 botomiam. 55
 Siccus morbus quid. 175
 Sanguinis excretio per os quid. 222
 Sanguinis insignis mutatio dissua-
 det phlebotomiam. 202
 Spumose deiectiones vnde. 260
 Spumæ origo vnde. *ibid.*
 Sternutamenti remedia. 381
 Spina difficilis inflectio catarrhū
 non designat, sed aliquando
 calculum. 548

Eccc

INDEX.

<i>Scaligeri opinio de phlebotomia oppositi lateris in pleuritide.</i>	456
<i>Singultus à tumore & pressu hepatis.</i>	466
<i>Sicca pleuritis.</i>	537, &c.
<i>Somni explicatio longa.</i>	376
<i>Somniferorum medicamentorum ratio & usus.</i>	ibid.
<i>Symptomata terrifica initio morborum.</i>	158
<i>Sternutamenti causa.</i>	309
<i>Somni incomoda in febris.</i>	560,
& 539	
<i>Sputa saluginosa quid faciant.</i>	556
<i>Sanguis extra vasa an suppuret.</i>	499
<i>Singultus & vomitus distinctio.</i>	310
<i>Singultus cur non fit in inedia.</i>	314
<i>Spondylorum cervicis affectio ad manus pertinet.</i>	548
<i>Sitis remedia.</i>	329
<i>Spinae dorsii dolores.</i>	548
<i>Singultus ab inflammatione ventric. cerebri & meningum.</i>	310
<i>Somnus quid faciat.</i>	539
<i>Seri maligni vis.</i>	549
<i>Sanguineorum quidam ferunt phlebotomiam alij non.</i>	361
<i>Somnus cur nocet & non.</i>	59
<i>de Somno locus Hipp. præclar. ibid.</i>	
<i>Spirituum interceptio quid.</i>	542
<i>Singultus causa.</i>	306
<i>Sudor initio morborum quid.</i>	139
<i>Syncera deiectiones quæ.</i>	135
<i>Sudor multus ex somno quid.</i>	139
<i>Sudor particularis an malus.</i>	140

T

T <i>Abescentis curatio.</i>	4, 44,
45, 46, 47	
<i>Tussis splenicis propria, & malè à catarrho esse putatur.</i>	15
<i>Tussis remedia multa.</i>	43
<i>Tabes an morbus hereditarius & contagiosus.</i>	42, & 43
<i>Tabescentis fluoris alui curatio.</i>	47
<i>Tussis ut fiat.</i>	43
<i>Tussis initio paroxysmorum.</i>	57
<i>Temperies si vna cur tot actiones.</i>	213
<i>Thermintorum eruptio.</i>	507, & 327
<i>Thoracica remedia.</i>	42, & sequ.
<i>Tibiarum dolores sedantur.</i>	443
<i>Tympanites unde.</i>	516
<i>Tabidi & hecici cur non singulatiunt.</i>	515
<i>Tremor cordis.</i>	510
<i>Tabis causa.</i>	551
<i>Tabes dorsalis.</i>	ibid.
<i>Tabidorum oculus puluerulentus.</i>	552

V

V <i>Vigilia immodica quid faciant.</i>	374
<i>Vigilia cur fiant, & in quibus.</i>	375
<i>Venter ambustus, venter ardens, & siccus.</i>	94, & 376
<i>Vterini fluoris remedia.</i>	380
<i>Vnguentum ad renum & spinæ ardorem.</i>	ibid.


I N D E X.

<i>Vnguentum ad lienem.</i>	73, & 380	<i>examen.</i>	175
<i>Ventriculo conferentes pilule.</i>	3	<i>Vomere improprie dictum.</i>	224
<i>Urina nigra non semper mala.</i>	6	<i>Vteri carcinoma curatur.</i>	476
<i>Voluulus multiplex.</i>	9	<i>Urinarum aquearum considera- tio.</i>	363
<i>Ventris dolorem sedatiuum.</i>	23	<i>Urinarum oleosarum consideratio.</i>	328
<i>Vermes aluum fluidam faciunt.</i>	19	<i>Urina cum sunt tenues non pur- gandum.</i>	437
<i>Venenum ut in nobis generetur.</i>	35, & 36	<i>Urinae crassae & tenues quid agen- dum suadent.</i>	563
<i>Urina nephriticorum insida.</i>	26	<i>Urinae crassa purgationem suadent.</i>	561
<i>Voluulus multiplex.</i>	81	<i>Vteri fluor.</i>	379
<i>In voluula clysteres Hippocrates dat nouo modo.</i>	ibid.	<i>Ventriculi confirmandi ratio.</i>	478
<i>Voluulo liberatis mali morbi acci- dunt Mesueo.</i>	80	<i>Vomitus & singultus differentia.</i>	310
<i>In voluulo an vomitus pessimus.</i>	78	<i>Virgines decolores palpitant.</i>	516
<i>de Voluulo multa.</i>	77	<i>Vtero inflammato quae secanda ve- na.</i>	472
<i>Voluulus an febre sedatur.</i>	99	<i>Vini dulcis dotes.</i>	532
<i>de Vermibus multa.</i>	74, & 75	<i>Vinum dulce pulmone confert non hepati.</i>	533
<i>Ventriculi morbi explicantur.</i>	60, & 129	<i>Vteri pulsatio.</i>	498
<i>Vinum in febre an dandum.</i>	54	<i>Vertigo in febris.</i>	565
<i>Urinae suppressio initio morborum vnde.</i>	231	<i>Veterum error de hono habita.</i>	565
<i>Ventris dolores ex situ non parent.</i>	271, & 273	<i>Vacuatio an phthisicis conueniat.</i>	555
<i>Urinis coctis an mors sequitur.</i>	204	<i>Urina mala aliquando ad bonum apparet.</i>	418
<i>de Urinae coctis ad bonum appare- tibus Galeni explicatio.</i>	ibid.	<i>Vterinus fluor.</i>	351, & 300
<i>Ventriculi sideratio vnde.</i>	199	<i>Visus imbecilli cura.</i>	473
<i>Vomitionis diuturnae causa.</i>	198	<i>Ventriculi oppressio ab hepate an singultus causa.</i>	313
<i>Vena arteriosae examen, &c.</i>	190	<i>Vterus an ex alto trahit.</i>	352
<i>Urinae suppressio an sit obstructo vno rene.</i>	253	<i>Vterus an causa fluoris muliebris.</i>	352
<i>Ventris eleuatio aluo fluente mala.</i>	217		
<i>Victus rationis in morbis acutis</i>			

INDEX.

<i>Vomitus an cruentus hydropicis.</i>	<i>chondriaca sedes.</i>	142
153	<i>Urina aquea in bilioso corpore</i>	136
<i>Urina tenues suspecta.</i>	<i>quid.</i>	129
136	<i>Vomitus commoda.</i>	
<i>Ventricul. an melanch. Hypo-</i>		

FINIS.




INDEX

VOCVM GRÆCARVM

memoratu dignarum quæ in hoc opere
continentur numerus paginam
designat.

A

 πειπόν & ὀμών differunt.

374

Ατμῶδες πείησμα. *ibid.*

Α' ἄρον. 433, & 274

Αδρός. *ibid.*

Αυχμός. 269, & 292

Αυχμός cum humore, sine humore.

270

Άχρσα. 289

Απιπόν & ὀμών, an idem quod ξενόν,

270, & 271

Αιματος πύσος. 46

Αισίτις & ἀποισίτις διαφορά. 267

Αδριπών quid. 535

Άλμυρι σάμα. 552

Απόλησις ἢ πυρμάτων. 542

Ανομαλία, propria febr. putrid. 321

Αδ' εστίως π'. 129

spirationi quid. 302, & 325

Βεαχάγνοια, unde & δύσπνοια. 558

Γ

Γλώσσα πειπνεομαγική. 288

Γειθόμασιον ἄληγμα. 356

Γνώμηπ. 216

Δ

Διάθεσις ἐρυσιπυλατώδης λεηπυείας πα-
rit. 297

Διάνοια π. 216

Διάχυσις. 553

Διαφθορά quid. 490

Διοίρειν quid. 540

E

Εοδότης quid: item ἐψιμένον. 374

Εκκασις soluit maniam. 298

& 125

B

Βή & θυμός. 537

Βεαχάγνοια succedens magna re-

INDEX.

Ἐπιφουσις ὀρθώδης. 283, & 284
 Ἐπιπασασις. ibid.
 Ἐπι καὶ ὀπιφύδασι. 283
 Εἰλεός sumptum generalius. 298
 Ἐφουός quid. 299
 Ἐπίστασις ἀδρόα. 274
 Ἐκρουσις quid. 22
 Εκρωσμοός. ibid.
 Ἐύχουσι an malum signum. 64, 361,

521, & 537
 Ἐμείνη καταχρηστικώς. 224
 Ἐπιγίνεσθαι π. 266
 Ἐξ ἑμέτα quid significet. 310
 Ἐπισημασία ἀδελπός. 530
 Ἐκλυσις quid. 443, & anté.
 Εκχύμωσις καὶ ἑγχύμωσις differunt. 501
 verbi ἐνείη, vis. 498
 Ἐπιπερσύνεσθαι quid. 320, & 321
 Ἐξέρουδροι quid. 361
 Ἐξέρουδροι cur melanch., 146

Z

H

Θ

Θερμὸν π. 211
 Θάσις καὶ θμερώδης vis. 537
 Θείην frustra in morbis vsurpatur. 321
 Θλίψις & ἀνωμαλία in pulsibus. ibid.

I

Ιαγόν. 289
 Ιαγάρ π. 270

K

Καύσις. 295
 Καύσις καὶ λεπτείας διαφορῶς. 299
 Κόπος. 326
 καρδιωδὲς sumitur aliter apud Gal. in
 Aphorismis. 512
 Κείσις καὶ λύσις διαφορῶς. 138

Λαρυξ. 291, & 290
 Λεπτείας. 295, & 296
 Λεπτείας καὶ λυσις. 298
 Λύειν quid. 296
 Λύσις καὶ κρίσις differentia. 478

M

Μαίαν soluit ἕκτασις. 298, & 125
 Μεγαλοπλάσχει quid. 563

N

Ναρκατικῶς, an in febris con-
 ferant. 375, & 377
 Νόσημα ξηρόν. 282, & 269
 Νύσος Κύντοςφωρος. 478

Ξ

Ξηρόν quid. 281
 Ξηρός νεύσις, an idem quod ὄμιος
 καὶ ἀπύσιος. 287
 Ξηρότη πολλὴ ἄνγιναν parit. 282
 Ξηροφθαλμία. 286
 Ξηροσία. 288
 Ξηροχίνα fictum verbum. 292

O

Οφθαλμία ξηρά. 282
 Οφθαλμία φθιώδης. 281, & 283
 Οφθαλμία ὑγρά. 281, & 283
 Οφθαλμία ροώδης. 280
 Οφθαλμία ξηρὰ bifariam. 283
 Οξυρεμία in fluoribus alui. 14

Π

Περίκλυσις ξέρουδροι. 264, & 271
 Πιλαδύρα. 286

INDEX.

τὰ Πολλὰ π.	207	Συνηξίς.	553
Πρόσας quid.	206	Συνηξίδα, corpus quid sit.	439
Παροξυσμῶν nomen an ad febres intermittentes pertinet.	530	T	
Ποιά κρείσις.	308		
Παλιῶν ἰσχυροτέρων.	478	T Ελευταῖν π.	132, & 211
Παλιῶν κτῆσεων, differentia.	510	T Τύφου species.	322
P		T	
P ρῶτον γυναικείον.	21, 301, & 351	Y ωνος ὀπτηθενδεῖς.	374
Ρευματικὴ διάθεσις.	260	Υπνωτικὰ quando conferant.	375,
Ρῆσιν cura.	480	376, & 38.	
Ρῆσιν γυναικείων balnea.	556	Υγρῶν.	287
R		Υγρῶν.	288
		Υπερβολοῦσιν ἐν ξηρῶν.	282
Σ ΥΝΟΛΗ.	288	Φ	
Συνάλη, Συναληκτὸν πάθημα,	288,	Φ Αῖμα.	291
& 281		Φθίνουσα ὀφθαλμία, vide ὀφθαλμία.	
Συναληκτὸν γογγύσιον.	282	Φθίσις ὀφθαλμοῦ.	289
περὶ Συναληκτῶν.	281, 282, 283, & 284	Φθίσις ἀσθενῶν π.	216
Σπυροτόμα μετὰ πνευμάτιος. quid.	64	Φθίνον π.	205
Συνασφραδῶν quid.	155	X	
Σπατλή quid.	532	X Ολίγα humida & sicca. 287, & 288	
Συστάσις & κινήσις causa.	540	X Χολέρα λεπυρία λυφ. 293, 294, & 298	
Σπαδὸν quid.	502	Ψ	
Συστροφὴ ad Hypochondrium.	542	Ψευδοφθαλμία.	289
Σφύσιν nomen quid Hippocr.	496		

F I N I S.

